



国产保健食品备案凭证

产品名称	三精牌多种B族维生素口服液(甜橙味)
备案人	哈药集团三精制药有限公司
备案人地址	哈尔滨经开区南岗集中区衡山路76号
备案结论	按照《中华人民共和国食品安全法》《保健食品注册与备案管理办法》等法律、规章的规定，予以备案。
备案号	食健备G202223003248
附件	1 产品说明书；2 产品技术要求
备注	

2022年12月16日





附件1

保健食品产品说明书

食健备G202223003248

三精牌多种B族维生素口服液(甜橙味)

【原料】烟酸, 盐酸吡哆醇, 核黄素-5'-磷酸钠, 盐酸硫胺素

【辅料】纯化水, 三氯蔗糖, 甜橙香精

【功效成分及含量】每支含: 维生素B₁ 0.31mg、维生素B₂ 0.31mg、维生素B₆ 0.31mg、烟酸 2.2mg

【适宜人群】需要补充多种B族维生素的1-17岁人群及成人、孕妇、乳母

【不适宜人群】1岁以下人群

【保健功能】补充多种B族维生素

【食用量及食用方法】1-3岁:每日1次, 每次1支, 4-10岁:每日2次, 每次1支, 11-17岁:每日3次, 每次1支, 成人:每日3次, 每次1支, 孕妇:每日3次, 每次1支, 乳母:每日3次, 每次1支, 食用方法: 饭后食用

【规格】10 mL/支

【贮藏方法】遮光、密封、置常温(10-30℃)通风干燥处保存。

【保质期】24个月

【注意事项】本品不能代替药物。适宜人群外的人群不推荐食用本产品。不宜超过推荐量或与同类营养素同时食用

本品为无糖型产品。使用时需注意吸管插入方式, 如产生胶塞落屑, 慎用





附件2

保健食品产品技术要求

食健备G202223003248

三精牌多种B族维生素口服液(甜橙味)

- 【原料】烟酸, 盐酸吡哆醇, 核黄素-5’-磷酸钠, 盐酸硫胺素
- 【辅料】纯化水, 三氯蔗糖, 甜橙香精
- 【生产工艺】本品经溶解、配制、过滤、灌装、湿热灭菌（105℃±5℃）、包装等主要工艺加工制成。
- 【直接接触产品包装材料的种类、名称及标准】
- 钠钙玻璃管制口服液体瓶应符合《钠钙玻璃管制口服液体瓶》（Q/HYSD 02）的企业标准。
- 【感官要求】应符合表1的规定。

表 1 感官要求

项 目	指 标
色 泽	淡黄绿色至黄绿色
滋味、气味	具有本品特有的滋味、气味，无异味
状 态	液体；无正常视力可见外来异物

【鉴别】

无

【理化指标】应符合表2的规定。

表2 理化指标

项 目	指 标	检测方法
铅（以 Pb计），mg/kg	≤0.02	GB 5009.12
总砷（以 As计），mg/kg	≤0.3	GB 5009.11
PH 值	2.5~5.5	GB 8538





可溶性固形物，%	≥ 0	GB/T 12143
总汞（以 Hg计），mg/kg	≤ 0.02	GB 5009.17

【微生物指标】应符合表3的规定。

表3 微生物指标

项 目	指 标	检测方法
菌落总数，CFU/ml	< 1000	GB 4789.2
大肠菌群，MPN/ml	≤ 0.43	GB 4789.3 MPN 计数法
霉菌和酵母，CFU/ml	≤ 50	GB 4789.15
金黄色葡萄球菌	$\leq 0/25\text{ml}$	GB 4789.10
沙门氏菌	$\leq 0/25\text{ml}$	GB 4789.4

【功效成分或标志性成分指标】应符合表4的规定。

表4 功效成分或标志性成分指标

项 目	指 标	检测方法
每支含 维生素B ₁ （以硫胺素计）	0.25-0.56mg	见附录
每支含 维生素B ₂ （以核黄素计）	0.25-0.56mg	见附录
每支含 维生素B ₆ （以吡哆醇计）	0.25-0.56mg	见附录
每支含 烟酸（以烟酸计）	1.76-3.96mg	见附录

附录：

1、维生素B₁（盐酸硫胺素）的含量测定

1.1 试剂

除非另有说明，在分析中所用的水为GB/T 6682-2008中规定的一级水。

1.1.1 乙腈：色谱纯。

1.1.2 磷酸：分析纯。

1.1.3 硫酸月桂酯钠：高效液相色谱用试剂。

1.1.4 标准溶液：取盐酸硫胺素标准品适量，用水溶解并稀释制成每1ml约含20 μg的溶液。

1.2 仪器





1.2.1 高效液相色谱仪：附紫外检测器。

1.3 分析步骤

1.3.1 试样处理：精密量取5mL样品置于10mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀，经0.45 μm滤膜过滤后待进样。

1.3.2 色谱条件

1.3.2.1 色谱柱：Agilent ZORBAX SB-C18 (4.6mm×250mm, 5 μm)或效能相当的色谱柱。

1.3.2.2 柱温：30℃。

1.3.2.3 检测波长：260nm。

1.3.2.4 流动相：硫酸月桂酯钠溶液（5g→530mL）+乙腈+磷酸=530+470+1。

1.3.2.5 流速：1mL/min。

1.3.2.6 进样量：10 μL。

1.4 结果计算

$$X = \frac{A1 \times C \times V \times 10}{A2 \times m \times 1000}$$

式中：

X 一样品中盐酸硫胺素的含量，单位为mg/支；

A1—试样峰面积；

C 一标准溶液浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V 一试样定容体积，单位为毫升（mL）；

A2 一标准溶液峰面积；

m 一试样量，单位为毫升（mL）。

注：试样中测定的盐酸硫胺素含量乘以换算系数0.892，即得硫胺素的含量。

1.5 精密度

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算数平均值的10%。

2、维生素B₂的含量测定





2.1 试剂和材料

除非另有说明，在分析中所用的水为GB/T 6682-2008中规定的三级水。

2.2 仪器和设备

2.2.1 分光光度计

2.3 分析步骤

避光操作。精密量取25ml样品置于50ml容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀，作为试样溶液。以水作空白，用光程为1cm的比色杯，在444nm波长处测定试样溶液的吸光度。核黄素的吸光系数（1629164434766056751.jpg）以328计。

2.4 结果计算

$$A \times 50 / 25 \times 1000 \times 10$$

$$\text{样品中核黄素含量 (mg/支)} = \frac{\text{—————}}{328 \times 100}$$

实验结果以平行测定结果的算术平均值为准。在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值与算术平均值的比值不大于1.0%。

3、维生素B₆（盐酸吡哆醇）的含量测定

3.1 试剂

除非另有说明，在分析中所用的水为GB/T 6682-2008中规定的一级水。

3.1.1 乙腈：色谱纯。

3.1.2 磷酸：分析纯。

3.1.3 癸烷磺酸钠：高效液相色谱用试剂。

3.1.4 标准溶液：取盐酸吡哆醇标准品适量，用水溶解并稀释制成每1ml约含10 μg的溶液。

3.2 仪器

3.2.1 高效液相色谱仪：附紫外检测器。

3.3 分析步骤

3.3.1 试样处理：精密量取10mL样品置于50mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀，经0.45 μm滤膜过滤后待进样。

3.3.2 色谱条件

3.3.2.1 色谱柱：Agilent ZORBAX SB-C18 (4.6mm×250mm, 5 μm)或效能相当的色谱柱。





3.3.2.2 柱温：30℃。

3.3.2.3 检测波长：280nm。

3.3.2.4 流动相：癸烷磺酸钠溶液（1.22g→850mL）+乙腈+磷酸=850+150+1。

3.3.2.5 流速：1mL/min。

3.3.2.6 进样量：10 μL。

3.4 结果计算

$$X = \frac{A1 \times C \times V \times 10}{A2 \times m \times 1000}$$

式中：

X 一样品中盐酸吡哆醇的含量，单位为mg/支；

A1—试样峰面积；

C 一标准溶液浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V 一试样定容体积，单位为毫升（mL）；

A2 一标准溶液峰面积；

m 一试样量，单位为毫升（mL）。

注：试样中测定的盐酸吡哆醇含量乘以换算系数0.823，即得吡哆醇的含量。

3.5 精密度

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算数平均值的10%。

4、烟酸的含量测定

4.1 试剂

除非另有说明，在分析中所用的水为GB/T 6682-2008中规定的一级水。

4.1.1 乙腈：色谱纯。

4.1.2 磷酸：分析纯。

4.1.3 癸烷磺酸钠：高效液相色谱用试剂。

4.1.4 标准溶液：取烟酸标准品适量，用水溶解并稀释制成每1ml约含50 μg的溶液。

4.2 仪器





4.2.1 高效液相色谱仪：附紫外检测器。

4.3 分析步骤

4.3.1 试样处理：精密量取10mL样品置于50mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀，经0.45 μm滤膜过滤后待进样。

4.3.2 色谱条件

4.3.2.1 色谱柱：Agilent ZORBAX SB-C18 (4.6mm×250mm, 5 μm)或效能相当的色谱柱。

4.3.2.2 柱温：30℃。

4.3.2.3 检测波长：280nm。

4.3.2.4 流动相：癸烷磺酸钠溶液（1.22g→850mL）+乙腈+磷酸=850+150+1。

4.3.2.5 流速：1mL/min。

4.3.2.6 进样量：10 μL。

4.4 结果计算

$$X = \frac{A1 \times C \times V \times 10}{A2 \times m \times 1000}$$

式中：

X 一样品中烟酸的含量，单位为mg/支；

A1—试样峰面积；

C 一标准溶液浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V 一试样定容体积，单位为毫升（mL）；

A2 一标准溶液峰面积；

m 一试样量，单位为毫升（mL）。

4.5 精密度

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算数平均值的10%。

【装量指标】

应符合现行《中华人民共和国药典》中“制剂通则”项下“口服溶液剂 口服混悬剂 口服乳剂”装量的规定。

【原辅料质量要求】





- 1、盐酸硫胺素：应符合GB 14751 《食品安全国家标准 食品添加剂 维生素B1（盐酸硫胺）》的规定
- 2、核黄素-5'-磷酸钠：应符合GB 28301 《食品安全国家标准 食品添加剂 核黄素5'-磷酸钠》的规定
- 3、盐酸吡哆醇：应符合GB 14753 《食品安全国家标准 食品添加剂 维生素B6（盐酸吡哆醇）》的规定
- 4、烟酸：应符合GB 14757 《食品安全国家标准 食品添加剂 烟酸》的规定
- 5、三氯蔗糖：应符合GB 25531 《食品安全国家标准 食品添加剂 三氯蔗糖》的规定
- 6、甜橙香精：应符合《食品用香精》（GB 30616）的规定
- 7、纯化水：应符合现行《中华人民共和国药典》的规定

