



MC001

哺育用量建议表

月龄	每日哺育次数		每次哺育量	
	奶量(次)	其他辅食(次)	温开水量(毫升)	奶量(毫升)
第一周	7	----	60	2
第二周	6	----	90	3
第三、四周	5	----	120	4
第二个月	5	----	150	5
第三个月	5	----	180	6
第四个月	5	----	210	7
第五、六个月	4	1	210	7

*注:每平匙约为4.5克(g)。

贮藏方法

本产品应贮藏于阴凉干燥处,勿放入冰箱内,每次食用后请及时将盖子盖紧,开罐后请尽快食用。

注意事项

如果发现婴幼儿食用配方奶粉后,出现任何过敏反应,应立即停止食用该奶粉,去医院检查,听从医生的建议。

咨询热线:
400-998-5897

WWW.dqlyrp.com

营养成分表

项目	单位	每100g	每100kJ
能量	kJ	2079	100
蛋白质	g	11.19	0.54
脂肪	g	24.90	1.20
亚油酸	g	2.71	0.13
α -亚油酸	mg	320	15
碳水化合物	g	56.5	2.7
维生素			
维生素A	$\mu\text{g RE}$	384	18
维生素D	μg	12.48	0.60
维生素E	$\text{mg } \alpha\text{-TE}$	3.20	0.15
维生素K ₁	μg	27.70	1.33
维生素B ₁	μg	384	18
维生素B ₂	μg	512	25
维生素B ₆	μg	226.0	10.9
维生素B ₁₂	μg	0.682	0.033
烟酸(烟酰胺)	μg	2495	120
叶酸	μg	77.0	3.7
泛酸	μg	2558	123
维生素C	mg	68.2	3.3
生物素	μg	10.70	0.51
胆碱	mg	124.8	6.0
矿物质			
钠	mg	188	9
钾	mg	458	22
铜	μg	372.1	17.9
镁	mg	32.0	1.5
铁	mg	2.77	0.13
锌	mg	3.20	0.15
锰	μg	32.00	1.54
钙	mg	320	15
磷	mg	171	8
氯	μg	93.6	4.5
硒	mg	320	15
碘	μg	18.72	0.90
可选择成分			
低聚半乳糖	mg	185.5	8.9
低聚果糖	mg	730.8	35.2
1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	g	3.89	0.19
核苷酸	mg	18.7	0.9

鸣翠安旭贝儿
婴儿配方奶粉
(0-6月龄,1段)

1段

净含量: 800g

注册号: 国食注字YP20170666



配料表

脱盐乳清粉、食用植物调和油(玉米油、菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、脱脂乳粉、1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、乳糖、乳清蛋白粉、低聚果糖(FOS)、低聚半乳糖(GOS)、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、食品添加剂:磷脂。

维生素: 醋酸视黄醇、胆钙化醇、dl- α -醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、氯化胆碱。

矿物质: 柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠。

冲调方法



1、将奶瓶、奶嘴及奶瓶环盖洗净,使用前用沸水煮至少5分钟。



2、将饮用水煮沸5分钟,然后参照哺育用量建议表,准备所需的水量及奶粉量。



3、待水冷却至约50°C(温开水),将正确水量倒入消毒过的奶瓶中,盖紧奶瓶备用。



4、请使用附赠量勺,依照哺育用量建议表加入准确份量的奶粉,量取奶粉时请轻压平实,与勺沿齐。



5、盖紧奶瓶,轻轻晃动奶瓶直至完全溶解为止,确认奶温凉到适宜的温度(体温左右)再喂哺给宝宝。

特别提示: 本产品含有乳蛋白质和乳糖,乳过敏和乳糖不耐者慎用或遵医嘱。冲调好的奶液最好一次性食用完,不要给宝宝喂剩奶,哺喂时应抱着宝宝,以免宝宝呛咳。

重要声明: 对于0~6月龄的婴儿最理想的食物是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

执行标准: GB 10765-2021

产品属性及类别: 乳基粉类婴儿配方食品

制造商: 大庆市绿叶乳品有限公司

生产地址: 大庆市红岗区杏六路

产地: 黑龙江省大庆市

电话: 0459-6800678

生产许可证编号: SC12923060500036

保质期: 24个月

生产日期: (年/月/日) 示于罐底

想了解更多产品信息及资料请查询: <http://www.dqlyrp.com>

6 922182 1131911



MC002

哺育用量建议表

月龄	每日喂奶次数	每次喂奶量	
		温开水量(毫升)	奶粉量(平匙)
6-8个月	5	240	8
8-12个月	4	270	9

*注:每平匙约为4.5克(g)。

贮藏方法

本产品应贮藏于阴凉干燥处,勿放入冰箱内,每次食用后请及时将盖子盖紧,开罐后请尽快食用。

注意事项

如果发现婴幼儿食用配方奶粉后,出现任何过敏反应,应立即停止食用该奶粉,去医院检查,听从医生的建议。

咨询热线:
400-998-5897

WWW.dqlyrp.com

营养成分表

项目	单位	每100g	每100kJ
能量	kJ	1999	100
蛋白质	g	12.34	0.62
脂肪	g	20.91	1.05
亚油酸	g	2.60	0.13
α -亚麻酸	mg	300	15
碳水化合物	g	59.3	3.0
维生素			
维生素A	μ g RE	457	23
维生素D	μ g	11.95	0.60
维生素E	mg α -TE	3.78	0.19
维生素K ₁	μ g	23.89	1.20
维生素B ₁	μ g	360	18
维生素B ₂	μ g	480	24
维生素B ₆	μ g	278.0	13.9
维生素B ₁₂	μ g	0.990	0.050
烟酸(烟酰胺)	μ g	2742	137
叶酸	μ g	60.0	3.0
泛酸	μ g	2400	120
维生素C	mg	60.0	3.0
生物素	μ g	9.90	0.50
胆碱	mg	120.0	6.0
矿物质			
钠	mg	139	7
钾	mg	457	23
铜	μ g	230.0	11.5
镁	mg	35.8	1.8
铁	mg	6.36	0.32
锌	mg	2.99	0.15
锰	μ g	12.00	0.60
钙	mg	397	20
磷	mg	230	12
碘	μ g	90.0	4.5
氯	mg	298	15
硒	μ g	12.00	0.60
食品添加剂			
低聚半乳糖	mg	184.9	9.2
低聚果糖	mg	730.8	36.6
1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	g	2.98	0.15
核苷酸	mg	19.9	1.0

鸣翠安旭贝儿 较大婴儿配方奶粉 (6-12月龄,2段)



净含量: 800g

注册号: 国食注字YP20170667

配料表

脱盐乳清粉、脱脂乳粉、食用植物调和油(玉米油、菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、乳糖、1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、低聚果糖(FOS)、低聚半乳糖(GOS)、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、食品添加剂:磷脂。

维生素: 醋酸视黄醇、胆钙化醇、dl- α -醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、氯化胆碱。

矿物质: 柠檬酸钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钾、磷酸三钙、磷酸钾、亚硒酸钠。

冲调方法



- 1、将奶瓶、奶嘴及奶瓶环差5分钟,然后参照哺育用量建议表,用沸水至少5分钟。
- 2、将饮用水煮沸5分钟,然后参照哺育用量建议表,准备所需的水量及奶粉量。
- 3、待水冷却至约50°C(温开水),将正确水量倒入消毒过的奶瓶中,盖紧奶瓶备用。
- 4、请使用附赠量勺,依照哺育用量建议表加入准确份量的奶粉,量取奶粉时请轻压平实,与勺沿齐。
- 5、盖紧奶瓶,轻轻晃动奶瓶直至完全溶解为止;确认奶温凉到适宜的温度(体温左右)再喂哺给宝宝。

特别提示: 本产品含有乳蛋白质和乳糖,乳过敏和乳糖不耐者慎用或遵医嘱,冲调好的奶液最好一次性食用完,不要给宝宝喂剩奶,喂时应抱着宝宝,以免宝宝呛咳。

重要声明: 6~12月龄的较大婴儿食用本产品时,须配合添加辅助食品。

执行标准: GB 10766-2021

产品属性及类别: 乳基粉状较大婴儿配方食品

制造商: 大庆市绿叶乳品有限公司

生产地址: 大庆市红岗区杏六路

产地: 黑龙江省大庆市

电话: 0459-6800678

生产许可证编号: SC12923060500036

保质期: 24个月

生产日期: (年/月/日) 示于罐底

想了解更多产品信息及资料请查询: <http://www.dqlyrp.com>

6 922182 131928



MC003

哺育用量建议表

月龄	每日喂奶次数	每次喂奶量	
		温开水量(毫升)	奶粉量(平匙)
12-36个月	2-3	240	8

*注:每平匙约为4.5克(g)。

贮藏方法

本产品应贮藏于阴凉干燥处,勿放入冰箱内,每次食用后请及时将盖子盖紧,开罐后请尽快食用。

注意事项

如果发现婴幼儿食用配方奶粉后,出现任何过敏反应,应立即停止食用该奶粉,去医院检查,听从医生的建议。

咨询热线:
400-998-5897

WWW.DQLYRP.COM

营养成分表

项目	单位	每100g	每100kJ
能量	kJ	2000	100
蛋白质	g	13.61	0.68
脂肪	g	20.93	1.05
亚油酸	g	2.60	0.13
α -亚麻酸	mg	300	15
碳水化合物	g	58.1	2.9
维生素			
维生素A	$\mu\text{g RE}$	449	22
维生素D	μg	12.00	0.60
维生素E	$\text{mg } \alpha\text{-TE}$	3.71	0.19
维生素K ₁	μg	24.00	1.20
维生素B ₁	μg	360	18
维生素B ₂	μg	480	24
维生素B ₆	μg	274.0	13.7
维生素B ₁₂	μg	0.980	0.049
烟酸(烟酰胺)	μg	2696	135
叶酸	μg	60.0	3.0
泛酸	μg	2400	120
维生素C	mg	60.0	3.0
生物素	μg	9.80	0.49
矿物质			
钠	mg	137	7
钾	mg	449	22
铜	μg	176.0	8.8
铁	mg	35.2	1.8
锌	mg	6.25	0.31
钙	mg	2.60	0.13
磷	mg	391	20
碘	μg	230	12
氯	μg	35.2	1.8
硒	mg	293	15
可溶性成分			
低聚半乳糖	mg	179.0	9.0
低聚果糖	mg	730.8	36.5
1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	g	2.93	0.15
核苷酸	mg	19.9	1.0

鸣翠安旭贝儿 幼儿配方奶粉 (12-36月龄,3段)

3 段

净含量: 800g

注册号: 国食注字YP20170668



配料表

脱盐乳清粉、脱脂乳粉、食用植物调和油(玉米油、菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、乳糖、1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、低聚果糖(FOS)、低聚半乳糖(GOS)、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、食品添加剂:磷脂。

维生素: 维生素A、维生素D、维生素E、维生素K₁、维生素B₁、维生素B₂、维生素B₆、维生素B₁₂、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸、生物素、维生素C、维生素E、维生素K₁、维生素B₁、维生素B₂、维生素B₆、维生素B₁₂、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸、生物素。

矿物质: 柠檬酸钾、硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、碳酸钙、碘酸钾。

冲调方法



- 1、将奶瓶、奶嘴及奶瓶环盖洗净,使用前用沸水煮至少5分钟。
- 2、将饮用水煮沸5分钟,然后参照哺育用量建议表,准备所需的水量及奶粉量。
- 3、待水冷却至约50°C(温开水),将正确水量倒入消毒过的奶瓶中,盖紧奶瓶备用。
- 4、请使用附赠量勺,依照哺育用量建议表加入准确份量的奶粉,量取奶粉时请轻压平实,与勺沿齐。
- 5、盖紧奶瓶,轻轻晃动奶瓶直至完全溶解为止,确认奶液冷却到适宜的温度(体温左右)再喂给宝宝。

特别提示:本产品含有乳蛋白质和乳糖,乳过敏和乳糖不耐者慎用或遵医嘱,冲调好的奶液最好一次性食用完,不要给宝宝哺喂剩奶,哺喂时应抱着宝宝,以免宝宝呛咳。

执行标准:GB 10767-2021

产品属性及类别:乳基粉状幼儿配方食品

制造商:大庆市绿叶乳品有限公司

生产地址:大庆市红岗区杏六路

产地:黑龙江省大庆市

电话:0459-6800678

生产许可证编号:SC12923060500036

保质期:24个月

生产日期:(年/月/日)示于罐底

想了解更多产品信息及资料请查询:http://www.dqlyrp.com



6 922182 131935