

序号1:

谱力纳 | 婴儿配方羊奶粉(0~6月龄,1段)

配料表

脱盐羊乳清粉、全脂羊奶粉、食用植物调和油(葵花籽油、低芥酸菜籽油、椰子油、玉米油)、1,3-二油酰 2-棕榈酸甘油三酯、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、核桃油、花生四烯酸(ARA)、二-二碳六烯酸(DHA)、乳铁蛋白、叶黄素、维生素(L-抗坏血酸、dl-α-醋酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄醇、烟酰胺、D-泛酸钙、D-生物素、植物甲萘醌、叶酸、核黄素、盐酸硫胺素、氰钴胺、氯化胆碱)、矿物质(柠檬酸钠、氯化钾、碳酸钙、磷酸三钙、硫酸镁、碘酸钾、硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、碳酸氢钾、磷脂。

营养成分表

营养成分	单位	每100kJ	每100g	营养成分	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2090	钠	mg	8	167
蛋白质	g	0.51	10.70	钾	mg	29	606
脂肪	g	1.28	26.80	铜	μg	20.2	422.2
亚油酸	g	0.15	3.14	镁	mg	1.7	35.5
α-亚麻酸	mg	15	314	铁	mg	0.18	3.76
碳水化合物	g	2.5	52.0	锌	mg	0.19	3.97
维生素				锰	μg	4.56	95.30
维生素A	μg RE	18	376	钙	mg	16	334
维生素D	μg	0.52	10.87	磷	mg	11	230
维生素E	mg α-TE	0.30	6.27	碘	μg	5.2	108.7
维生素K ₁	μg	2.60	54.34	氯	mg	15	314
维生素B ₁	μg	27	564	硒	μg	0.82	17.14
维生素B ₂	μg	30	627	可选择成分			
维生素B ₆	μg	15.7	328.1	二十二碳六烯酸	mg	3.7	77.3
维生素B ₁₂	μg	0.082	1.714	二十碳四烯酸	mg	4.0	83.6
烟酸	μg	188	3929	低聚半乳糖	g	0.08	1.66
叶酸	μg	6.4	133.8	低聚果糖	g	0.11	2.37
泛酸	μg	174	3637	1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	g	0.2	4.2
维生素C	mg	5.0	104.5	叶黄素	μg	4.0	83.6
生物素	μg	0.92	19.23	乳铁蛋白	mg	1.8	37.6
胆碱	mg	7.0	146.3				

宜贝儿
EBENZ

谱力纳

净含量:800克

婴儿配方羊奶粉(0~6月龄,1段)

注册号:国食注字YP20230381

喂养用量建议表

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水量(毫升)	平均量	
0-15天	30-60	1-2	8-10
15天-1月	60-90	2-3	7-8
1-2月	90	3	7
2-4月	90-120	3-4	7
4-6月	120-150	4-5	6-7

①1勺=4.5g奶粉,1勺兑30mL水(40°C-45°C的温开水)。②此表只是正常的喂哺指导,您的宝宝也许要比此表的用量更多或更少。③冲奶时只用随包装附带的专用量勺。④没有煮沸的水、没有消毒的奶嘴或不正确的奶液浓度均会影响宝宝的健康。⑤冲奶时请参照喂哺用量建议表调制,每次只调制一次的用量,剩余奶液丢弃不用,不可下次再喂。⑥用于少于或多于指定份量的奶粉会令宝宝得不到适当的营养或导致脱水。⑦本喂哺表是参照正常发育宝宝的营养需求而设计,您可根据宝宝的发育状况酌情增减。⑧100mL标准奶液=13.2g奶粉+90mL水。

奶具消毒及调奶的方法



①在调配奶粉之前,请洗净、擦干双手;②清洗奶瓶、奶嘴、瓶盖;③把奶瓶放在沸水中至少煮五分钟;④将水煮沸5分钟后,冷却至约40°C-45°C,将正确量煮开过的温水(40°C-45°C)倒入消毒后的奶瓶中;⑤用专用量勺,参照喂哺用量建议表加入正确份量奶粉;⑥盖好奶瓶瓶口。

●未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均会引起婴儿不适。

重要说明

对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。6个月龄以上婴儿食用本产品时,应配合添加辅食。

贮存条件

本品存放于阴凉干燥处,开封使用后请及时密封,以防受潮。请在保质期内食用本产品(建议在开封后四周内食用完)。

齐齐哈尔宜贝生物科技有限公司 生产

地址:黑龙江省齐齐哈尔市富裕县富裕农场场部二区
产地:黑龙江省齐齐哈尔市

生产日期和生产批号:见罐底部
生产许可证编号:SC10523300750235
执行标准:GB 10765-2021
保质期:24个月
产品类型和属性:乳基粉状婴儿配方食品

咨询热线:400-618-8167

如需更多产品信息及资料请咨询:
www.swizer.com.cn



序号2:

谱力纳 | 婴儿配方羊奶粉(0~6月龄,1段)

宜贝儿
EBENZ

配料表

脱盐羊乳清粉、全脂羊奶粉、食用植物调和油(葵花籽油、低芥酸菜籽油、椰子油、玉米油)、1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、核桃油、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、乳铁蛋白、叶黄素、维生素(L-抗坏血酸、dl-α-醋酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄醇、烟酰胺、D-泛酸钙、D-生物素、植物甲萘醌、叶酸、核黄素、盐酸硫胺素、胍钴胺、氯化胆碱)、矿物质(柠檬酸钠、氯化钾、碳酸钙、磷酸三钙、硫酸镁、碘酸钾、硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、碳酸氢钾、磷脂。

营养成分表

营养成分	单位	每100kJ	每100g	营养成分	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2090	矿物质			
蛋白质	g	0.51	10.70	钠	mg	8	167
脂肪	g	1.28	26.80	钾	mg	29	606
亚油酸	g	0.15	3.14	铜	μg	20.2	422.2
α-亚麻酸	mg	15	314	镁	mg	1.7	35.5
碳水化合物	g	2.5	52.0	铁	mg	0.18	3.76
维生素				锌	mg	0.19	3.97
维生素A	μg RE	18	376	锰	μg	4.56	95.30
维生素D	μg	0.52	10.87	钙	mg	16	334
维生素E	mg α-TE	0.30	6.27	磷	mg	11	230
维生素K ₁	μg	2.60	54.34	碘	μg	5.2	108.7
维生素B ₁	μg	27	564	氯	mg	15	314
维生素B ₂	μg	30	627	硒	μg	0.82	17.14
维生素B ₆	μg	15.7	328.1	可选择成分			
维生素B ₁₂	μg	0.082	1.714	二十二碳六烯酸	mg	3.7	77.3
烟酸	μg	188	3929	二十碳四烯酸	mg	4.0	83.6
叶酸	μg	6.4	133.8	低聚半乳糖	g	0.08	1.66
泛酸	μg	174	3637	低聚果糖	g	0.11	2.37
维生素C	mg	5.0	104.5	1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	g	0.2	4.2
生物素	μg	0.92	19.23	叶黄素	μg	4.0	83.6
胆碱	mg	70	146.3	乳铁蛋白	mg	1.8	37.6

谱力纳

1
净含量:700克

婴儿配方羊奶粉(0~6月龄,1段)


注册号:国食注字YP20230381

喂养用量建议表

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水量(毫升)	平均量	
0-15天	30-60	1-2	8-10
15天-1月	60-90	2-3	7-8
1-2月	90	3	7
2-4月	90-120	3-4	7
4-6月	120-150	4-5	6-7

①1勺≈4.5g奶粉,1勺粉兑30mL水(40℃-45℃的温开水)。②此表只是正常的喂哺指导,您的宝宝也许要比此表的用量更多或更少。③冲奶时只用随包装附带的专用量勺。④没有煮沸的水、没有消毒的奶嘴或错误的奶液浓度均会影响宝宝的健康。⑤冲奶时请参照喂哺用量建议表调制,每次只调制一次的用量,剩余奶液丢弃不用,不可下次再喂。⑥用少于或多于指定份量的奶粉会令宝宝得不到适当的营养或导致脱水。⑦本喂哺表是参照正常发育宝宝的营养需求而设计,您可根据宝宝的发育状况酌情增减。⑧100mL标准奶液=13.2g奶粉+90mL水。

奶具消毒及调奶的方法



①在调配奶粉之前,请洗净、擦干双手;②清洗奶瓶、奶嘴、瓶盖;③把奶瓶放在沸水中至少煮五分钟;④饮用水煮沸5分钟后,冷却至约40℃-45℃,将正确量煮开过的温水(40℃-45℃)倒入消毒后的奶瓶中;⑤用专用量勺,参照喂哺用量建议表加入正确份量奶粉;⑥盖好奶瓶摇匀。

⑦未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均会引起婴儿不适。

重要说明

对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳。在母乳不足或无母乳时可食用本产品。6个月以上婴儿食用本产品时,应配合添加辅食。

贮存条件

本品存放于阴凉干燥处,开封使用后请及时密封,以防受潮。请在保质期内食用本产品(建议在开封后四周内食用完)。

齐齐哈尔宜贝生物科技有限公司 生产

地址:黑龙江省齐齐哈尔市富裕县富裕镇场直二区
产地:黑龙江省齐齐哈尔市

咨询热线:400-618-8167

如需更多产品信息及资料请咨询:
www.swizer.com.cn

生产日期和生产批号:见罐底部
生产许可证编号:SC10523300750235
执行标准:GB 10765-2021
保质期:24个月
产品类别和属性:乳基粉状婴儿配方食品



6 937527 489619

序号3:

谱力纳

婴儿配方羊奶粉(0~6月龄1段)

配料表

脱盐羊乳清粉、全脂羊奶粉、食用植物调和油(葵花籽油、低芥酸菜籽油、椰子油、玉米油)、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、核桃油、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、乳铁蛋白、叶黄素、维生素(L-抗坏血酸、dl-α-醋酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄醇、烟酰胺、D-泛酸钙、D-生物素、植物甲萘醌、叶酸、核黄素、盐酸硫胺素、氰钴胺、氯化胆碱)、矿物质(柠檬酸钠、氯化钾、碳酸钾、磷酸三钙、硫酸镁、碘酸钾、硫酸亚铁、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰)、动物双歧杆菌乳亚种b-12、碳酸氢钾、磷脂。

营养成分表

营养成分	单位	每100kJ	每100g	营养成分	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2090	矿物质			
蛋白质	g	0.51	10.70	钠	mg	8	167
脂肪	g	1.28	26.80	钾	mg	29	606
亚油酸	g	0.15	3.14	铜	μg	20.2	422.2
α-亚麻酸	mg	15	314	铁	mg	1.7	35.5
碳水化合物	g	2.5	52.0	锌	mg	0.18	3.76
维生素				锰	mg	0.19	3.97
维生素A	μgRE	18	376	钴	μg	4.56	95.30
维生素D	μg	0.52	10.87	钙	mg	16	334
维生素E	mg α-TE	0.30	6.27	磷	mg	11	230
维生素K ₁	μg	2.60	54.34	碘	μg	5.2	108.7
维生素B ₁	μg	27	564	氯	mg	15	314
维生素B ₂	μg	30	627	硒	μg	0.82	17.14
维生素B ₆	μg	15.7	328.1	可选择成分			
维生素B ₁₂	μg	0.082	1.714	二十二碳六烯酸	mg	3.7	77.3
胆酸	μg	188	3929	二十碳四烯酸	mg	4.0	83.6
叶酸	μg	6.4	133.8	低聚半乳糖	g	0.08	1.66
泛酸	μg	174	3637	低聚果糖	g	0.11	2.37
维生素C	mg	5.0	104.5	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.2	4.2
生物素	μg	0.92	19.23	叶黄素	μg	4.0	83.6
胆碱	mg	7.0	146.3	乳铁蛋白	mg	1.8	37.6

宜贝儿
EBENZ

谱力纳

1
净含量:400克

婴儿配方羊奶粉(0~6月龄1段)

注册号:国食注字YP20230381

哺喂用量建议表

月龄	每次哺喂量		每日 哺喂次数
	量(毫升)	平均数	
0-15天	30-60	1-2	8-10
15天-1月	60-90	2-3	7-8
1-2月	90	3	7
2-4月	90-120	3-4	7
4-6月	120-150	4-5	6-7

①1勺≈4.5g奶粉,1勺兑30mL水(40℃-45℃的温开水)。②此表只是正常的哺喂指导,您的宝宝也许要比此表的用量更多或更少。③冲奶时只用随包装附带的专用量勺。④没有煮沸的水,没有消毒的奶瓶或不正确的奶液浓度均会影响宝宝的发育。⑤冲奶时请参照哺喂用量建议表调制,每次只调制一次的用量,剩余奶液丢弃不用,不可下次再喂。⑥用少于或多于指定份量的奶液会令宝宝得不到适当的营养或导致脱水。⑦本哺喂表是参照正常发育宝宝的营养需求而设计,您可根据宝宝的发育状况酌情增减。⑧100mL标准奶液=13.2g奶粉+90mL水。

奶具消毒及调奶的方法



①在调配奶粉之前,请洗净、擦干双手;②清洗奶瓶、奶嘴、瓶盖;③把奶瓶放在沸水中至少煮五分钟;④饮用水煮沸5分钟后,冷却至约40℃-45℃,将正确量煮开过的温水(40℃-45℃)倒入消毒后的奶瓶中;⑤用专用量勺,参照哺喂用量建议表加入正确份量奶粉;⑥盖好奶瓶摇匀。

⑦未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均会引起婴儿不适。

重要说明

对于0-6月龄的婴儿最理想的食品是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。6个月龄以上婴儿食用本产品时,应配合添加辅食。

贮存条件

本品存放于阴凉干燥处,开封使用后请及时密封,以防受潮。请在保质期内食用本产品(建议在开封后四周内食用完)。

齐齐哈尔宜贝儿生物科技有限公司 生产

地址:黑龙江省齐齐哈尔市富裕县富裕农场二区
产地:黑龙江省齐齐哈尔市

咨询热线:400-618-8167

如需更多产品信息及资料请咨询:
www.swizer.com.cn

生产日期和生产批号:见罐底部
生产许可证编号:SC10523300750235
执行标准:GB 10765-2021
保质期:24个月
产品类型和属性:乳基粉类婴儿配方食品



6 937527 488315

序号4:

谱力纳

婴儿配方羊奶粉(0-6月龄1段)

配料表

脱盐羊乳清粉、全脂羊奶粉、食用植物调和油(葵花籽油、低芥酸菜籽油、椰子油、玉米油)、1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、乳糖、低聚果糖、低聚果糖、核桃油、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、乳铁蛋白、叶黄素、维生素(L-抗坏血酸、dl-α-醋酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄醇、烟酰胺、D-泛酸钙、D-生物素、植物甲萘醌、叶酸、核黄素、盐酸硫胺素、氰钴胺、氯化胆碱)、矿物质(柠檬酸钠、氯化钾、碳酸钙、磷酸三钙、硫酸镁、硫酸钾、硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、碳酸氢钾、磷脂。

营养成分表

营养成分	单位	每100kJ	每100g	营养成分	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2090	矿物质			
蛋白质	g	0.51	10.70	钠	mg	8	167
脂肪	g	1.28	26.80	钾	mg	29	606
亚油酸	g	0.15	3.14	铜	μg	20.2	422.2
α-亚麻酸	mg	15	314	镁	mg	1.7	35.5
碳水化合物	g	2.5	52.0	铁	mg	0.18	3.76
维生素				锌	mg	0.19	3.97
维生素A	μg RE	18	376	锰	μg	4.56	95.30
维生素D	μg	0.52	10.87	钙	mg	16	334
维生素E	mg α-TE	0.30	6.27	磷	mg	11	230
维生素K ₁	μg	2.60	54.34	碘	μg	5.2	108.7
维生素B ₁	μg	27	564	氯	mg	15	314
维生素B ₂	μg	30	627	硒	μg	0.82	17.14
维生素B ₆	μg	15.7	328.1	可选择成分			
维生素B ₁₂	μg	0.082	1.714	二十二碳六烯酸	mg	3.7	77.3
烟酸	μg	188	3929	二十碳四烯酸	mg	4.0	83.6
叶酸	μg	6.4	133.8	低聚果糖	g	0.08	1.66
泛酸	μg	174	3637	低聚果糖	g	0.11	2.37
维生素C	mg	5.0	104.5	1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	g	0.2	4.2
生物素	μg	0.92	19.23	叶黄素	μg	4.0	83.6
胆碱	mg	7.0	146.3	乳铁蛋白	mg	1.8	376

宜贝儿
EBENZ

谱力纳

1
净含量:80克

婴儿配方羊奶粉(0~6月龄1段)


注册号:国食注字YP20230381

哺喂用量建议表

月龄	每次哺喂量		每日哺喂次数
	温开水量(毫升)	平均量	
0-15天	30-60	1-2	8-10
15天-1月	60-90	2-3	7-8
1-2月	90	3	7
2-4月	90-120	3-4	7
4-6月	120-150	4-5	6-7

①1勺=4.5g奶粉,1勺兑30mL水(40℃-45℃的温开水)。②此表只是正常的哺喂指导,您的宝宝也许要比此表的用量更多或更少。③冲奶时只用随包装附带的专用量勺。④没有煮沸的水,没有消毒的奶瓶或不正确的奶液浓度均会影响宝宝的健康。⑤冲奶时请参照哺喂用量建议表调制,每次只调制一次的用量,剩余奶液丢弃不用,不可下次再喂。⑥少于或多于指定份量的奶液会令宝宝得不到适当的营养或导致脱水。⑦本哺喂表是参照正常发育宝宝的营养需求而设计,您可依据宝宝的发育状况酌情增减。⑧100mL标准奶液=13.2g奶粉+90mL水。

奶瓶消毒及调奶的方法



①在调配奶粉之前,请洗净、擦干双手;②清洗奶瓶、奶嘴、瓶盖;③把奶瓶放在沸水中至少煮五分钟;④饮用水煮沸5分钟后,冷却至约40℃-45℃,将正确量煮开过的温水(40℃-45℃)倒入消毒后的奶瓶中;⑤用专用量勺,参照哺喂用量建议表加入正确份量奶粉;⑥盖好奶瓶摇匀。

⑦未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均会引起婴儿不适。

重要说明

对于0-6月龄的婴儿最理想的食品是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。6个月龄以上婴儿食用本产品时,应配合添加辅食。

贮存条件

本品存放于阴凉干燥处,开封使用后请及时密封,以防受潮。请在保质期内食用本产品(建议在开封后四周内食用完)。

齐齐哈尔宜贝生物科技有限公司 生产

地址:黑龙江省齐齐哈尔市富裕县富裕牧场直二区
产地:黑龙江省齐齐哈尔市

生产日期和生产批号:见罐底部
生产许可证编号:SC10523300750235
执行标准:GB 10765-2021
保质期:24个月
产品类别和属性:乳基粉状婴儿配方食品

咨询热线:400-618-8167

如需更多产品信息及资料请查询:
www.swizer.com.cn



序号5:

谱力纳 | 较大婴儿配方羊奶粉(6~12月龄,2段)

配料表

脱盐羊乳清粉、全脂羊奶粉、食用植物调和油(葵花籽油、低芥酸菜籽油、椰子油、玉米油)、1,3-二油酰 2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、乳糖、低聚果糖、核桃油、花生四烯酸(ARA)、二-二碳六烯酸(DHA)、乳铁蛋白、叶黄素、维生素(L-抗坏血酸、dl-α-醋酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄醇、烟酰胺、D-泛酸钙、D-生物素、植物甲萘醌、叶酸、核黄素、盐酸硫胺素、氰钴胺、氯化胆碱)、矿物质(氯化钾、碳酸钾、磷酸三钙、硫酸镁、硫酸钾、硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、磷脂。

营养成分表

营养成分	单位	每100kJ	每100g	营养成分	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2005	矿物质			
蛋白质	g	0.62	12.34	钠	mg	5	100
脂肪	g	1.13	22.56	钾	mg	28	561
亚油酸	g	0.11	2.21	铜	μg	16.7	334.8
α-亚麻酸	mg	15	301	镁	mg	1.9	38.1
碳水化合物	g	2.7	54.6	铁	mg	0.31	6.22
维生素				锌	mg	0.23	4.61
维生素A	μg RE	21	421	锰	μg	5.07	101.65
维生素D	μg	0.59	11.83	钙	mg	21	421
维生素E	mg α-TE	0.30	6.02	磷	mg	14	281
维生素K	μg	2.86	57.34	碘	μg	5.6	112.3
维生素B ₁	μg	32	642	氯	mg	14	281
维生素B ₂	μg	53	1063	硒	μg	0.65	13.03
维生素B ₆	μg	21.0	421.1	可选择成分			
维生素B ₁₂	μg	0.095	1.905	二十二碳六烯酸	mg	3.7	74.2
烟酸	μg	198	3970	二十碳四烯酸	mg	4.1	82.2
叶酸	μg	5.8	116.3	低聚半乳糖	g	0.08	1.66
泛酸	μg	190	3810	低聚果糖	g	0.12	2.37
维生素C	mg	3.5	70.2	1,3-二油酰 2-棕榈酸甘油三酯	g	0.2	4.0
生物素	μg	1.11	22.26	叶黄素	μg	8.5	170.4
胆碱	mg	7.5	150.4	乳铁蛋白	mg	1.9	38.1

宜贝儿®
EBENZ

谱力纳

2

净含量:800克

较大婴儿配方羊奶粉(6~12月龄,2段)

注册号:国食注字YP20230382

喂哺用量建议表

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	毫升(盎司)	平均数	
6-7月	150	5	5-6
7-9月	150-180	5-6	4-5
9-12月	180	6	4

①1勺≈4.5g奶粉,1勺粉兑30mL水(40°C-45°C的温开水)。②此表只是正常的喂哺指导,您的宝宝也许要比此表的用量更多或更少。③冲奶时只用随包装附带的专用量勺。④没有煮沸的水、没有消毒的奶瓶或不正确的奶液浓度均会影响宝宝的成长。⑤冲奶时请参照喂哺用量建议表调制,每次只调制一次的用量,剩余奶液丢弃不用,不可下次再喂。⑥用少于或多于指定份量的奶粉会令宝宝得不到适当的营养或导致脱水。⑦本喂哺表是参照正常发育较大婴儿的营养需求而设计,您可根据宝宝的发育状况酌情增减。⑧100mL标准奶液=13.5g奶粉+90mL水。

奶瓶消毒及调奶的方法



①在调配奶粉之前,请洗净、擦干双手;②清洗奶瓶、奶嘴、瓶盖;③把奶瓶放在沸水中至少煮五分钟;④饮用水煮沸5分钟后,冷却至约40°C-45°C,将正确量煮开过的温水(40°C-45°C)倒入消毒后的奶瓶中;⑤用专用量勺,参照喂哺用量建议表加入正确份量奶粉;⑥盖好奶瓶摇匀。

⑦未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均会引起宝宝不适。

重要说明

6个月龄以上较大婴儿食用本产品时,须配合添加辅助食品。

贮存条件

本品存放于阴凉干燥处,开封使用后请及时密封,以防受潮。请在保质期内食用本产品(建议在开封后四周内食用完)。

齐齐哈尔宜贝生物科技有限公司 生产

地址:黑龙江省齐齐哈尔市富裕县富裕镇牧场直二区
产地:黑龙江省齐齐哈尔市

生产日期和生产批号:见罐底部

生产许可证编号:SC10523300750235

执行标准:GB 10766-2021

保质期:24个月

产品类别和属性:乳基粉状较大婴儿配方食品

咨询热线:400-618-8167

如需更多产品信息及资料请查询:
www.swizer.com.cn



6 937527 488322

序号6:

谱力纳 较大婴儿配方羊奶粉(6~12月龄,2段)

宜贝儿
EBENZ

配料表

脱盐羊乳清粉、全脂羊奶粉、食用植物调和油(葵花籽油、低芥酸菜籽油、椰子油、玉米油)、1,3-二油酰 2-棕榈酸甘油三酯、低聚乳糖、乳糖、低聚果糖、核桃油、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、乳铁蛋白、叶黄素、维生素(L-抗坏血酸、dl-α-醋酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄醇、烟酰胺、D-泛酸钙、D-生物素、植物甲萘醌、叶酸、核黄素、盐酸硫胺素、氰钴胺、氯化胆碱)、矿物质(氯化钾、碳酸钙、磷酸三钙、硫酸镁、硫酸钾、硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、磷脂。

营养成分表

营养成分	单位	每100kJ	每100g	营养成分	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2005	矿物质			
蛋白质	g	0.62	12.34	钠	mg	5	100
脂肪	g	1.13	22.56	钾	mg	28	561
亚油酸	g	0.11	2.21	铜	μg	16.7	334.8
α-亚麻酸	mg	15	301	镁	mg	1.9	38.1
碳水化合物	g	2.7	54.6	铁	mg	0.31	6.22
维生素				锌	mg	0.23	4.61
维生素A	μg RE	21	421	锰	μg	5.07	101.65
维生素D	μg	0.59	11.83	钙	mg	21	421
维生素E	mg α-TE	0.30	6.02	磷	mg	14	281
维生素K ₁	μg	2.86	57.34	碘	μg	5.6	112.3
维生素B ₁	μg	32	642	氯	mg	14	281
维生素B ₂	μg	53	1063	硒	μg	0.65	13.03
维生素B ₆	μg	21.0	421.1	可选择成分			
维生素B ₁₂	μg	0.095	1.905	二十二碳六烯酸	mg	3.7	74.2
烟酸	μg	198	3970	二十碳四烯酸	mg	4.1	82.2
叶酸	μg	5.8	116.3	低聚乳糖	g	0.08	1.66
泛酸	μg	190	3810	低聚果糖	g	0.12	2.37
维生素C	mg	3.5	70.2	1,3-二油酰 2-棕榈酸甘油三酯	g	0.2	4.0
生物素	μg	1.11	22.26	叶黄素	μg	8.5	170.4
胆碱	mg	7.5	150.4	乳铁蛋白	mg	1.9	38.1

谱力纳

2
净含量:700克

较大婴儿配方羊奶粉(6~12月龄,2段)


注册号:国食注字YP20230382

喂哺用量建议表

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水量(毫升)	平均数	
6-7月	150	5	5-6
7-9月	150-180	5-6	4-5
9-12月	180	6	4

①1勺≈4.5g奶粉,1勺粉兑30mL水(40℃-45℃的温开水)。②此表只是正常的喂哺指导,您的宝宝也许要比此表的用量更多或更少。③冲奶时只用随包装附带的专用量勺。④没有煮沸的水、没有消毒的奶瓶或不正确的奶液浓度均会影响宝宝的健康。⑤冲奶时请参照喂哺用量建议表调制,每次只调制一次的用量,剩余奶液丢弃不用,不可下次再喂。⑥用少于或多于指定份量的奶粉会令宝宝得不到适当的营养或导致脱水。⑦本喂哺表是参照正常发育较大婴儿的营养需求而设计,您可根据宝宝的发育状况酌情增减。⑧100mL标准奶液=13.5g奶粉+90mL水。

奶具消毒及调奶的方法



①在调制奶粉之前,请洗净、擦干双手;②清洗奶瓶、奶嘴、瓶盖;③把奶瓶放在沸水中至少煮五分钟;④饮用水煮沸5分钟后,冷却至约40℃-45℃,将正确量煮开过的温水(40℃-45℃)倒入消毒后的奶瓶中;⑤用专用量勺,参照喂哺用量建议表加入正确份量奶粉;⑥盖好奶瓶摇匀。

①未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均会引起宝宝不适。

重要说明

6个月以上较大婴儿食用本产品时,须配合添加辅食。

贮存条件

本品存放于阴凉干燥处,开封使用后请及时密封,以防受潮。请在保质期内食用本产品(建议在开封后四周内食用完)。

齐齐哈尔宜贝生物科技有限公司 生产

地址:黑龙江省齐齐哈尔市富裕县富裕镇通直二区
产地:黑龙江省齐齐哈尔市

咨询热线:400-618-8167

如需更多产品信息及资料请查询:
www.swizer.com.cn

生产日期和生产批号:见罐底部

生产许可证编号:SC10523300750235

执行标准:GB 10766-2021

保质期:24个月

产品类别和属性:乳基粉状较大婴儿配方食品



6 937527 489626

A0600045E001

序号7:

谱力纳 较大婴儿配方羊奶粉(6~12月龄,2段)

配料表

脱盐羊乳清粉、全脂羊奶粉、食用植物调和油(葵花籽油、低芥酸菜籽油、椰子油、玉米油)、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、乳糖、低聚果糖、核桃油、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、乳铁蛋白、叶黄素、维生素(L-抗坏血酸、D-α-醋酸生育酚、维生素E)、胆钙化醇、维生素K₂、烟酰胺、D-泛酸钙、D-生物素、植物甲萘醌、叶酸、核黄素、盐酸硫胺素、氰钴胺、氯化胆碱、矿物质(氯化钾、碳酸钾、磷酸三钙、硫酸镁、硫酸钾、硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、磷脂。

营养成分表

营养成分	单位	每100kJ	每100g	营养成分	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2005	矿物质			
蛋白质	g	0.62	12.34	钠	mg	5	100
脂肪	g	1.13	22.56	钾	mg	28	561
亚油酸	g	0.11	2.21	铜	μg	16.7	334.8
α-亚麻酸	g	15	301	镁	mg	1.9	38.1
碳水化合物	g	2.7	54.6	铁	mg	0.31	6.22
维生素				锌	mg	0.23	4.61
维生素A	μRE	21	421	锰	μg	5.07	101.65
维生素D	H	0.59	11.83	钙	mg	21	421
维生素E	mg α-TE	0.30	6.02	磷	mg	14	281
维生素K ₁	H	2.86	57.34	碘	μg	5.6	112.3
维生素B ₁	H	32	642	硒	μg	14	281
维生素B ₂	H	53	1063	氯	mg	0.65	13.03
维生素B ₆	H	21.0	421.1	可选择成分			
维生素B ₁₂	H	0.095	1.905	二十二碳六烯酸	mg	3.7	74.2
烟酸	H	198	3970	二十碳四烯酸	mg	4.1	82.2
叶酸	H	5.8	116.3	低聚半乳糖	g	0.08	1.66
泛酸	H	190	3810	低聚果糖	g	0.12	2.37
维生素C	mg	3.5	70.2	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.2	4.0
生物素	H	1.11	22.26	叶黄素	μg	8.5	170.4
胆碱	mg	7.5	150.4	乳铁蛋白	mg	1.9	38.1

宜贝儿
EBENZ

谱力纳

2
净含量:400克

较大婴儿配方羊奶粉(6~12月龄,2段)


注册号:国食注字YP20230382

喂哺用量建议表

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温水量(毫升)	平均勺数	
6-7月	150	5	5-6
7-9月	150-180	5-6	4-5
9-12月	180	6	4

①1勺≈4.5g奶粉,1勺粉兑30mL水(40°C-45°C的温开水)。②此表只是正常的喂哺指导,您的宝宝也许要比此表的用量更多或更少。③冲奶时只用随包装附带的专用量勺。④没有煮沸的水、没有消毒的奶瓶或不正确的奶液浓度均会影响宝宝的健康。⑤冲奶时请参照喂哺用量建议表调制,每次只调制一次的用量,剩余奶液丢弃不用,不可下次再喂。⑥用少于或多于指定份量的奶粉会令宝宝得不到适当的营养或导致脱水。⑦本喂哺表是参照正常发育较大婴儿的营养需求而设计,您可根据宝宝的发育状况酌情增减。⑧100mL标准奶液=13.5g奶粉+90mL水。

奶瓶消毒及调奶的方法



①在调配奶粉之前,请洗净、擦干双手;②清洗奶瓶、奶嘴、瓶盖;③把奶瓶放在沸水中至少煮五分钟;④饮用水煮沸5分钟后,冷却至约40°C-45°C,将正确量煮开过的温水(40°C-45°C)倒入消毒后的奶瓶中;⑤用专用量勺,参照喂哺用量建议表加入正确份量奶粉;⑥盖好奶瓶摇匀。

⑦未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均会引起婴儿不适。

重要说明

6个月以上较大婴儿食用本产品时,须配合添加辅食。

贮存条件

本品存放于阴凉干燥处,开封使用后请及时密封,以防受潮。请在保质期内食用本产品(建议在开封后四周内食用完)。

齐齐哈尔宜贝儿生物科技有限公司 生产

地址:黑龙江省齐齐哈尔市富裕县富裕镇牧场二区
产地:黑龙江省齐齐哈尔市

生产日期和生产批号:见罐底部
生产许可证编号:SC10523000750235
执行标准:GB 10765-2021
保质期:24个月
产品类型和属性:乳基粉类婴儿配方食品

咨询热线:400-618-8167

如需更多信息及资料请查询:
www.swizer.com.cn



6 937527 488322

序号8:

谱力纳 | 幼儿配方羊奶粉(12-36月龄,3段)

配料表

脱盐羊乳清粉、全脂羊奶粉、1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、食用植物调和油(葵花籽油、低芥酸菜籽油、椰子油、玉米油)、低聚半乳糖、低聚果糖、核桃油、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、乳铁蛋白、叶黄素、维生素(L-抗坏血酸、dl-α-醋酸生育酚)、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄酯、烟酰胺、D-泛酸钙、D-生物素、植物甲萘醌、叶酸、核黄素、盐酸硫胺素、氯化胆碱、矿物质(碳酸钙、碘酸钾、硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、磷脂。

营养成分表

营养成分	单位	每100kJ	每100g	营养成分	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1957	矿物质			
蛋白质	g	0.72	14.00	钠	mg	8	157
脂肪	g	1.05	20.60	钾	mg	29	568
亚油酸	g	0.11	2.15	铜	μg	18.5	362.0
α-亚麻酸	mg	14	274	镁	mg	2.2	43.1
碳水化合物	g	2.8	54.4	铁	mg	0.34	6.65
维生素				锌	mg	0.18	3.52
维生素A	μg RE	23	450	钙	mg	20	391
维生素D	μg	0.62	12.13	磷	mg	12	235
维生素E	mg α-TE	0.32	6.26	碘	μg	4.8	93.9
维生素K	μg	3.14	61.45	氯	mg	11	215
维生素B ₁	μg	34	665	可选择成分			
维生素B ₂	μg	83	1624	硒	μg	0.71	13.89
维生素B ₆	μg	18.9	369.9	胆碱	mg	8.5	166.3
维生素B ₁₂	μg	0.099	1.937	锰	μg	4.77	93.35
烟酸	μg	196	3836	二十二碳六烯酸	mg	1.6	31.3
叶酸	μg	5.8	113.5	二十碳四烯酸	mg	1.6	31.3
泛酸	μg	220	4305	低聚半乳糖	g	0.08	1.66
维生素C	mg	4.6	90.0	低聚果糖	g	0.12	2.37
生物素	μg	1.24	24.27	1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	g	0.2	3.9
				叶黄素	μg	8.8	172.2
				乳铁蛋白	mg	1.9	37.2

宜贝儿
EBENZ

谱力纳

3

净含量:800克

幼儿配方羊奶粉(12~36月龄,3段)


注册号:国食注字YP20230383

喂哺用量建议表

月龄	温开水量 (毫升)	平均数	每日 喂哺次数
12-24月	180-210	6-7	2-3
24-36月	210	7	2

①1勺=4.5g奶粉,1勺兑30mL水(40℃-45℃的温开水)。②此表只是正常的喂哺指导,您的宝宝也许要比此表的用量更多或更少。③冲奶时只用随包装附带的专用量勺。④没有煮沸的水、没有消毒的奶瓶或不正确的奶液浓度均会影响宝宝的健康。⑤冲奶时请参照喂哺用量建议表调制,每次只调制一次的用量,剩余奶液丢弃不用,不可下次再喂。⑥用于少于或多于指定份量的奶粉会令宝宝得不到适当的营养或导致脱水。⑦本喂哺表是参照正常发育幼儿的营养需求而设计,您可根据宝宝的发育状况酌情增减。⑧100mL标准奶液=13.5g奶粉+90mL水。

奶具消毒及调奶的方法



①在调配奶粉之前,请洗净、擦干双手;②清洗奶瓶、奶嘴、瓶盖;③把奶瓶放在沸水中至少煮五分钟;④饮用水煮沸5分钟后,冷却至约40℃-45℃,将正确量煮开过的温水(40℃-45℃)倒入消毒后的奶瓶中;⑤用专用量勺,参照喂哺用量建议表加入正确份量奶粉;⑥盖好奶瓶摇匀。

●未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均会引起幼儿不适。

重要说明

12-36月龄幼儿食用本产品时,须配合添加辅助食品。

贮存条件

本品存放于阴凉干燥处,开封使用后请及时密封,以防受潮。请在保质期内食用本产品(建议在开封后四周内食用完)。

齐齐哈尔宜贝生物科技有限公司 生产

地址:黑龙江省齐齐哈尔市富裕县富裕牧场直二区
产地:黑龙江省齐齐哈尔市

生产日期和生产批号:见罐底部
生产许可证编号:SC10523300750235
执行标准:GB 10767-2021
保质期:24个月
产品类别和属性:乳基粉状幼儿配方食品

咨询热线:400-618-8167

如需更多产品信息及资料请查询:
www.swizer.com.cn



6 937527 488339

序号9:

谱力纳 幼儿配方羊奶粉(12~36月龄,3段)

宜贝儿
EBENZ

配料表

脱盐羊乳清粉、全脂羊奶粉、1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、食用植物调和油(葵花籽油、低芥酸菜籽油、椰子油、玉米油)、低聚半乳糖、低聚果糖、核桃油、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、乳铁蛋白、叶黄素、维生素(L-抗坏血酸、dl-α-醋酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄醇、烟酰胺、D-泛酸钙、D-生物素、植物甲萘醌、叶酸、核黄素、盐酸硫胺素、氰钴胺、氯化胆碱)、矿物质(碳酸钙、碘酸钾、硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、磷脂。

营养成分表

营养成分	单位	每100kJ	每100g	营养成分	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1957	矿物质			
蛋白质	g	0.72	14.00	钠	mg	8	157
脂肪	g	1.05	20.60	钾	mg	29	568
亚油酸	g	0.11	2.15	铜	μg	18.5	362.0
α-亚麻酸	mg	14	274	镁	mg	2.2	43.1
碳水化合物	g	2.8	54.4	铁	mg	0.34	6.65
维生素				锌	mg	0.18	3.52
维生素A	μg RE	23	450	钙	mg	20	391
维生素D	μg	0.62	12.13	磷	mg	12	235
维生素E	mg α-TE	0.32	6.26	碘	μg	4.8	93.9
维生素K	μg	3.14	61.45	氯	mg	11	215
维生素B ₁	μg	34	665	可选择成分			
维生素B ₂	μg	83	1624	硒	μg	0.71	13.89
维生素B ₆	μg	18.9	369.9	胆碱	mg	8.5	166.3
维生素B ₁₂	μg	0.099	1.937	锰	μg	4.77	93.35
烟酸	μg	196	3836	二十二碳六烯酸	mg	1.6	31.3
叶酸	μg	5.8	113.5	二十碳四烯酸	mg	1.6	31.3
泛酸	μg	220	4305	低聚半乳糖	g	0.08	1.66
维生素C	mg	4.6	90.0	低聚果糖	g	0.12	2.37
生物素	μg	1.24	24.27	1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	g	0.2	3.9
				叶黄素	μg	8.8	172.2
				乳铁蛋白	mg	1.9	37.2

谱力纳

3

净含量:700克

幼儿配方羊奶粉(12~36月龄,3段)


注册号:国食注字YP20230383

喂哺用量建议表

月龄	温开水量 (毫升)	平勺数	每日 喂哺次数
12-24月	180-210	6-7	2-3
24-36月	210	7	2

①1勺=4.5g奶粉,1勺粉兑30mL水(40℃-45℃的温开水)。②此表只是正增的喂哺指南。您的宝宝也许要比此表的用量更多或更少。③冲奶时只用随包装附带的专用量勺。④没有煮沸的水、没有消毒的奶瓶或不正确的奶液浓度均会影响宝宝的健康。⑤冲奶时请参照喂哺用量建议表调制,每次只调制一次的用量,剩余奶液丢弃不用,不可下次再喂。⑥用少于或多于指定份量的奶粉会令宝宝得不到适当的营养或导致脱水。⑦本喂哺表是参照正常发育幼儿的营养需求而设计,您可根据宝宝的发育状况酌情增减。⑧100mL标准奶液=13.5g奶粉+90mL水。

奶具消毒及调奶的方法



①在调制奶粉之前,请洗净、擦干双手;②清洗奶瓶、奶嘴、瓶盖;③把奶瓶放在沸水中至少煮五分钟;④饮用水煮沸5分钟后,冷却至约40℃-45℃,将正确量煮开过的温水(40℃-45℃)倒入消毒后的奶瓶中;⑤用专用量勺,参照喂哺用量建议表加入正确份量奶粉;⑥盖好奶瓶摇匀。

⑦未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均会引起幼儿不适。

重要说明

12-36月龄幼儿食用本产品时,须配合添加辅食。

贮存条件

本品存放于阴凉干燥处,开封使用后请及时密封,以防受潮。请在保质期内食用本产品(建议在开封后四周内食用完)。

齐齐哈尔宜贝生物科技有限公司 生产

地址:黑龙江省齐齐哈尔市富裕县富裕镇牧场二区
产地:黑龙江省齐齐哈尔市

咨询热线:400-618-8167

如需更多产品信息及资料请咨询:
www.swizer.com.cn

生产日期和生产批号:见罐底部
生产许可证编号:SC10523300750235
执行标准:GB 10767-2021
保质期:24个月
产品类别和属性:乳基粉状幼儿配方食品



6 937527 489633

序号10:

谱力纳

幼儿配方羊奶粉(12~36月龄3段)

配料表

脱盐羊乳清粉、全脂羊奶粉、1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、食用植物调和油(葵花籽油、低芥酸菜籽油、椰子油、玉米油)、低聚半乳糖、低聚果糖、核桃油、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、乳铁蛋白、叶黄素、维生素(L-抗坏血酸、D-α-醋酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄酯、烟酰胺、D-泛酸钙、D-生物素、植物甲萘醌、叶酸、核黄素、盐酸硫胺素、氰钴胺、氯化胆碱)、矿物质(碳酸钙、磷酸钾、硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、磷脂。

营养成分表

营养成分	单位	每100kJ	每100g	营养成分	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1957	矿物质			
蛋白质	g	0.72	14.00	钠	mg	8	157
脂肪	g	1.05	20.60	钾	mg	29	568
亚油酸	g	0.11	2.15	铜	μg	18.5	362.0
α-亚麻酸	mg	14	274	镁	mg	2.2	43.1
碳水化合物	g	2.8	54.4	铁	mg	0.34	6.65
维生素				锌	mg	0.18	3.52
维生素A	μRE	23	450	钙	mg	20	391
维生素D	μg	0.62	12.13	磷	mg	12	235
维生素E	mg α-TE	0.32	6.26	碘	μg	4.8	93.9
维生素K ₁	μg	3.14	61.45	氯	mg	11	215
维生素B ₁	μg	34	665	可选择成分			
维生素B ₂	μg	83	1624	硒	μg	0.71	13.89
维生素B ₆	μg	18.9	369.9	胆碱	mg	8.5	166.3
维生素B ₁₂	μg	0.099	1.937	锰	μg	4.77	93.35
烟酸	μg	196	3836	二十二碳六烯酸	mg	1.6	31.3
叶酸	μg	5.8	113.5	低聚半乳糖	g	0.08	1.66
泛酸	μg	220	4305	低聚果糖	g	0.12	2.37
维生素C	mg	4.6	90.0	1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	g	0.2	3.9
生物素	μg	1.24	24.27	叶黄素	μg	8.8	172.2
				乳铁蛋白	mg	1.9	37.2

宜贝儿
EBENZ

谱力纳

3

净含量:400克


幼儿配方羊奶粉(12~36月龄3段)

注册号:国食注字YP20230383

喂养用量建议表

月龄	温开水量 (毫升)	平均数	每日 喂奶次数	说明
12-24月	180-210	6-7	2-3	①1勺≈4.5g奶粉,1勺兑30mL水(40℃-45℃的温开水)。②此表只是正常的喂养指导,您的宝宝也许要比此表的用量更多或更少。③冲奶时只用随包装附带的专用量勺。④没有煮沸的水、没有消毒的奶瓶或不正确的奶液浓度均会影响宝宝的健康。⑤冲奶时请参照喂养用量建议表调制,每次只调制一次的用量,剩余奶液丢弃不用,不可下次再喂。⑥用少于或多于指定份量的奶粉会令宝宝得不到适当的营养或导致脱水。⑦本喂养表是参照正常发育幼儿的营养需求而设计,您可根据宝宝的发育状况酌情增减。⑧100mL标准奶液=13.5g奶粉+90mL水。
24-36月	210	7	2	

奶瓶消毒及调奶的方法



①在调配奶粉之前,请洗净、擦干双手;②清洗奶瓶、奶嘴、瓶盖;③把奶瓶放在沸水中至少煮五分钟;④吹用水煮沸5分钟后,冷却至约40℃-45℃,将正确量煮开过的温水(40℃-45℃)倒入消毒后的奶瓶中;⑤用专用量勺,参照喂养用量建议表加入正确份量奶粉;⑥盖好奶瓶瓶帽。

⑦未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当的浓度均会引起婴儿不适。

重要说明

12-36月龄幼儿食用本产品时,须配合添加辅食。

贮存条件

本品存放于阴凉干燥处,开封使用后请及时密封,以防受潮。请在保质期内食用本产品(建议在开封后四周内食用完)。

齐齐哈尔宜贝儿生物科技有限公司 生产

地址:黑龙江省齐齐哈尔市富裕县富裕镇福源二区
产地:黑龙江省齐齐哈尔市

生产日期和生产批号:见罐底部
生产许可证编号:SC10523800750235
执行标准:GB 10765-2021
保质期:24个月
产品类型和属性:乳基粉类婴儿配方食品

咨询热线:400-618-8167

如需更多信息及资料请查询:
www.swizer.com.cn



6 937527 488339

- 常用量建议表

贮藏方法

- 温馨提示

- 重慶商學

- 新于第一月... 在... 不足...
... 个... 余...
...

生产厂: 齐齐哈尔宜贝生物科技有限公司
地址: 黑龙江省齐齐哈尔市富裕县富裕牧场畜二区
产地: 黑龙江齐齐哈尔
生产许可证号: SC10523300750235
执行标准: GB10765-2021
产品属性及用途: 乳基粉体婴儿配方食品
生产日期和批号: 见罐底部
保质期: 24个月
产品曾用名: 俄乳

见提力

婴儿配方奶粉
(0-6月龄, 1段)

1 段

净含量: 100克

注册号:国食注字YP20230384



脱氢乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯)、葵花籽油、椰子油、低芥酸菜籽油、玉米油、亚麻籽油、脱脂奶粉、低聚半乳糖、乳糖、低聚果糖、乳清蛋白粉、生牛四磷酸(AHA)、二十二碳六烯酸(DHA)、酪蛋白氨基酸、乳铁蛋白、牛磺酸、核苷酸(5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠)、叶黄素、维生素E(抗坏血醇、dl-α-醋酸生育酚、维生素C哆醇、胆钙化醇、胆维他黄甙、烟酰胺、D-泛酸钙、D-生物素、植物甲萘酮、叶酸、核黄素、硫酸硫胺素、亚硒酸钠、氯化亚砷)、矿物质(柠檬酸钠、氯化钾、磷酸二氢钾、硫酸锌、硫酸铜、硫酸钾、硫酸铝、硫酸亚铁、硫酸锰、亚硒酸钠、硫酸镁)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、碳酸氢氧、磷脂

● 更多产品信息请查询

www.yangyy.com.cn

咨询热线: 400-618-9162



6 || 9 3 7 5 2 7 || 4 8 8 5 3 7 ||

营养成分表

营养成分	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2090
蛋白质	g	0.51	10.70
脂肪	g	1.28	26.80
亚油酸	g	0.24	5.02
α -亚麻酸	mg	27	564
碳水化合物	g	2.5	52.0
维生素			
维生素A	$\mu\text{g RE}$	17	355
维生素D	μg	0.54	11.29
维生素E	mg $\alpha\text{-TE}$	0.30	6.27
维生素K ₁	μg	2.67	55.80
维生素B ₁	μg	27	564
维生素B ₂	μg	41	857
维生素B ₆	μg	14.8	309.3
维生素B ₁₂	μg	0.102	2.132
烟酸	μg	155	3240
叶酸	μg	6.0	125.4
泛酸	μg	167	3490
维生素C	mg	4.7	98.2
生物素	μg	0.81	16.93
胆碱	mg	8.7	181.8
矿物质			
钠	mg	9	188
钾	mg	24	502
铜	μg	18.2	380.4
钴	mg	1.6	33.4
铁	mg	0.24	5.02
锌	mg	0.18	3.76
钙	mg	4.00	83.60
镁	mg	15	314
磷	mg	10	209
氯	mg	4.5	94.1
氮	mg	15	314
硒	μg	0.78	16.30
可溶性成分			
牛磺酸	mg	2.2	46.0
二十碳六烯酸	mg	3.8	79.4
二十二碳四烯酸	mg	3.9	81.5
低聚乳糖	g	0.08	1.66
低聚果糖	g	0.11	2.37
1,3-二糖醇-2-脱氧核糖衍生物	g	0.3	6.3
叶黄素	μg	4.0	83.6
核黄素	mg	1.4	29.3
乳铁蛋白	mg	4.1	85.7
酪蛋白磷酸肽	mg	5.5	115.0

序号13:

奶瓶消毒及冲调方法



1. 冲调奶粉前应将手洗干净。
2. 将奶瓶、奶嘴和奶瓶盖洗干净，并在沸水中煮不少于5分钟。
3. 将饮用水煮沸后冷却至(40-45)°C。
4. 将正确所需水量加入已消毒的奶瓶中。
5. 用所附量勺加入正确份量的奶粉。
6. 旋紧瓶盖，晃动奶瓶直至奶粉完全溶解，滴几滴在手腕上以不烫手为准，即可喂哺。

喂哺用量建议表

月龄	水量	勺数	次数/每日
6-7月	150mL	5	5-6
7-9月	150-180mL	5-6	4-5
9-12月	180mL	6	4

1. 1匙≈4.5g奶粉，1匙粉兑30mL水(40-45°C 温开水)。
2. 此表只是正确的喂哺指导，您的宝宝也许要比此表的用量更多或更少。
3. 冲奶时只用随包装附带的专用量匙。
4. 没有煮沸的水、没有消毒的奶瓶或不正确的奶液浓度都会影响宝宝的健康。
5. 冲奶时请参照喂哺用量建议表调制，每次只调制一次的用量，剩余奶液丢弃不用，不可下次再喂。
6. 用少于或多于指定份量的奶粉会令宝宝得不到适当的营养或导致脱水。
7. 本喂哺表是参照正常发育较大婴儿的营养需求而设计，您可根据宝宝的发育状况酌情增减。
8. 100mL标准奶液=13.5g奶粉+90mL水。

贮藏方法

1. 每次用后将罐盖盖紧，存放在阴凉干燥处。
2. 开封后最好在三个月内用完。
3. 请在包装所示保质期内食用。

温馨提示

1. 喂哺时多加照顾，以防宝宝呛奶。
2. 本产品不适合6个月以下的婴儿，12月大时请选用幼儿配方奶粉。

重要声明

6-12月龄较大婴儿食用本产品时，须配合添加辅食。

生产商：齐齐哈尔宜贝生物科技有限公司
地址：黑龙江省齐齐哈尔市富裕县富裕牧场场区二区
产地：黑龙江齐齐哈尔
生产许可证编号：SC10523300750235
执行标准：GB 10766-2021
产品属性和类别：乳基粉状较大婴儿配方食品
生产日期和生产批号：见罐底部
保质期：24个月
产品曾用名：鹭然

贝提力

贝提力

较大婴儿配方奶粉 (6-12月龄, 2段)

2段

净含量: 800克
注册号: 国食注字YP20230385



配料表

脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、低芥酸菜籽油、亚麻籽油、玉米油)、脱脂奶粉、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、乳清蛋白粉、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、酪蛋白磷酸肽、乳铁蛋白、牛磺酸、核苷酸(5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠)、叶黄素、维生素(L-抗坏血酸、dl-α-酮酸生育醇、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B₁、维生素B₂、维生素B₆、维生素B₁₂、烟酸、叶酸、泛酸、生物素、植物甲萘醌、叶黄素、核黄素、盐酸硫胺素、氯化胆碱、胆碱、矿物质(磷酸三钙、氯化钾、碳酸钾、硫酸镁、磷酸钾、硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、碳酸氢钾、磷酸。

更多产品信息请查询

www.yanggy.com.cn

咨询热线: 400-618-9162



6 937527 488568

营养成分表

营养成分	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2005
蛋白质	g	0.62	12.34
脂肪	g	1.13	22.56
亚油酸	g	0.22	4.41
α-亚麻酸	mg	25	501.3
碳水化合物	g	2.7	54.6

维生素

维生素 A	μg RE	19	381
维生素 D	μg	0.58	11.63
维生素 E	mg α-TE	0.28	5.61
维生素 K ₁	μg	2.58	51.73
维生素 B ₁	μg	28	561
维生素 B ₂	μg	49	982
维生素 B ₆	μg	17.5	350.9
维生素 B ₁₂	μg	0.114	2.286
烟酸	μg	159	3188
叶酸	μg	6.3	126.3
泛酸	μg	195	3910
维生素 C	mg	4.6	92.2
生物素	μg	0.85	17.04
胆碱	mg	8.7	174.4

矿物质

钠	mg	4	80
钾	mg	23	461
铜	μg	13.5	270.7
镁	mg	1.4	28.1
铁	mg	0.37	7.42
锌	mg	0.21	4.21
钙	μg	4.27	85.61
磷	mg	21	421
碘	mg	14	281
氯	μg	4.7	94.2
硒	μg	16	321
锰	μg	0.69	13.83

可选择成分

牛磺酸	mg	2.3	46.1
二十二碳六烯酸	mg	3.8	76.2
二十碳四烯酸	mg	4.1	82.2
低聚半乳糖	g	0.08	1.66
低聚果糖	g	0.12	2.37
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	μg	0.3	6.0
叶黄素	μg	8.4	168.4
核黄素	mg	1.5	30.1
乳铁蛋白	mg	4.7	94.2
酪蛋白磷酸肽	mg	7.3	146.4

奶瓶消毒及冲调方法



1. 冲调奶粉前应将手洗干净。
2. 将奶瓶、奶嘴和奶瓶盖洗干净，并在沸水中煮不少于5分钟。
3. 将饮用水煮沸后冷却至(40-45)°C。
4. 将正确所需水量加入已消毒的奶瓶中。
5. 用所附量匙加入正确份量的奶粉。
6. 旋紧瓶盖，摇动奶瓶直至奶粉完全溶解，滴几滴在手腕上以不烫手为准，即可喂哺。

喂哺用量建议表

月龄	水量	平均数	次数/每日
12-24月	130-210mL	6-7	2-3
24-36月	210mL	7	2

1. 1匙≈4.5g 奶粉，1匙粉兑 30mL 水(40-45°C 的温开水)。
2. 此表只是正确的喂哺指导，您的宝宝也许要比此表的重量更多或更少。
3. 冲奶时只用罐包装附带的专用量匙。
4. 没有煮沸的水、没有消毒的奶瓶或不正确的奶液浓度都会影响宝宝的健康。
5. 冲奶时请参考喂哺用量建议表调制，每次只调制一次奶用量，剩余奶液丢弃不用，不可下次再兑。
6. 用少于或多于指定份量的奶粉会令宝宝得不到适当营养或导致脱水。
7. 本喂哺表是参照正常发育幼儿的营养需求而设计，您可根据宝宝的发育状况酌情增减。
8. 100mL 标准奶液=13.5g 奶粉+90mL 水。

贮藏方法

1. 每次用后将罐盖盖紧，存放在阴凉干燥处。
2. 开封后最好在三个月内用完。
3. 请在包装所示保质期内食用。

温馨提示

1. 喂哺时多加照顾，以防宝宝呛奶。
2. 本产品不适合6个月以下的婴儿。

重要声明

12-36 月龄幼儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。

生产商：齐齐哈尔宜贝生物科技有限公司
地址：黑龙江省齐齐哈尔市富裕县富裕牧场场直二区
产地：黑龙江齐齐哈尔
生产许可证编号：SC10523300750235
执行标准：GB 10767-2021
产品属性和类别：乳基粉状幼儿配方食品
生产日期和生产批号：见罐底部
保质期：24 个月
产品曾用名：雅然

贝提力

贝提力 幼儿配方奶粉 (12-36月龄, 3段)

3段

净含量: 800克
注册号: 国食注字 YP20230386



配料表

脱盐乳清粉、脱脂奶粉、食用植物调和油(1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油、低芥酸菜籽油、玉米油)、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、乳清蛋白粉、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、酪蛋白磷酸肽、乳铁蛋白、牛磺酸、核苷酸(5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠)、叶黄素、维生素(L-抗坏血酸、dl-α-醋酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄醇、烟酰胺、D-泛酸钙、D-生物素、植物甲萘醌、叶酸、核黄素、盐酸硫胺素、氰钴胺、氯化胆碱)、矿物质(磷酸三钙、氯化钾、碳酸钾、硫酸镁、磷酸钾、硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、硫酸氢钾、碘酸钾。

更多产品信息请咨询

www.yangyy.com.cn

咨询热线: 400-618-9162



6 937527 148857 5

营养成分表

营养成分	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1957
蛋白质	g	0.72	14.00
脂肪	g	1.05	20.60
亚油酸	g	0.21	4.11
α-亚油酸	mg	23	450
碳水化合物	g	2.8	54.4

维生素

维生素 A	μg RE	20	391
维生素 D	μg	0.59	11.55
维生素 E	mg α-TE	0.31	6.07
维生素 K ₁	μg	3.07	60.08
维生素 B ₁	μg	31	607
维生素 B ₂	μg	51	998
维生素 B ₆	μg	17.2	336.6
维生素 B ₁₂	μg	0.125	2.446
烟酸	μg	151	2955
叶酸	μg	6.0	117.4
泛酸	μg	188	3679
维生素 C	mg	4.7	92.0
生物素	μg	0.83	16.24

矿物质

钠	mg	5	98
钾	mg	26	509
铜	μg	14.3	279.9
镁	mg	1.9	37.2
铁	mg	0.34	6.65
锌	mg	0.17	3.33
钙	mg	23	450
磷	mg	15	294
碘	μg	3.9	76.3
氯	mg	20	391

可选择成分

硒	μg	0.75	14.68
胆碱	mg	9.3	182.0
锰	μg	4.49	87.87
牛磺酸	mg	2.3	45.0
二十二碳六烯酸	mg	3.7	72.4
二十碳四烯酸	mg	4.0	78.3
低聚半乳糖	g	0.08	1.66
低聚果糖	g	0.12	2.37
1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	g	0.3	5.9
叶黄素	μg	8.8	172.2
核苷酸	mg	1.6	31.3
乳铁蛋白	mg	4.9	95.9
酪蛋白磷酸肽	mg	8.0	156.6

序号15:

婴儿配方羊奶粉(0~6月龄,1段)

宜贝儿
婴儿配方羊奶粉
(0-6月龄,1段)

1. 没有煮沸的水、没有消毒的奶桶或不正确的奶液浓度都会影响宝宝的健康。
2. 用少于或多于指定量的奶粉会令宝宝得不到适当的营养或导致脱水。
3. 本罐奶粉是参照正发育婴儿的营养需求而设计，您可根据宝宝的发育状况酌情增减。

1. 冲调奶粉前使用肥皂或清水将手彻底洗净；
2. 将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗洁净，用沸水煮5分钟；
3. 饮用水煮满5分钟，冷却至40℃-45℃预备使用；
4. 参照“喂哺用量建议表”，用本品专用量匙加入正确份量奶粉；
5. 盖好奶瓶摇匀；
6. 滴一滴奶在手背测试温度。

生产者：齐齐哈尔宜贝生物科技有限公司
地址：黑龙江省齐齐哈尔市富裕县畜牧牧场所直二区
产地：黑龙江齐齐哈尔
生产许可证编号：SC0523300750235
执行标准：GB 10765-2021
产品属性和类别：母乳喂养婴儿配方食品
生产日期和生产批次：见罐底部
保质期：24个月
产品曾用名：陆康

1 段

净含量:800克
注册号:国食注字YP20200049

[illegible]

营养成分表						
营养成分	单位	每100kJ	每100g	营养成分	单位	每100kJ
能量	kJ	100	2090	钠	mg	9
蛋白质	g	0.51	10.70	钾	mg	21
脂肪	g	1.28	26.80	钙	μg	17.4
亚油酸	g	0.17	3.55	镁	mg	1.4
α-亚麻酸	mg	16	334	铁	mg	0.16
碳水化合物	g	2.5	52.0	锌	mg	0.15
维生素				锰	μg	3.99
维生素A	μg RE	17	355	钴	mg	18
维生素D	μg	0.52	10.87	铜	mg	10
维生素E	mg α-TE	0.33	6.90	碘	μg	3.7
维生素K ₁	μg	2.71	56.64	氟	mg	13
维生素B ₁	μg	25	523	硒	μg	1.06
维生素B ₂	μg	43	899	可选择成分		
维生素B ₆	μg	14.1	294.7	牛磺酸	mg	1.2
维生素B ₁₂	μg	0.113	2.365	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.0
烟酸	μg	139	2905	二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.4
泛酸	μg	57	119.1	低聚半乳糖	g	0.08
叶酸	μg	133	2780	低聚果糖	g	0.11
维生素C	mg	5.0	104.5	1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	g	0.20
生物素	μg	0.78	16.30	叶黄素	μg	4.2
胆碱	mg	7.1	148.4	核苷酸	mg	1.0
矿物质				酪蛋白磷酸肽	mg	7

100ml标准奶液=13.2g奶粉+90ml水

对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

1. 喂奶时应抱着宝宝，避免宝宝呛咳。
2. 每次喂奶前应使用消毒过的奶嘴，如百集全请手持加温食用。

1、避免强光直射，置于阴凉干燥处保存。
2、开封后产品请注意密封保存，请尽量在开封后四周内食用完，请勿放入冰箱内保存。

☎ 咨询热线: 400-619-9160

④ 欲購更多產品請致電或來函查詢：
www.swizer.com.cn



6 937527 488384

A060015F002

宜贝儿

较大婴儿配方羊奶粉(6~12月龄,2段)

宜贝儿
EBENZ

宜贝儿

较大婴儿配方羊奶粉
(6-12月龄,2段)

含膳食纤维

含1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯

含核苷酸

含牛磺酸

喂哺用量建议表

月龄	水量 (ml)	平匙数 / 次	每日喂哺次数 / 天
6-7	150	5	5-6
7-9	50-180	5-6	4-5
9-12	180	6	4

1. 没有煮沸的水、没有消毒的奶瓶或不正确的奶液浓度均会影响宝宝的健康。
2. 用少于或多于指定量的奶粉会令宝宝得不到适当的营养或导致脱水。
3. 本喂哺表是参照正发育较大婴儿的营养需求而设计，您可视宝宝的发育状况酌情增减。

奶具消毒及调奶方法

1. 冲调奶粉前应使用肥皂或清水将手彻底洗净；
2. 将奶瓶、奶嘴、奶瓶盖及器具清洗干净，用沸水煮5分钟；
3. 将水煮沸5分钟，冷却至40℃-45℃准备使用；
4. 参照“喂哺用量建议表”，用本品专用量匙加入正确份量奶粉；
5. 盖好奶瓶盖；
6. 滴一滴奶在手背测试温度。

生产商：齐纳尔国贝生物科技股份有限公司
地址：黑龙江省齐齐哈尔市富裕县富裕镇牧草场三区
产地：黑龙江齐齐哈尔
生产许可证编号：SC10523000750325
执行标准：GB 10766-2021
产品属性及类别：乳基预混较大婴儿配方食品
生产日期及生产批号：见罐底部
保质期：24个月
产品名称：奶粉

2段

净含量800克
注册号：国食注字YP20200050

宜贝儿 较大婴儿配方羊奶粉(6~12月龄,2段)

配料表：脱盐乳清粉（来源绵羊乳）、全脂绵羊奶粉、乳糖、食用植物油和油（葵花籽油、低芥酸菜籽油、椰子油、玉米油）、脱脂绵羊奶粉、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、低聚半乳糖、低聚果糖、核黄素、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油酯（来源鱼肝油）、维生素A棕榈酸酯、维生素E、维生素K、维生素B₁₂、维生素B₆、维生素B₂、维生素B₁、维生素C、维生素D₃、维生素D₂、维生素D₁、维生素D₄、维生素D₅、维生素D₆、维生素D₇、维生素D₈、维生素D₉、维生素D₁₀、维生素D₁₁、维生素D₁₂、维生素D₁₃、维生素D₁₄、维生素D₁₅、维生素D₁₆、维生素D₁₇、维生素D₁₈、维生素D₁₉、维生素D₂₀、维生素D₂₁、维生素D₂₂、维生素D₂₃、维生素D₂₄、维生素D₂₅、维生素D₂₆、维生素D₂₇、维生素D₂₈、维生素D₂₉、维生素D₃₀、维生素D₃₁、维生素D₃₂、维生素D₃₃、维生素D₃₄、维生素D₃₅、维生素D₃₆、维生素D₃₇、维生素D₃₈、维生素D₃₉、维生素D₄₀、维生素D₄₁、维生素D₄₂、维生素D₄₃、维生素D₄₄、维生素D₄₅、维生素D₄₆、维生素D₄₇、维生素D₄₈、维生素D₄₉、维生素D₅₀、维生素D₅₁、维生素D₅₂、维生素D₅₃、维生素D₅₄、维生素D₅₅、维生素D₅₆、维生素D₅₇、维生素D₅₈、维生素D₅₉、维生素D₆₀、维生素D₆₁、维生素D₆₂、维生素D₆₃、维生素D₆₄、维生素D₆₅、维生素D₆₆、维生素D₆₇、维生素D₆₈、维生素D₆₉、维生素D₇₀、维生素D₇₁、维生素D₇₂、维生素D₇₃、维生素D₇₄、维生素D₇₅、维生素D₇₆、维生素D₇₇、维生素D₇₈、维生素D₇₉、维生素D₈₀、维生素D₈₁、维生素D₈₂、维生素D₈₃、维生素D₈₄、维生素D₈₅、维生素D₈₆、维生素D₈₇、维生素D₈₈、维生素D₈₉、维生素D₉₀、维生素D₉₁、维生素D₉₂、维生素D₉₃、维生素D₉₄、维生素D₉₅、维生素D₉₆、维生素D₉₇、维生素D₉₈、维生素D₉₉、维生素D₁₀₀、维生素D₁₀₁、维生素D₁₀₂、维生素D₁₀₃、维生素D₁₀₄、维生素D₁₀₅、维生素D₁₀₆、维生素D₁₀₇、维生素D₁₀₈、维生素D₁₀₉、维生素D₁₁₀、维生素D₁₁₁、维生素D₁₁₂、维生素D₁₁₃、维生素D₁₁₄、维生素D₁₁₅、维生素D₁₁₆、维生素D₁₁₇、维生素D₁₁₈、维生素D₁₁₉、维生素D₁₂₀、维生素D₁₂₁、维生素D₁₂₂、维生素D₁₂₃、维生素D₁₂₄、维生素D₁₂₅、维生素D₁₂₆、维生素D₁₂₇、维生素D₁₂₈、维生素D₁₂₉、维生素D₁₃₀、维生素D₁₃₁、维生素D₁₃₂、维生素D₁₃₃、维生素D₁₃₄、维生素D₁₃₅、维生素D₁₃₆、维生素D₁₃₇、维生素D₁₃₈、维生素D₁₃₉、维生素D₁₄₀、维生素D₁₄₁、维生素D₁₄₂、维生素D₁₄₃、维生素D₁₄₄、维生素D₁₄₅、维生素D₁₄₆、维生素D₁₄₇、维生素D₁₄₈、维生素D₁₄₉、维生素D₁₅₀、维生素D₁₅₁、维生素D₁₅₂、维生素D₁₅₃、维生素D₁₅₄、维生素D₁₅₅、维生素D₁₅₆、维生素D₁₅₇、维生素D₁₅₈、维生素D₁₅₉、维生素D₁₆₀、维生素D₁₆₁、维生素D₁₆₂、维生素D₁₆₃、维生素D₁₆₄、维生素D₁₆₅、维生素D₁₆₆、维生素D₁₆₇、维生素D₁₆₈、维生素D₁₆₉、维生素D₁₇₀、维生素D₁₇₁、维生素D₁₇₂、维生素D₁₇₃、维生素D₁₇₄、维生素D₁₇₅、维生素D₁₇₆、维生素D₁₇₇、维生素D₁₇₈、维生素D₁₇₉、维生素D₁₈₀、维生素D₁₈₁、维生素D₁₈₂、维生素D₁₈₃、维生素D₁₈₄、维生素D₁₈₅、维生素D₁₈₆、维生素D₁₈₇、维生素D₁₈₈、维生素D₁₈₉、维生素D₁₉₀、维生素D₁₉₁、维生素D₁₉₂、维生素D₁₉₃、维生素D₁₉₄、维生素D₁₉₅、维生素D₁₉₆、维生素D₁₉₇、维生素D₁₉₈、维生素D₁₉₉、维生素D₂₀₀、维生素D₂₀₁、维生素D₂₀₂、维生素D₂₀₃、维生素D₂₀₄、维生素D₂₀₅、维生素D₂₀₆、维生素D₂₀₇、维生素D₂₀₈、维生素D₂₀₉、维生素D₂₁₀、维生素D₂₁₁、维生素D₂₁₂、维生素D₂₁₃、维生素D₂₁₄、维生素D₂₁₅、维生素D₂₁₆、维生素D₂₁₇、维生素D₂₁₈、维生素D₂₁₉、维生素D₂₂₀、维生素D₂₂₁、维生素D₂₂₂、维生素D₂₂₃、维生素D₂₂₄、维生素D₂₂₅、维生素D₂₂₆、维生素D₂₂₇、维生素D₂₂₈、维生素D₂₂₉、维生素D

序号21:

宜贝儿

幼儿配方羊奶粉(12~36月龄,3段)

含膳食纤维

三、乘积的求导法则

含糖甘藷

含牛磺酸

宜贝儿®
EBENZ

宜贝儿

幼儿配方羊奶粉
(12-36月龄,3段)

月龄	喂奶水量 (ml)	平匙数 / 次	每日哺哺次数 / 天
12-24	180-210	6-7	2-3
24-36	210	7	2

- 1、没有煮沸的水、有细菌的奶瓶或不正确的奶液浓度都会影响宝宝的健康。
- 2、用少于或多于指定量的奶粉会让宝宝得不到适当的营养或导致脱水。
- 3、本罐奶表是参照正常发育幼儿的营养需求而设计，您可根据宝宝的发育状况酌情增减。

奶具消毒及調製方法

1. 冲调奶粉前应使用肥皂或清水将手彻底洗净；
2. 将奶瓶、奶嘴、奶嘴盖及器具清洗干净，用沸水煮沸5分钟；
3. 饮用水煮沸5分钟，冷却至40℃-45℃ 预备使用；
4. 参照“喂哺用量建议表”，用本品专用量匙加入正确份量奶粉；
5. 盖好奶瓶摇匀；
6. 滴一滴奶在手背测试温度。

生产者: 齐齐哈尔宜民生物科技有限公司
地址: 黑龙江省齐齐哈尔市富裕县富裕牧场场道二区
产地: 黑龙江省齐齐哈尔市
生产许可证编号: SC102153007500235
执行标准: GB 10767-2021
产品属性和类别: 乳基粉状幼儿配方食品
生产日期和生产批次: 见罐底部
保质期: 24个月
产品食用名: 尚能

3段
净含量:400克
注册号:国食注字YP20200051

宜贝儿 幼儿配方羊奶粉(12~36月龄,3段)

[illegible]

营养成分表			
营养成分	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1957
蛋白质	g	0.72	14.00
脂肪	g	1.05	20.60
亚油酸	g	0.14	2.74
α -亚麻酸	mg	15	294
碳水化合物	g	2.8	54.4
维生素			
维生素A	$\mu\text{g RE}$	19	372
维生素D	μg	0.62	12.13
维生素E	$\text{mg } \alpha\text{-TE}$	0.32	6.26
维生素K ₁	μg	2.74	53.62
维生素B ₁	μg	28	548
维生素B ₂	μg	51	998
维生素B ₆	μg	15.9	311.2
维生素B ₁₂	μg	0.122	2.388
烟酸	μg	158	3092
叶酸	μg	5.3	103.7
泛酸	μg	135	2642
维生素C	mg	4.3	84.2
生物素	μg	0.78	15.26
矿物质			
钠	mg	6	117

营养成分	单位	每100kJ	每100g
钙	mg	21	411
铜	μg	14.5	283.8
镁	mg	1.5	29
铁	mg	0.31	6.07
锌	mg	0.13	2.54
硒	mg	21	411
磷	mg	12	235
碘	μg	3.1	60.7
氯	mg	12	235
可选择成分			
酒	μg	0.92	18.00
胆碱	mg	6.0	117.4
锰	μg	4.63	90.61
牛磺酸	mg	1.3	25.4
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	1.4	27.4
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	1.7	33.3
低聚半乳糖	g	0.08	1.66
低聚果糖	g	0.12	2.37
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.16	3.13
叶黄素	μg	9.1	178.1
核苷酸	mg	1.3	25.4
酪蛋白磷酸肽	mg	8	157

100ml标准奶液=13.5g奶粉+90ml水

重要说明

对于12-36月龄的幼儿食用本产品时，须添加辅助食品。

温馨提示

- 1、喂奶时应抱着宝宝，避免宝宝呛咳。
- 2、每次喂奶都应使用新配置的奶液，如百利余请丢弃并加再食用。

貯存條件

- 1、避免强光直射，置于阴凉干燥处保存。
2、开封后产品请注意密封保存，请尽量在开封后四周内食用完，请勿放入冰箱内保存。

☎ 咨询热线: 400-619-9160

如需更多产品信息及资料下载:
www.swizer.com.cn



6 937527 488438

A060014F002

