

| 营养成分表              |         |       |        |
|--------------------|---------|-------|--------|
| 项目                 | 单位      | 每100g | 每100kJ |
| 能量                 | kJ      | 2032  | 100    |
| 蛋白质                | g       | 11.0  | 0.54   |
| 脂肪                 | g       | 24.1  | 1.19   |
| 亚油酸                | g       | 1.95  | 0.10   |
| α-亚麻酸              | mg      | 322   | 16     |
| 碳水化合物              | g       | 54.5  | 2.7    |
| 维生素                |         |       |        |
| 维生素A               | μg RE   | 382   | 19     |
| 维生素D               | μg      | 12.9  | 0.63   |
| 维生素E               | mg α-TE | 3.24  | 0.16   |
| 维生素K <sub>1</sub>  | μg      | 33.2  | 1.63   |
| 维生素B <sub>1</sub>  | μg      | 421   | 21     |
| 维生素B <sub>2</sub>  | μg      | 564   | 28     |
| 维生素B <sub>6</sub>  | μg      | 295.5 | 14.5   |
| 维生素B <sub>12</sub> | μg      | 0.785 | 0.039  |
| 烟酸(烟酰胺)            | μg      | 2550  | 125    |
| 叶酸                 | μg      | 78.7  | 3.9    |
| 泛酸                 | μg      | 3219  | 158    |
| 维生素C               | mg      | 66.3  | 3.3    |
| 生物素                | μg      | 11.6  | 0.57   |
| 矿物质                | mg      | 128   | 6.3    |
| 钠                  | mg      | 178   | 9      |
| 钾                  | mg      | 419   | 21     |
| 钙                  | μg      | 366   | 18.0   |
| 镁                  | mg      | 31.6  | 1.6    |
| 铁                  | mg      | 3.42  | 0.17   |
| 锌                  | μg      | 3.47  | 0.17   |
| 锰                  | μg      | 45.2  | 2.22   |
| 铜                  | μg      | 309   | 15     |
| 磷                  | mg      | 177   | 9      |
| 碘                  | μg      | 94.7  | 4.7    |
| 硒                  | mg      | 303   | 15     |
| 膳食纤维               | μg      | 19.2  | 0.94   |
| 可溶性成分              |         |       |        |
| 肌醇                 | mg      | 271   | 1.3    |
| 牛磺酸                | mg      | 29    | 1.4    |
| 二十二碳六烯酸(DHA)       | mg      | 80    | 3.9    |
| 二十二碳四烯酸(ARA)       | mg      | 100   | 4.9    |
| 低聚半乳糖              | mg      | 1230  | 61     |
| 低聚果糖               | mg      | 2142  | 105    |
| 1,3-二油酸-2-酰基甘油三酯   | g       | 4.3   | 0.21   |
| 叶黄素                | μg      | 80    | 3.9    |
| 核苷酸                | mg      | 17    | 0.84   |
| 乳铁蛋白               | mg      | 45    | 2.2    |

| 配料表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-酰基甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚油酸甘油酯)、低聚果糖(FOS)、低聚半乳糖(GOS)、乳清蛋白粉、无水奶油、浓缩乳清蛋白粉、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、乳铁蛋白、谷氨酰胺、大豆卵磷脂、大豆异黄酮、5-肌苷酸二钠、5-鸟苷酸二钠、5-腺苷酸二钠、5-胞苷酸二钠、维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B <sub>1</sub> (盐酸硫胺素)、维生素B <sub>2</sub> (核黄素)、维生素B <sub>6</sub> (盐酸吡哆醇)、维生素B <sub>12</sub> (氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(抗坏血酸)、D-生物素、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、叶黄素、碳酸钾、磷酸三钙、硫酸铁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸锰、硫酸钠、亚硫酸钠、柠檬酸钠、氯化钾。 |                                           |
| 冲调方法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 冲调前请洗净双手;将奶瓶、奶嘴及奶瓶盖彻底清洗干净。                |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 将奶具放在沸水中煮至5分钟,备用。                         |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 将清水冷却至50℃~60℃,将正确水量加入奶瓶中。                 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 按《喂哺表》说明,用专用量匙将准确量奶粉加入奶瓶中(取奶粉时,请勿刻意压实)。   |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 将奶瓶盖紧后摇晃至完全溶解。喂哺前将奶液滴二、三滴于内手腕测试温度,以不烫手为宜。 |

爱美乐®

爱美乐臻萃

1段

婴儿配方奶粉  
(0-6月龄,1段)

净含量:800克·国食注字YP20230436

## 喂哺表

| 婴儿月龄  | 每次用量   |     | 每24小时喂哺次数 |
|-------|--------|-----|-----------|
|       | 毫升(毫升) | 茶匙数 |           |
| 2-14天 | 60     | 2   | 8         |
| 3-8周  | 120    | 4   | 6         |
| 2-3个月 | 120    | 4   | 6         |
| 3-6个月 | 180    | 6   | 5         |

\* 瓶内附赠专用量匙

## 注意事项

标准稀释法:一平匙奶粉(约4.5克)兑30毫升水。

请按《喂哺表》喂哺。请不要擅自改变冲调比例,不当的冲调不利于婴儿的健康。

请勿使用沾有水的量匙取奶粉。

冲调后请马上给婴儿喂哺,或盖紧奶瓶并储存在温度为2-4℃的冰箱中,冷藏时间不得超过24小时,如果冲调后的配方奶粉超过2小时未予冷藏,则不能再食用。

请勿将冲调好的配方奶粉冻结。

开始喂哺后,奶瓶内的配方奶粉必须在1小时内用完,未用完的配方奶粉必须倒掉,不能再进行冷藏。

请回收并  
循环利用400-707-5116  
产品咨询热线  
<http://www.dazingdairy.com>

## 贮藏方法

本品应存放在阴凉、干燥处,开启后  
请将开口封严,并在一个月内用完。  
开封后请勿放入冰箱储存,请在保质  
期内食用此产品。

## 重要说明

对于0-6月龄的婴儿最理想的食品是  
母乳。在母乳不足或无母乳时可食用  
本产品。本品为乳基粉状婴儿配方食品,牛奶  
蛋白过敏者勿用。制造商:大庆乳品厂有限责任公司  
公司地址:黑龙江省大庆市高新区  
安萨路18公里处产地:黑龙江省大庆市  
邮编:163311  
生产许可证号:SC10523060205637  
销售热线:0459-6030306  
售后服务:0459-6030666  
产品执行标准:GB 10765-2021  
产品类别:乳基婴儿配方奶粉  
保质期:24个月  
生产日期(批号):见罐底

6 907121 213156

| 喂哺表   |                  |      |               | 注意事项                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|-------|------------------|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 婴儿月龄  | 每次用量<br>温开水量(毫升) | 量匙匙数 | 每24小时<br>喂哺次数 | 1. 标准稀释法: 一平匙奶粉(约4.5克)兑30毫升水。<br>2. 请按《喂哺表》喂哺, 请不要擅自改变冲调比例, 不当的冲调不利于婴儿的健康。<br>3. 请您使用沾有水的量匙取奶粉。<br>4. 冲调后请立即给宝宝喂哺, 罐盖紧密封并储存在温度为2-4℃的冰柜中, 冷藏时间不得超过24小时; 如果冲调后的配方奶粉超过2小时未予冷藏, 则不能再食用。<br>5. 请勿将冲调好的配方奶粉冻结。<br>6. 开始喂哺后, 奶瓶内的配方奶粉必须在1小时内用完。未用完的配方奶粉必须倒掉, 不能再进行冷藏。 |  |
| 2-14天 | 60               | 2    | 8             |                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 3-8周  | 120              | 4    | 6             |                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 2-3个月 | 120              | 4    | 6             |                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 3-6个月 | 180              | 6    | 5             |                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

  

| 营养成分表             |         |       |        |
|-------------------|---------|-------|--------|
| 项目                | 单位      | 每100g | 每100kJ |
| 能量                | kJ      | 2032  | 100    |
| 蛋白质               | g       | 11.0  | 0.54   |
| 脂肪                | g       | 24.1  | 1.19   |
| 亚油酸               | g       | 1.95  | 0.10   |
| α-亚麻酸             | mg      | 322   | 16     |
| 碳水化合物             | g       | 54.5  | 2.7    |
| 维生素               |         |       |        |
| 维生素A              | μg RE   | 382   | 19     |
| 维生素D              | μg      | 12.9  | 0.63   |
| 维生素E              | mg α-TE | 3.24  | 0.16   |
| 维生素K              | μg      | 33.2  | 1.63   |
| 维生素B <sub>1</sub> | μg      | 421   | 21     |
| 维生素B <sub>2</sub> | μg      | 564   | 28     |
| 维生素B <sub>6</sub> | μg      | 0.785 | 0.039  |
| 烟酸(烟酰胺)           | μg      | 2550  | 125    |
| 叶酸                | μg      | 78.7  | 3.9    |
| 泛酸                | μg      | 3219  | 158    |
| 维生素C              | mg      | 66.3  | 3.3    |
| 生物素               | μg      | 11.6  | 0.57   |
| 胆碱                | mg      | 128   | 6.3    |
| 矿物质               |         |       |        |
| 钠                 | mg      | 178   | 9      |

  

| 项目           | 单位 | 每100g | 每100kJ |
|--------------|----|-------|--------|
| 钾            | mg | 419   | 21     |
| 铜            | μg | 366   | 18.0   |
| 镁            | mg | 31.6  | 1.6    |
| 铁            | mg | 3.42  | 0.17   |
| 锌            | mg | 3.47  | 0.17   |
| 锰            | μg | 45.2  | 2.22   |
| 钴            | mg | 309   | 15     |
| 磷            | μg | 94.7  | 4.7    |
| 硒            | μg | 303   | 15     |
| 可选择成分        |    |       |        |
| 肌醇           | mg | 27.1  | 1.3    |
| 牛磺酸          | mg | 29    | 1.4    |
| 二十二碳六烯酸(DHA) | mg | 80    | 3.9    |
| 二十二碳五烯酸(EPA) | mg | 100   | 4.9    |
| 低聚果糖         | mg | 1230  | 61     |
| 低聚半乳糖        | mg | 2142  | 105    |
| β-胡萝卜素       | μg | 4.3   | 0.21   |
| 叶黄素          | μg | 80    | 3.9    |
| 核苷酸          | mg | 17    | 0.84   |
| 乳铁蛋白         | mg | 45    | 2.2    |

爱美乐®

爱美乐臻萃

1段

婴儿配方奶粉  
(0-6月龄, 1段)

净含量: 150克 · 国食注字YP20230436

#### 配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物油和油(1,3-二油酸-2-萘醇酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、乳糖、低聚果糖(FOS)、低聚半乳糖(GOS)、乳清蛋白粉、无水奶油、浓缩乳清蛋白粉、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、核苷酸(5'-单磷酸腺苷、5'-核苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠)、维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B<sub>1</sub>(盐酸硫胺素)、维生素B<sub>2</sub>(核黄素)、维生素B<sub>6</sub>(盐酸吡哆醇)、维生素B<sub>12</sub>(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸)、D-生物素、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、叶黄素、硬脂酸、磷酸三钙、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、磷酸钾、磷酸钠、磷酸铝、亚硒酸钠、柠檬酸钠、氯化钾。

#### 贮藏方法

本品应存放在阴凉、干燥处, 开启后请将开口封严, 并在一个月内用完。开封后请放入冰箱储存, 请在保质期内食用此产品。

#### 重要说明

对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳。在母乳不足或无母乳时可食用本产品。本品为乳基粉状婴儿配方食品, 牛奶蛋白过敏者勿用。

#### 冲调方法

- 冲调前请洗净双手; 将奶瓶、奶嘴及奶盖彻底清洗干净。
- 将奶具放在沸水中煮至5分钟, 备用。
- 将沸水冷却至50℃~60℃, 将正确水量加入奶瓶中。
- 按《喂哺表》说明, 用专用量匙将准确量奶粉加入奶瓶中(取奶粉时, 请勿刻意压平)。
- 将奶盖盖紧后摇匀至完全溶解。喂哺前将奶液滴二、三滴于手腕测试温度, 以不烫手为宜。



400-707-5116  
产品咨询热线  
<http://www.doingdairy.com>



6 907121 213323

### 配料表

| 项目                | 单位      | 每100g | 每100L |
|-------------------|---------|-------|-------|
| 能量                | kJ      | 1999  | 100   |
| 蛋白质               | g       | 12.3  | 0.62  |
| 脂肪                | g       | 22.5  | 1.13  |
| 碳水化合物             | g       | 1.97  | 0.10  |
| α-亚油酸             | mg      | 302   | 15    |
| 碳水化合物             | g       | 54.7  | 2.7   |
| 维生素               |         |       |       |
| 维生素A              | μg RE   | 48.2  | 24    |
| 维生素D              | μg      | 13.1  | 0.66  |
| 维生素E              | mg α-TE | 4.24  | 0.21  |
| 维生素K <sub>1</sub> | μg      | 33    | 1.65  |
| 维生素K <sub>2</sub> | μg      | 437   | 22    |
| 维生素B <sub>1</sub> | μg      | 550   | 28    |
| 维生素B <sub>2</sub> | μg      | 345   | 17.3  |
| 维生素B <sub>6</sub> | μg      | 126   | 0.063 |
| 烟酸/烟酰胺            | mg      | 63    | 3.2   |
| 叶酸                | μg      | 30    | 3.2   |
| 胆碱                | μg      | 3215  | 161   |
| 维生素C              | mg      | 62.4  | 3.1   |
| 生物素               | μg      | 12.6  | 0.63  |
| 胆碱                | mg      | 128   | 6.4   |
| 矿物质               |         |       |       |
| 钠                 | mg      | 66    | 3     |
| 钾                 | mg      | 404   | 20    |
| 钙                 | mg      | 258   | 12.9  |
| 镁                 | mg      | 301   | 1.5   |
| 铁                 | mg      | 6.85  | 0.34  |
| 锌                 | mg      | 3.5   | 0.18  |
| 铜                 | μg      | 48.5  | 2.43  |
| 钴                 | mg      | 371   | 19    |
| 锰                 | μg      | 224   | 11    |
| 钼                 | μg      | 90    | 4.5   |
| 硒                 | μg      | 145   | 7     |
| 氯                 | μg      | 12.5  | 0.63  |
| 可溶性成分             |         |       |       |
| 肌醇                | mg      | 28.6  | 1.4   |
| 维生素C              | mg      | 34    | 1.7   |
| 二-萜六烯酸(DHA)       | mg      | 80    | 4.0   |
| 十一-四烯酸(EPA)       | mg      | 100   | 5.0   |
| 维生素E              | mg      | 1320  | 66    |
| 维生素K <sub>2</sub> | mg      | 1444  | 107   |
| 低-三-油酸-2-羟酸甘油酯    | g       | 3.6   | 0.18  |
| 维生素E              | μg      | 180   | 9.0   |
| 维生素K <sub>2</sub> | μg      | 36    | 0.80  |
| 乳白蛋白              | mg      | 40    | 2.0   |

[illegible]

### 冲调方法

- 

1 冲调前请洗净双手;将奶瓶、奶嘴及奶瓶盖彻底清洗干净。
- 

2 将奶具放在沸水中煮至5分钟,备用。
- 

3 将沸水冷却至50℃~60℃,将正确水量加入奶瓶中。
- 

4 按(喂哺表)说明,用专用量匙将准确量奶粉加入瓶中(取奶粉时,请勿刻意压实)。
- 

5 将奶瓶盖紧后摇晃至完全溶解。眼睛前将奶液滴2、三滴于内手腕测试温度,以不烫伤为宜。

爱美乐®

# 爱美乐臻萃

2段

较大婴儿配方奶粉  
(6-12月龄,2段)

净含量:800克·国食注字YP20230437

喂哺表

| 较大婴儿月龄 | 每次用量    |      | 每24小时喂哺次数 |
|--------|---------|------|-----------|
|        | 温开水(毫升) | 量匙匙数 |           |
| 6-12个月 | 240     | 8    | 4         |

\* 蓋内附贈专用量匙

### 注意事项

标准稀释法：一平匙奶粉（约4.5克）兑30毫升水。

请按《喂哺表》喂哺。请不要擅自改变冲调比例，不恰当的冲调不利于较大婴儿的健康。

请勿使用沾有水的量匙取奶粉。

冲调后请马上给较大婴儿喂哺,或盖紧奶瓶并储存在温度为2-4℃的冰箱中,冷藏时间不得超过24小时,如果冲调后的配方奶粉超过2小时未予冷藏,则不能再食用。

请勿将冲调好的配方奶粉冻结。

开始喂哺后，奶瓶内的配方奶粉必须在1小时内用完。  
未用完的配方奶粉必须倒掉，不能再进行冷藏。



400-707-5116  
产品咨询热线  
<http://www.dagongdairy.com>

### 贮藏方法

本品应存放在阴凉、干燥处，开启后  
请将开口封严，并在一个月内用完。  
开封后请勿放入冰箱储存，请在保质  
期内食用此产品。

## 重要说明

较大婴儿食用本产品时,须配合添加辅助食品。

本品为乳基粉状较大婴儿配方食品  
牛奶蛋白过敏者勿用。

制造商: 大庆乳品厂有限责任公司  
公司地址: 黑龙江省大庆市高新区  
安萨路18公里处  
产地: 黑龙江省大庆市  
邮编: 163311  
生产许可证号: SC10523060250637  
销售热线: 0459-6030306  
售后服务: 0459-6030666  
产品执行标准: GB 10766-2021  
产品类别: 乳基较大婴儿配方奶粉  
保质期: 24个月  
生产日期(批号): 见罐底



6 907121 213163

营养成分表

| 项目                 | 单位      | 每100g | 每100kJ |
|--------------------|---------|-------|--------|
| 能量                 | kJ      | 1999  | 100    |
| 蛋白质                | g       | 13.4  | 0.67   |
| 脂肪                 | g       | 22.4  | 1.12   |
| 亚油酸                | g       | 1.97  | 0.10   |
| α-亚麻酸              | mg      | 301   | 15     |
| 碳水化合物              | g       | 53.9  | 2.7    |
| 维生素                |         |       |        |
| 维生素A               | μg RE   | 496   | 25     |
| 维生素D               | μg      | 13.2  | 0.66   |
| 维生素E               | mg α-TE | 4.24  | 0.21   |
| 维生素K               | μg      | 53    | 1.55   |
| 维生素B <sub>1</sub>  | μg      | 425   | 21     |
| 维生素B <sub>2</sub>  | μg      | 575   | 29     |
| 维生素B <sub>6</sub>  | μg      | 315   | 15.8   |
| 维生素B <sub>12</sub> | μg      | 1.27  | 0.064  |
| 烟酸(烟酰胺)            | μg      | 3497  | 175    |
| 叶酸                 | μg      | 63.2  | 3.2    |
| 维生素C               | mg      | 3215  | 161    |
| 生物素                | mg      | 64.2  | 3.2    |
| 矿物质                |         |       |        |
| 钠                  | mg      | 119   | 6      |
| 钾                  | mg      | 475   | 24     |
| 铜                  | μg      | 319   | 16.0   |
| 镁                  | mg      | 36.8  | 1.8    |
| 铁                  | mg      | 7.42  | 0.37   |
| 锌                  | mg      | 2.7   | 0.14   |
| 钙                  | mg      | 414   | 21     |
| 磷                  | mg      | 219   | 11     |
| 氯                  | mg      | 51.6  | 2.6    |
| 碘                  | mg      | 180   | 9      |
| 可选择成分              |         |       |        |
| 硒                  | μg      | 12.3  | 0.62   |
| 胆碱                 | mg      | 131   | 6.6    |
| 锰                  | μg      | 62    | 3.10   |
| 肌醇                 | mg      | 31.5  | 1.6    |
| 牛磺酸                | mg      | 35    | 1.8    |
| 二十二碳六烯酸(DHA)       | mg      | 48    | 2.4    |
| 二十二碳四烯酸(ARA)       | mg      | 49    | 2.5    |
| 低聚半乳糖              | mg      | 1140  | 57     |
| 低聚果糖               | mg      | 2144  | 107    |
| 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯  | g       | 3.6   | 0.18   |
| 叶黄素                | μg      | 183   | 9.2    |
| 核苷酸                | μg      | 16    | 0.80   |
| 乳铁蛋白               | mg      | 43    | 2.2    |

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯)、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油、乳脂、低聚果糖FOS、低聚半乳糖(GOS)、乳清蛋白粉、浓缩乳清蛋白粉、无水奶油、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、核苷酸(5'-核苷酸腺苷、5'-核苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-腺苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠)、维生素A(视黄醇或真醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B<sub>1</sub>(盐酸硫胺素)、维生素B<sub>2</sub>(核黄素)、维生素B<sub>6</sub>(盐酸吡哆醇)、维生素B<sub>12</sub>(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(抗坏血酸)、D-生物素、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、叶黄素、赖氨酸、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠、柠檬酸钾。

冲调方法

1 冲调前请洗净双手；将奶瓶、奶嘴及奶盖彻底清洗干净。

2 将奶具放在沸水中煮至5分钟，备用。

3 将清水冷却至50℃~60℃，将正确水量加入奶瓶中。

4 按《说明》说明，用专用量匙将准确量奶粉加入奶瓶中(取奶粉时，请勿刻意压平)。

5 将奶瓶盖紧后摇晃至完全溶解。喂哺前将奶液滴二、三滴于内手腕测试温度，以不烫手为宜。

爱美乐®

爱美乐臻萃

3段

幼儿配方奶粉  
(12-36月龄,3段)

净含量:800克·国食注字YP20230438

## 喂哺表

| 幼儿月龄    | 每次用量   |        | 每24小时喂哺次数 |
|---------|--------|--------|-----------|
|         | 毫升(盎司) | 毫升(盎司) |           |
| 12-36个月 | 240    | 8      | 2-3       |

\*盖内附赠专用量匙

## 贮藏方法

本品应存放在阴凉、干燥处，开启后  
请将开口封严，并在一个月内用完。  
开封后请勿放入冰箱储存，请在保质  
期内食用此产品。

## 重要说明

本品为乳基粉状幼儿配方食品，牛奶  
蛋白过敏者勿用。

制造商：大庆乳品厂有限责任公司  
公司地址：黑龙江省大庆市高新区  
安萨路18公里处  
产地：黑龙江省大庆市  
邮编：163311  
生产许可证号：SC10523060250637  
销售热线：0459-6030306  
售后服务：0459-6030666  
产品执行标准：GB 10767-2021  
产品类别：乳基幼儿配方奶粉  
保质期：24个月  
生产日期(批号)：见罐底

## 注意事项

标准稀释法：一平匙奶粉(约4.5克)兑30毫升水。

请按《喂哺表》喂哺。请不要擅自改变冲调比例，  
不恰当的冲调不利于幼儿的健康。

请勿使用沾有水的量匙取奶粉。

冲调后请马上给幼儿喂哺，或盖紧奶瓶并储存在  
温度为2-4℃的冰箱中，冷藏时间不得超过24小时。  
如果冲调后的配方奶粉超过2小时未予冷藏，则  
不能再食用。

请勿将冲调好的配方奶粉冻结。

开始喂哺后，奶瓶内的配方奶粉必须在1小时内用完。  
未用完的配方奶粉必须倒掉，不能再进行冷藏。



400-707-5116  
产品咨询热线  
<http://www.daqingdairy.com>



6 907121 213170



| 营养成分表              |         |       |        |
|--------------------|---------|-------|--------|
| 项目                 | 单位      | 每100g | 每100kJ |
| 能量                 | kJ      | 2033  | 100    |
| 蛋白质                | g       | 11.0  | 0.54   |
| 脂肪                 | g       | 24.2  | 1.19   |
| 亚油酸                | g       | 1.94  | 0.10   |
| α-亚麻酸              | mg      | 327   | 16     |
| 碳水化合物              | g       | 54.3  | 2.7    |
| 维生素A               | μg RE   | 382   | 19     |
| 维生素D               | μg      | 12.8  | 0.63   |
| 维生素E               | mg α-TE | 3.2   | 0.16   |
| 维生素K <sub>1</sub>  | μg      | 27.4  | 1.35   |
| 维生素B <sub>1</sub>  | μg      | 374   | 18     |
| 维生素B <sub>2</sub>  | μg      | 515   | 25     |
| 维生素B <sub>6</sub>  | μg      | 231.4 | 11.4   |
| 维生素B <sub>12</sub> | μg      | 0.698 | 0.034  |
| 叶酸(叶酸酸)            | μg      | 2580  | 127    |
| 叶酸                 | μg      | 76.4  | 3.8    |
| 泛酸                 | μg      | 2650  | 130    |
| 维生素C               | mg      | 66.5  | 3.3    |
| 生物素                | mg      | 10.7  | 0.53   |
| 胆碱                 | mg      | 125   | 6.1    |
| 矿物质                |         |       |        |
| 钠                  | mg      | 183   | 9      |
| 钾                  | mg      | 447   | 22     |
| 钙                  | mg      | 369   | 18.2   |
| 镁                  | mg      | 32.5  | 1.6    |
| 铁                  | mg      | 2.85  | 0.14   |
| 锌                  | mg      | 3.2   | 0.16   |
| 铜                  | μg      | 32.6  | 1.60   |
| 锰                  | μg      | 325   | 16     |
| 钴                  | mg      | 175   | 9      |
| 磷                  | mg      | 96.6  | 4.8    |
| 碘                  | mg      | 324   | 16     |
| 硒                  | μg      | 19.7  | 0.97   |
| 可选择成分              |         |       |        |
| 肌醇                 | mg      | 28.4  | 1.4    |
| 牛磺酸                | mg      | 28    | 1.4    |
| 十二-羟六烯酸(DHA)       | mg      | 80    | 3.9    |
| 二十-碳五烯酸(EPA)       | mg      | 100   | 4.9    |
| 低聚半乳糖              | mg      | 477   | 23     |
| 低聚果糖               | mg      | 2999  | 148    |
| 核苷酸                | mg      | 15.2  | 0.75   |
| 乳铁蛋白               | mg      | 42    | 2.1    |

## 配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、乳糖、低聚果糖(FOS)、低聚半乳糖(GOS)、花生四烯酸(ARA)、二十二-碳六烯酸(DHA)、浓缩乳清蛋白粉、乳铁蛋白、核苷酸(5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠)、维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(d-α-生育酚生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B<sub>1</sub>(硫胺素)、维生素B<sub>2</sub>(核黄素)、维生素B<sub>6</sub>(吡哆醇)、维生素B<sub>12</sub>(氰钴胺)、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸)、D-生物素、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、碳酸钾、碳酸三钙、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸钾、硫酸铜、硫酸锰、亚硫酸钠、柠檬酸钠、氯化钾。

## 冲调方法

- 1 冲调前请洗净双手；将奶瓶、奶嘴及奶瓶盖彻底清洗干净。
- 2 将奶瓶放在沸水中煮至5分钟，备用。
- 3 将沸水冷却至50℃~60℃，将正确水量加入奶瓶中。
- 4 按《喂哺表》说明，用专用量匙将准确量奶粉加入奶瓶中(取奶粉时，请勿刻意压实)。
- 5 将奶瓶盖紧后摇匀至完全溶解，喂哺前将奶液滴二、三滴于内手腕测试温度，以不烫手为宜。

爱美乐®

爱美乐臻护

婴儿配方奶粉  
(0-6月龄, 1段)

净含量: 800克 · 国食注字YP20230439

## 喂哺表

| 婴儿月龄  | 每次用量  |       | 每日喂奶次数 |
|-------|-------|-------|--------|
|       | 毫升/盎司 | 毫升/盎司 |        |
| 2-14天 | 60    | 2     | 8      |
| 2-6周  | 120   | 4     | 6      |
| 2-3个月 | 120   | 4     | 6      |
| 3-6个月 | 180   | 6     | 5      |

\* 盖内附赠专用量匙

## 贮藏方法

本品应存放在阴凉、干燥处，开启后请将开口封严，并在一个月内用完。开封后请勿放入冰箱储存，请在保质期内食用此产品。

## 重要说明

对于0-6月龄的婴儿最理想的食品是母乳。在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

本品为乳基配方奶粉，牛奶蛋白过敏者勿用。

制造商: 大庆乳品厂有限责任公司  
公司地址: 黑龙江省大庆市高新区安萨路18公里处  
产地: 黑龙江省大庆市  
邮编: 163311  
生产许可证号: SC10523060250637  
销售热线: 0459-6030306  
售后服务: 0459-6030666  
产品执行标准: GB 10765-2021  
产品类别: 乳基婴儿配方奶粉  
保质期: 24个月  
生产日期(批号): 见罐底

## 注意事项

标准稀释法: 一平匙奶粉(约4.5克)兑30毫升水。

请按《喂哺表》喂哺。请不要擅自改变冲调比例，不恰当的冲调不利于婴儿的健康。

请勿使用沾有水的量匙取奶粉。

冲调后请马上给婴儿喂哺，或盖紧奶瓶并储存在温度为2-4℃的冰箱中，冷藏时间不得超过24小时。如果冲调后的配方奶粉超过2小时未予冷藏，则不能再食用。

请勿将冲调好的配方奶粉冻结。

开始喂哺后，奶瓶内的配方奶粉必须在1小时内用完。未用完的配方奶粉必须倒掉，不能再进行冷藏。



400-707-5116  
产品咨询热线  
<http://www.doingdairy.com>



| 喂哺表   |                  |                    | 注意事项                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|-------|------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 婴儿月龄  | 每次用量<br>温开水量(毫升) | 每24小时<br>量匙匙数 喂哺次数 | 1. 标准稀释法:一平匙奶粉(约4.5克)兑30毫升水。<br>2. 请按《喂哺表》喂哺,请不要擅自改变冲泡比例,不恰<br>当的冲泡不利于婴儿的健康。<br>3. 请勿使用开水冲泡奶粉。<br>4. 冲泡后请立即上给婴儿喂哺,或盖紧奶瓶并储存在温<br>度为2-4℃的冰箱中,冷藏时间不得超过24小时,如<br>果冲泡后的配方奶粉超过2小时未予冷藏,则不能再<br>食用。<br>5. 请勿将冲泡好的配方奶粉冻结。<br>6. 开始喂哺后,奶瓶内的配方奶粉必须在1小时内用完,<br>未用完的配方奶粉必须倒掉,不能再进行冷藏。 |  |
| 2-14天 | 60               | 2 8                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 3-8周  | 120              | 4 6                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 2-3个月 | 120              | 4 6                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 3-6个月 | 180              | 6 5                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |

  

| 营养成分表              |         |       |        |
|--------------------|---------|-------|--------|
| 项目                 | 单位      | 每100g | 每100kJ |
| 能量                 | kJ      | 2033  | 100    |
| 蛋白质                | g       | 11.0  | 0.54   |
| 脂肪                 | g       | 24.2  | 1.19   |
| 碳水化合物              | g       | 19.4  | 0.10   |
| α-亚麻酸              | mg      | 327   | 16     |
| 碳水化合物              | g       | 54.3  | 2.7    |
| 维生素                |         |       |        |
| 维生素A               | μg RE   | 382   | 19     |
| 维生素D               | μg      | 12.8  | 0.63   |
| 维生素E               | mg α-TE | 3.2   | 0.16   |
| 维生素K               | μg      | 27.4  | 1.35   |
| 维生素B <sub>1</sub>  | μg      | 37.4  | 1.8    |
| 维生素B <sub>2</sub>  | μg      | 515   | 25     |
| 维生素B <sub>6</sub>  | μg      | 231.4 | 11.4   |
| 维生素B <sub>12</sub> | μg      | 0.698 | 0.034  |
| 烟酸(烟酰胺)            | μg      | 2580  | 127    |
| 叶酸                 | μg      | 76.4  | 3.8    |
| 泛酸                 | μg      | 2650  | 130    |
| 维生素C               | mg      | 66.5  | 3.3    |
| 生物素                | μg      | 10.7  | 0.53   |
| 胆碱                 | mg      | 125   | 6.1    |
| 矿物质                |         |       |        |

  

| 项目           | 单位 | 每100g | 每100kJ |
|--------------|----|-------|--------|
| 钠            | mg | 183   | 9      |
| 钾            | mg | 447   | 22     |
| 钙            | μg | 369   | 18.2   |
| 铁            | mg | 32.5  | 1.6    |
| 锌            | mg | 2.85  | 0.14   |
| 铜            | μg | 32    | 0.16   |
| 锰            | μg | 32.6  | 1.60   |
| 磷            | mg | 325   | 16     |
| 氯            | mg | 175   | 9      |
| 碘            | μg | 96.6  | 4.8    |
| 硒            | μg | 32.4  | 1.6    |
| 维生素          | μg | 19.7  | 0.97   |
| 可选择成分        |    |       |        |
| 肌醇           | mg | 28.4  | 1.4    |
| 牛磺酸          | mg | 28    | 1.4    |
| 二十二碳六烯酸(DHA) | mg | 80    | 3.9    |
| 低聚果糖         | mg | 100   | 4.9    |
| 低聚半乳糖        | mg | 477   | 23     |
| 核黄素          | mg | 2999  | 148    |
| 乳铁蛋白         | mg | 15.2  | 0.75   |
|              | mg | 42    | 2.1    |

爱乐美®

爱美乐臻护



婴儿配方奶粉  
(0-6月龄,1段)

净含量:150克·国食注字YP20230439

#### 配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物油和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、乳糖、低聚果糖(FOS)、低聚半乳糖(GOS)、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、浓缩乳清蛋白粉、乳铁蛋白、核苷酸(5'-单磷酸腺苷、5'-二磷酸腺苷、5'-鸟苷酸二核苷酸、5'-尿苷酸二核苷酸、5'-胞苷酸二核苷酸)、维生素A(维生素A)、维生素D(维生素D)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K<sub>1</sub>(植物甲萘醌)、维生素B<sub>1</sub>(盐酸硫胺素)、维生素B<sub>2</sub>(核黄素)、维生素B<sub>6</sub>(盐酸吡哆醇)、维生素B<sub>12</sub>(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸)、D-生物素、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、磷酸钙、磷酸三钙、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸钾、硫酸铜、硫酸锰、亚硒酸钠、柠檬酸钠、氯化钾。

#### 冲调方法

- 冲调前请洗净双手;将奶瓶、奶嘴及奶瓶盖彻底清洗并消毒。
- 将奶具放在沸水中煮至5分钟,备用。
- 将沸水冷却至50℃~60℃,将正确水量加入奶瓶中。
- 按《喂哺表》说明,用专用量匙将准确量奶粉加入奶瓶中(取奶粉时,请勿刻意压平)。
- 将奶瓶盖紧后摇匀至完全溶解,喂哺前将奶液滴二、三滴于内手腕测试温度,以不烫手为宜。



400-707-5116  
产品咨询热线  
<http://www.donglinglary.com>

#### 贮藏方法

本品应存放在阴凉、干燥处,开启后将开口封严,并在一个月内用完,开封后请勿放入冰箱储存,请在保质期内食用此产品。

#### 重要说明

对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳。在母乳不足或无母乳时可食用本产品。本品为乳基粉状婴儿配方食品,牛奶蛋白过敏者勿用。

制造商:大庆乳品厂有限责任公司  
公司地址:黑龙江省大庆市高新区安萨路18公里处  
产地:黑龙江省大庆市  
邮编:163311  
生产许可证号:SC10523060250637  
销售热线:0459-6030306  
售后服务:0459-6030666  
产品执行标准:GB 10765-2021  
产品类别:乳基婴儿配方奶粉  
保质期:24个月  
生产日期(批号):见罐底



营养成分表

| 项目                 | 单位      | 每100g | 每100kcal |
|--------------------|---------|-------|----------|
| 能量                 | kJ      | 2007  | 100      |
| 蛋白质                | g       | 12.0  | 0.60     |
| 脂肪                 | g       | 22.8  | 1.14     |
| 亚油酸                | g       | 2.7   | 0.13     |
| α-亚麻酸              | mg      | 439   | 22       |
| 碳水化合物              | g       | 54.8  | 2.7      |
| 维生素A               | μg RE   | 472   | 24       |
| 维生素D               | μg      | 13.4  | 0.67     |
| 维生素E               | mg α-TE | 3.92  | 0.20     |
| 维生素K               | μg      | 27    | 1.35     |
| 维生素B <sub>1</sub>  | μg      | 375   | 19       |
| 维生素B <sub>2</sub>  | μg      | 500   | 25       |
| 维生素B <sub>6</sub>  | μg      | 315   | 15.7     |
| 维生素B <sub>12</sub> | μg      | 1.06  | 0.053    |
| 烟酸(烟酰胺)            | μg      | 3125  | 156      |
| 叶酸                 | μg      | 67    | 3.3      |
| 泛酸                 | μg      | 2450  | 122      |
| 维生素C               | mg      | 62.6  | 3.1      |
| 生物素                | μg      | 10.6  | 0.53     |
| 胆碱                 | mg      | 126   | 6.3      |
| 矿物质                |         |       |          |
| 钠                  | mg      | 70    | 3        |
| 钾                  | mg      | 440   | 22       |
| 钙                  | mg      | 225   | 11.2     |
| 镁                  | mg      | 32.1  | 1.6      |
| 铁                  | mg      | 6.65  | 0.33     |
| 锌                  | mg      | 3.14  | 0.16     |
| 铜                  | μg      | 38.6  | 1.92     |
| 锰                  | mg      | 378   | 19       |
| 钴                  | mg      | 225   | 11       |
| 硒                  | μg      | 91    | 4.5      |
| 碘                  | mg      | 167   | 8        |
| 维生素                | μg      | 12.6  | 0.63     |
| 可选择成分              |         |       |          |
| 肌醇                 | mg      | 29.2  | 1.5      |
| 牛磺酸                | mg      | 27    | 1.3      |
| 二十二碳六烯酸(DHA)       | mg      | 80    | 4.0      |
| 二-硬脂酰基磷脂酰胆碱(DSAPC) | mg      | 100   | 5.0      |
| 低聚半乳糖              | mg      | 450   | 22       |
| 低聚果糖               | mg      | 3000  | 149      |
| 大豆卵磷脂              | mg      | 27    | 1.3      |
| 乳铁蛋白               | mg      | 43    | 2.1      |

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物油和油、玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、乳糖、低聚果糖(FOS)、低聚半乳糖(GOS)、花生四烯酸(AHA)、棕榈乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸(DHA)、乳铁蛋白、核黄素、单磷酸腺苷、5-肌苷酸二钠、5-鸟苷酸二钠、5-尿苷酸二钠、5-胞苷酸二钠、维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(d-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B<sub>1</sub>(硫胺素)、维生素B<sub>2</sub>(核黄素)、维生素B<sub>6</sub>(吡哆醇)、维生素B<sub>12</sub>(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(抗坏血酸)、D-生物素、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、磷酸钙、磷酸三钙、磷酸亚铁、硫酸锌、硫酸镁、磷酸钾、硫酸铜、硫酸锰、亚硒酸钠、柠檬酸钾。

冲泡方法

- 1 冲泡前请洗净双手；将奶瓶、奶嘴及奶瓶盖彻底清洗干净。
- 2 将奶具放在沸水中煮至5分钟，备用。
- 3 将沸水冷却至50℃~60℃，将正确水量加入奶瓶中。
- 4 按《喂哺表》说明，用专用量匙将准确量奶粉加入奶瓶中(取奶粉时，请勿刮匙抹平)。
- 5 将奶瓶盖紧后摇晃至完全溶解。喂哺前将奶液滴二、三滴于内手腕测试温度，以不烫手为宜。

爱美德®

爱美德臻护

2 较大婴儿配方奶粉 (6-12月龄, 2段)

净含量: 800克 · 国食注字YP20230440

喂哺表

| 较大婴儿月龄 | 每次用量  | 每日喂奶次数 |
|--------|-------|--------|
| 基38毫升  | 基38毫升 | 基38毫升  |
| 6-12个月 | 240   | 8 4    |

\*基内附赠专用量匙

贮藏方法

本品应存放在阴凉、干燥处，开启后请将开口封严，并在一个月内用完。开封后请勿放入冰箱储存，请在保质期内食用此产品。

重要说明

较大婴儿食用本产品时，须配合添加辅食。

本品为乳基粉状较大婴儿配方食品，牛奶蛋白过敏者勿用。

制造商：大庆乳品厂有限责任公司  
公司地址：黑龙江省大庆市高新区安萨路18公里处  
产地：黑龙江省大庆市  
邮编：163311  
生产许可证号：SC10523060250637  
销售热线：0459-6030306  
售后服务：0459-6030666  
产品执行标准：GB 10766-2021  
产品类别：乳基较大婴儿配方奶粉  
保质期：24个月  
生产日期(批号)：见罐底

注意事项

标准稀释法：一平匙奶粉(约4.5克)兑30毫升水。

请按《喂哺表》喂哺。请不要擅自改变冲调比例，不恰当的冲调不利于较大婴儿的健康。

请勿使用沾有水的量匙取奶粉。

冲调后请马上给较大婴儿喂哺，或盖紧奶瓶并储存在温度为2-4℃的冰箱中，冷藏时间不得超过24小时，如果冲调后的配方奶粉超过2小时未予冷藏，则不能再食用。

请勿将冲调好的配方奶粉冻结。

开始喂哺后，奶瓶内的配方奶粉必须在1小时内用完。未用完的配方奶粉必须倒掉，不能再进行冷藏。

400-707-5116

产品咨询热线

http://www.daqingdairy.com

1002

营养成分表

| 项目                 | 单位      | 每100g | 每100kJ |
|--------------------|---------|-------|--------|
| 能量                 | kJ      | 1997  | 100    |
| 蛋白质                | g       | 13.2  | 0.66   |
| 脂肪                 | g       | 22.4  | 1.12   |
| 亚油酸                | g       | 2.7   | 0.14   |
| α-亚麻酸              | mg      | 433   | 22     |
| 碳水化合物              | g       | 53.9  | 2.7    |
| 维生素                |         |       |        |
| 维生素A               | μg RE   | 486   | 24     |
| 维生素D               | μg      | 12.9  | 0.65   |
| 维生素E               | mg α-TE | 4.01  | 0.20   |
| 维生素K               | μg      | 28    | 1.40   |
| 维生素B <sub>1</sub>  | μg      | 375   | 19     |
| 维生素B <sub>2</sub>  | μg      | 495   | 25     |
| 维生素B <sub>6</sub>  | μg      | 316   | 15.8   |
| 维生素B <sub>12</sub> | μg      | 1.08  | 0.054  |
| 烟酸(烟酰胺)            | μg      | 3135  | 157    |
| 叶酸                 | μg      | 69    | 3.5    |
| 泛酸                 | μg      | 2488  | 125    |
| 维生素C               | mg      | 68.8  | 3.4    |
| 生物素                | μg      | 10.7  | 0.54   |
| 矿物质                |         |       |        |
| 钠                  | mg      | 124   | 6      |
| 钾                  | mg      | 495   | 25     |
| 钙                  | μg      | 235   | 11.8   |
| 镁                  | mg      | 37.5  | 1.9    |
| 铁                  | mg      | 6.75  | 0.34   |
| 锌                  | mg      | 2.8   | 0.14   |
| 硒                  | μg      | 426   | 21     |
| 碘                  | mg      | 244   | 12     |
| 铜                  | μg      | 43.5  | 2.2    |
| 锰                  | μg      | 200   | 10     |
| 可选择成分              |         |       |        |
| 糖                  | μg      | 12.4  | 0.62   |
| 有机酸                | mg      | 129   | 6.5    |
| 膳食纤维               | μg      | 68    | 3.40   |
| 肌醇                 | mg      | 33.3  | 1.7    |
| 牛磺酸                | mg      | 28    | 1.4    |
| 二十二碳六烯酸(DHA)       | mg      | 40    | 2.0    |
| 二十二碳五烯酸(EPA)       | mg      | 41    | 2.1    |
| 低聚半乳糖              | mg      | 497   | 25     |
| 低聚果糖               | mg      | 3000  | 150    |
| 核苷酸                | mg      | 28    | 1.4    |
| 乳铁蛋白               | mg      | 44    | 2.2    |

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油)、乳糖、低聚果糖(FOS)、浓缩乳清蛋白粉、低聚半乳糖(GOS)、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、乳铁蛋白、核苷酸(单磷酸腺苷、5'-肌苷二钠、5'-鸟苷二钠、5'-腺苷二钠、5'-胞苷二钠)、维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B<sub>1</sub>(盐酸硫胺素)、维生素B<sub>2</sub>(核黄素)、维生素B<sub>6</sub>(盐酸吡哆醇)、维生素B<sub>12</sub>(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸)、D-生物素、氯化亚铁、甘氨酸、牛磺酸、微晶纤维素、硫酸亚铁、硫酸钾、磷酸钾、磷酸钠、硫酸锰、亚硒酸钠、柠檬酸钾。

冲泡方法

- 1 冲泡前请洗净双手；将奶瓶、奶嘴及奶瓶盖彻底清洗干净。
- 2 将奶具放在沸水中煮至5分钟，备用。
- 3 将沸水冷却至50℃~60℃，将正确水量加入奶瓶中。
- 4 按《喂哺表》说明，用专用量匙将准确量奶粉加入奶瓶中(取奶粉时，请勿刻意压实)。
- 5 将奶瓶盖紧后摇匀至完全溶解。喂哺前将奶液滴二、三滴于内手腕测试温度，以不烫手为宜。

爱乐美®

爱乐美臻护

3<sup>+</sup> 幼儿配方奶粉 (12-36月龄, 3段)

净含量: 800克 · 国食注字YP20230441

喂哺表

| 幼儿月龄    | 每次用量  |       | 每次喂奶次数 |
|---------|-------|-------|--------|
|         | 量(毫升) | 量(盎司) |        |
| 12-36个月 | 240   | 8     | 2-3    |

\* 盖内附赠专用量匙

注意事项

标准稀释法: 一平匙奶粉(约4.5克)兑30毫升水。

请按《喂哺表》喂哺。请不要擅自改变冲泡比例，不当的冲泡不利于幼儿的健康。

请勿使用沾有水的量匙取奶粉。

冲调后请立即给幼儿喂哺，或盖紧奶瓶并储存在温度为2-4℃的冰箱中；冷藏时间不得超过24小时。如果冲调后的配方奶粉超过2小时未予冷藏，则不能再食用。

请勿将冲调好的配方奶粉冻结。

开始喂哺后，奶瓶内的配方奶粉必须在2小时内用完。未用完的配方奶粉必须倒掉，不能再进行冷藏。

重要说明

本品为乳基粉状幼儿配方食品，牛奶蛋白过敏者勿用。

制造商: 大庆乳品厂有限责任公司  
公司地址: 黑龙江省大庆市高新区安萨路18公里处  
邮编: 163311  
生产许可证号: SC10523060250637  
销售热线: 0459-6030306  
售后服务: 0459-6030666  
产品执行标准: GB 10767-2021  
产品类别: 乳基幼儿配方奶粉  
保质期: 24个月  
生产日期(批号): 见罐底

400-707-5116

产品咨询热线

http://www.daqingdairy.com

6 907121 213149

1003