

标签企业编号: 30100485



配料

基粉(生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、葵花籽油、椰子油)、乳糖、低聚果糖、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸钠)、D-生物素、氯化胆碱、柠檬酸钠、氯化钠、氯化钾、葡萄糖酸铜、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸氢钙、碘化钾、亚硒酸钠)、维生素C(L-抗坏血酸钠)、维生素E(dl-α-生育酚)、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、乳铁蛋白、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)。

配料中含有乳及乳制品(包括乳糖)、大豆制品。

喂哺表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(毫升)	专用平匙数
第1~2周	7~8	60	2
第3~4周	6~7	90	3
第2个月	5~6	120	4
第3个月	5~6	150	5
第4个月	5~6	180	6
第5~6个月	4~5	210	7

- ① 1专用平匙约4.3克奶粉。
- ② 调奶时请用产品所附专用量匙,并按照喂哺表配制奶液,用多于或少于指定份量的奶粉,将令宝宝得不到适当的营养。
- ③ 也可根据宝宝个体差异调整喂哺量,如有疑问可拨打400-6572000进行咨询。

营养成分表

项目	单位	每100kJ 奶粉	每100g 奶粉	每100mL 奶液	项目	单位	每100kJ 奶粉	每100g 奶粉	每100mL 奶液
能量	kJ	100	2054	265	镁	mg	1.5	30.9	3.99
蛋白质	g	0.52	10.6	1.37	铁	mg	0.18	3.60	0.464
脂肪	g	1.23	25.2	3.25	锌	mg	0.18	3.75	0.484
其中:亚油酸	g	0.20	4.13	0.533	锰	μg	1.63	33.4	4.31
α-亚油酸	mg	20	413	53.3	钙	mg	15	309	39.9
碳水化合物	g	2.6	53.8	6.94	磷	mg	9	180	23.2
维生素					碘	μg	4.5	92.50	11.93
维生素A	μg RE	18	360	46.4	氯	mg	19	380	49
维生素D	μg	0.60	12.4	1.60	硒	μg	0.93	19	2.5
维生素E	mg α-TE	0.35	7.25	0.935	可选择成分				
维生素K ₁	μg	2.00	41.0	5.29	肌醇	mg	2.1	43.2	5.6
维生素B ₁	μg	24	500	64.5	牛磺酸	mg	1.7	34.5	4.45
维生素B ₂	μg	27	550	71.0	左旋肉碱	mg	0.6	12.5	1.6
维生素B ₆	μg	18.0	370	47.7	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.6	95.0	12.3
维生素B ₁₂	μg	0.097	2.0	0.26	二十碳四烯酸(APA)	mg	6.8	140	18.1
烟酸(烟酰胺)	μg	180	3700	477	低聚半乳糖	g	0.05	1.00	0.129
叶酸	μg	4.2	86.0	11.1	低聚果糖	g	0.12	2.40	0.310
泛酸	μg	154	3160	408	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.26	5.40	0.697
维生素C	mg	3.5	72.1	9.3	核苷酸	mg	1.46	30.00	3.87
生物素	μg	0.73	15.0	1.94	乳铁蛋白	mg	1.56	32.0	4.13
胆碱	mg	7.3	150	19					
矿物质									
钠	mg	9	180	23.2					
钾	mg	21	438	56.5					
铜	μg	18.0	370	48					

菁采



1段婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段)

国食注字YP20170239

净含量:808克

本企业通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证

重要声明

对于0~6月龄的婴儿最理想的食物是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

特别提示

冲调好的奶液应及时饮用,不要给宝宝喂哺剩奶。冲调好的奶液勿放入微波炉内加热,以免烫伤。

食用方法

- 1 冲调奶液前请先洗净双手。
- 2 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净,使用前用沸水煮沸至少5分钟,待用。
- 3 将饮用水煮沸5分钟,冷却至50°C左右。
- 4 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量,将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。用产品所附专用量匙将所需的奶粉加入到奶瓶中。
- 5 盖紧奶瓶,轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- 6 待奶液温度适宜时,再给宝宝喂奶。

注:冲调奶液时,请保证环境及操作过程的卫生。冲调方法不正确,可能影响宝宝健康。

贮存条件

本产品应贮藏于阴凉干燥处,勿放入冰箱内;每次食用后及时将罐口封严,开罐后请在一个月内食用完毕。

北大荒完达山乳业股份有限公司

地址:哈尔滨市南岗区长江路386号
邮编:150090
官方网站:www.wondersun.com.cn

制造商:北大荒完达山乳业股份有限公司双城分公司
生产地址:哈尔滨双城市经济技术开发区
产地:黑龙江省哈尔滨市
食品生产许可证编号:SC10523018250136

产品类别、属性:乳基婴儿配方奶粉
产品标准号:GB 10765-2021
检验合格证号:同生产批号
保质期及生产日期(批号):见罐底





完达山



注册会员



产品追溯
见罐底

标签企业编号: 30100488



配料

基粉(生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物油和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、葵花籽油、椰子油)、乳糖、低聚果糖、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸钠)、D-生物素、氯化胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、氯化钙、葡萄糖酸铜、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌、硫酸锰、碳酸钾、磷酸氢钙、碘化钾、亚硒酸钠)、维生素C(L-抗坏血酸钠)、维生素E(dl-α-生育酚)、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、乳铁蛋白、核苷酸(5'-胞苷二磷酸、5'-尿苷二磷酸、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷二磷酸、5'-鸟苷二磷酸)、配料中含有乳及乳制品(包括乳糖)、大豆制品。

喂哺表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(毫升)	专用平匙数
第1~2周	7~8	60	2
第3~4周	6~7	90	3
第2个月	5~6	120	4
第3个月	5~6	150	5
第4个月	5~6	180	6
第5~6个月	4~5	210	7

- 1 专用平匙约4.3克奶粉。
- 2 调奶时请用产品所附专用量匙,并参照喂哺表配制奶液,用多于或少于指定份量的奶粉,将令宝宝得不到适当的营养。
- 3 也可根据宝宝个体差异调整喂哺量,如有疑问请拨打400-657-2003进行咨询。

营养成分表

项目	单位	每100kJ 奶液	每100g 奶液	每100mL 奶液
能量	kJ	100	2054	265
蛋白质	g	0.52	10.6	1.37
脂肪	g	1.23	25.2	3.25
其中:亚油酸	g	0.20	4.13	0.533
α-亚麻酸	mg	20	413	53.3
碳水化合物	g	2.6	53.8	6.94
维生素				
维生素A	μg RE	18	360	46.4
维生素D	μg	0.60	12.4	1.60
维生素E	mg α-TE	0.35	7.25	0.935
维生素K ₁	μg	2.00	41.0	5.29
维生素B ₁	μg	24	500	64.5
维生素B ₂	μg	27	550	71.0
维生素B ₆	μg	18.0	370	47.7
维生素B ₁₂	μg	0.097	2.0	0.26
烟酸(烟酰胺)	μg	180	3700	477
叶酸	μg	4.2	86.0	11.1
泛酸	μg	154	3160	408
维生素C	mg	3.5	72.1	9.3
生物素	μg	0.73	15.0	1.94
胆碱	mg	7.3	150	19
矿物质				
钠	mg	9	180	23.2
钾	mg	21	438	56.5
铜	μg	18.0	370	48

项目	单位	每100kJ 奶液	每100g 奶液	每100mL 奶液
镁	mg	1.5	30.9	3.99
铁	mg	0.18	3.60	0.464
锌	mg	0.18	3.75	0.484
锰	μg	1.63	33.4	4.31
钙	mg	15	309	39.9
磷	mg	9	180	23.2
碘	μg	4.5	92.50	11.93
氯	mg	19	380	49
硒	μg	0.93	19	2.5

可选择成分

肌醇	mg	2.1	43.2	5.6
牛磺酸	mg	1.7	34.5	4.45
左旋肉碱	mg	0.6	12.5	1.6
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.6	95.0	12.3
二十碳四烯酸(ARA)	mg	6.8	140	18.1
低聚半乳糖	g	0.05	1.00	0.129
低聚果糖	g	0.12	2.40	0.310
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.26	5.40	0.697
核苷酸	mg	1.46	30.00	3.87
乳铁蛋白	mg	1.56	32.0	4.13

*100mL奶液=12.9g青采婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段)+90mL温开水

菁采

完达山
稚净

1段婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段)

国食注字YP20170239

净含量:288克

本企业通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证

重要声明

对于0~6月龄的婴儿最理想的食物是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

特别提示

冲调好的奶液应及时饮用,不要给宝宝喂哺剩奶。冲调好的奶液勿放入微波炉内加热,以免烫伤。

食用方法

- 1 冲调奶液前请先洗净双手。
- 2 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净,使用前用沸水煮沸至少5分钟,待用。
- 3 将饮用水煮沸5分钟,冷却至50°C左右。
- 4 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量,将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中,用产品所附专用量匙将所需的奶粉加入奶瓶中。
- 5 盖紧奶瓶,轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- 6 待奶液温度适宜时,再给宝宝喂奶。

注:冲调奶液时,请保证环境及操作过程的卫生。冲调方法不正确,可能影响宝宝健康。

贮存条件

本产品应贮藏于阴凉干燥处,勿放入冰箱内;每次食用后及时将罐口封严,开罐后请在一个月内食用完毕。

北大荒完达山乳业股份有限公司
地址:哈尔滨市南岗区长江路386号
邮编:150090
官方网站:www.wondersun.com.cn
制 造 商:北大荒完达山乳业股份有限公司双城分公司
生产地址:哈尔滨双城市经济技术开发区
产 地:黑龙江省哈尔滨市
食品生产许可证编号:SC10523018250136

产品类别、属性:乳基婴儿配方奶粉
产品标准号:GB 10765-2021
检验合格证号:同生产批号
保质期及生产日期(批号):见罐底





注册会员



产品追溯
见罐底

标签企业编号: 30100491



配料				喂哺表			
基料(生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物油和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、葵花籽油、椰子油)、乳糖、低聚果糖、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B ₁ (盐酸硫胺素)、维生素B ₂ (核黄素)、维生素B ₆ (盐酸吡哆醇)、维生素B ₁₂ (氰钴胺)、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸钠)、D-生物素、氯化胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、葡萄糖酸铜、硫酸锌、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锰、葡萄糖酸钙、磷酸氢钙、氯化钾、亚硫酸钠)、维生素C(L-抗坏血酸钠)、维生素E(α-生育酚)、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、乳铁蛋白、核苷酸(5'-核苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、				月龄	每日喂哺次数	每次使用量	每次使用量
配料中含有乳及乳制品(包括乳糖、大豆制品)。				第1~2周	7~8	60	2
				第3~4周	6~7	90	3
				第2个月	5~6	120	4
				第3个月	5~6	150	5
				第4个月	5~6	180	6
				第5~6个月	4~5	210	7
营养成分表				营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2054	蛋白质	g	1.5	30.9
蛋白质	g	0.52	10.6	脂肪	g	0.18	3.60
脂肪	g	1.23	25.2	其中:亚油酸	g	0.18	3.75
其中:亚油酸	g	0.20	4.13	α-亚麻酸	g	1.63	33.4
α-亚麻酸	g	20	413	碳水化合物	g	15	309
碳水化合物	g	2.6	53.8	膳食纤维	g	9	180
维生素				维生素A	μgRE	4.5	92.50
维生素A	μgRE	18	360	维生素D	μg	19	380
维生素D	μg	0.60	12.4	维生素E	mg α-TE	0.93	19
维生素E	mg α-TE	0.35	7.25	维生素K ₁	μg	2.1	43.2
维生素K ₁	μg	2.00	41.0	牛磺酸	mg	1.7	34.5
维生素B ₁	μg	24	500	左旋肉碱	mg	0.6	12.5
维生素B ₂	μg	27	550	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.6	95.0
维生素B ₆	μg	18.0	370	二十碳四烯酸(ARA)	mg	6.8	140
维生素B ₁₂	μg	0.097	2.0	低聚半乳糖	g	0.05	1.00
烟酸(烟酰胺)	μg	180	3700	低聚果糖	g	0.12	2.40
叶酸	μg	4.2	86.0	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.26	5.40
泛酸	μg	154	3160	核苷酸	mg	1.46	30.00
维生素C	mg	3.5	72.1	乳铁蛋白	mg	1.56	32.0
生物素	μg	0.73	15.0				
胆碱	mg	7.3	150				
矿物质							
钠	mg	9	180				
钾	mg	21	438				
铜	μg	18.0	370				

菁采

完达山 稚净

1段婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段)

净含量:138克

国食注字YP20170239

本企业通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证

重要声明

对于0~6月龄的婴儿最理想的食物是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

特别提示

冲调好的奶液应及时饮用,不要给宝宝喂哺剩奶。冲调好的奶液勿放入微波炉内加热,以免烫伤。

食用方法

- 1 冲调奶液前请先洗净双手。
- 2 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净,使用前用沸水煮沸至少5分钟,待用。
- 3 将饮用水煮沸5分钟,冷却至50℃左右。
- 4 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量,将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中,用产品所附专用量匙将所需的奶粉加入奶瓶中。
- 5 盖紧奶瓶,轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- 6 待奶液温度适宜时,再给宝宝喂奶。

注:冲调奶液时,请保证环境及操作过程的卫生。冲调方法不正确,可能影响宝宝健康。

贮存条件


本产品应贮藏于阴凉干燥处,勿放入冰箱内;每次食用后及时将罐口封严,开罐后请在一个月内食用完毕。


北大荒完达山乳业有限公司
地址:哈尔滨市南岗区长江路386号
邮编:150090
官方网站:www.wondersun.com.cn

制造商:北大荒完达山乳业有限公司双城分公司
生产地址:哈尔滨双城市经济技术开发区
产地:黑龙江省哈尔滨市
食品生产许可证编号:SC10523018250136

产品类别、属性:乳基婴儿配方奶粉
产品标准号:GB 10765-2021
检验合格证号:同生产批号
保质期及生产日期(批号):见罐底







标签企业编号: 30100486

配料

基粉(生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、葵花籽油、椰子油)、乳糖、低聚果糖、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸钠)、D-生物素、氯化胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、葡萄糖酸铜、硫酸锰、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌、硫酸镁、磷酸钙、磷酸氢钙、碘化钾、亚硒酸钠)、维生素C(L-抗坏血酸钠)、维生素E(dl-α-生育酚)、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、乳铁蛋白、核苷酸(5'-胞苷二钠、5'-尿苷二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷二钠、5'-鸟苷二钠)、
配料中含有乳及乳制品(包括乳糖)、大豆制品。

喂哺表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(毫升)	专用平匙数
6~7个月	4~5	210	7
7~12个月	3~4	240	8

- ① 1专用平匙约4.3克奶粉。
② 调奶时请用产品所附专用量匙,并严格按照喂哺表配制奶液,用多于或少于指定份量的奶粉,将令宝宝得不到适当的营养。
③ 也可根据宝宝个体差异调整喂哺量,如有疑问可拨打400-6572000进行咨询。

特别提示

冲调好的奶液应及时饮用,不要给宝宝喂哺剩奶。
冲调好的奶液勿放入微波炉内加热,以免烫伤。

营养成分表

项目	单位	每100kJ 奶粉	每100g 奶粉	每100mL 奶液	项目	单位	每100kJ 奶粉	每100g 奶粉	每100mL 奶液
能量	kJ	100	2036	263	镁	mg	1.5	30.7	3.96
蛋白质	g	0.63	12.8	1.65	铁	mg	0.30	6.12	0.789
脂肪	g	1.19	24.3	3.13	锌	mg	0.18	3.75	0.484
其中:亚油酸	g	0.17	3.39	0.437	锰	μg	1.70	34.7	4.48
α-亚油酸	mg	17	339	43.7	钙	mg	21	434	56.0
碳水化合物	g	2.6	52.5	6.77	磷	mg	12	252	32.5
维生素					碘	μg	4.5	91.70	11.83
维生素A	μgRE	23	459	59.2	氯	mg	14	280	36
维生素D	μg	0.60	12.3	1.59	硒	μg	0.74	15	1.9
维生素E	mgα-TE	0.36	7.30	0.942	可选择成分				
维生素K ₁	μg	2.04	41.5	5.35	肌醇	mg	2.2	44.0	5.7
维生素B ₁	μg	26	520	67.1	牛磺酸	mg	1.7	34.8	4.49
维生素B ₂	μg	28	570	73.5	左旋肉碱	mg	0.6	12.8	1.7
维生素B ₆	μg	18.7	380	49.0	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.7	95.0	12.3
维生素B ₁₂	μg	0.108	2.2	0.28	二十碳四烯酸(ARA)	mg	6.9	140	18.1
烟酸(烟酰胺)	μg	187	3800	490	低聚半乳糖	g	0.05	1.00	0.129
叶酸	μg	3.7	76.0	9.80	低聚果糖	g	0.12	2.40	0.310
泛酸	μg	156	3180	410	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.23	4.70	0.606
维生素C	mg	3.5	72.1	9.3	核苷酸	mg	1.47	30.00	3.87
生物素	μg	0.79	16.0	2.06	乳铁蛋白	mg	1.57	32.0	4.13
胆碱	mg	7.4	150	19					
矿物质									
钠	mg	6	130	16.8					
钾	mg	23	459	59.2					
铜	μg	10.8	220	28					

*100mL奶液=12.9g菁采较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段)+90mL温开水

菁采



2段较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段)

国食注字YP20170240

完达山

稚净

净含量:808克

本企业通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证

产品特点

含1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯



含二十二碳六烯酸(DHA)



含核苷酸、含牛磺酸、含左旋肉碱

食用方法

- 1 冲调奶液前请先洗净双手。
- 2 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净,使用前用沸水煮沸至少5分钟,待用。
- 3 将饮用水煮沸5分钟,冷却至50°C左右。
- 4 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量,将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中,用产品所附专用量匙将所需的奶粉加入到奶瓶中。
- 5 盖紧奶瓶,轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- 6 待奶液温度适宜时,再给宝宝喂奶。

注:冲调奶液时,请保证环境及操作过程的卫生。冲调方法不正确,可能影响宝宝健康。

重要声明

食用本产品时,须配合添加辅助食品。

贮存条件

本产品应贮藏于阴凉干燥处,勿放入冰箱内;每次食用后及时将罐口封严,开罐后请在一个月内食用完毕。

北大荒完达山乳业股份有限公司

地址:哈尔滨市南岗区长江路386号

邮编:150090

官方网站:www.wondersun.com.cn

制造商:北大荒完达山乳业股份有限公司双城分公司

生产地址:哈尔滨双城市经济技术开发区

产地:黑龙江省哈尔滨市

食品生产许可证编号:SC10523018250136

产品类别、属性:乳基较大婴儿配方奶粉

产品标准号:GB 10766-2021

检验合格证号:同生产批号

保质期及生产日期(批号):见罐底





完达山



注册会员



产品追溯
见罐底

标签企业编号: 30100489



配料

基粉(生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、葵花籽油、椰子油)、乳糖、低聚果糖、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸钠)、D-生物素、氯化胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、葡萄糖酸铜、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸氢钙、碘化钾、亚硒酸钠)、维生素C(L-抗坏血酸钠)、维生素E(dl-α-生育酚)、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、乳铁蛋白、核苷酸(5'-胞苷二磷酸、5'-尿苷二磷酸、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷二磷酸、5'-鸟苷二磷酸)。

配料中含有乳及乳制品(包括乳糖)、大豆制品。

喂哺表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(毫升)	专用平匙数
6~7个月	4~5	210	7
7~12个月	3~4	240	8

- 1 专用平匙约4.3克奶粉。
- 2 调奶时请用产品所附专用量匙,并严格按照喂哺表配制奶液,用多于或少于指定份量的奶粉,将令宝宝得不到适当的营养。
- 3 也可根据宝宝个体差异调整喂哺量,如有疑问请拨打400-6572006进行咨询。

特别提示

冲调好的奶液应及时饮用,不要给宝宝喂哺剩奶。
冲调好的奶液勿放入微波炉内加热,以免烫伤。

营养成分表

项目	单位	每100kJ 奶粉	每100g 奶粉	每100mL 奶液*
能量	kJ	100	2036	263
蛋白质	g	0.63	12.8	1.65
脂肪	g	1.19	24.3	3.13
其中:亚油酸	g	0.17	3.39	0.437
α-亚麻酸	mg	17	339	43.7
碳水化合物	g	2.6	52.5	6.77
维生素				
维生素A	μg RE	23	459	59.2
维生素D	μg	0.60	12.3	1.59
维生素E	mg α-TE	0.36	7.30	0.942
维生素K ₁	μg	2.04	41.5	5.35
维生素B ₁	μg	26	520	67.1
维生素B ₂	μg	28	570	73.5
维生素B ₆	μg	18.7	380	49.0
维生素B ₁₂	μg	0.108	2.2	0.28
烟酸(烟酰胺)	μg	187	3800	490
叶酸	μg	3.7	76.0	9.80
泛酸	μg	156	3180	410
维生素C	mg	3.5	72.1	9.3
生物素	μg	0.79	16.0	2.06
胆碱	mg	7.4	150	19
矿物质				
钠	mg	6	130	16.8
钾	mg	23	459	59.2
铜	μg	10.8	220	28

项目	单位	每100kJ 奶粉	每100g 奶粉	每100mL 奶液*
镁	mg	1.5	30.7	3.96
铁	mg	0.30	6.12	0.789
锌	mg	0.18	3.75	0.484
锰	μg	1.70	34.7	4.48
钙	mg	21	434	56.0
磷	mg	12	252	32.5
碘	μg	4.5	91.70	11.83
氯	mg	14	280	36
硒	μg	0.74	15	1.9
可选择成分				
肌醇	mg	2.2	44.0	5.7
牛磺酸	mg	1.7	34.8	4.49
左旋肉碱	mg	0.6	12.8	1.7
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.7	95.0	12.3
二十碳四烯酸(ARA)	mg	6.9	140	18.1
低聚半乳糖	g	0.05	1.00	0.129
低聚果糖	g	0.12	2.40	0.310
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.23	4.70	0.606
核苷酸	mg	1.47	30.00	3.87
乳铁蛋白	mg	1.57	32.0	4.13

*100mL奶液=12.9g菁采较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段)+90mL温开水

菁采

完达山
稚净

2段较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段)

国食注字YP20170240

净含量:288克

本企业通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证

产品特点

含1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯



含二十二碳六烯酸(DHA)

含核苷酸、含牛磺酸、含左旋肉碱

食用方法

- 1 冲调奶液前请先洗净双手。



- 2 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净,使用前用沸水煮沸至少5分钟,待用。



- 3 将饮用水煮沸5分钟,冷却至50°C左右。



- 4 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量,将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中,用产品所附专用量匙将所需的奶粉加入到奶瓶中。



- 5 盖紧奶瓶,轻轻摇动直至奶粉完全溶解。



- 6 待奶液温度适宜时,再给宝宝喂奶。



注:冲调奶液时,请保证环境及操作过程的卫生。冲调方法不正确,可能影响宝宝健康。

重要声明

食用本产品时,须配合添加辅助食品。

贮存条件

本产品应贮藏于阴凉干燥处,勿放入冰箱内;每次食用后及时将罐口封严,开罐后请在一个月内食用完毕。

北大荒完达山乳业股份有限公司
地址:哈尔滨市南岗区长江路386号
邮编:150090
官方网站:www.wondersun.com.cn

制造商:北大荒完达山乳业股份有限公司双城分公司
生产地址:哈尔滨双城市经济技术开发区
产地:黑龙江省哈尔滨市
食品生产许可证编号:SC10523018250136

产品类别、属性:乳基较大婴儿配方奶粉
产品标准号:GB 10766-2021
检验合格证号:同生产批号
保质期及生产日期(批号):见罐底





注册会员



产品追溯
见罐底

标签企业编号: 30100487



配料

基粉(生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物油和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、葵花籽油、椰子油)、乳糖、乳清蛋白粉、低聚果糖、低聚半乳糖、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸钠)、D-生物素、柠檬酸钠、氯化钾、葡萄糖酸铜、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌、磷酸钙、磷酸氢钙、碘化钾、亚硒酸钠)、维生素C(L-抗坏血酸钠)、维生素E(dl-α-生育酚)、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、乳铁蛋白、核苷酸(5'-胞苷二磷酸、5'-尿苷二磷酸、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷二磷酸、5'-鸟苷二磷酸)。

配料中含有乳及乳制品(包括乳糖)、大豆制品。

喂哺表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(毫升)	专用平匙数
12-24个月	3-4	240	8
24-36个月	2-3	240	8

- 1 专用平匙约4.3克奶粉。
- 2 喂奶时请用产品所附专用量匙,并参照喂哺表配制奶液,用多于或少于指定份量的奶粉,将令宝宝得不到适当的营养。
- 3 也可根据宝宝个体差异调整喂哺量,如有疑问可拨打400-6572000进行咨询。

特别提示

冲调好的奶液应及时饮用,不要给宝宝喂哺剩奶。
冲调好的奶液勿放入微波炉内加热,以免烫伤。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g奶粉	每100mL奶液	项目	单位	每100kJ	每100g奶粉	每100mL奶液
能量	kJ	100	2008	259	镁	mg	1.8	35.3	4.55
蛋白质	g	0.74	14.9	1.92	铁	mg	0.30	6.12	0.789
脂肪	g	1.16	23.3	3.01	锌	mg	0.14	2.85	0.368
其中:亚油酸	g	0.15	3.02	0.390	钙	mg	21	428	55.2
α-亚油酸	mg	15	302	39.0	磷	mg	12	249	32.1
碳水化合物	g	2.5	50.9	6.57	碘	μg	3.3	65.80	8.49
维生素					氯	mg	15	300	39
维生素A	μg RE	23	453	58.4	可选择成分				
维生素D	μg	0.60	12.1	1.56	硒	μg	0.75	15	1.9
维生素E	mg α-TE	0.36	7.30	0.942	胆碱	mg	7.5	150	19
维生素K ₁	μg	2.09	42.0	5.42	肌醇	mg	2.2	44.6	5.8
维生素B ₁	μg	27	540	69.7	牛磺酸	mg	1.7	35.1	4.53
维生素B ₂	μg	29	590	76.1	左旋肉碱	mg	0.7	13.1	1.7
维生素B ₆	μg	19.4	390	50.3	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.7	95.0	12.3
维生素B ₁₂	μg	0.120	2.4	0.31	二十碳四烯酸(ARA)	mg	7.0	140	18.1
烟酸(烟酰胺)	μg	189	3800	490	低聚半乳糖	g	0.05	1.00	0.129
叶酸	μg	3.8	76.0	9.80	低聚果糖	g	0.12	2.40	0.310
泛酸	μg	159	3200	413	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.20	4.00	0.516
维生素C	mg	3.6	72.1	9.3	核苷酸	mg	1.49	30.00	3.87
生物素	μg	0.80	16.0	2.06	乳铁蛋白	mg	1.59	32.0	4.13
矿物质									
钠	mg	7	140	18.1					
钾	mg	23	453	58.4					
铜	μg	9.0	180	23					

*100mL奶液=12.9g菁采奶粉(12-36月龄,3段)+90mL温开水

菁采



完达山
稚净

3段幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段)

国食注字YP20170241

净含量:808克

本企业通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证

产品特点

含1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯



含核苷酸、含胆碱、含牛磺酸

食用方法

- 1 冲调奶液前请先洗净双手。
- 2 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净,使用前用沸水煮沸至少5分钟,待用。
- 3 将饮用水煮沸5分钟,冷却至50°C左右。
- 4 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量,将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中,用产品所附专用量匙将所需的奶粉加入奶瓶中。
- 5 盖紧奶瓶,轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- 6 待奶液温度适宜时,再给宝宝喂奶。

注:冲调奶液时,请保证环境及操作过程的卫生。冲调方法不正确,可能影响宝宝健康。

贮存条件

本产品应贮藏于阴凉干燥处,勿放入冰箱内;每次食用后及时将罐口封严,开罐后请在一个月内食用完毕。

北大荒完达山乳业股份有限公司

地址:哈尔滨市南岗区长江路386号
邮编:150090

官方网站:www.wondersun.com.cn

制造商:北大荒完达山乳业股份有限公司双城分公司

生产地址:哈尔滨双城市经济技术开发区

产地:黑龙江省哈尔滨市

食品生产许可证编号:SC10523018250136

产品类别、属性:乳基幼儿配方奶粉

产品标准号:GB 10767-2021

检验合格证号:同生产批号

保质期及生产日期(批号):见罐底



完达山



注册会员



产品追溯
见罐底

标签企业编号: 30100490



配料

基粉(生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、葵花籽油、椰子油)、乳糖、乳清蛋白粉、低聚果糖、低聚半乳糖、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸钠)、D-生物素、柠檬酸钠、氯化钾、葡萄糖酸铜、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌、碳酸钙、磷酸氢钙、碘化钾、亚硒酸钠)、维生素C(L-抗坏血酸钠)、维生素E(dl-α-生育酚)、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、乳铁蛋白、核苷酸(5'-胞苷二钠、5'-尿苷二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷二钠、5'-鸟苷二钠)、

配料中含有乳及乳制品(包括乳糖)、大豆制品。

喂哺表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(毫升)	专用平匙数
12~24个月	3~4	240	8
24~36个月	2~3	240	8

1. 专用平匙约4.3克奶粉。
2. 喂奶时请用产品所附专用量匙,并严格按照喂哺表配制奶液,用多于或少于指定份量的奶液,将令宝宝得不到适当的营养。
3. 也可根据宝宝个体差异调整喂哺量,如有疑问可拨打400-6572000进行咨询。

特别提示

冲调好的奶液应及时饮用,不要给宝宝喂哺剩奶。
冲调好的奶液勿放入微波炉内加热,以免烫伤。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	每100mL
能量	kJ	100	2008	259
蛋白质	g	0.74	14.9	1.92
脂肪	g	1.16	23.3	3.01
其中:亚油酸	g	0.15	3.02	0.390
α-亚麻酸	mg	15	302	39.0
碳水化合物	g	2.5	50.9	6.57
维生素				
维生素A	μg RE	23	453	58.4
维生素D	μg	0.60	12.1	1.56
维生素E	mg α-TE	0.36	7.30	0.942
维生素K ₁	μg	2.09	42.0	5.42
维生素B ₁	μg	27	540	69.7
维生素B ₂	μg	29	590	76.1
维生素B ₆	μg	19.4	390	50.3
维生素B ₁₂	μg	0.120	2.4	0.31
烟酸(烟酰胺)	μg	189	3800	490
叶酸	μg	3.8	76.0	9.80
泛酸	μg	159	3200	413
维生素C	mg	3.6	72.1	9.3
生物素	μg	0.80	16.0	2.06
矿物质				
钠	mg	7	140	18.1
钾	mg	23	453	58.4
铜	μg	9.0	180	23

项目	单位	每100kJ	每100g	每100mL
镁	mg	1.8	35.3	4.55
铁	mg	0.30	6.12	0.789
锌	mg	0.14	2.85	0.368
钙	mg	21	428	55.2
磷	mg	12	249	32.1
碘	μg	3.3	65.80	8.49
氯	mg	15	300	39

可选择成分

硒	μg	0.75	15	1.9
胆碱	mg	7.5	150	19
肌醇	mg	2.2	44.6	5.8
牛磺酸	mg	1.7	35.1	4.53
左旋肉碱	mg	0.7	13.1	1.7
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.7	95.0	12.3
二十碳四烯酸(ARA)	mg	7.0	140	18.1
低聚半乳糖	g	0.05	1.00	0.129
低聚果糖	g	0.12	2.40	0.310
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.20	4.00	0.516
核苷酸	mg	1.49	30.00	3.87
乳铁蛋白	mg	1.59	32.0	4.13

*100mL奶液=12.9g菁采婴幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段)+90mL温开水

菁采



3段婴幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段)

国食注字YP20170241


完达山®
稚净®

净含量:288克

本企业通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证

产品特点

含1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯



含核苷酸、含胆碱、含牛磺酸

食用方法

1. 冲调奶液前请先洗净双手。
2. 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净,使用前用沸水煮沸至少5分钟,待用。
3. 将饮用水煮沸5分钟,冷却至50°C左右。
4. 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量,将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中,用产品所附专用量匙将所需的奶粉加入奶瓶中。
5. 盖紧奶瓶,轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
6. 待奶液温度适宜时,再给宝宝喂奶。

注:冲调奶液时,请保证环境及操作过程的卫生。冲调方法不正确,可能影响宝宝健康。

贮存条件

本产品应贮藏于阴凉干燥处,勿放入冰箱内;每次食用后及时将罐口封严,开罐后请在一个月内食用完毕。

北大荒完达山乳业股份有限公司
地址:哈尔滨市南岗区长江路386号
邮编:150090
官方网站:www.wondersun.com.cn
制造商:北大荒完达山乳业股份有限公司双城分公司
生产地址:哈尔滨双城市经济技术开发区
产地:黑龙江省哈尔滨市
食品生产许可证编号:SC10523018250136

产品类别、属性:乳基幼儿配方奶粉
产品标准号:GB 10767-2021
检验合格证号:同生产批号
保质期及生产日期(批号):见罐底





标签企业编号: 30100461



配料

基粉(生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物油和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、乳糖、低聚果糖、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、磷酸、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸钠)、D-生物素、氯化胆碱、柠檬酸钠、氯化钠、氯化钾、葡萄糖酸铜、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸氢钙、碘化钾、亚硒酸钠)、维生素C(L-抗坏血酸钠、L-抗坏血酸)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)。配料中含有乳及乳制品(包括乳糖)、大豆制品。

营养成分表

项目	单位	每100kJ 奶粉	每100g 奶粉	每100mL 奶液
能量	KJ	100	2052	265
蛋白质	g	0.52	10.6	1.37
脂肪	g	1.22	25.1	3.24
其中:亚油酸	g	0.21	4.38	0.565
α-亚麻酸	mg	21	438	56.5
碳水化合物	g	2.6	53.9	6.95
维生素				
维生素A	μg RE	18	360	46.4
维生素D	μg	0.60	12.4	1.60
维生素E	mg α-TE	0.35	7.25	0.935
维生素K ₁	μg	2.00	41.0	5.29
维生素B ₁	μg	24	500	64.5
维生素B ₂	μg	27	550	71.0
维生素B ₆	μg	18.0	370	47.7
维生素B ₁₂	μg	0.097	2.0	0.26
烟酸(烟酰胺)	μg	180	3700	477
叶酸	μg	4.2	86.0	11.1
泛酸	μg	154	3160	408
维生素C	mg	3.5	72.1	9.3
生物素	μg	0.73	15.0	1.94
胆碱	mg	7.3	150	19
矿物质				
钠	mg	9	180	23.2
钾	mg	21	437	56.4

喂哺表

月龄	每日喂哺 次数	每次使用量 温开水用量(毫升)	专用平匙数
第1~2周	7~8	60	2
第3~4周	6~7	90	3
第2个月	5~6	120	4
第3个月	5~6	150	5
第4个月	5~6	180	6
第5~6个月	4~5	210	7

① 1专用平匙约4.3克奶粉。

② 调奶时请用产品所附专用量匙,并参照喂哺表配制奶液,用多于或少于指定份量的奶粉,将令宝宝得不到适当的营养。

③ 也可根据宝宝个体差异调整喂哺量,如有疑问可拨打400-6572000进行咨询。

优巧贝能

1段

净含量:800克
国食注字YP20230106

婴儿配方奶粉
(0-6月龄1段)

完达山

本企业通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证

重要声明

对于0~6月龄的婴儿最理想的食物是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

特别提示

冲调好的奶液应及时饮用,不要给宝宝喂哺剩奶。冲调好的奶液勿放入微波炉内加热,以免烫伤。

食用方法

- 1 冲调奶液前请先洗净双手。
- 2 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净,使用前用沸水煮沸至少5分钟,待用。
- 3 将饮用水煮沸5分钟,冷却至45°C左右。
- 4 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量,将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。用产品所附专用量匙将所需的奶粉加入至奶瓶中。
- 5 盖紧奶瓶,轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- 6 待奶液温度适宜时,再给宝宝喂奶。

注:冲调奶液时,请保证环境及操作过程的卫生。冲调方法不正确,可能影响宝宝健康。

贮存条件

本产品应贮藏于阴凉干燥处,勿放入冰箱内;每次食用后及时将罐口封严,开罐后请在一个月内食用完毕。

完达山

北大荒完达山乳业有限公司

地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路386号

邮编:150090

官方网站:www.wondersun.com.cn

制造商:北大荒完达山乳业有限公司双城分公司

生产地址:哈尔滨双城市经济技术开发区

产地:黑龙江省哈尔滨市

食品生产许可证编号:SC10523018250136

产品类别/属性:乳基婴儿配方奶粉

产品标准号:GB 10765-2021

检验合格证号:同生产批号

保质期及生产日期(批号):见罐底

扫描二维码获取更多咨询



标签企业编号: 30100464



本企业通过ISO9001质量管理体系认证
ISO14001环境管理体系认证



北大荒完达山乳业股份有限公司
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路386号
邮编:150090
官方网站:www.wondersun.com.cn
制 造 商:北大荒完达山乳业股份有限公司双城分公司
生产地址:哈尔滨双城市经济技术开发区
产 地:黑龙江省哈尔滨市
食品生产许可证编号:SC10523018250136
产品类别:属性:乳基婴儿配方奶粉
产品标准号:GB 10765-2021
检验合格证书:同生产批号
包装生产许可证号:

追溯码:
批 号:
生产日期:
保质期至:



食用方法

- 1 冲调前请先洗净双手。
- 2 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净,使用前用沸水烫至少5分钟,待用。
- 3 将饮用水煮沸5分钟,冷却至45℃左右。
- 4 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量,将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中,用产品所附专用量匙将所需的奶粉加入到奶瓶中。
- 5 盖紧奶瓶,轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- 6 待奶液温度适宜时,再给宝宝喂奶。

注:冲调奶液时,请保证环境及操作过程的卫生。冲调方法不正确,可能影响宝宝健康。


重要声明

对于0~6月龄的婴儿最理想的食物是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

贮存条件

本产品应贮藏于阴凉干燥处,勿放入冰箱内;每次食用后及时将袋口封严,开袋后请在两周内食用完毕。

优巧贝能



1段 婴儿配方奶粉 (0-6月龄,1段)
净含量:400克
国食注字YP20230106



营养成分表

项目	单位	每100kJ 奶粉	每100g 奶粉	每100mL 奶液
能量	KJ	100	2052	265
蛋白质	g	0.52	10.6	1.37
脂肪	g	1.22	25.1	3.24
其中:亚油酸	g	0.21	4.35	0.565
α-亚麻酸	g	21	435	56.5
碳水化合物	g	2.6	53.9	6.95
维生素				
维生素A	μg RE	18	369	46.4
维生素D	μg	0.60	12.4	1.60
维生素E	mg α-TE	0.35	7.25	0.935
维生素K ₁	μg	2.00	41.0	5.29
维生素B ₁	μg	24	500	64.5
维生素B ₂	μg	27	550	71.0
维生素B ₆	μg	18.0	370	47.7
维生素B ₁₂	μg	0.097	2.0	0.26
烟酸(尼克酸)	μg	100	2000	257
叶酸	μg	4.2	86.0	11.1
泛酸	μg	154	3160	408
维生素C	mg	3.5	72.1	9.3
生物素	μg	0.73	15.0	1.94
胆碱	mg	7.3	150	19
矿物质				
钠	mg	9	185	23.2
钾	mg	21	437	56.4
钙	mg	18.0	370	47.7
镁	mg	1.5	30.9	3.99
铁	mg	0.18	3.60	0.464
锌	mg	0.18	3.75	0.484
锰	μg	1.63	33.4	4.31
铜	μg	15	309	39.9
碘	μg	9	180	23.2
磷	mg	4.5	92.40	11.92
氯	mg	19	380	49
硒	μg	0.93	19	2.5
可选择成分				
肌醇	mg	2.1	43.2	5.6
牛磺酸	mg	1.7	34.5	4.45
左旋肉碱	mg	0.6	12.5	1.6
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.6	95.0	12.3
二十碳四烯酸(ARA)	mg	6.8	140	18.1
低聚半乳糖	g	0.05	1.00	0.129
低聚果糖	g	0.12	2.40	0.310
叶黄素	μg	4.87	100	12.9
核苷酸	mg	1.46	30.00	3.87

*100mL奶液=12.9g优巧贝能婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段)+90mL温开水

配料

基粉(生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、乳糖、低聚果糖、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、磷脂、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(d,l-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸钠)、D-生物素、氯化胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、氯化钙、葡萄糖酸钙、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌、硫酸锰、硫酸铜、磷酸氢钙、碘化钾、亚硒酸钠)、维生素C(L-抗坏血酸钠)、维生素E(d,l-α-生育酚)、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷二磷酸、5'-尿苷二磷酸、5'-鸟苷二磷酸、5'-腺苷二磷酸、5'-肌苷二磷酸、5'-鸟苷二磷酸)、配料中含有乳及乳制品(包括乳糖)、大豆制品。

喂哺表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(毫升)	专用勺量
第1-2周	7-8	60	2
第3-4周	6-7	90	3
第2个月	5-6	120	4
第3个月	5-6	150	5
第4个月	5-6	180	6
第5-6个月	4-5	210	7

- 1 专用平匙约4.3克奶粉。
- 2 调奶时请用产品所附专用量匙,并按喂哺表配制奶液,多于或少于指定量的奶液,将令宝宝得不到适当的营养。
- 3 也可根据宝宝个体差异调整喂哺量,如有疑问请拨打400-6572000进行咨询。

特别提示

冲调好的奶液应及时饮用,不要给宝宝喂哺剩奶。冲调好的奶液勿放入微波炉内加热,以免烫伤。



扫描二维码 获取更多资讯

标签企业编号: 30100467



配料

喂哺表

基粉(生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物油和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、乳糖、低聚果糖、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、磷脂、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B₁(硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸)、D-生物素、氯化胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、氯化钙、葡萄糖酸铜、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌、硫酸锰、磷酸钙、磷酸氢钙、碘化钾、亚硒酸钠)、维生素C(L-抗坏血酸钠、L-抗坏血酸)、维生素E(dl-α-生育酚)、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、叶黄素、核黄素(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)。

配料中含有乳及乳制品(包括乳糖)、大豆制品。

月龄	每日喂哺次数	每次使用量 温开水用量(毫升)	专用平匙数
第1~2周	7~8	60	2
第3~4周	6~7	90	3
第2个月	5~6	120	4
第3个月	5~6	150	5
第4个月	5~6	180	6
第5~6个月	4~5	210	7

①专用平匙约4.3克奶粉。

②喂奶时请用产品所附专用量匙,并按照喂哺表配制奶液,用多于或少于指定份量的奶液,将令宝宝得不到适当的营养。


③也可根据宝宝个体差异调整喂哺量,如有疑问可拨打400-6572000进行咨询。

营养成分表

项目	单位	每100kJ 奶粉	每100g 奶粉	每100mL 奶液*	项目	单位	每100kJ 奶粉	每100g 奶粉	每100mL 奶液*
能量	kJ	100	2052	265	铜	μg	18.0	370	48
蛋白质	g	0.52	10.6	1.37	镁	mg	1.5	30.9	3.99
脂肪	g	1.22	25.1	3.24	铁	mg	0.18	3.60	0.464
其中:亚油酸	g	0.21	4.38	0.565	锌	mg	0.18	3.75	0.484
α-亚麻酸	mg	21	438	56.5	锰	μg	1.63	33.4	4.31
碳水化合物	g	2.6	53.9	6.95	钙	mg	15	309	39.9
维生素					磷	mg	9	180	23.2
维生素A	μg RE	18	360	46.4	碘	μg	4.5	92.40	11.92
维生素D	μg	0.60	12.4	1.60	氯	mg	19	380	49
维生素E	mg α-TE	0.35	7.25	0.935	硒	μg	0.93	19	2.5
维生素K ₁	μg	2.00	41.0	5.29	可选择成分				
维生素B ₁	μg	24	500	64.5	肌醇	mg	2.1	43.2	5.6
维生素B ₂	μg	27	550	71.0	牛磺酸	mg	1.7	34.5	4.45
维生素B ₆	μg	18.0	370	47.7	左旋肉碱	mg	0.6	12.5	1.6
维生素B ₁₂	μg	0.097	2.0	0.26	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.6	95.0	12.3
烟酸(烟酰胺)	μg	180	3700	477	二十碳四烯酸(ARA)	mg	6.8	140	18.1
叶酸	μg	4.2	86.0	11.1	低聚半乳糖	g	0.05	1.00	0.129
泛酸	μg	154	3160	408	低聚果糖	g	0.12	2.40	0.310
维生素C	mg	3.5	72.1	9.3	叶黄素	μg	4.87	100	12.9
生物素	μg	0.73	15.0	1.94	核苷酸	mg	1.46	30.00	3.87
胆碱	mg	7.3	150	19					
矿物质									
钠	mg	9	180	23.2					
钾	mg	21	437	56.4					

*100mL奶液=12.9g 优可贝婴儿配方奶粉(0-6月龄,1份)+90mL温开水

优巧贝能



1段 婴儿配方奶粉 (0-6月龄1段)

净含量:138克
国食注字YP20230106

本企业通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证

重要声明
对于0~6月龄的婴儿最理想的食物是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

特别提示
冲调好的奶液应及时饮用,不要给宝宝喂哺剩奶。冲调好的奶液勿放入微波炉内加热,以免烫伤。

食用方法

- 1 冲调奶液前请先洗净双手。
- 2 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净,使用前用沸水煮沸至少5分钟,待用。
- 3 将饮用水煮沸5分钟,冷却至45℃左右。
- 4 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量,将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中,用产品所附专用量匙将所需的奶粉加入奶瓶中。
- 5 盖紧奶瓶,轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- 6 待奶液温度适宜时,再给宝宝喂奶。

注:冲调奶液时,请保证环境及操作过程的卫生。冲调方法不正确,可能影响宝宝健康。

贮存条件
本产品应贮藏于阴凉干燥处,勿放入冰箱内;每次食用后及时将罐口封严,开罐后请在一个月内食用完毕。

完达山
北大荒完达山乳业股份有限公司
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路386号
邮编:150090
官方网站:www.wondersun.com.cn

制造商:北大荒完达山乳业股份有限公司双城分公司
生产地址:哈尔滨双城市经济技术开发区
产地:黑龙江省哈尔滨市
食品生产许可证编号:SC10523018250136

产品类别、属性:乳基婴儿配方奶粉
产品标准号:GB 10765-2021
检验合格证号:同生产批号
保质期及生产日期(批号):见罐底



标签企业编号: 30100462



配料

基粉(生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、乳糖、低聚果糖、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、磷脂、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸钠)、D-生物素、氯化胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、葡萄糖酸铜、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸氢钙、碘化钾、亚硒酸钠)、维生素C(L-抗坏血酸钠)、维生素E(dl-α-生育酚)、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)。配料中含有乳及乳制品(包括乳糖)、大豆制品。

喂哺表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(毫升)	专用平匙数
6~7个月	4~5	210	7
7~12个月	3~4	240	8

- 1 专用平匙约4.3克奶粉。
- 2 调奶时请用产品所附专用量匙,并参照喂哺表配制奶液,用于多于或少于指定份量的奶粉,将令宝宝得不到适当的营养。
- 3 也可根据宝宝个体差异调整喂哺量,如有疑问可拨打400-6572000进行咨询。

特别提示

冲调好的奶液应及时饮用,不要给宝宝喂哺剩奶。
冲调好的奶液勿放入微波炉内加热,以免烫伤。

营养成分表


项目	单位	每100kJ 奶粉	每100g 奶粉	每100mL 奶液
能量	kJ	100	2036	263
蛋白质	g	0.63	12.8	1.65
脂肪	g	1.19	24.3	3.13
其中:亚油酸	g	0.17	3.47	0.448
α-亚麻酸	mg	17	347	44.8
碳水化合物	g	2.6	52.5	6.77
维生素				
维生素A	μg RE	23	459	59.2
维生素D	μg	0.60	12.3	1.59
维生素E	mg α-TE	0.36	7.30	0.942
维生素K ₁	μg	2.04	41.5	5.35
维生素B ₁	μg	26	520	67.1
维生素B ₂	μg	28	570	73.5
维生素B ₆	μg	18.7	380	49.0
维生素B ₁₂	μg	0.108	2.2	0.28
烟酸(烟酰胺)	μg	187	3800	490
叶酸	μg	3.7	76.0	9.80
泛酸	μg	156	3180	410
维生素C	mg	3.5	72.1	9.3
生物素	μg	0.79	16.0	2.06
胆碱	mg	7.4	150	19
矿物质				
钠	mg	6	130	16.8
钾	mg	23	459	59.2

项目	单位	每100kJ 奶粉	每100g 奶粉	每100mL 奶液
铜	μg	10.8	220	28
镁	mg	1.5	30.7	3.96
铁	mg	0.30	6.12	0.789
锌	mg	0.18	3.75	0.484
锰	μg	1.70	34.7	4.48
钙	mg	21	434	56.0
磷	mg	12	252	32.5
碘	μg	4.5	91.70	11.83
氯	mg	14	280	36
硒	μg	0.74	15	1.9

可选择成分				
肌醇	mg	2.2	44.0	5.7
牛磺酸	mg	1.7	34.8	4.49
左旋肉碱	mg	0.6	12.8	1.7
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.7	95.0	12.3
二十碳四烯酸(ARA)	mg	6.9	140	18.1
低聚半乳糖	g	0.05	1.00	0.129
低聚果糖	g	0.12	2.40	0.310
叶黄素	μg	10.3	210	27.1
核苷酸	mg	1.47	30.00	3.87

净含量:800克
国食注字YP20230107
*100mL奶液=12.9g优巧贝能较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段)+90mL温开水

优巧贝能



2段

较大婴儿配方奶粉
(6-12月龄,2段)



本企业通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证

产品特点

含核苷酸

含叶黄素、含牛磺酸

含左旋肉碱

含二十二碳六烯酸(DHA)

食用方法

- 1 冲调奶液前请先洗净双手。
- 2 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净,使用前用沸水煮沸至少5分钟,待用。
- 3 将饮用水煮沸5分钟,冷却至45℃左右。
- 4 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量,将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。用产品所附专用量匙将所需的奶粉加入到奶瓶中。
- 5 盖紧奶瓶,轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- 6 待奶液温度适宜时,再给宝宝喂奶。

注:冲调奶液时,请保证环境及操作过程的卫生。冲调方法不正确,可能影响宝宝健康。

重要声明

食用本产品时,须配合添加辅助食品。

贮存条件

本产品应贮藏于阴凉干燥处,勿放入冰箱内;每次食用后及时将罐口封严,开罐后请在一个月内食用完毕。



北大荒完达山乳业有限公司
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路386号
邮编:150090
官方网站:www.wondersun.com.cn

制造商:北大荒完达山乳业有限公司双城分公司
生产地址:哈尔滨双城市经济技术开发区
产地:黑龙江省哈尔滨市
食品生产许可证编号:SC10523018250136

产品类别/属性:乳基较大婴儿配方奶粉
产品标准号:GB 10766-2021
检验合格证号:同生产批号
保质期及生产日期(批号):见罐底

扫描二维码获取更多咨询



标签企业编号: 30100465



本企业通过ISO9001质量管理体系认证
ISO14001环境管理体系认证



北大荒完达山乳业股份有限公司
地址: 黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路386号
邮编: 150090
官方网站: www.wondersun.com.cn
制造: 北大荒完达山乳业股份有限公司双城分公司
生产地址: 哈尔滨双城市经济技术开发区
产地: 黑龙江省哈尔滨市
食品生产许可证编号: SC10523018250136
产品类别: 属性: 乳基较大婴儿配方奶粉
产品标准号: GB 10766-2021
检验合格证书: 同生产批号
包装生产许可证号:

追溯码:
批号:
生产日期:
保质期至:



产品特点

- 含核苷酸
- 含叶黄素、含牛磺酸
- 含左旋肉碱
- 含二十二碳六烯酸(DHA)

食用方法

1. 冲泡前请先洗净双手。
2. 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净, 使用前用沸水煮沸至少5分钟, 待用。
3. 将饮用水煮沸5分钟, 冷却至45°C左右。
4. 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量, 将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中, 用产品所附专用量匙将所需奶粉加入奶瓶中。
5. 盖紧奶后, 轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
6. 待奶液温度适宜时, 再给宝宝喂奶。

注: 冲泡奶液时, 请保证环境及操作过程的卫生。冲泡方法不正确, 可能影响宝宝健康。


重要声明

食用本产品时, 须配合添加辅助食品。

贮存条件

本产品应贮存于阴凉干燥处, 勿放入冰箱内; 每次食用后及时将袋口封严, 开袋后请在两周内食用完毕。

优巧贝能



2段 较大婴儿配方奶粉 (6-12月龄, 2段)



营养成分表

项目	单位	每100kJ 奶粉	每100g 奶粉	每100mL 奶液
能量	kJ	100	2036	263
蛋白质	g	0.63	12.8	1.63
脂肪	g	1.19	24.3	3.13
其中: 亚油酸	g	0.17	3.47	0.448
α -亚油酸	mg	17	347	44.8
碳水化合物	g	2.6	52.5	6.77
维生素				
维生素A	$\mu\text{g RE}$	23	459	58.2
维生素D	μg	0.60	12.3	1.59
维生素E	$\text{mg } \alpha\text{-TE}$	0.36	7.30	0.942
维生素K ₁	μg	2.64	41.5	5.35
维生素B ₁	μg	26	520	67.1
维生素B ₂	μg	26	520	73.5
维生素B ₆	μg	18.7	380	48.0
维生素B ₁₂	μg	0.108	2.2	0.28
烟酸(烟酰胺)	μg	181	3600	450
叶酸	μg	3.7	76.0	9.80
泛酸	μg	156	3180	410
维生素C	mg	3.5	72.1	9.3
生物素	μg	0.79	16.0	2.08
胆碱	mg	7.4	150	19
矿物质				
钠	mg	6	130	16.8
钾	mg	23	459	58.2
钙	μg	10.8	220	28
镁	mg	1.5	30.7	3.98
铁	mg	0.30	6.12	0.789
锌	mg	0.18	3.75	0.484
锰	μg	1.70	34.7	4.48
铜	mg	21	434	56.0
磷	mg	12	252	32.5
碘	μg	4.5	91.70	11.83
氯	mg	14	280	36
硒	μg	0.74	15	1.9
可选择成分				
肌醇	mg	2.2	44.0	5.7
牛磺酸	mg	1.7	34.8	4.49
左旋肉碱	mg	0.6	12.8	1.7
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.7	95.0	12.3
二十碳四烯酸(ARA)	mg	6.9	140	18.1
低聚半乳糖	g	0.05	1.00	0.128
低聚果糖	g	0.12	2.40	0.310
叶黄素	μg	10.3	210	27.1
核苷酸	mg	1.47	30.00	3.87

*100mL奶液=12.5g优巧贝能较大婴儿配方奶粉(6-12月龄, 2段)+90mL温开水

配料

基粉(生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物油和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、乳糖、低聚果糖、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、酪蛋白、牛磺酸、左旋肉碱、维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl- α -生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸)、D-生物素、氯化胆碱、柠檬酸钙、氯化钾、葡萄糖酸钙、磷酸钙、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌、硫酸锰、硫酸铜、磷酸氢钙、磷酸钾、亚硫酸钠)、维生素C(L-抗坏血酸钠)、L-抗坏血酸、维生素E(dl- α -生育酚)、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-腺苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)。

配料中含有乳及乳制品(包括乳糖)、大豆制品。

喂哺表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(毫升)	专用量匙
6-7个月	4-5	210	7
7-12个月	3-4	240	8

- 1. 1岁用平匙约4.3克奶粉。
- 2. 喂奶时请用产品所附专用量匙, 并按喂哺表配制奶液, 用多于或少于指定份量的奶粉, 将令宝宝得不到适当的营养。
- 3. 也可根据宝宝个体差异调整喂哺量, 如有疑问请拨打400-6572000进行咨询。

特别提示

冲调好的奶液应及时饮用, 不要给宝宝喂哺剩奶。
冲调好的奶液勿放入微波炉内加热, 以免烫伤。



扫描二维码 获取更多信息

标签企业编号: 30100463



配料

基粉(生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、乳糖、乳清蛋白粉、低聚果糖、低聚半乳糖、磷脂、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸钠)、D-生物素、柠檬酸钠、氯化钾、葡萄糖酸铜、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌、碳酸钙、磷酸氢钙、碘化钾、亚硒酸钠)、维生素C(L-抗坏血酸钠、L-抗坏血酸)、维生素E(dl-α-生育酚)、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷二核苷酸、5'-尿苷二核苷酸、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷二核苷酸、5'-鸟苷二核苷酸)。

配料中含有乳及乳制品(包括乳糖)、大豆制品。

喂哺表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(毫升)	专用平匙数
12~24个月	3~4	240	8
24~36个月	2~3	240	8

- 1 专用平匙约4.3克奶粉。
- 2 调奶时请用产品所附专用量匙,并参照喂哺表配制奶液,将多于或少于指定份量的奶粉,将令宝宝得不到适当的营养。
- 3 也可根据宝宝个体差异调整喂哺量,如有疑问可拨打400-6572000进行咨询。

特别提示

冲调好的奶液应及时饮用,不要给宝宝喂哺剩奶。
冲调好的奶液勿放入微波炉内加热,以免烫伤。

营养成分表

项目	单位	每100kJ 奶粉	每100g 奶粉	每100mL 奶液	项目	单位	每100kJ 奶粉	每100g 奶粉	每100mL 奶液
能量	kJ	100	2008	259	铜	mg	9.0	180	23
蛋白质	g	0.74	14.9	1.92	镁	mg	1.8	35.3	4.55
脂肪	g	1.16	23.3	3.01	铁	mg	0.30	6.12	0.769
其中:亚油酸	g	0.15	3.02	0.390	锌	mg	0.14	2.85	0.368
α-亚麻酸	mg	15	302	39.0	钙	mg	21	428	55.2
碳水化合物	g	2.5	50.9	6.57	磷	mg	12	249	32.1
维生素					钠	mg	3.3	65.80	8.49
维生素A	μg RE	23	453	58.4	氯	mg	15	300	39
维生素D	μg	0.60	12.1	1.56	可选择成分				
维生素E	mg α-TE	0.36	7.30	0.942	糖	μg	0.75	15	1.9
维生素K ₁	μg	2.09	42.0	5.42	胆碱	mg	7.5	150	19
维生素B ₁	μg	27	540	69.7	肌醇	mg	2.2	44.6	5.8
维生素B ₂	μg	29	590	76.1	牛磺酸	mg	1.7	35.1	4.53
维生素B ₆	μg	19.4	390	50.3	左旋肉碱	mg	0.7	13.1	1.7
维生素B ₁₂	μg	0.120	2.4	0.31	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.7	95.0	12.3
烟酸(烟酰胺)	μg	189	3800	490	二十碳四烯酸(ARA)	mg	7.0	140	18.1
叶酸	μg	3.8	76.0	9.80	低聚半乳糖	g	0.05	1.00	0.129
泛酸	μg	159	3200	413	低聚果糖	g	0.12	2.40	0.310
维生素C	mg	3.6	72.1	9.3	叶黄素	μg	10.5	210	27.1
生物素	μg	0.80	16.0	2.06	核苷酸	mg	1.49	30.00	3.87
矿物质					净含量:800克				
钠	mg	7	140	18.1	国食注字YP20230108				
钾	mg	23	453	58.4	100mL奶液=12.9g优巧贝能®配方奶粉(12-36月龄,3段)+90mL温开水				

优巧贝能

3段

净含量:800克
国食注字YP20230108

幼儿配方奶粉
(12-36月龄,3段)

完达山®

本企业通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证

产品特点

含核苷酸

含叶黄素、含牛磺酸

含左旋肉碱

含胆碱

食用方法

- 1 冲调奶液前请先洗净双手。
- 2 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净,使用前用沸水煮沸至少5分钟,待用。
- 3 将饮用水煮沸5分钟,冷却至45°C左右。
- 4 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量,将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。用产品所附专用量匙将所需的奶粉加入奶瓶中。
- 5 盖紧奶瓶,轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- 6 待奶液温度适宜时,再给宝宝喂奶。

注:冲调奶液时,请保证环境及操作过程的卫生。冲调方法不正确,可能影响宝宝健康。

贮存条件

本产品应贮藏于阴凉干燥处,勿放入冰箱内;每次食用后及时将罐口封严,开罐后请在一个月内食用完毕。

完达山®

北大荒完达山乳业股份有限公司

地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路386号

邮编:150090

官方网站:www.wondersun.com.cn

制造商:北大荒完达山乳业股份有限公司双城分公司

生产地址:哈尔滨双城市经济技术开发区

产地:黑龙江省哈尔滨市

食品生产许可证编号:SC10523018250136

产品类别、属性:乳基幼儿配方奶粉

产品标准号:GB 10767-2021

检验合格证号:同生产批号

保质期及生产日期(批号):见罐底

扫描二维码获取更多咨询



标签企业编号: 30100466



本企业通过ISO9001质量管理体系认证
ISO14001环境管理体系认证

完达山

北大荒完达山乳业股份有限公司
地址: 黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路386号
邮编: 150090
官方网站: www.wondersun.com.cn
制造: 北大荒完达山乳业股份有限公司双城分公司
生产地址: 哈尔滨双城市经济技术开发区
产地: 黑龙江省哈尔滨市
食品生产许可证编号: SC10523018250136

产品类别: 属性: 乳基幼儿配方奶粉
产品标准号: GB 10767-2021
检验合格证书: 同生产批号
包装生产许可证号:

追溯码:
批号:
生产日期:
保质期至:



产品特点

- 含核苷酸
- 含叶黄素、含牛磺酸
- 含左旋肉碱
- 含胆碱

食用方法


- 1 冲调前请先洗净双手。
- 2 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净, 使用前用沸水烫至少5分钟, 待用。
- 3 将饮用水煮沸5分钟, 冷却至45℃左右。
- 4 依据宝宝月龄及喂哺量, 将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中, 用产品所附专用量匙将所需的奶粉加入奶瓶中。
- 5 盖紧奶瓶, 轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- 6 待奶液温度适宜时, 再给宝宝喂奶。

注: 冲调奶液时, 请保证环境及操作过程的卫生。冲调方法不正确, 可能影响宝宝健康。

贮存条件

本产品应贮藏于阴凉干燥处, 勿放入冰箱内; 每次食用后及时将袋口封严, 开袋后请在两周内食用完毕。

优巧贝能



3段

净含量: 400克
国食注字YP20230108

幼儿配方奶粉
(12-36月龄, 3段)

完达山

营养成分表

项目	单位	每100g 奶粉	每100g 奶液	每100mL 奶液
能量	kJ	100	253	253
蛋白质	g	17.1	14.9	13.2
脂肪	g	11.5	23.3	3.01
其中: 亚油酸	g	1.5	3.02	0.390
α-亚油酸	g	15	302	38.0
碳水化合物	g	2.5	50.9	6.57
维生素				
维生素A	μg RE	23	453	58.4
维生素D	μg	0.60	12.1	1.56
维生素E	mg α-TE	0.35	7.30	0.942
维生素K ₁	μg	2.09	42.0	5.42
维生素B ₁	mg	27	540	69.7
维生素B ₂	mg	23	590	76.1
维生素B ₆	mg	19.4	390	50.3
维生素B ₁₂	μg	0.120	2.4	0.31
烟酸(烟酰胺)	mg	189	3800	490
叶酸	μg	9.8	196	25.2
泛酸	mg	159	3180	413
维生素C	mg	9.5	190	24.5
生物素	μg	0.80	16.0	2.05
矿物质				
钙	mg	7	140	18.1
磷	mg	23	453	58.4
钾	mg	9.0	180	23.2
钠	mg	1.6	32.3	4.15
镁	mg	0.30	6.13	0.789
锌	mg	0.14	2.85	0.368
铜	mg	21	418	53.2
铁	mg	12	249	31.1
锰	mg	3.3	65.0	8.45
硒	μg	15	300	39
可选择成分				
胆碱	μg	0.75	15	1.9
肌醇	mg	7.5	150	19
葡萄糖	mg	2.2	44.6	5.8
牛磺酸	mg	1.7	35.1	4.53
左旋肉碱	mg	0.7	13.1	1.7
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.7	95.0	12.3
二十碳四烯酸(ARA)	mg	7.0	140	18.1
低聚半乳糖	g	0.05	1.00	0.128
低聚果糖	g	0.12	2.40	0.310
肉碱	μg	10.5	210	27.1
核苷酸	mg	1.49	30.00	3.87

*100mL奶液=12.9g优巧贝能幼儿配方奶粉(12-36月龄, 3段)+90mL温开水

配料

基粉(生牛乳、脱脂乳清粉、食用植物油和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、乳糖、乳清蛋白粉、低聚果糖、低聚半乳糖、蔗糖、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸钠)、D-生物素、柠檬酸、氯化钾、葡萄糖酸钙、磷酸钙、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌、葡萄糖酸铜、磷酸钾、磷酸钠、亚硒酸钠、维生素C(L-抗坏血酸钠)、维生素E(dl-α-生育酚)、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、PI(益生)、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)。
配料中含有乳及乳制品(包括乳糖)、大豆制品。

喂哺表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(毫升)	专用平匙数
12-24个月	3-4	240	8
24-36个月	2-3	240	8

- 1 1岁用平匙约4.3克奶粉。
- 2 调奶时请用产品所附专用量匙, 并按喂哺表配制奶液, 用多于或少于指定份量的奶粉, 将宝宝喂得不适当的营养。
- 3 也可根据宝宝个体差异调整喂哺量, 如有疑问请拨打400-6572000进行咨询。

特别提示

冲调好的奶液应及时饮用, 不要给宝宝喂哺剩奶。
冲调好的奶液勿放入微波炉内加热, 以免烫伤。



扫描二维码获取更多资讯

标签企业编号: 30100515



配料

基粉(脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、葵花籽油、椰子油)、全脂羊奶粉、乳糖、低聚果糖、低聚半乳糖、脱脂羊奶粉、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸钠)、D-生物素、氯化胆碱、柠檬酸钠、氯化钠、氯化钾、葡萄糖酸铜、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌、硫酸锰、碳酸钾、磷酸氢钙、碘化钾、亚硒酸钠)、维生素C(L-抗坏血酸钠、L-抗坏血酸)、维生素E(dl-α-生育酚)、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、配料中含有乳及乳制品(包括乳糖)、大豆制品。

喂哺表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(毫升)	专用平匙数
第1-2周	7-8	60	2
第3-4周	6-7	90	3
第2个月	5-6	120	4
第3个月	5-6	150	5
第4个月	5-6	180	6
第5-6个月	4-5	210	7

- 1 专用平匙约4.3克奶粉。
- 2 喂奶时请用产品所附专用量匙,并严格按照喂哺表配制奶液,用多于或少于指定份量的奶粉,将令宝宝得不到适当的营养。
- 3 也可根据宝宝个体差异调整喂哺量,如有疑问可拨打400-6572000进行咨询。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	每100mL	项目	单位	每100kJ	每100g	每100mL
能量	kJ	100	2048	264	镁	mg	1.5	30.8	3.97
蛋白质	g	0.49	10.1	1.30	铁	mg	0.18	3.60	0.464
脂肪	g	1.22	24.9	3.21	锌	mg	0.18	3.75	0.484
其中:亚油酸	g	0.20	4.13	0.533	锰	μg	1.63	33.4	4.31
α-亚麻酸	mg	20	413	53.3	钙	mg	15	308	39.7
碳水化合物	g	2.7	54.6	7.04	磷	mg	9	180	23.2
维生素					碘	μg	4.5	92.20	11.89
维生素A	μgRE	18	359	45.3	氯	mg	19	380	49
维生素D	μg	0.60	12.3	1.59	硒	μg	0.93	19	2.5
维生素E	mgα-TE	0.31	6.40	0.826	可选择成分				
维生素K ₁	μg	1.72	35.3	4.55	肌醇	mg	2.1	432	5.6
维生素B ₁	μg	24	500	64.5	牛磺酸	mg	1.7	34.5	4.45
维生素B ₂	μg	27	550	71.0	左旋肉碱	mg	0.6	12.5	1.6
维生素B ₆	μg	18.1	370	47.7	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.6	95.0	12.3
维生素B ₁₂	μg	0.083	1.7	0.22	二十碳四烯酸(ARA)	mg	6.8	140	18.1
烟酸(烟酰胺)	μg	181	3700	477	低聚半乳糖	g	0.05	1.00	0.129
叶酸	μg	4.2	86.0	11.1	低聚果糖	g	0.12	2.40	0.310
泛酸	μg	154	3160	408	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.26	5.30	0.694
维生素C	mg	3.5	72.1	9.3	叶黄素	μg	4.88	100	12.9
生物素	μg	0.73	15.0	1.94	核苷酸	mg	1.71	35.00	4.52
胆碱	mg	7.3	150	19					
矿物质									
钠	mg	9	180	23.2					
钾	mg	21	437	56.4					
铜	μg	18.1	370	48					

*100mL奶液=12.9g菌河湾羊乳(配方羊奶粉)(0-6月龄,1段)+90mL温开水

完达山

国食注字YP20230103



净含量:800克

1段 婴儿配方羊奶粉(0-6月龄1段)

本企业通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证

重要声明

对于0~6月龄的婴儿最理想的食物是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

特别提示

冲调好的奶液应及时饮用,不要给宝宝喂哺剩奶。冲调好的奶液勿放入微波炉内加热,以免烫伤。

食用方法

- 1 冲调奶液前请先洗净双手。
- 2 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净,使用前用沸水煮沸至少5分钟,待用。
- 3 将饮用水煮沸5分钟,冷却至45℃左右。
- 4 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量,将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中,用产品所附专用量匙将所需的奶粉加入奶瓶中。
- 5 盖紧奶瓶,轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- 6 待奶液温度适宜时,再给宝宝喂奶。

注:冲调奶液时,请保证环境及操作过程的卫生。冲调方法不正确,可能影响宝宝健康。

贮存条件

本产品应贮藏于阴凉干燥处,勿放入冰箱内;每次食用后及时将罐口封严,开罐后请在一个月内食用完毕。

完达山

北大荒完达山乳业股份有限公司
地址:哈尔滨市南岗区长江路386号
邮编:150090
官方网站:www.wondersun.com.cn

制造商:北大荒完达山乳业股份有限公司双城分公司
生产地址:哈尔滨双城市经济技术开发区
产地:黑龙江省哈尔滨市
食品生产许可证编号:SC10523018250136

产品类别、属性:乳基婴儿配方奶粉
产品标准号:GB 10765-2021
检验合格证号:同生产批号
保质期及生产日期(批号):见罐底





标签企业编号: 30100518



配料

基粉(脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、葵花籽油、椰子油)、全脂羊奶粉、乳糖、低聚果糖、低聚半乳糖、脱脂羊奶粉、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B₁(硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸钠)、D-生物素、氯化胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、葡萄糖酸铜、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌、硫酸锰、硫酸钴、磷酸氢钙、碘化钾、亚硒酸钠)、维生素C(L-抗坏血酸钠、L-抗坏血酸)、维生素E(dl-α-生育酚)、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)。

配料中含有乳及乳制品(包括乳糖)、大豆制品。

喂哺表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(毫升)	专用平匙数
第1~2周	7~8	60	2
第3~4周	6~7	90	3
第2个月	5~6	120	4
第3个月	5~6	150	5
第4个月	5~6	180	6
第5~6个月	4~5	210	7

- 1 专用平匙约4.3克奶粉。
- 2 调奶时请用产品所附专用量匙,并按喂哺表配制奶液,用多于或少于指定份量的奶粉,将令宝宝得不到适当的营养。
- 3 也可根据宝宝个体差异调整喂哺量,如有疑问可拨打400-657-2000进行咨询。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	每100mL
能量	kJ	100	2048	264
蛋白质	g	0.49	10.1	1.30
脂肪	g	1.22	24.9	3.21
其中:亚油酸	g	0.20	4.13	0.533
α-亚油酸	mg	20	413	53.3
碳水化合物	g	2.7	54.6	7.04
维生素				
维生素A	μg RE	18	359	46.3
维生素D	μg	0.60	12.3	1.59
维生素E	mg α-TE	0.31	6.40	0.826
维生素K ₁	μg	1.72	35.3	4.55
维生素B ₁	μg	24	500	64.5
维生素B ₂	μg	27	550	71.0
维生素B ₆	μg	18.1	370	47.7
维生素B ₁₂	μg	0.083	1.7	0.22
烟酸(烟酰胺)	μg	181	3700	477
叶酸	μg	4.2	86.0	11.1
泛酸	μg	154	3160	408
维生素C	mg	3.5	72.1	9.3
生物素	μg	0.73	15.0	1.94
胆碱	mg	7.3	150	19
矿物质				
钠	mg	9	180	23.2
钾	mg	21	437	56.4
铜	μg	18.1	370	48

*100mL奶液=12.9g菁润优羊婴儿配方羊奶粉(0-6月龄,1段)+90mL温开水

完达山®



国食注字YP20230103

净含量:300克

1段 婴儿配方羊奶粉(0-6月龄1段)

本企业通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证

重要声明

对于0~6月龄的婴儿最理想的食物是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

特别提示

冲调好的奶液应及时饮用,不要给宝宝喂哺剩奶。冲调好的奶液勿放入微波炉内加热,以免烫伤。

食用方法

- 1 冲调奶液前请先洗净双手。
- 2 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净,使用前用沸水煮沸至少5分钟,待用。
- 3 将饮用水煮沸5分钟,冷却至45°C左右。
- 4 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量,将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中,用产品所附专用量匙将所需的奶粉加入奶瓶中。
- 5 盖紧奶瓶,轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- 6 待奶液温度适宜时,再给宝宝喂奶。

注:冲调奶液时,请保证环境及操作过程的卫生。冲调方法不正确,可能影响宝宝健康。

贮存条件

本产品应贮藏于阴凉干燥处,勿放入冰箱内;每次食用后及时将罐口封严,开罐后请在一个月内食用完毕。



北大荒完达山乳业股份有限公司

地址:哈尔滨市南岗区长江路386号

邮编:150090

官方网站:www.wondersun.com.cn

制造商:北大荒完达山乳业股份有限公司双城分公司

生产地址:哈尔滨双城市经济技术开发区

产地:黑龙江省哈尔滨市

食品生产许可证编号:SC10523018250136

产品类别:属性:乳基婴儿配方奶粉

产品标准号:GB 10765-2021

检验合格证号:同生产批号

保质期及生产日期(批号):见罐底





标签企业编号: 30100521



配料

基粉(脱盐乳清粉、食用植物油和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、葵花籽油、椰子油)、全脂羊奶粉、低聚果糖、低聚半乳糖、脱脂羊奶粉、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(d-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B₁(硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₃(烟酰胺)、维生素B₅(泛酸)、维生素B₆(吡哆素)、维生素B₇(生物素)、维生素B₉(叶酸)、维生素B₁₂(钴胺素)、维生素C(L-抗坏血酸)、D-生物素、氯化胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、葡萄糖酸铜、硫酸铁、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌、硫酸锰、硫酸钾、碘化钾、亚硒酸钠、维生素C(L-抗坏血酸)、L-抗坏血酸钠、维生素E(d-α-生育酚)、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、叶黄素、核黄素、5'-腺苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)。

配料中含有乳及乳制品(包括乳粉)、大豆制品。

喂哺表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量 温开水用量(毫升)	专用平匙数
第1~2周	7~8	60	2
第3~4周	6~7	90	3
第2个月	5~6	120	4
第3个月	5~6	150	5
第4个月	5~6	180	6
第5~6个月	4~5	210	7

① 1专用平匙约4.3克奶粉。

② 调奶时请用产品所附专用量匙,并参照喂哺表配制奶液,用多于或少于指定份量的奶粉,将令宝宝得不到适当的营养。

③ 也可根据宝宝个体差异调整喂哺量,如有疑问可拨打400-6572000进行咨询。

营养成分表

项目	单位	每100kJ 奶粉	每100g 奶粉	每100mL 奶液	项目	单位	每100kJ 奶粉	每100g 奶粉	每100mL 奶液
能量	kJ	100	2048	264	镁	mg	1.5	30.8	3.97
蛋白质	g	0.49	10.1	1.30	铁	mg	0.18	3.60	0.464
脂肪	g	1.22	24.9	3.21	锌	mg	0.18	3.75	0.484
其中:亚油酸	g	0.20	4.13	0.533	锰	μg	1.63	33.4	4.31
α-亚麻酸	mg	20	413	53.3	钙	mg	15	308	39.7
碳水化合物	g	2.7	54.6	7.04	磷	mg	9	180	23.2
维生素					碘	μg	4.5	92.20	11.89
维生素A	μg RE	18	359	46.3	氯	mg	19	380	49
维生素D	μg	0.60	12.3	1.59	硒	μg	0.93	19	2.5
维生素E	mg α-TE	0.31	6.40	0.826	可选择成分				
维生素K ₁	μg	1.72	35.3	4.55	肌醇	mg	2.1	43.2	5.6
维生素B ₁	μg	24	500	64.5	牛磺酸	mg	1.7	34.5	4.45
维生素B ₂	μg	27	550	71.0	左旋肉碱	mg	0.6	12.5	1.6
维生素B ₆	μg	18.1	370	47.7	二十二碳六烯酸 (DHA)	mg	4.6	95.0	12.3
维生素B ₁₂	μg	0.083	1.7	0.22	二十碳四烯酸 (ARA)	mg	6.8	140	18.1
烟酸(烟酰胺)	μg	181	3700	477	低聚半乳糖	g	0.05	1.00	0.129
叶酸	μg	4.2	86.0	11.1	低聚果糖	g	0.12	2.40	0.310
泛酸	μg	154	3160	408	1,3-二油酸-2-棕 榈酸甘油三酯	g	0.26	5.30	0.684
维生素C	mg	3.5	72.1	9.3	叶黄素	μg	4.88	100	12.9
生物素	μg	0.73	15.0	1.94	核苷酸	mg	1.71	35.00	4.52
胆碱	mg	7.3	150	19					
矿物质									
钠	mg	9	180	23.2					
钾	mg	21	437	56.4					
铜	μg	18.1	370	48					

*100mL奶液=12.9g普润优羊乳配方羊奶粉(0-6月龄,1段)+90mL温开水

完达山



净含量:138克

1段 婴儿配方羊奶粉(0-6月龄)

国食注字YP20230103

本企业通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证

重要声明

对于0~6月龄的婴儿最理想的食物是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

特别提示

冲调好的奶液应及时饮用,不要给宝宝喂哺剩奶。冲调好的奶液勿放入微波炉内加热,以免烫伤。

食用方法

- 1 冲调奶液前请先洗净双手。
- 2 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净,使用前用沸水煮沸至少5分钟,待用。
- 3 将饮用水煮沸5分钟,冷却至45℃左右。
- 4 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量,将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中,用产品所附专用量匙将所需的奶粉加入到奶瓶中。
- 5 盖紧奶瓶,轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- 6 待奶液温度适宜时,再给宝宝喂奶。

注:冲调奶液时,请保证环境及操作过程的卫生。冲调方法不正确,可能影响宝宝健康。

贮存条件

本产品应贮藏于阴凉干燥处,勿放入冰箱内;每次食用后及时将罐口封严,开罐后请在一个月内食用完毕。

完达山

北大荒完达山乳业股份有限公司

地址:哈尔滨市南岗区长江路386号

邮编:150090

官方网站:www.wondsun.com.cn

制造商:北大荒完达山乳业股份有限公司双城分公司

生产地址:哈尔滨双城市经济技术开发区

产地:黑龙江省哈尔滨市

食品生产许可证编号:SC10523018250136

产品类别/属性:乳基婴儿配方奶粉

产品标准号:GB 10765-2021

检验合格证号:同生产批号

保质期及生产日期(批号):见罐底





标签企业编号: 30100516



配料

基粉(脱盐羊乳清粉、全脂羊奶粉、食用植物油和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、葵花籽油、椰子油)、脱脂羊奶粉、乳糖、低聚果糖、低聚半乳糖、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸钠)、D-生物素、氯化胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、葡萄糖酸铜、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌、硫酸锰、磷酸钙、磷酸氢钙、碘化钾、亚硒酸钠、维生素C(L-抗坏血酸钠)、L-抗坏血酸、维生素E(dl-α-生育酚)、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)。配料中含有乳及乳制品(包括乳糖)、大豆制品。

喂哺表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(毫升)	专用平匙数
6~7个月	4~5	210	7
7~12个月	3~4	240	8

- 1专用平匙约4.3克奶粉。
- 2调奶时请用产品所附专用量匙,并参照喂哺表配制奶液,用多于或少于指定份量的奶粉,将令宝宝得不到适当的营养。
- 3也可根据宝宝个体差异调整喂哺量,如有疑问可拨打400-6572000进行咨询。

特别提示

冲调好的奶液应及时饮用,不要给宝宝喂哺剩奶。冲调好的奶液勿放入微波炉内加热,以免烫伤。

营养成分表

项目	单位	每100kJ 奶粉	每100g 奶粉	每100mL 奶液	项目	单位	每100kJ 奶粉	每100g 奶粉	每100mL 奶液
能量	kJ	100	2024	261	镁	mg	1.5	30.4	3.92
蛋白质	g	0.58	11.7	1.51	铁	mg	0.30	6.08	0.784
脂肪	g	1.17	23.7	3.06	锌	mg	0.19	3.75	0.484
其中:亚油酸	g	0.18	3.71	0.479	锰	μg	1.71	34.7	4.48
α-亚麻酸	mg	18	371	47.9	钙	mg	21	432	55.7
碳水化合物	g	2.7	54.2	6.99	磷	mg	12	252	32.5
维生素					碘	μg	4.5	91.10	11.75
维生素A	μg RE	23	457	59.0	氯	mg	15	310	40
维生素D	μg	0.60	12.2	1.57	硒	μg	0.74	15	1.9
维生素E	mg α-TE	0.32	6.50	0.839	可选择成分				
维生素K ₁	μg	1.74	35.3	4.55	肌醇	mg	2.2	44.0	5.7
维生素B ₁	μg	26	520	67.1	牛磺酸	mg	1.7	34.8	4.49
维生素B ₂	μg	28	570	73.5	左旋肉碱	mg	0.6	12.8	1.7
维生素B ₆	μg	18.8	380	49.0	二十二碳六烯酸 (DHA)	mg	4.7	95.0	12.3
维生素B ₁₂	μg	0.094	1.9	0.25	二十碳四烯酸 (ARA)	mg	6.9	140	18.1
烟酸(烟酰胺)	μg	188	3800	490	低聚半乳糖	g	0.05	1.00	0.129
叶酸	μg	3.8	76.0	9.80	低聚果糖	g	0.12	2.40	0.310
泛酸	μg	157	3180	410	1,3-二油酸-2-棕榈酸 甘油三酯	g	0.24	4.80	0.619
维生素C	mg	3.6	72.1	9.3	叶黄素	μg	10.4	210	27.1
生物素	μg	0.79	16.0	2.06	核苷酸	mg	1.73	35.00	4.52
胆碱	mg	7.4	150	19	100mL奶液=12.9g菁润优羊较大婴儿配方羊奶粉(6-12月龄,2段)+90mL温开水				
矿物质									
钠	mg	6	130	16.8					
钾	mg	23	457	59.0					
铜	μg	10.9	220	28					

完达山

国食注字YP20230104



净含量:800克

2段 较大婴儿配方羊奶粉(6-12月龄,2段)

本企业通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证

产品特点

含核苷酸

含左旋肉碱

含二十二碳六烯酸(DHA)

含1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯

含牛磺酸

食用方法

- 1 冲调奶液前请先洗净双手。
- 2 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净,使用前用沸水煮沸至少5分钟,待用。
- 3 将饮用水煮沸5分钟,冷却至45°C左右。
- 4 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量,将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。用产品所附专用量匙将所需的奶粉加入到奶瓶中。
- 5 盖紧奶瓶,轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- 6 待奶液温度适宜时,再给宝宝喂奶。

注:冲调奶液时,请保证环境及操作过程的卫生。冲调方法不正确,可能影响宝宝健康。

重要声明

食用本产品时,须配合添加辅助食品。

贮存条件

本产品应贮藏于阴凉干燥处,勿放入冰箱内,每次食用后及时将罐口封严,开罐后请在一个月食用完毕。

完达山

北大荒完达山乳业股份有限公司

地址:哈尔滨市南岗区长江路386号

邮编:150090

官方网站:www.wondersun.com.cn

制造商:北大荒完达山乳业股份有限公司双城分公司

生产地址:哈尔滨双城市经济技术开发区

产地:黑龙江省哈尔滨市

食品生产许可证编号:SC10523018250136

产品类别、属性:乳基较大婴儿配方奶粉

产品标准号:GB 10766-2021

检验合格证号:同生产批号

保质期及生产日期(批号):见罐底





标签企业编号: 30100519



配料

基粉(脱盐羊乳清粉、全脂羊奶粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、葵花籽油、椰子油)、脱脂羊奶粉、乳糖、低聚果糖、低聚半乳糖、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸钠)、D-生物素、氯化胆碱、柠檬酸钠、氯化钾、葡萄糖酸铜、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸氢钙、碘化钾、亚硒酸钠)、维生素C(L-抗坏血酸钠、L-抗坏血酸)、维生素E(dl-α-生育酚)、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)。
配料中含有乳及乳制品(包括乳糖)、大豆制品。

喂哺表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(毫升)	专用平匙数
6~7个月	4~5	210	7
7~12个月	3~4	240	8

- 1 专用平匙约4.3克奶粉。
- 2 调奶时请用产品所附专用量匙,并按喂哺表配制奶液,用多于或少于指定份量的奶粉,将令宝宝得不到适当的营养。
- 3 也可根据宝宝个体差异调整喂哺量,如有疑问可拨打400-5572000进行咨询。

特别提示

冲调好的奶液应及时饮用,不要给宝宝喂哺剩奶。
冲调好的奶液勿放入微波炉内加热,以免烫伤。

营养成分表

项目	单位	每100kJ 奶粉	每100g 奶粉	每100mL 奶液*
能量	kJ	100	2024	261
蛋白质	g	0.58	11.7	1.51
脂肪	g	1.17	23.7	3.06
其中:亚油酸	g	0.18	3.71	0.479
α-亚油酸	mg	18	371	47.9
碳水化合物	g	2.7	54.2	6.99
维生素				
维生素A	μg RE	23	457	59.0
维生素D	μg	0.60	12.2	1.57
维生素E	mg α-TE	0.32	6.50	0.839
维生素K ₁	μg	1.74	35.3	4.55
维生素B ₁	μg	26	520	67.1
维生素B ₂	μg	28	570	73.5
维生素B ₆	μg	18.8	380	49.0
维生素B ₁₂	μg	0.094	1.9	0.25
烟酸(烟酰胺)	μg	188	3800	490
叶酸	μg	3.8	76.0	9.80
泛酸	μg	157	3180	410
维生素C	mg	3.6	72.1	9.3
生物素	μg	0.79	16.0	2.06
胆碱	mg	7.4	150	19
矿物质				
钠	mg	6	130	16.8
钾	mg	23	457	59.0
铜	μg	10.9	220	28

项目	单位	每100kJ 奶粉	每100g 奶粉	每100mL 奶液*
镁	mg	1.5	30.4	3.92
铁	mg	0.30	6.08	0.784
锌	mg	0.19	3.75	0.484
锰	μg	1.71	34.7	4.48
钙	mg	21	432	55.7
磷	mg	12	252	32.5
碘	μg	4.5	91.0	11.75
氯	mg	15	310	40
硒	μg	0.74	15	1.9
可选择成分				
肌醇	mg	2.2	44.0	5.7
牛磺酸	mg	1.7	34.8	4.49
左旋肉碱	mg	0.6	12.8	1.7
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.7	95.0	12.3
二十碳四烯酸(ARA)	mg	6.9	140	18.1
低聚半乳糖	g	0.05	1.00	0.129
低聚果糖	g	0.12	2.40	0.310
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.24	4.80	0.619
叶黄素	μg	10.4	210	27.1
核苷酸	mg	1.73	35.00	4.52

*100mL奶液=12.9g菁润优羊较大婴儿配方羊奶粉(6-12月龄,2段)+90mL温开水

完达山®



净含量:300克

2段 较大婴儿配方羊奶粉(6-12月龄,2段)

国食注字YP20230104

本企业通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证

产品特点

- 含核苷酸
- 含左旋肉碱
- 含二十二碳六烯酸(DHA)
- 含牛磺酸
- 含1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯

食用方法

- 1 冲调奶液前请先洗净双手。
- 2 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净,使用前用沸水煮至少5分钟,待用。
- 3 将饮用水煮沸5分钟,冷却至45℃左右。
- 4 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量,将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中,用产品所附专用量匙将所需的奶粉加入奶瓶中。
- 5 盖紧奶瓶,轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- 6 待奶液温度适宜时,再给宝宝喂奶。

注:冲调奶液时,请保证环境及操作过程的卫生。冲调方法不正确,可能影响宝宝健康。

重要声明

食用本产品时,须配合添加辅助食品。

贮存条件

本产品应贮藏于阴凉干燥处,勿放入冰箱内;每次食用后及时将罐口封严,开罐后请在一个月内食用完毕。

完达山®

北大荒完达山乳业股份有限公司

地址:哈尔滨市南岗区长江路386号

邮编:150090

官方网站:www.wondersun.com.cn

制造商:北大荒完达山乳业股份有限公司双城分公司

生产地址:哈尔滨双城市经济技术开发区

产地:黑龙江省哈尔滨市

食品生产许可证编号:SC10523018250136

产品类别/属性:乳基较大婴儿配方奶粉

产品标准号:GB 10766-2021

检验合格证号:同生产批号

保质期及生产日期(批号):见罐底





标签企业编号: 30100517



配料

基粉(脱盐羊乳清粉、全脂羊奶粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、葵花籽油、椰子油)、脱脂羊奶粉、乳糖、低聚果糖、低聚半乳糖、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸钠)、D-生物素、柠檬酸钠、葡萄糖酸铜、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌、碳酸钙、磷酸氢钙、碘化钾、亚硒酸钠、维生素C(L-抗坏血酸钠、L-抗坏血酸)、维生素E(dl-α-生育酚)、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)。

配料中含有乳及乳制品(包括乳糖)、大豆制品。

喂哺表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(毫升)	专用平匙数
12~24个月	3~4	240	8
24~36个月	2~3	240	8

- 1 专用平匙约4.3克奶粉。
- 2 调奶时请用产品附专用量匙,并按照喂哺表配制奶液,用少于或少于指定份量的奶粉,将令宝宝得不到适当的营养。
- 3 也可根据宝宝个体差异调整喂哺量,如有疑问可拨打400-6572000进行咨询。

特别提示

冲调好的奶液应及时饮用,不要给宝宝喂哺剩奶。冲调好的奶液勿放入微波炉内加热,以免烫伤。

营养成分表

项目	单位	每100kJ 奶粉	每100g 奶粉	每100mL 奶液
能量	kJ	100	1998	258
蛋白质	g	0.73	14.6	1.88
脂肪	g	1.14	22.8	2.94
其中:亚油酸	g	0.16	3.13	0.404
α-亚油酸	mg	16	313	40.4
碳水化合物	g	2.6	51.7	6.67
维生素				
维生素A	μgRE	23	450	58.1
维生素D	μg	0.60	12.0	1.55
维生素E	mgα-TE	0.33	6.50	0.839
维生素K ₁	μg	1.77	35.3	4.55
维生素B ₁	μg	27	540	69.7
维生素B ₂	μg	30	590	76.1
维生素B ₆	μg	19.5	390	50.3
维生素B ₁₂	μg	0.105	2.1	0.27
烟酸(烟酰胺)	μg	190	3800	490
叶酸	μg	3.8	76.0	9.80
泛酸	μg	160	3200	413
维生素C	mg	3.6	72.1	9.3
生物素	μg	0.80	16.0	2.06
矿物质				
钠	mg	8	160	20.6
钾	mg	23	450	58.1
钙	mg	9.0	180	23

项目	单位	每100kJ 奶粉	每100g 奶粉	每100mL 奶液
镁	mg	1.8	35.1	4.53
铁	mg	0.30	6.08	0.784
锌	mg	0.14	2.85	0.368
钙	mg	21	425	54.8
磷	mg	12	249	32.1
碘	μg	3.3	65.80	8.49
氯	mg	16	320	41
可选择成分				
硒	μg	0.75	15	1.9
胆碱	mg	7.5	150	19
肌醇	mg	2.2	44.6	5.8
牛磺酸	mg	1.8	35.1	4.53
左旋肉碱	mg	0.7	13.1	1.7
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.8	95.0	12.3
二十碳四烯酸(ARA)	mg	7.0	140	18.1
低聚半乳糖	g	0.05	1.00	0.129
低聚果糖	g	0.12	2.40	0.310
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.20	4.00	0.516
叶黄素	μg	10.5	210	27.1
核苷酸	mg	1.75	35.00	4.52

*100mL奶液=12.9g菁润优羊(12-36月龄,3段)+90mL温开水

完达山

国食注字YP20230105



净含量:800克

3段 幼儿配方羊奶粉(12-36月龄3段)

本企业通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证

产品特点

含核苷酸

含1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯

含叶黄素、含牛磺酸

食用方法

- 1 冲调奶液前请先洗净双手。
- 2 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净,使用前用沸水煮沸至少5分钟,待用。
- 3 将饮用水煮沸5分钟,冷却至45℃左右。
- 4 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量,将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中,用产品所附专用量匙将所需的奶粉加入到奶瓶中。
- 5 盖紧奶瓶,轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- 6 待奶液温度适宜时,再给宝宝喂奶。

注:冲调奶液时,请保证环境及操作过程的卫生。冲调方法不正确,可能影响宝宝健康。

贮存条件

本产品应贮藏于阴凉干燥处,勿放入冰箱内;每次食用后及时将罐口封严,开罐后请在一个月内食用完毕。

完达山

北大荒完达山乳业股份有限公司

地址:哈尔滨市南岗区长江路386号

邮编:150090

官方网站:www.wondersun.com.cn

制造商:北大荒完达山乳业股份有限公司双城分公司

生产地址:哈尔滨双城市经济技术开发区

产地:黑龙江省哈尔滨市

食品生产许可证编号:SC10523018250136

产品类别、属性:乳基幼儿配方奶粉

产品标准号:GB 10767-2021

检验合格证号:同生产批号

保质期及生产日期(批号):见罐底





标签企业编号: 30100520



配料

基粉(脱盐羊乳清粉、全脂羊奶粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、葵花籽油、椰子油)、脱脂羊奶粉、乳糖、低聚果糖、低聚半乳糖、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸钠)、D-生物素、柠檬酸钠、葡萄糖酸铜、硫酸镁、葡萄糖酸亚铁、葡萄糖酸锌、磷酸钙、磷酸氢钙、碘化钾、亚硒酸钠)、维生素C(L-抗坏血酸钠、L-抗坏血酸)、维生素E(dl-α-生育酚)、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)。

配料中含有乳及乳制品(包括乳糖)、大豆制品。

喂哺表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(毫升)	专用平匙数
12~24个月	3~4	240	8
24~36个月	2~3	240	8

1. 专用平匙约4.3克奶粉。
2. 调奶时请用产品所附专用量匙,并按照喂哺表配制奶液,用多于或少于指定份量的奶液,将令宝宝得不到适当的营养。
3. 也可根据宝宝个体差异调整喂哺量,如有疑问可拨打400-6572000进行咨询。

特别提示

冲调好的奶液应及时饮用,不要给宝宝喂哺剩奶。
冲调好的奶液勿放入微波炉内加热,以免烫伤。

营养成分表

项目	单位	每100kJ 奶粉	每100g 奶粉	每100mL 奶液*
能量	kJ	100	1998	258
蛋白质	g	0.73	14.6	1.88
脂肪	g	1.14	22.8	2.94
其中:亚油酸	g	0.16	3.13	0.404
α-亚油酸	mg	16	313	40.4
碳水化合物	g	2.6	51.7	6.67
维生素				
维生素A	μg RE	23	450	58.1
维生素D	μg	0.60	12.0	1.55
维生素E	mg α-TE	0.33	6.50	0.839
维生素K ₁	μg	1.77	35.3	4.55
维生素B ₁	μg	27	540	69.7
维生素B ₂	μg	30	590	76.1
维生素B ₆	μg	19.5	390	50.3
维生素B ₁₂	μg	0.105	2.1	0.27
烟酸(烟酰胺)	μg	190	3800	490
叶酸	μg	3.8	76.0	9.80
泛酸	μg	160	3200	413
维生素C	mg	3.6	72.1	9.3
生物素	μg	0.80	16.0	2.06
矿物质				
钠	mg	8	160	20.6
钾	mg	23	450	58.1
铜	μg	9.0	180	23

项目	单位	每100kJ 奶粉	每100g 奶粉	每100mL 奶液*
镁	mg	1.8	35.1	4.53
铁	mg	0.30	6.08	0.784
锌	mg	0.14	2.85	0.368
钙	mg	21	425	54.8
磷	mg	12	249	32.1
碘	μg	3.3	65.80	8.49
氯	mg	16	320	41
可选择成分				
硒	μg	0.75	15	1.9
胆碱	mg	7.5	150	19
肌醇	mg	2.2	44.6	5.8
牛磺酸	mg	1.8	35.1	4.53
左旋肉碱	mg	0.7	13.1	1.7
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.8	95.0	12.3
二十碳四烯酸(ARA)	mg	7.0	140	18.1
低聚半乳糖	g	0.05	1.00	0.129
低聚果糖	g	0.12	2.40	0.310
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.20	4.00	0.516
叶黄素	μg	10.5	210	27.1
核苷酸	mg	1.75	35.00	4.52

*100mL奶液=12.9g菁润优羊婴幼儿配方羊奶粉(12-36月龄,3段)+90mL温开水

完达山



菁润优羊

净含量:300克

3段 幼配 方羊奶粉(12-36月龄,3段)

国食注字YP20230105

本企业通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证

产品特点

含核苷酸



含1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯

含叶黄素、含牛磺酸

食用方法

1. 冲调奶液前请先洗净双手。
2. 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净,使用前用沸水煮沸至少5分钟,待用。
3. 将饮用水煮沸5分钟,冷却至45°C左右。
4. 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量,将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中,用产品所附专用量匙将所需的奶粉加入到奶瓶中。
5. 盖紧奶瓶,轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
6. 待奶液温度适宜时,再给宝宝喂奶。

注:冲调奶液时,请保证环境及操作过程的卫生。冲调方法不正确,可能影响宝宝健康。

贮存条件

本产品应贮藏于阴凉干燥处,勿放入冰箱内;每次食用后及时将罐口封严,开罐后请在一个月内食用完毕。

完达山

北大荒完达山乳业股份有限公司

地址:哈尔滨市南岗区长江路386号
邮编:150090

官方网站:www.wondersun.com.cn

制造商:北大荒完达山乳业股份有限公司双城分公司

生产地址:哈尔滨双城市经济技术开发区

产地:黑龙江省哈尔滨市

食品生产许可证编号:SC10523018250136

产品类别/属性:乳基婴幼儿配方奶粉

产品标准号:GB 10767-2021

检验合格证号:同生产批号

保质期及生产日期(批号):见罐底



