

MYFY01

依然婴儿配方奶粉(0-6月龄, 1段) 奶具消毒及调奶方法

1. 请先洗净双手, 再用瓶刷将奶瓶等器具清洗干净, 然后将奶具放在沸水中煮五分钟, 彻底消毒。
2. 先将煮沸的开水冷却至50℃以下, 然后参照《喂哺用量建议表》将适量的水倒入已消毒过的奶瓶中。
3. 参照《喂哺用量建议表》, 用明一专用奶粉量匙(以4.5g/平匙计)添加所需的奶粉量。
4. 用匙搅拌均匀或盖好奶瓶摇匀, 直至奶粉完全溶解, 再将奶液滴在手背上试温, 温度适宜即可喂食。



营养成分表 NUTRITION INFORMATION

项目	单位	每100千焦	每100克	项目	单位	每100千焦	每100克
能量	千焦	100	2058	亚油酸	克	0.13	2.68
蛋白质	克	0.56	11.52	α-亚麻酸	毫克	15	309
脂肪	克	1.22	25.11	碳水化合物	克	2.6	53.5

维生素

维生素A	微克视黄醇当量	17	350	维生素B12	微克	0.067	1.379
维生素D	微克	0.60	12.35	烟酸(烟酰胺)	微克	157	3231
维生素E	毫克α-生育酚当量	0.33	6.79	叶酸	微克	4.8	98.8
维生素K1	微克	2.84	58.45	泛酸	微克	180	3704
维生素B1	微克	23	473	维生素C	毫克	3.2	65.9
维生素B2	微克	32	659	生物素	微克	0.86	17.70
维生素B6	微克	16.3	335.5	胆碱	毫克	5.0	102.9

矿物质

钠	毫克	8	165	锰	微克	5.54	114.01
钾	毫克	17	350	钙	毫克	14	288
铜	微克	15.1	310.8	磷	毫克	8	165
镁	毫克	1.5	30.9	碘	微克	3.7	76.1
铁	毫克	0.20	4.12	氯	毫克	15	309
锌	毫克	0.17	3.50	硒	微克	0.73	15.02

可选择成分

肌醇	毫克	3.8	78.2	膳食纤维	毫克	52.0	1070
牛磺酸	毫克	1.4	28.8	低聚半乳糖	毫克	94.0	1934
左旋肉碱	毫克	0.5	10.3				
二十二碳六烯酸(DHA)	毫克	4.0	82.3				
二十碳四烯酸(EPA)	毫克	4.0	82.3				



薇然®



净含量: 100g

国食注字YP20230240

婴儿配方奶粉(0-6月龄, 1段)

对于0-6月龄的婴儿最理想的食品是母乳, 在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

即食状态下每100mL含13.5g配方乳粉

产品标准号: GB 10765-2021

产品类别: 婴儿配方奶粉

产品属性: 乳基粉状配方食品

生产日期(PRO)、保质期至(EXP)、批号(LOT)见罐底喷码

产品检验合格证号同批号

曾用名: 原护

生产商: 明一乳业(富裕)有限公司
地址: 黑龙江省齐齐哈尔市富裕县富裕镇五街工业园区
产地: 黑龙江省齐齐哈尔市
生产许可证号: SC10523022750443
咨询热线: 400-6611-111
更多资讯, 敬请登录: www.wissun.com.cn



依然婴儿配方奶粉(0-6月龄, 1段) 配料表

脱盐乳清粉、食用植物调和油(葵花籽油、大豆油、椰子油、菜籽油、磷脂)、全脂奶粉、脱脂奶粉、低聚果糖、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、动物双歧杆菌乳亚种06-12、酯化视黄酯、胆钙化醇、d-α-生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸钠、D-生物素、氯化胆碱、氯化钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸氢钙、磷酸钾、亚硒酸钠、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱酒石酸盐、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸油脂、磷脂

依然婴儿配方奶粉(0-6月龄, 1段) 注意事项

1. 贮藏方法: 置于阴凉、干燥、干燥处保存, 请勿放在高温或潮湿处, 勿存放于冰箱内。
2. 开罐后请将盖口封严, 防止微生物及异味污染或杂物掉入, 以免影响品质, 建议在两周内食用完。
3. 奶粉冲调后应立即上眼, 喂奶时请抱着小宝宝, 吃剩下的奶水须倒掉, 请勿留作下次喂哺。
4. 不正确的冲调方式或不恰当的奶液浓度, 可能会使宝宝得不到适量的营养, 导致宝宝不适。

依然婴儿配方奶粉(0-6月龄, 1段)喂哺用量建议表 根据平均喂哺量

宝宝年龄	温开水(毫升)	奶粉匙数(平匙)	每天喂哺次数
0~2周	60	2	8
2~4周	120	4	7
4~8周	150	5	6
8~12周	180	6	5
3~6月龄	210	7	5

MYFY02

依然较大婴儿配方奶粉(6-12月龄, 2段).....奶具消毒及调奶方法

1. 请先洗净双手, 再用瓶刷将奶瓶等器具清洗干净, 然后将奶具放在沸水中煮五分钟, 彻底消毒。
2. 先将煮沸的开水冷却至50℃以下, 然后参照《喂哺用量建议表》将适量的水倒入已消毒过的奶瓶中。
3. 参照《喂哺用量建议表》, 用明一专用奶粉量匙(以4.5g/平匙计)添加所需的奶粉量。
4. 用匙搅拌均匀或盖好奶瓶摇匀, 直至奶粉完全溶解, 再将奶液滴在手背上试温, 温度适宜即可喂食。



营养成分表 NUTRITION INFORMATION

项目	单位	每100千焦	每100克	项目	单位	每100千焦	每100克
能量	千焦	100	2046	亚油酸	克	0.12	2.46
蛋白质	克	0.70	14.32	α-亚麻酸	毫克	14	286
脂肪	克	1.20	24.55	碳水化合物	克	2.5	51.2

维生素

维生素A	微克视黄醇当量	19	389	维生素B ₁₂	微克	0.070	1.432
维生素D	微克	0.60	12.27	烟酸(烟酰胺)	微克	151	3089
维生素E	毫克α-生育酚当量	0.27	5.52	叶酸	微克	4.9	100.3
维生素K	微克	2.87	58.72	泛酸	微克	180	3683
维生素B ₁	微克	26	532	维生素C	毫克	3.2	65.5
维生素B ₂	微克	37	757	生物素	微克	0.86	17.60
维生素B ₆	微克	16.4	335.5	胆碱	毫克	5.0	102.3

矿物质


钠	毫克	6	123	锰	微克	5.52	112.94
钾	毫克	20	409	钙	毫克	22	450
铜	微克	14.0	286.4	磷	毫克	14	286
镁	毫克	1.8	36.8	碘	微克	4.0	81.8
铁	毫克	0.30	6.14	氯	毫克	8	164
锌	毫克	0.19	3.89	硒	微克	0.77	15.75

可选择成分

肌醇	毫克	3.9	79.8	膳食纤维	毫克	53.0	1084
牛磺酸	毫克	1.4	28.6	低聚半乳糖	毫克	95.5	1954
左旋肉碱	毫克	0.6	12.3				
二十二碳六烯酸(DHA)	毫克	4.0	81.8				
二十碳四烯酸(EPA)	毫克	4.0	81.8				



薇然®



净含量: 100g

国食注字YP20230241

较大婴儿配方奶粉(6-12月龄, 2段)

食用本品时, 须配合添加辅助食品。

即食状态下每100mL含13.5g配方乳粉

产品标准号: GB 10766-2021

产品类别: 较大婴儿配方奶粉

产品属性: 乳基粉状配方食品

生产日期(PRO)、保质期至(EXP)、批号

(LOT) 见罐底标识

产品检验合格证号同批号

曾用名: 原护

生产商: 明一乳业(富裕)有限公司

地址: 黑龙江省齐齐哈尔市富裕县富裕镇五街工业园区

产地: 黑龙江省齐齐哈尔市

生产许可证号: SC10523022750443

咨询热线: 400-6611-111

更多资讯, 敬请登录: www.wissun.com.cn



依然较大婴儿配方奶粉(6-12月龄, 2段).....配料表

脱盐乳清粉、全脂奶粉、食用植物油和油(葵花籽油、大豆油、椰子油、菜籽油、
磷脂)、脱脂奶粉、低聚果糖、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、动物双歧杆菌乳亚种
Bb-12、酯化视黄醇、胆钙化醇、d-α-维生素E、植物甲萘酚、硫酸硫
胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、羧基胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸钠、
D-生物素、氯化胆碱、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、
磷酸钙、磷酸钾、亚硒酸钠、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱酒石酸盐、二十二碳
六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸油脂、磷脂

依然较大婴儿配方奶粉(6-12月龄, 2段).....注意事项

- I. 贮藏方法: 置于阴凉、干燥处保存, 请勿放在高温或潮湿处, 勿存放于冰箱内。
- II. 开罐后将罐口封严, 防止微生物及异味污染或杂物掉入, 以免影响品质, 建议在两周内食用完。
- III. 奶粉冲调后应立即上眼, 吃剩下的奶水须倒掉, 请勿留作下次眼。
- IV. 不正确的冲调方式或不恰当的奶液浓度, 可能会使宝宝得不到适量的营养, 引致宝宝不适。

依然较大婴儿配方奶粉(6-12月龄, 2段) 喂哺用量建议表——根据平均喂哺量

宝宝年龄	温开水(毫升)	奶粉匙数(平匙)	每天喂哺次数
6-12月龄	210	7	5

* 喂哺时可根据宝宝的发育和健康状况, 在营养师的指导下适当增减食用量及次数。

薇然幼儿配方奶粉(12-36月龄, 3段).....奶具消毒及调奶方法

1. 请先洗净双手, 再用瓶刷将奶瓶等器具清洗干净, 然后将奶具放在沸水中煮五分钟, 彻底消毒。
2. 先将煮沸的开水冷却至50℃以下, 然后参照《喂哺用量建议表》将适量的水倒入已消毒过的奶瓶中。
3. 参照《喂哺用量建议表》, 用明一专用奶粉量匙(以4.5g/平匙计)添加所需的奶粉量。
4. 用匙搅拌均匀或盖好奶瓶摇匀, 直至奶粉完全溶解, 再将奶液滴在手背上试温, 温度适宜即可喂食。



营养成分表 NUTRITION INFORMATION

项目	单位	每100千焦	每100克	项目	单位	每100千焦	每100克
能量	千焦	100	2025	亚油酸	克	0.12	2.43
蛋白质	克	0.74	15.00	α-亚麻酸	毫克	15	304
脂肪	克	1.18	23.93	碳水化合物	克	2.5	50.6

维生素

维生素A	微克视黄醇当量	19	385	维生素B6	微克	16.1	326.0
维生素D	微克	0.59	11.95	维生素B12	微克	0.080	1.620
维生素E	毫克α-生育酚当量	0.27	5.47	烟酸(烟酰胺)	微克	142	2876
维生素K1	微克	3.53	71.52	叶酸	微克	4.0	81.0
维生素D1	微克	26	527	泛酸	微克	176	3564
维生素B2	微克	30	608	维生素C	毫克	3.2	64.8
				生物素	微克	0.82	16.61

矿物质


钠	毫克	7	142	锌	毫克	0.16	3.24
钾	毫克	20	405	钙	毫克	23	466
铜	微克	15.0	303.8	磷	毫克	14	284
镁	毫克	2.0	40.5	碘	微克	4.0	81.0
铁	毫克	0.36	7.29	氯	毫克	10	203

可选择成分

硒	微克	0.60	12.15	二十碳四烯酸(AA/ARA)	毫克	1.2	24.3
胆碱	毫克	5.0	101.3	膳食纤维	毫克	53.5	1083
锰	微克	3.91	79.18	低聚半乳糖	毫克	95.5	1934
肌醇	毫克	3.0	60.8	低聚果糖	毫克		
牛磺酸	毫克	1.4	28.4				
左旋肉碱	毫克	0.6	12.2				
二十二碳六烯酸(DHA)	毫克	1.2	24.3				



薇然®



净含量: 100g

国食注字YP20230242

3段
幼儿配方奶粉(12-36月龄, 3段)

食用本品时, 须配合添加辅助食品。

即食状态下每100ml含13.5g配方乳粉

产品标准号: GB 10767-2021

产品类别: 幼儿配方奶粉

产品属性: 乳基粉状配方食品

生产日期(PRD)、保质期至(EXP)、批号

(LOT) 见罐底喷码

产品检验合格证号同批号

曾用名: 原炉

生产商: 明一乳业(富裕)有限公司

地址: 黑龙江省齐齐哈尔市富裕县富裕镇五街工业园区

产地: 黑龙江省齐齐哈尔市

生产许可证号: SC10523022750443

咨询热线: 400-6611-111

更多资讯, 敬请登录: www.wissun.com.cn



MYFY03

薇然幼儿配方奶粉(12-36月龄, 3段).....配料表

脱盐乳清粉、脱脂奶粉、食用植物调和油(葵花籽油、大豆油、椰子油、菜籽油、磷脂)、全脂奶粉、低聚果糖、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、酯化视黄酯、胆钙化醇、d-α-生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸钠、D-生物素、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸钙、磷酸氢钙、磷酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、硫酸锰、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱酒石酸盐、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸油脂、磷脂

薇然幼儿配方奶粉(12-36月龄, 3段).....注意事项

1. 贮藏方法: 置于阴凉、干燥、密封处保存, 请勿放在高温或潮湿处, 勿存放于冰箱内。
2. 开罐后将罐口封严, 防止微生物及异味污染或杂物掉入, 以免影响品质, 建议于两周内食用完。
3. 奶粉冲调后应立即上眼, 吃剩下的奶水须倒掉, 请勿留作下次喂哺。
4. 不正确的冲调方式或不恰当的奶液浓度, 可能会使宝宝得不到适量的营养, 导致宝宝不适。

薇然幼儿配方奶粉(12-36月龄, 3段)喂哺用量建议表 根据平均喂哺量

宝宝年龄	温开水(毫升)	奶粉匙数(平匙)	每天喂哺次数
12~36月龄	210	7	4

* 喂哺时可依据宝宝的发育和健康状况, 在营养师的指导下适当增减食用量及次数。

MYFY04

依然婴儿配方奶粉(0-6月龄, 1段) 奶具消毒及调奶方法

I. 请先洗净双手, 再用瓶刷将奶瓶等器具清洗干净, 然后将奶具放在沸水中煮五分钟, 彻底消毒。

II. 参照《喂哺用量建议表》, 用奶一专用奶粉量匙(以4.5g/平匙计)添加所需的奶粉量。

III. 先将煮沸的开水冷却至50℃以下, 然后参照《喂哺用量建议表》将适量的水倒入已消毒过的奶瓶中。

IV. 用匙搅拌均匀或盖好奶瓶摇匀, 直至奶粉完全溶解, 再将奶液滴在手背上试温, 温度适宜即可喂食。



营养成分表 NUTRITION INFORMATION

项目/Items	单位/Units	每100千焦	每100克	项目/Items	单位/Units	每100千焦	每100克
能量/Energy	千焦(kJ)	100	2058	亚油酸/Unsaturated acid	克(g)	0.13	2.68
蛋白质/Protein	克(g)	0.56	11.52	(L-亚油酸/L-Unsaturated acid	毫克(mg)	15	309
脂肪/Fat	克(g)	1.22	25.11	碳水化合物/Carbohydrate	克(g)	2.6	53.5

维生素

维生素A/Vitamin A	视黄醇当量(μg RE)	17	350	维生素B ₆ /Vitamin B ₆	微克(μg)	0.067	1.379
维生素D/Vitamin D	微克(μg)	0.60	12.35	烟酸(烟酰胺)/Niacin	微克(μg)	157	3231
维生素E/Vitamin E	毫克(α-生育酚)	0.33	6.79	叶酸/Folic acid	微克(μg)	4.8	98.8
	当量(mg α-TE)			泛酸/Pantothenic acid	微克(μg)	180	3704
维生素K ₁ /Vitamin K ₁	微克(μg)	2.84	58.45	维生素C/Vitamin C	毫克(mg)	3.2	65.9
维生素B ₁ /Vitamin B ₁	微克(μg)	23	473	生物素/Biotin	微克(μg)	0.06	17.70
维生素B ₂ /Vitamin B ₂	微克(μg)	32	659	胆碱/Choline	毫克(mg)	5.0	102.9
维生素B ₁₂ /Vitamin B ₁₂	微克(μg)	16.3	335.5				

矿物质


钠/Sodium	毫克(mg)	8	165	锰/Manganese	微克(μg)	5.54	114.01
钾/Potassium	毫克(mg)	17	350	钙/Calcium	毫克(mg)	14	288
铜/Copper	微克(μg)	15.1	310.8	磷/Phosphorus	毫克(mg)	8	165
镁/Magnesium	毫克(mg)	1.5	30.9	碘/Iodine	微克(μg)	37	76.1
铁/Iron	毫克(mg)	0.20	4.12	氯/Chloride	毫克(mg)	15	309
锌/Zinc	毫克(mg)	0.17	3.50	硒/Selenium	微克(μg)	0.73	15.02

可选择成分

肌醇/Inositol	毫克(mg)	3.8	78.2	膳食纤维/Dietary Fiber			
牛磺酸/Taurine	毫克(mg)	1.4	28.8	低聚半乳糖/	毫克(mg)	52.0	1070
左旋肉碱/L-Carnitine	毫克(mg)	0.5	10.3	Galacto-Oligosaccharides			
二十二碳六烯酸/DHA	毫克(mg)	4.0	82.3	低聚果糖/	毫克(mg)	94.0	1934
二十碳四烯酸(AA/ARA)	毫克(mg)	4.0	82.3	Fructo-Oligosaccharide			



薇然®



净含量900g

国食字 YP20230240

婴儿配方奶粉(0-6月龄, 1段)



对于0-6月龄的婴儿最理想的食品是母乳。
在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

即食状态下每100mL含13.5g配方乳粉

产品标准号: GB 10765-2021

产品类别: 婴儿配方奶粉

产品属性: 乳基粉状配方食品

生产日期(PRO)、保质期至(EXP)、批号

(LOT) 见罐底喷码

产品检验合格证书同批号

曾用名: 原护

生产商: 明一乳业(富裕)有限公司

地址: 黑龙江省齐齐哈尔市富裕县富裕镇五街
工业园区

产地: 黑龙江省齐齐哈尔市

生产许可证号: SC10523022750443

咨询热线: 400-6611-111

更多资讯, 敬请登录: www.wissun.com.cn



如您有什么建议或疑问, 请致函

E-mail: mingyi@wissun.com

友情提示: 罐盖内置明一奶粉专用量匙

依然婴儿配方奶粉(0-6月龄, 1段) 配料表

脱盐乳清粉、食用植物调和油(葵花籽油、大豆油、椰子油、菜籽油、
磷脂)、全脂奶粉、脱脂奶粉、低聚果糖、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、动物
双歧杆菌乳亚种00-12、胆碱维生素、胆碱维生素、d-α-胆碱生育醇、植物
甲萘酚、硫酸硫酸、核黄素、硫酸吡哆醇、氯化钾、氯化钠、叶酸、
D-泛酸钙、L-抗坏血酸钠、D-生物素、氯化胆碱、氯化钾、硫酸铜、
硫酸铁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、硫酸钙、硫酸钾、硫酸钾、亚
硫酸、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸(左旋法)、
花生四烯酸、磷脂

依然婴儿配方奶粉(0-6月龄, 1段) 注意事项

I. 贮藏方法: 置于阴凉、干燥、干燥处保存, 请勿放在高温或潮湿处,
勿存放于冰箱内。

II. 开罐后请盖紧罐盖, 防止微生物及异味污染或杂物掉入, 以免影
品质, 建议于两周内食用完。

III. 奶粉冲调后应立即上眼, 喂奶时请抱着宝宝, 吃剩下的奶水须倒掉,
请勿留作下次喂哺。

IV. 婴儿最理想的食品是母乳, 在母乳不足或无母乳时请选用本品。

* 未经煮沸的水或未消毒的奶具或不恰当的浓度, 可能会引起宝宝
不适。请按时请依照喂哺表和奶具消毒及调奶方法指示正确操作。

* 调奶时请用明一专用奶粉量匙。如用少于或多于指定份量的奶粉,
可能会使宝宝得不到适量的营养。

依然婴儿配方奶粉(0-6月龄, 1段) 喂哺用量建议表 根据平均喂哺量

宝宝年龄	温开水(毫升)	奶粉量匙(平匙)	每天喂哺次数
0-2周	60	2	8
2-4周	120	4	7
4-8周	150	5	6
8-12周	180	6	5
3-6月龄	210	7	5

依然较大婴儿配方奶粉(6-12月龄, 2段) 奶具消毒及调奶方法

- Ⅰ. 请先洗净双手, 再用瓶刷将奶瓶等器具清洗干净, 然后将奶具放在沸水中煮五分钟, 彻底消毒。
- Ⅱ. 先将煮沸的开水冷却至50℃以下, 然后参照《喂哺用量建议表》将适量的水倒入已消毒过的奶瓶中。
- Ⅲ. 参照《喂哺用量建议表》, 用明一专用奶粉量匙(以4.5g/平匙计)添加所需的奶粉量。
- Ⅳ. 用匙搅拌均匀或盖好奶瓶摇匀, 直至奶粉完全溶解, 再将奶液滴在手臂上试温, 温度适宜即可喂食。




营养成分表 NUTRITION INFORMATION

项目/Items	单位/Units	每100千焦	每100克	项目/Items	单位/Units	每100千焦	每100克
能量/Energy	千焦(kJ)	100	2046	亚油酸/Linoleic acid	克(g)	0.12	2.46
蛋白质/Protein	克(g)	0.70	14.32	(L-亚油酸/L- α -linolenic acid	毫克(mg)	14	286
脂肪/Fat	克(g)	1.20	24.55	碳水化合物/Carbohydrate	克(g)	2.5	51.2
维生素							
维生素A/Vitamin A	微克(μg RE)	19	389	维生素B ₆ /Vitamin B ₆	微克(μg)	0.070	1.432
维生素D/Vitamin D	微克(μg)	0.60	12.27	烟酸(烟酰胺)/Nicotin	微克(μg)	151	3089
维生素E/Vitamin E	毫克(α-生育酚)	0.27	5.52	叶酸/Folic acid	微克(μg)	4.9	100.3
	当量(mg α-TE)			泛酸/Pantothenic acid	微克(μg)	180	3683
维生素K ₁ /Vitamin K ₁	微克(μg)	2.87	58.72	维生素C/Vitamin C	毫克(mg)	3.2	65.5
维生素B ₁ /Vitamin B ₁	微克(μg)	26	532	生物素/Biotin	微克(μg)	0.86	17.60
维生素B ₂ /Vitamin B ₂	微克(μg)	37	757	胆碱/Choline	毫克(mg)	5.0	102.3
维生素B ₆ /Vitamin B ₆	微克(μg)	16.4	335.5				
矿物质							
钠/Sodium	毫克(mg)	6	123	锰/Manganese	微克(μg)	5.52	112.94
钾/Potassium	毫克(mg)	20	409	钙/Calcium	毫克(mg)	22	450
铜/Copper	微克(μg)	14.0	286.4	磷/Phosphorus	毫克(mg)	14	286
镁/Magnesium	毫克(mg)	1.8	36.8	碘/Iodine	微克(μg)	4.0	81.8
铁/Iron	毫克(mg)	0.30	6.14	氯/Chloride	毫克(mg)	8	164
锌/Zinc	毫克(mg)	0.19	3.89	硒/Selenium	微克(μg)	0.77	15.75
可选择成分							
肌醇/Inositol	毫克(mg)	3.9	79.8	膳食纤维/Dietary Fiber			
牛磺酸/Taurine	毫克(mg)	1.4	28.6	低聚半乳糖/Oligo	毫克(mg)	53.0	1084
左旋肉碱/L-Carnitine	毫克(mg)	0.6	12.3	Galacto-Oligosaccharides			
二十二碳六烯酸/DHA	毫克(mg)	4.0	81.8	低聚果糖/Fructo-Oligosaccharide	毫克(mg)	95.5	1954
二十二碳四烯酸(AA/ARA)	毫克(mg)	4.0	81.8				



薇然®



净含量: 900g

国食注字YP20230241

较大婴儿配方奶粉(6-12月龄, 2段)



食用本品时, 须配合添加辅助食品。

即食状态下每100mL含13.5g配方乳粉

产品标准号: GB 10766-2021

产品类别: 较大婴儿配方奶粉

产品属性: 乳基粉状配方食品

生产日期(PRO)、保质期至(EXP)、批号(LOT)见罐底喷码

产品检验合格证号同批号

曾用名: 原护

生产商: 明一乳业(富裕)有限公司

地址: 黑龙江省齐齐哈尔市富裕县富裕镇五街工业园区

产地: 黑龙江省齐齐哈尔市

生产许可证号: SC10523022750443

咨询热线: 400-6611-111

更多资讯, 敬请登录: WWW.WISSUN.COM.CN



如您有什么建议或疑问, 请致函
E-mail: mingyi@wissun.com
友情提示: 罐盖内宣明一奶粉专用量匙

依然较大婴儿配方奶粉(6-12月龄, 2段) 配料表

脱盐乳清粉、全脂奶粉、食用植物调和油(葵花籽油、大豆油、椰子油、菜籽油、棕榈油)、脱脂奶粉、低聚果糖、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、动物双歧杆菌乳亚种0-12、糖酸视黄醇、胆钙化醇、d-α-胡萝卜素、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸钠、D-生物素、氯化胆碱、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸氢钙、磷酸钾、亚硒酸钠、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱石胆盐、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸油脂、磷脂

依然较大婴儿配方奶粉(6-12月龄, 2段) 注意事项

- Ⅰ. 贮藏方法: 置于阴凉、干净、干燥处保存, 请勿放在高温或潮湿处, 勿存放于冰箱内。
- Ⅱ. 开罐后请盖紧塑料盖, 防止微生物及异味污染或杂物掉入, 以免影响品质, 建议于两周内食用完。
- Ⅲ. 奶粉冲调后应立即上眼罩, 喂奶时请抱着小宝宝, 吃剩下的奶水须倒掉, 请勿留作下次喂哺。
- Ⅳ. 6月龄以上的较大婴儿食用本产品时, 应配合添加辅助食品。

- * 未经煮沸的水或未消毒的奶具或不恰当的浓度, 可能会引起宝宝不适。调奶时请依照喂哺表和奶具消毒及调奶方法指示正确操作。
- * 调奶时请用明一专用奶粉量匙。如用少于或多于指定份量的奶粉, 可能会使宝宝得不到适量的营养。

依然较大婴儿配方奶粉(6-12月龄, 2段) 喂哺用量建议表 根据平均喂哺量

宝宝年龄	温开水(毫升)	奶粉匙数(平匙)	每天喂哺次数
6-12月龄	210	7	5

* 喂哺时可根据宝宝的发育和健康状况, 在营养师指导下适当增减食用量及次数。

项目 / Items	单位 / Units	每 100 千焦	每 100 克	项目 / Items	单位 / Units	每 100 千焦	每 100 克
能量 / Energy	千焦 (kJ)	100	2025	亚油酸 / Oleic acid	克 (g)	0.12	2.43
蛋白质 / Protein	克 (g)	0.74	15.00	(α -亚麻酸) / α -Linolenic acid	毫克 (mg)	15	304
脂肪 / Fat	克 (g)	1.18	23.93	碳水化合物 / Carbohydrate	克 (g)	2.5	50.6


维生素A / Vitamin A	视黄醇当量 (μg RE)	19	385	维生素B ₆ / Vitamin B ₆	核黄 (μg)	16.1	326.0
维生素D / Vitamin D	视黄 (μg)	0.59	11.95	维生素B ₁₂ / Vitamin B ₁₂	核黄 (μg)	0.080	1.620
维生素E / Vitamin E	α-生育酚 (α-生育酚当量 mg (α-TE))	0.27	5.47	烟酸 (烟酰胺) / Nicotin	核黄 (μg)	142	2876
				叶酸 / Folic acid	核黄 (μg)	4.0	81.0
维生素K / Vitamin K	核黄 (μg)	3.53	71.52	泛酸 / Pantothenic acid	核黄 (μg)	176	3564
维生素B ₁ / Vitamin B ₁	核黄 (μg)	26	527	维生素C / Vitamin C	毫克 (mg)	3.2	64.8
维生素B ₂ / Vitamin B ₂	核黄 (μg)	30	608	生物素 / Biotin	核黄 (μg)	0.82	16.61

钠 / Sodium	毫克 (mg)	7	142	锌 / Zinc	毫克 (mg)	0.16	3.24
钾 / Potassium	毫克 (mg)	20	405	钙 / Calcium	毫克 (mg)	23	466
铜 / Copper	微克 (µg)	15.0	303.8	磷 / Phosphorus	毫克 (mg)	14	284
镁 / Magnesium	毫克 (mg)	2.0	40.5	碘 / Iodine	微克 (µg)	4.0	81.0
铁 / Iron	毫克 (mg)	0.36	7.29	氯 / Chloride	毫克 (mg)	10	203

硒 / Selenium	微克 (µg)	0.60	12.15	膳食纤维 / Dietary Fiber			
胆碱 / Choline	毫克 (mg)	5.0	101.3	低聚半乳糖 /	毫克 (mg)	53.5	1033
锰 / Manganese	微克 (µg)	3.91	79.18	Galacto-Oligosaccharides			
肌醇 / Inositol	毫克 (mg)	3.0	60.8	低聚果糖 /	毫克 (mg)	95.5	1934
牛磺酸 / Taurine	毫克 (mg)	1.4	28.4	Fructo-Oligosaccharide			
左旋肉碱 / L-Carnitine	毫克 (mg)	0.6	12.2				
二十二碳六烯酸 / DHA	毫克 (mg)	1.2	24.3				
二十碳四烯酸 / (AA/ARA)	毫克 (mg)	1.2	24.3				



薇然®



净含量: 900g

国食注字YP20230242

幼儿配方奶粉(12-36月龄, 3段)

曾用名：原护

脱氢基清油、脱氢基油、食用植物油和油(葵花籽油、大豆油、椰子油、菜籽油、桐油)、全蛋脂肪、低聚果糖、低聚半乳糖、乳清蛋白、动物源胶原、杆菌亚种0-12、硫酸戊糖素、脂肪化酶、d-1-氨基葡萄糖、植物甲萘酮、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸硫苄醇、葡胺盐、硫酸盐、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸钠、D-生物素、硫酸铜、硫酸铁、硫酸亚铁、硫酸钾、葡萄糖、磷酸氢钙、磷酸钾、亚磷酸钙、果糖低聚糖、硫酸镁、肌醇、牛磺酸、L-亮氨酸、L-缬氨酸、L-异亮氨酸(苏甜三)、L-苏氨酸、L-缬氨酸、L-亮氨酸

更多资讯, 敬请登录: WWW.WISSUN.COM.CN

IV. 宝宝12月龄后食用本品时,须配合添加辅食食品。这时需要将奶嘴孔适度放大,使宝宝能轻松吸食。

- * 未经煮沸的水或未消毒的奶具或不恰当浓度，可能会引起宝宝不适。调奶时请依照图表和奶具消毒及调奶方法指示正确操作。
- * 调奶时请用明一专用奶粉量匙。如用少于或多于指定份量的奶粉，可能会使宝宝得不到适量的营养。

宝宝年龄	温开水(毫升)	奶粉匙数(平匙)	每天喂哺次数
12~36月龄	210	7	4

* 喂哺时可根据宝宝的发育和健康状况,在营养师的指导下适当地增减用量及次数。

如您有什么建议或疑问, 请致函
E-mail: mingyi@wissun.com
友情提示: 罐盖内置明一奶粉专用量匙



茁萃小羊®

国食注字
YP20230416

1段

净含量: 100g

婴儿配方羊奶粉(0-6月龄, 1段)

茁萃小羊婴儿配方羊奶粉(0-6月龄, 1段)..... 奶具消毒及调奶方法

1. 请先洗净双手, 再用瓶刷将奶瓶等器具清洗干净, 然后将奶具放在沸水中煮五分钟, 彻底消毒。
2. 先将煮沸的热水冷却至50℃以下, 然后参照《喂哺用量建议表》将适量的水倒入已消毒过的奶瓶中。
3. 参照《喂哺用量建议表》, 用明一专用奶粉量匙(以4.5g/平匙计)添加所需的奶粉量。
4. 用匙搅拌均匀或盖好奶瓶摇匀, 直至奶粉完全溶解, 再将奶液滴在手背上试温, 温度适宜即可喂食。



营养成分表 NUTRITION INFORMATION

项目	单位	每100千焦	每100克	项目	单位	每100千焦	每100克
能量	千焦	100	2070	亚油酸	克	0.11	2.28
蛋白质	克	0.51	10.56	α-亚麻酸	毫克	18	373
脂肪	克	1.19	24.62	碳水化合物	克	2.7	56.2

维生素

维生素A	微克视黄醇当量	18	373	维生素D ₂	微克	0.050	1.035
维生素D	微克	0.50	10.35	烟酸(烟酰胺)	微克	136	2815
维生素E	毫克α-生育酚当量	0.25	5.18	叶酸	微克	3.2	66.2
维生素K ₁	微克	1.97	40.78	泛酸	微克	128	2650
维生素B ₁	微克	18	373	维生素C	毫克	3.1	64.2
维生素B ₂	微克	28	580	生物素	微克	0.45	9.32
维生素B ₆	微克	12.8	265.0	胆碱	毫克	5.1	105.6

矿物质

钠	毫克	8	166	锰	微克	4.73	97.91
钾	毫克	19	393	钙	毫克	14	290
铜	微克	14.9	308.4	磷	毫克	8	166
镁	毫克	1.3	26.9	碘	微克	3.9	80.7
铁	毫克	0.17	3.52	氯	毫克	18	373
锌	毫克	0.17	3.52	硒	微克	0.75	15.53

可选择成分

肌醇	毫克	1.8	37.3	膳食纤维	毫克	52.0	1076
左旋肉碱	毫克	0.5	10.4	低聚半乳糖	毫克	91.8	1900
二十二碳六烯酸/DHA	毫克	4.5	93.2	低聚果糖	毫克	5.0	103.5
二十碳四烯酸/AA	毫克	6.0	124.2	乳铁蛋白	毫克		

对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳, 在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

即食状态下每100mL含13.5g配方乳粉

产品标准号: GB 10765-2021

产品类别: 婴儿配方奶粉

产品属性: 乳基粉状配方食品

保质期: 二年

生产日期/批号: 见罐底喷码

产品检验合格证号同批号

生产商: 明一乳业(富裕)有限公司
地址: 黑龙江省齐齐哈尔市富裕县富裕镇五街工业园区
产地: 黑龙江省齐齐哈尔市
生产许可证号: SC10523022750443
咨询热线: 400-6611-111
更多资讯, 敬请登录: www.wissun.com.cn



茁萃小羊婴儿配方羊奶粉(0-6月龄, 1段)..... 配料表

脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(低芥酸菜籽油、葵花籽油、大豆油、玉米油、椰子油)、全脂羊奶粉、低聚果糖(FOS)、低聚半乳糖(GOS)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种HN019、酪酸视黄酯、胆钙化醇、d-α-酪酸生育酚、植物甲萘酮、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸钠、D-生物素、氯化胆碱、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸氢钙、磷酸钾、亚硒酸钠、肌醇、左旋肉碱酒石酸盐、二十二碳六烯酸(DHA)、花生四烯酸(AA)、乳铁蛋白、磷脂

茁萃小羊婴儿配方羊奶粉(0-6月龄, 1段)..... 注意事项

1. 贮藏方法: 置于阴凉、干燥处保存, 请勿放在高温或潮湿处, 勿存放于冰箱内。
2. 开罐后请将盖子封严, 防止微生物及异味污染或杂物掉入, 以免影响品质, 建议于两周内食用完。
3. 奶粉冲调后应马上喂哺, 喂奶时请抱着小宝宝, 吃剩下的奶水须倒掉, 请勿留作下次喂哺。
4. 不正确的冲调方式或不恰当的奶液浓度, 可能会使宝宝得不到适量的营养, 引致宝宝不适。

茁萃小羊婴儿配方羊奶粉(0-6月龄, 1段)喂哺用量建议表: 根据平均喂哺量

宝宝年龄	温开水(毫升)	奶粉匙数(平匙)	每天喂哺次数
0~2周	60	2	8
2~4周	120	4	7
4~8周	150	5	6
8~12周	180	6	5
3~6月龄	210	7	5

茁萃小羊婴儿配方羊奶粉(0-6月龄, 1段)

奶具消毒及调奶方法

I. 请先洗净双手, 再用瓶刷将奶瓶等器具清洗干净, 然后将奶具放在沸水中煮五分钟, 彻底消毒。

II. 先将煮沸的开水冷却至50℃以下, 然后参照《喂哺用量建议表》将适量的水倒入已消毒过的奶瓶中。

III. 参照《喂哺用量建议表》, 用明一专用奶粉量匙(以4.5g/平匙计)添加所需的奶粉量。

IV. 用匙搅拌均匀或盖好奶瓶摇匀, 直至奶粉完全溶解, 再将奶液滴在手背上试温, 温度适宜即可喂食。

1

2

3

4

营养成分表 NUTRITION INFORMATION							
项目/Items	单位/Units	每100千焦	每100克	项目/Items	单位/Units	每100千焦	每100克
能量/Energy	千焦(kJ)	100	2070	亚油酸/linoleic acid	克(g)	0.11	2.28
蛋白质/Protein	克(g)	0.51	10.56	α-亚麻酸/α-linolenic acid	毫克(mg)	18	373
脂肪/Fat	克(g)	1.19	24.62	碳水化合物/Carbohydrate	克(g)	2.7	56.2
维生素							
维生素A/Vitamin A	微克视黄醇当量(μg RE)	18	373	维生素B ₂ /Vitamin B ₂	微克(μg)	0.050	1.035
维生素D/Vitamin D	微克(μg)	0.50	10.35	烟酸(烟酰胺)/Niacin	微克(μg)	136	2815
维生素E/Vitamin E	毫克α-生育酚当量(mg α-TE)	0.25	5.18	叶酸/Folic acid	微克(μg)	3.2	66.2
维生素K ₁ /Vitamin K ₁	微克(μg)	1.97	40.78	泛酸/Pantothenic acid	微克(μg)	128	2650
维生素B ₆ /Vitamin B ₆	微克(μg)	18	373	维生素C/Vitamin C	毫克(mg)	3.1	64.2
维生素B ₁₂ /Vitamin B ₁₂	微克(μg)	28	580	生物素/Biotin	微克(μg)	0.45	9.32
维生素B ₉ /Vitamin B ₉	微克(μg)	12.8	265.0	胆碱/Choline	毫克(mg)	5.1	105.6
矿物质							
钠/Sodium	毫克(mg)	8	166	锰/Manganese	微克(μg)	4.73	97.91
钾/Potassium	毫克(mg)	19	393	钙/Calcium	毫克(mg)	14	290
铜/Copper	微克(μg)	14.9	308.4	磷/Phosphorus	毫克(mg)	8	166
镁/Magnesium	毫克(mg)	1.3	26.9	碘/Iodine	微克(μg)	3.9	80.7
铁/Iron	毫克(mg)	0.17	3.52	氯/Chloride	毫克(mg)	18	373
锌/Zinc	毫克(mg)	0.17	3.52	硒/Selenium	微克(μg)	0.75	15.53
可选择成分							
肌醇/Inositol	毫克(mg)	1.8	37.3	膳食纤维/Dietary Fiber			
左旋肉碱/L-Carnitine	毫克(mg)	0.5	10.4	低聚半乳糖/Oligosaccharides	毫克(mg)	52.0	1076
二十二碳六烯酸/DHA	毫克(mg)	4.5	93.2	低聚果糖/Fructo-Oligosaccharide	毫克(mg)	91.8	1900
二十碳四烯酸/AA	毫克(mg)	6.0	124.2	乳铁蛋白/Lactoferrin	毫克(mg)	5.0	103.5



茁萃小羊



国食注字 YP20230416

1 段
净含量: 800g

婴儿配方羊奶粉(0-6月龄, 1段)



对于0-6月龄的婴儿最理想的食品是母乳, 在母乳不足或无母乳时可食用本产品。
即食状态下每100mL含13.5g配方乳粉
产品标准号: GB 10765-2021
产品类别: 婴儿配方奶粉
产品属性: 乳基粉状配方食品
保质期: 二年
生产日期/批号: 见罐底喷码
产品检验合格证号同批号



扫一扫了解更多资讯

生产商: 明一乳业(富裕)有限公司
地址: 黑龙江省齐齐哈尔市富裕县富裕镇五街工业园区
产地: 黑龙江省齐齐哈尔市
生产许可证号: SC10523022750443

咨询热线: 400-6611-111
更多资讯, 敬请登录: www.wissun.com.cn



如您有什么建议或疑问, 请致函
E-mail: mingyi@wissun.com
友情提示: 罐盖内置明一奶粉专用量匙

MYFY08

茁萃小羊婴儿配方羊奶粉(0-6月龄, 1段) 配料表
脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物油和油(低芥酸菜籽油、葵花籽油、大豆油、玉米油、椰子油)、全脂羊奶粉、低聚果糖(FOS)、低聚半乳糖(GOS)、动物双歧杆菌乳亚种B-12、动物双歧杆菌乳亚种HN019、酪酸梭状芽孢杆菌、胆钙化醇、D-α-酮酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、葡萄糖胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸钠、D-生物素、氯化胆碱、氯化钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钾、磷酸氢钙、磷酸钾、亚硒酸钠、肌醇、左旋肉碱酒石酸盐、二十二碳六烯酸(DHA)、花生四烯酸(AA)、乳铁蛋白、磷脂

茁萃小羊婴儿配方羊奶粉(0-6月龄, 1段) 注意事项
I. 贮藏方法: 置于阴凉、干净、干燥处保存, 请勿放在高温或潮湿处, 勿存放于冰箱。
II. 开罐后请盖紧罐盖, 防止微生物及异味污染或杂物掉入, 以免影响品质, 建议于两周内食用完。
III. 奶粉冲调后应立即上喂哺, 喂哺时请抱着小宝宝, 吃剩下的奶水须倒掉, 请勿留作下次喂哺。
IV. 婴儿最理想的食品是母乳, 在母乳不足或无母乳时请选用本品。

* 未经煮沸的水或未消毒的奶具或不恰当的温度, 可能会引起宝宝不适。调奶时请依照喂哺表和奶具消毒及调奶方法指示正确操作。
* 调奶时请用明一专用奶粉量匙。如用少于或多于指定份量的奶粉, 可能会使宝宝得不到适量的营养。

茁萃小羊婴儿配方羊奶粉(0-6月龄, 1段) 喂哺用量建议表 根据平均喂哺量			
宝宝年龄	温开水(毫升)	奶粉匙数(平匙)	每天喂哺次数
0-2周	60	2	8
2-4周	120	4	7
4-8周	150	5	6
8-12周	180	6	5
3-6月龄	210	7	5

MYFY09

茁萃小羊较大婴儿配方羊奶粉(6-12月龄, 2段) 奶具消毒及调奶方法

- I. 请先洗净双手, 再用瓶刷将奶瓶等器具清洗干净, 然后将奶具放在沸水中煮五分钟, 彻底消毒。
- III. 参照《喂哺用量建议表》, 用明一专用奶粉量匙(以4.5g/平匙计)添加所需的奶粉量。
- II. 先将煮沸的开水冷却至50℃以下, 然后参照《喂哺用量建议表》将适量的水倒入已消毒过的奶瓶中。
- IV. 用匙搅拌均匀或盖好奶瓶摇匀, 直至奶粉完全溶解, 再将奶液滴在手背上试温, 温度适宜即可喂食。



营养成分表 NUTRITION INFORMATION					
项目/Items	单位/Units	每100千焦	每100克	项目/Items	单位/Units
能量/ Energy	千焦(kJ)	100	2062	亚油酸/ Linoleic acid	克(g)
蛋白质/ Protein	克(g)	0.57	11.69	(L-亚麻酸/ L-Linolenic acid	毫克(mg)
脂肪/ Fat	克(g)	1.16	23.98	碳水化合物/ Carbohydrate	克(g)
维生素					
维生素A/ Vitamin A	微克视黄醇当量(μg RE)	20	412	维生素B ₂ / Vitamin B ₂	微克(μg)
维生素D/ Vitamin D	微克(μg)	0.51	10.52	烟酸(烟酰胺)/ Nicotin	微克(μg)
维生素E/ Vitamin E	毫克(α-生育酚当量mg (α-TE))	0.20	4.12	叶酸/ Folic acid	微克(μg)
维生素K ₁ / Vitamin K ₁	微克(μg)	1.98	40.83	泛酸/ Pantothenic acid	微克(μg)
维生素B ₁ / Vitamin B ₁	微克(μg)	20	412	维生素C/ Vitamin C	毫克(mg)
维生素B ₆ / Vitamin B ₆	微克(μg)	32	660	生物素/ Biotin	微克(μg)
维生素B ₁₂ / Vitamin B ₁₂	微克(μg)	12.8	263.9	胆碱/ Choline	毫克(mg)
矿物质					
钠/ Sodium	毫克(mg)	6	124	锰/ Manganese	微克(μg)
钾/ Potassium	毫克(mg)	22	454	钙/ Calcium	毫克(mg)
铜/ Copper	微克(μg)	13.3	274.2	磷/ Phosphorus	毫克(mg)
镁/ Magnesium	毫克(mg)	1.5	30.9	碘/ Iodine	微克(μg)
铁/ Iron	毫克(mg)	0.25	5.16	氯/ Chloride	毫克(mg)
锌/ Zinc	毫克(mg)	0.17	3.51	硒/ Selenium	微克(μg)
可选择成分					
肌醇/ Inositol	毫克(mg)	1.8	37.1	膳食纤维/ Dietary Fiber	毫克(mg)
左旋肉碱/ L-Carnitine	毫克(mg)	0.5	10.3	低聚半乳糖/ Galacto-Oligosaccharides	毫克(mg)
二十二碳六烯酸/ DHA	毫克(mg)	4.9	101.0	低聚果糖/ Fructo-Oligosaccharide	毫克(mg)
二十碳四烯酸/ AA	毫克(mg)	6.6	136.1	乳铁蛋白/ Lactoferrin	毫克(mg)



茁萃小羊



国食注字
YP20230419

净含量: 800g

较大婴儿配方羊奶粉(6-12月龄, 2段)



食用本品时, 须配合添加辅助食品。
即食状态下每100mL含13.5g配方乳粉

产品标准号: GB 10766-2021
产品类别: 较大婴儿配方奶粉
产品属性: 乳基粉状配方食品
保质期: 二年
生产日期/批号: 见罐底喷码
产品检验合格证号同批号



生产商: 明一乳业(富裕)有限公司
地址: 黑龙江省齐齐哈尔市富裕县富裕镇五街工业园区
产地: 黑龙江省齐齐哈尔市
生产许可证号: SC10523022750443

咨询热线: 400-6611-111
更多资讯, 敬请登录: WWW.WISSUN.COM.CN



如您有什么建议或疑问, 请致函
E-mail: mingyi@wissun.com
友情提示 罐盖内置明一奶粉专用量匙

茁萃小羊较大婴儿配方羊奶粉(6-12月龄, 2段) 配料表

脱盐乳清粉(来源羊乳)、全脂羊奶粉、食用植物调和油(低芥酸菜籽油、葵花籽油、大豆油、玉米油、椰子油)、低聚果糖(FOS)、低聚半乳糖(GOS)、动物双歧杆菌乳亚种B-12、动物双歧杆菌乳亚种HN019、酪酸视黄醇、脱钙化醇、dl-(L-酪酸生育酚)、植物甲萘酚、硫酸硫酸素、核黄素、盐酸吡哆醇、氯化钠、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸钠、D-生物素、氯化胆碱、氯化钾、氯化钙、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、硫酸钙、磷酸氢钙、磷酸钾、亚硒酸钠、肌醇、左旋肉碱酒石酸盐、二十二碳六烯酸(DHA)、花生四烯酸(AA)、乳铁蛋白、磷脂

茁萃小羊较大婴儿配方羊奶粉(6-12月龄, 2段) 注意事项

- I. 贮藏方法: 置于阴凉、干燥处保存, 请勿放在高温或潮湿处, 勿存放于冰箱内。
- II. 开罐后请盖紧密封盖, 防止微生物及异味污染或杂物掉入, 以免影响品质, 建议于两周内食用完。
- III. 奶粉冲调后应立即上喂哺, 喂哺时请抱着宝宝, 吃剩下的奶水须倒掉, 请勿留作下次喂哺。
- IV. 6月龄以上的较大婴儿食用本产品时, 应配合添加辅助食品。

- * 未经煮沸的水或未消毒的奶具或不恰当的温度, 可能会引起宝宝不适。调奶时请依照喂哺表和奶具消毒及调奶方法指示正确操作。
- * 调奶时请用明一专用奶粉量匙。如用少于或多于指定份量的奶粉, 可能会使宝宝得不到适量的营养。

茁萃小羊较大婴儿配方羊奶粉(6-12月龄, 2段) 喂哺用量建议表 根据平均喂哺量

宝宝年龄	温开水(毫升)	奶粉匙数(平匙)	每天喂哺次数
6-12月龄	210	7	5

* 喂哺时可根据宝宝的发育和健康状况, 在营养师的指导下适当增减食用量及次数。

茁萃小羊幼儿配方羊奶粉(12-36月龄, 3段).....奶具消毒及调奶方法

- I. 请先洗净双手,再用瓶刷将奶瓶等器具清洗干净,然后将奶具放在沸水中煮五分钟,彻底消毒。
- II. 先将煮沸的开水冷却至50℃以下,然后参照《喂哺用量建议表》将适量的水倒入已消毒过的奶瓶中。
- III. 参照《喂哺用量建议表》,用明一专用奶粉量匙(以4.5g/平匙计)添加所需的奶粉量。
- IV. 用匙搅拌均匀或盖好奶瓶摇匀,直至奶粉完全溶解,再将奶液滴在手背上试温,温度适宜即可喂食。



营养成分表 NUTRITION INFORMATION

项目/Items	单位/Units	每100千焦	每100克	项目/Items	单位/Units	每100千焦	每100克
能量/Energy	千焦(kJ)	100	2069	亚油酸/Linoleic acid	克(g)	0.10	2.07
蛋白质/Protein	克(g)	0.68	13.98	α-亚麻酸/α-Linolenic acid	毫克(mg)	16	331
脂肪/Fat	克(g)	1.22	25.21	碳水化合物/Carbohydrate	克(g)	2.5	51.5
维生素							
维生素A/Vitamin A	微克视黄醇当量(μg RE)	19	393	维生素B ₆ /Vitamin B ₆	微克(μg)	13.6	281.4
维生素D/Vitamin D	微克(μg)	0.51	10.55	维生素B ₁₂ /Vitamin B ₁₂	微克(μg)	0.050	1.035
维生素E/Vitamin E	毫克(α-生育酚当量mg (α-TE))	0.20	4.14	烟酸(烟酰胺)/Niacin	微克(μg)	127	2628
维生素K ₁ /Vitamin K ₁	微克(μg)	1.92	39.72	叶酸/Folic acid	微克(μg)	2.5	51.7
维生素B ₁ /Vitamin B ₁	微克(μg)	20	414	泛酸/Pantothenic acid	微克(μg)	127	2628
维生素B ₂ /Vitamin B ₂	微克(μg)	24	497	维生素C/Vitamin C	毫克(mg)	3.0	62.1
矿物质							
钠/Sodium	毫克(mg)	4	83	锌/Zinc	毫克(mg)	0.16	3.31
钾/Potassium	毫克(mg)	21	434	钙/Calcium	毫克(mg)	18	372
铜/Copper	微克(μg)	14.7	304.1	磷/Phosphorus	毫克(mg)	10	207
镁/Magnesium	毫克(mg)	1.6	33.1	碘/Iodine	微克(μg)	4.2	86.9
铁/Iron	毫克(mg)	0.30	6.21	氯/Chloride	毫克(mg)	13	269
可选择成分							
硒/Selenium	微克(μg)	0.69	14.28	膳食纤维/Dietary Fiber			
胆碱/Choline	毫克(mg)	4.9	101.4	低聚半乳糖/	毫克(mg)	49.3	1020
锰/Manganese	微克(μg)	3.28	67.86	Galacto-Oligosaccharides			
肌醇/Inositol	毫克(mg)	1.8	37.2	低聚果糖/Fructo-Oligosaccharide	毫克(mg)	91.8	1900
左旋肉碱/L-Carnitine	毫克(mg)	0.5	10.3	乳铁蛋白/Lactoferrin	毫克(mg)	5.0	103.5
二十二碳六烯酸/DHA	毫克(mg)	1.7	35.2				
二十碳四烯酸/AA	毫克(mg)	1.9	39.3				



茁萃小羊®



净含量: 800g

幼儿配方羊奶粉(12-36月龄, 3段)



食用本品时, 须配合添加辅助食品。
即食状态下每100mL含13.5g配方乳粉

产品标准号: GB 10767-2021
产品类别: 幼儿配方奶粉
产品属性: 乳基粉状配方食品
保质期: 二年
生产日期/批号: 见罐底喷码
产品检验合格证号同批号



生产商: 明一乳业(富裕)有限公司
地址: 黑龙江省齐齐哈尔市富裕县富裕镇五街工业园区
产地: 黑龙江省齐齐哈尔市
生产许可证号: SC10523022750443

咨询热线: 400-6611-111
更多资讯, 敬请登录: WWW.WISSUN.COM.CN



如您有什么建议或疑问, 请致函
E-mail: mingyi@wissun.com
友情提示: 罐盖内置明一奶粉专用量匙

MYFY10

茁萃小羊幼儿配方羊奶粉(12-36月龄, 3段).....配料表

脱盐乳清粉(来源羊乳)、全脂羊奶粉、食用植物调和油(低芥酸菜籽油、葵花籽油、大豆油、玉米油、椰子油)、浓缩乳清蛋白粉(来源羊乳)、低聚果糖(FOS)、低聚半乳糖(GOS)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种HN019、酪酸视黄醇、胆钙化醇、dl-α-磷酸生育酚、植物甲萘酚、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、富钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸钠、D-生物素、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、碳酸钙、磷酸氢钙、磷酸钾、亚磷酸钠、氯化铝、硫酸锰、肌醇、左旋肉碱酒石酸盐、二十二碳六烯酸(DHA)、花生四烯酸(AA)、乳铁蛋白、磷脂

茁萃小羊幼儿配方羊奶粉(12-36月龄, 3段).....注意事项

- I. 贮藏方法: 置于阴凉、干燥、干燥处保存, 请勿放在高温或潮湿处, 勿存放于冰箱内。
- II. 开罐后请盖紧密封盖, 防止微生物及异味污染或杂物掉入, 以免影响品质, 建议于两周内食用完。
- III. 奶粉冲调后应立即上眼, 吃剩下的奶须倒掉, 请勿留作下次眼。
- IV. 宝宝12月龄后食用本品时, 须配合添加辅助食品。这时需要把奶粉乳适度放大, 使宝宝能轻松吸食。

* 未经煮沸的水或未消毒的奶具或不恰当的浓度, 可能会引起宝宝不适。调奶时请依照喂哺表和奶具消毒及调奶方法指示正确操作。
* 调奶时请用明一专用奶粉量匙。如用少于或多于指定份量的奶粉, 可能会使宝宝得不到适量的营养。

茁萃小羊幼儿配方羊奶粉(12-36月龄, 3段)喂哺用量建议表 根据平均眼量

宝宝年龄	温开水(毫升)	奶粉匙数(平匙)	每天眼次数
12-36月龄	210	7	4

* 眼哺时可依据宝宝的发育和健康状况, 在营养师的指导下适当增减食用量及次数。