

标签编号：20250218-M1-800

美慧宝婴儿配方羊奶粉（0-6月龄，1段）

奶具消毒及调奶方法

I. 请先洗净双手，再用瓶刷将奶瓶等器具清洗干净，然后将奶具放在沸水中煮五分钟，彻底消毒。

II. 先将煮沸的开水冷却至50℃以下，然后参照《喂哺用量建议表》将适量的水倒入已消毒过的奶瓶中。

III. 参照《喂哺用量建议表》，用明一专用奶粉量匙（约4.5g/平匙）添加所需的奶粉量。

IV. 用匙搅拌均匀或盖好奶瓶摇匀，直至奶粉完全溶解，再将奶液滴在手背上试温，温度适宜即可喂食。

1

2

3

4

营养成分表

NUTRITION INFORMATION

项目 / Items	单位 / Units	每100千焦	每100克	项目 / Items	单位 / Units	每100千焦	每100克
能量 / Energy	千焦 (kJ)	100	2065	亚油酸 / Linoleic acid	克 (g)	0.12	2.48
蛋白质 / Protein	克 (g)	0.52	10.74	α-亚麻酸 / α-Linolenic acid	毫克 (mg)	15	310
脂肪 / Fat	克 (g)	1.19	24.57	碳水化合物 / Carbohydrate	克 (g)	2.7	55.8

维生素

维生素A / Vitamin A	微克视黄醇当量 (μg RE)	17	351	维生素B ₂ / Vitamin B ₂	微克 (μg)	0.060	1.239
维生素D / Vitamin D	微克 (μg)	0.57	11.77	烟酸（烟酰胺） / Niacin	微克 (μg)	159	3283
维生素E / Vitamin E	毫克（L-生育酚当量）(mg (L-TE))	0.30	6.20	叶酸 / Folic acid	微克 (μg)	4.4	90.9
维生素K ₁ / Vitamin K ₁	微克 (μg)	2.61	53.90	泛酸 / Pantothenic acid	微克 (μg)	124	2561
维生素B ₁ / Vitamin B ₁	微克 (μg)	21	434	维生素C / Vitamin C	毫克 (mg)	3.0	62.0
维生素B ₆ / Vitamin B ₆	微克 (μg)	22	454	生物素 / Biotin	微克 (μg)	0.70	14.46
维生素B ₁₂ / Vitamin B ₁₂	微克 (μg)	15.4	318.0	胆碱 / Choline	毫克 (mg)	4.9	101.2

矿物质

钠 / Sodium	毫克 (mg)	8	165	锰 / Manganese	微克 (μg)	4.56	94.16
钾 / Potassium	毫克 (mg)	18	372	钙 / Calcium	毫克 (mg)	15	310
铜 / Copper	微克 (μg)	14.3	295.3	磷 / Phosphorus	毫克 (mg)	9	186
镁 / Magnesium	毫克 (mg)	1.3	26.8	碘 / Iodine	微克 (μg)	3.9	80.5
铁 / Iron	毫克 (mg)	0.18	3.72	氯 / Chloride	毫克 (mg)	17	351
锌 / Zinc	毫克 (mg)	0.16	3.30	硒 / Selenium	微克 (μg)	0.77	15.90

可选择成分

肌醇 / Inositol	毫克 (mg)	2.2	45.8	膳食纤维 / Dietary Fiber			
左旋肉碱 / L-Carnitine	毫克 (mg)	0.5	10.9	低聚半乳糖 /	毫克 (mg)	50.5	1043
二十二碳六烯酸 / DHA	毫克 (mg)	3.9	80.5	Galacto-Oligosaccharides			
二十碳四烯酸 / AA	毫克 (mg)	5.8	119.8	低聚果糖 /	毫克 (mg)	97.0	2001
				Fructo-Oligosaccharide			
				乳铁蛋白 / Lactoferrin	毫克 (mg)	2.4	49.6

明一

WISSUN

美慧宝®

1段

国食注字YP20230243

净含量: 800克

婴儿配方羊奶粉(0-6月龄, 1段)

对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

即食状态下每100mL含13.5g配方乳粉

产品标准号: GB10765-2021

产品类别: 婴儿配方奶粉

产品属性: 乳基粉状配方食品

生产日期 (PRO)、保质期 (EXP)、批号 (LOT) 见罐底喷码

产品检验合格证号同批号

曾用名: 小太羊®

生产商: 明一乳业(齐齐哈尔)有限公司

地址: 黑龙江省齐齐哈尔市碾子山区工业园区

产地: 黑龙江省齐齐哈尔市

生产许可证号: SC10523020750457

咨询热线: 400-6611-111

更多资讯, 敬请登录: www.wissun.com.cn



6 972510 180005

如您有什么建议或疑问, 请致函 E-mail: mingyi@wissun.com

友情提示: 罐盖内宣明一奶粉专用量匙

美慧宝婴儿配方羊奶粉（0-6月龄，1段）

配料表

脱盐乳清粉（来源羊乳）、食用植物调和油（低芥酸菜籽油、葵花籽油、大豆油、玉米油、椰子油）、全脂羊奶粉、低聚果糖（FOS）、低聚半乳糖（GOS）、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种HN019、醋酸视黄醇、胆钙化醇、dl-α-酮酸生育酚、植物甲萘酚、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、肌醇、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸钠、D-生物素、氯化胆碱、氯化钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钾、碳酸氢钾、碘酸钾、亚硒酸钠、肌醇、左旋肉碱酒石酸盐、二十二碳六烯酸（DHA）、花生四烯酸（AA）、乳铁蛋白、磷脂

美慧宝婴儿配方羊奶粉（0-6月龄，1段）

注意事项

I. 贮藏方法：置于阴凉、干燥、干燥处保存，请勿放在高温或潮湿处，勿存放于冰箱内。

II. 开罐后请盖紧塑料盖，防止微生物及异味污染或杂物掉入，以免影响品质，建议于两周内食用完。

III. 奶粉冲调后应立即上眼，喂奶时请抱着小宝宝，吃剩下的奶水须倒掉，请勿留作下次喂哺。

IV. 婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时请选用本品。

* 未经煮沸的水或未消毒的奶具或不恰当的浓度，可能会导致宝宝不适。喂奶时请依照喂哺表和奶具消毒及调奶方法指示正确操作。

* 调奶时请用明一专用奶粉量匙。如用少于或多于指定份量的奶粉，可能会使宝宝得不到适量的营养。

美慧宝婴儿配方羊奶粉（0-6月龄，1段）喂哺用量建议表——根据平均喂哺量			
宝 宝 年 龄	温开水（毫升）	奶粉匙数（平匙）	每天喂哺次数
0~2 周	60	2	8
2~4 周	120	4	7
4~8 周	150	5	6
8~12 周	180	6	5
3~6 月龄	210	7	5


扫码关注公众号
了解更多信息



明一奶粉官方微信

10.2cm

10.6cm



标签编号：20250218-M2-800

美慧宝较大婴儿配方羊奶粉（6-12月龄，2段）..... 奶具消毒及调奶方法

I. 请先洗净双手，再用瓶刷将奶瓶等器具清洗干净，然后将奶具放在沸水中煮五分钟，彻底消毒。

II. 先将煮沸的开水冷却至50℃以下，然后参照《喂哺用量建议表》将适量的水倒入已消毒过的奶瓶中。

III. 参照《喂哺用量建议表》，用明一专用奶粉量匙（约4.5g/平匙）添加所需的奶粉量。

IV. 用匙搅拌均匀或盖好奶瓶摇匀，直至奶粉完全溶解，再将奶液滴在手背上试温，温度适宜即可喂食。

1

2

3

4

营养成分表 NUTRITION INFORMATION

项目 / Items	单位 / Units	每100千焦	每100克	项目 / Items	单位 / Units	每100千焦	每100克
能量 / Energy	千焦 (kJ)	100	2066	亚油酸 / Linoleic acid	克 (g)	0.09	1.86
蛋白质 / Protein	克 (g)	0.59	12.19	α-亚麻酸 / α-Linolenic acid	毫克 (mg)	14	289
脂肪 / Fat	克 (g)	1.16	23.96	碳水化合物 / Carbohydrate	克 (g)	2.7	55.8

维 生 素

维生素A / Vitamin A	微克视黄醇当量 (μg RE)	20	413	维生素B ₂ / Vitamin B ₂	微克 (μg)	0.060	1.240
维生素D / Vitamin D	微克 (μg)	0.57	11.78	烟酸 (烟酰胺) / Niacin	微克 (μg)	152	3140
维生素E / Vitamin E	毫克(α-生育酚当量)(mg (α-TE))	0.25	5.17	叶酸 / Folic acid	微克 (μg)	4.4	90.9
				泛酸 / Pantothenic acid	微克 (μg)	125	2583
维生素K ₁ / Vitamin K ₁	微克 (μg)	2.62	54.13	维生素C / Vitamin C	毫克 (mg)	3.0	62.0
维生素B ₁ / Vitamin B ₁	微克 (μg)	24	496	生物素 / Biotin	微克 (μg)	0.73	15.08
维生素B ₆ / Vitamin B ₆	微克 (μg)	27	558	胆碱 / Choline	毫克 (mg)	5.0	103.3
维生素B ₁₂ / Vitamin B ₁₂	微克 (μg)	15.0	309.9				

矿 物 质

钠 / Sodium	毫克 (mg)	6	124	锰 / Manganese	微克 (μg)	4.63	95.66
钾 / Potassium	毫克 (mg)	19	393	钙 / Calcium	毫克 (mg)	18	372
铜 / Copper	微克 (μg)	10.0	206.6	磷 / Phosphorus	毫克 (mg)	11	227
镁 / Magnesium	毫克 (mg)	1.5	31.0	碘 / Iodine	微克 (μg)	4.0	82.6
铁 / Iron	毫克 (mg)	0.28	5.78	氯 / Chloride	毫克 (mg)	17	351
锌 / Zinc	毫克 (mg)	0.17	3.5	硒 / Selenium	微克 (μg)	0.78	16.11

可 选 择 成 分

肌醇 / Inositol	毫克 (mg)	2.2	45.5	膳食纤维 / Dietary Fiber			
左旋肉碱 / L-Carnitine	毫克 (mg)	0.5	10.3	低聚半乳糖 /	毫克 (mg)	50.7	1047
二十二碳六烯酸 / DHA	毫克 (mg)	3.9	80.6	Galacto-Oligosaccharides			
二十碳四烯酸 / AA	毫克 (mg)	3.9	80.6	低聚果糖 /	毫克 (mg)	94.6	1955
				Fructo-Oligosaccharide			
				乳铁蛋白 / Lactoferrin	毫克 (mg)	2.4	49.6

明一
WISSUN

美慧宝®

2段

国食注字YP20230244

较大婴儿配方羊奶粉(6-12月龄, 2段)

净含量:
800克

食用本品时，须配合添加辅助食品。
即食状态下每100mL含13.5g配方乳粉

产品标准号: GB10766-2021
产品类别: 较大婴儿配方奶粉
产品属性: 乳基粉状配方食品
生产日期 (PRO)、保质期 (EXP)、批号 (LOT) 见罐底喷码
产品检验合格证号同批号
曾用名: 小太羊®

美慧宝较大婴儿配方羊奶粉（6-12月龄，2段）..... 配料表

脱盐乳清粉（来源羊乳）、全脂羊奶粉、食用植物调和油（低芥酸菜籽油、葵花籽油、大豆油、椰子油）、低聚果糖（FOS）、低聚半乳糖（GOS）、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种HN019、醋酸视黄酯、胆钙化醇、d-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氯化钴、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸钠、D-生物素、氯化胆碱、氯化钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锰、碳酸钙、磷酸氢钙、碘酸钾、亚硫酸钠、肌醇、左旋肉碱酒石酸盐、二十二碳六烯酸（DHA）、花生四烯酸（AA）、乳铁蛋白、磷脂

美慧宝较大婴儿配方羊奶粉（6-12月龄，2段）..... 注意事项

I. 贮藏方法：置于阴凉、干燥、干燥处保存，请勿放在高温或潮湿处，勿存放于冰箱内。

II. 开罐后请盖紧密封盖，防止微生物及异味污染或杂物掉入，以免影响品质，建议于两周内食用完。

III. 奶粉冲调后应马上喂哺，喂奶时请抱着小宝宝，吃剩下的奶水须倒掉，请勿留作下次喂哺。

IV. 6月龄以上的较大婴儿食用本产品时，应配合添加辅助食品。

* 未经煮沸的水或未消毒的奶具或不恰当的浓度，可能会引起宝宝不适。调奶时请依照喂哺表和奶具消毒及调奶方法指示正确操作。
* 调奶时请用明一专用奶粉量匙。如用少于或多于指定份量的奶粉，可能会使宝宝得不到适量的营养。

美慧宝较大婴儿配方羊奶粉（6-12月龄，2段）喂哺用量建议表——根据平均喂哺量

宝 宝 年 龄	温开水(毫升)	奶粉匙数(平匙)	每天喂哺次数
6 ~ 12 月 龄	210	7	5

* 喂哺时可根据宝宝的发育和健康状况，在营养师的指导下适当增减食用量及次数。

咨询热线：400-6611-111
更多资讯，敬请登录：www.wissun.com.cn

6 972510 180012

如您有什么建议或疑问，请致函 E-mail:mingyi@wissun.com
友情提示：罐盖内宣明一奶粉专用量匙


扫码关注公众号
了解更多信息



明一奶粉官方微信

10.2cm

10.6cm



标签编号：20250218-M3-800

美慧宝幼儿配方羊奶粉（12-36月龄，3段）

奶具消毒及调奶方法

I. 请先洗净双手，再用瓶刷将奶瓶等器具清洗干净，然后将奶具放在沸水中煮五分钟，彻底消毒。

II. 先将煮沸的开水冷却至50℃以下，然后参照《喂哺用量建议表》将适量的水倒入已消毒过的奶瓶中。

III. 参照《喂哺用量建议表》，用明一专用奶粉量匙（约4.5g/平匙）添加所需的奶粉量。

IV. 用匙搅拌均匀或盖好奶瓶摇匀，直至奶粉完全溶解，再将奶液滴在手背上试温，温度适宜即可喂哺。

1

2

3

4

营养成分表 NUTRITION INFORMATION					
项目 / Items	单位 / Units	每100千焦	每100克	项目 / Items	单位 / Units
能量 / Energy	千焦 (kJ)	100	2032	亚油酸 / Linoleic acid	克 (g)
蛋白质 / Protein	克 (g)	0.67	13.61	α-亚麻酸 / α-Linolenic acid	毫克 (mg)
脂肪 / Fat	克 (g)	1.17	23.77	碳水化合物 / Carbohydrate	克 (g)
维 生 素					
维生素A / Vitamin A	微克视黄醇当量 (μg RE)	20	406	维生素B ₆ / Vitamin B ₆	微克 (μg)
维生素D / Vitamin D	微克 (μg)	0.58	11.79	维生素B ₁₂ / Vitamin B ₁₂	微克 (μg)
维生素E / Vitamin E	毫克(α-生育酚当量)(mg (α-TE))	0.25	5.08	烟酸(烟酰胺) / Niacin	微克 (μg)
维生素K ₁ / Vitamin K ₁	微克 (μg)	2.60	52.83	叶酸 / Folic acid	微克 (μg)
维生素B ₁ / Vitamin B ₁	微克 (μg)	24	488	泛酸 / Pantothenic acid	微克 (μg)
维生素B ₂ / Vitamin B ₂	微克 (μg)	20	406	维生素C / Vitamin C	毫克 (mg)
矿 物 质					
钠 / Sodium	毫克 (mg)	4	81	锌 / Zinc	毫克 (mg)
钾 / Potassium	毫克 (mg)	18	366	钙 / Calcium	毫克 (mg)
铜 / Copper	微克 (μg)	12.0	243.8	磷 / Phosphorus	毫克 (mg)
镁 / Magnesium	毫克 (mg)	1.6	32.5	碘 / Iodine	微克 (μg)
铁 / Iron	毫克 (mg)	0.33	6.71	氯 / Chloride	毫克 (mg)
可 选 择 成 分					
硒 / Selenium	微克 (μg)	0.72	14.63	膳食纤维 / Dietary Fiber	毫克 (mg)
胆碱 / Choline	毫克 (mg)	4.9	99.6	低聚半乳糖 / Galacto-Oligosaccharides	毫克 (mg)
锰 / Manganese	微克 (μg)	3.22	65.43	低聚果糖 / Fructo-Oligosaccharide	毫克 (mg)
肌醇 / Inositol	毫克 (mg)	2.2	44.7	乳铁蛋白 / Lactoferrin	毫克 (mg)
左旋肉碱 / L-Carnitine	毫克 (mg)	0.5	10.2		
二十二碳六烯酸 / DHA	毫克 (mg)	1.5	30.5		
二十碳四烯酸 / AA	毫克 (mg)	1.5	30.5		

明一

WISSUN

美慧宝®

3

段

国食注字YP20230245

净含量: 800克

幼儿配方羊奶粉(12-36月龄, 3段)

食用本品时，须配合添加辅助食品。
即食状态下每100mL含13.5g配方乳粉

产品标准号: GB10767-2021
产品类别: 幼儿配方奶粉
产品属性: 乳基粉状配方食品
生产日期 (PRO)、保质期 (EXP)、批号 (LOT) 见罐底喷码
产品检验合格证号同批号
曾用名: 小太羊®

美慧宝幼儿配方羊奶粉（12-36月龄，3段） 配料表

脱盐乳清粉（来源羊乳）、全脂羊奶粉、食用植物调和油（低芥酸菜籽油、葵花籽油、大豆油、玉米油、椰子油）、浓缩乳清蛋白粉（来源羊乳）、低聚果糖（FOS）、低聚半乳糖（GOS）、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种HN019、醋酸视黄醇、脂肪化醇、dl-α-酮酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸钠、D-生物素、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、碳酸钙、磷酸氢钙、碘酸钾、亚硒酸钠、氯化铝、硫酸锰、肌醇、左旋肉碱酒石酸盐、二十二碳六烯酸（DHA）、花生四烯酸（AA）、乳铁蛋白、磷脂

- 美慧宝幼儿配方羊奶粉（12-36月龄，3段） 注意事项
- I. 贮藏方法：置于阴凉、干净、干燥处保存，请勿放在高温或潮湿处，勿存放于冰箱内。
 - II. 开罐后请盖紧塑料盖，防止微生物及异味污染或杂物掉入，以免影响品质，建议于两周内食用完。
 - III. 奶粉冲调后应立即上喂哺，吃剩下的奶水须倒掉，请勿留作下次喂哺。
 - IV. 宝宝12月龄后食用本品时，须配合添加辅助食品。这时需要将奶嘴孔适度放大，使宝宝能轻松吸食。

* 未经煮沸的水或未消毒的奶具或不恰当的温度，可能会引起宝宝不适。调奶时请依照喂哺表和奶具消毒及调奶方法指示正确操作。
* 调奶时请用明一专用奶粉量匙。如用少于或多于指定份量的奶粉，可能会使宝宝得不到适量的营养。

咨询热线: 400-6611-111
更多资讯, 敬请登录: www.wissun.com.cn

6 972510 180029

如您有什么建议或疑问，请致函 E-mail: mingyi@wissun.com
友情提示：罐盖内申明一奶粉专用量匙

美慧宝幼儿配方羊奶粉（12-36月龄，3段）喂哺用量建议表——根据平均喂哺量			
宝 宝 年 龄	温开水(毫升)	奶粉匙数(平匙)	每天喂哺次数
12 ~ 36 月 龄	210	7	4
* 喂哺时可根据宝宝的发育和健康状况，在营养师的指导下适当增减食用量及次数。			


扫码关注公众号
了解更多信息



明一奶粉官方微信

10.2cm

10.6cm



10.6cm

10.2cm

标签编号：20250225-M1-100

美慧宝婴儿配方羊奶粉（0-6月龄，1段）

奶具消毒及调奶方法

I. 请先洗净双手，再用瓶刷将奶瓶等器具清洗干净，然后将奶具放在沸水中煮五分钟，彻底消毒。

II. 先将煮沸的开水冷却至50℃以下，然后参照《喂哺用量建议表》将适量的水倒入已消毒过的奶瓶中。

III. 参照《喂哺用量建议表》，用明一专用奶粉量匙（约4.5g/平匙）添加所需的奶粉量。

IV. 用匙搅拌均匀或盖好奶瓶摇匀，直至奶粉完全溶解，再将奶液滴在手背上试温，温度适宜即可喂食。

1

2

3

4

营养成分表

NUTRITION INFORMATION

项目	单位	每100千焦	每100克	项目	单位	每100千焦	每100克
能量	千焦	100	2065	亚油酸	克	0.12	2.48
蛋白质	克	0.52	10.74	α-亚麻酸	毫克	15	310
脂肪	克	1.19	24.57	碳水化合物	克	2.7	55.8
维生素							
维生素A	微克视黄醇当量	17	351	维生素B ₁₂	微克	0.060	1.239
维生素D	微克	0.57	11.77	烟酸（烟酰胺）	微克	159	3283
维生素E	毫克α-生育酚当量	0.30	6.20	叶酸	微克	4.4	90.9
维生素K ₁	微克	2.61	53.90	泛酸	微克	124	2561
维生素B ₁	微克	21	434	维生素C	毫克	3.0	62.0
维生素B ₂	微克	22	454	生物素	微克	0.70	14.46
维生素B ₆	微克	15.4	318.0	胆碱	毫克	4.9	101.2
矿物质							
钠	毫克	8	165	锰	微克	4.56	94.16
钾	毫克	16	372	钙	毫克	15	310
铜	微克	14.3	295.3	磷	毫克	9	186
镁	毫克	1.3	26.8	碘	微克	3.9	80.5
铁	毫克	0.18	3.72	氯	毫克	17	351
锌	毫克	0.16	3.30	硒	微克	0.77	15.90
可选择成分							
肌醇	毫克	2.2	45.8	膳食纤维	毫克	50.5	1043
左旋肉碱	毫克	0.5	10.9	低聚半乳糖	毫克	97.0	2001
二十二碳六烯酸/DHA	毫克	3.9	80.5	低聚果糖	毫克	2.4	49.6
二十碳四烯酸/AA	毫克	5.8	119.8	乳铁蛋白	毫克		



美慧宝®

1段

国食注字YP20230243

婴儿配方羊奶粉(0-6月龄,1段)

净含量: 100克

对于0-6月龄的婴儿最理想的食品是母乳。在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

即食状态下每100mL含13.5g配方乳粉

产品标准号: GB10765-2021

产品类别: 婴儿配方奶粉

产品属性: 乳基粉状配方食品

生产日期 (PRO)、保质期 (EXP)、批号 (LOT) 见罐底喷码

产品检验合格证号同批号

曾用名: 小太羊®

生产商: 明一乳业(齐齐哈尔)有限公司

地址: 黑龙江省齐齐哈尔市碾子山区工业园区

产地: 黑龙江省齐齐哈尔市

生产许可证号: SC10523020750457

咨询热线: 400-6611-111

更多资讯, 敬请登录: www.wissun.com.cn



美慧宝婴儿配方羊奶粉（0-6月龄，1段）…… 配料表

脱盐乳清粉（来源羊乳）、食用植物调和油（低芥酸菜籽油、葵花籽油、大豆油、玉米油、椰子油）、全脂羊奶粉、低聚果糖（FOS）、低聚半乳糖（GOS）、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种HN019、醋酸视黄醇、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸钠、D-生物素、氯化胆碱、氯化钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸氢钙、碘酸钾、亚硒酸钠、肌醇、左旋肉碱酒石酸盐、二十二碳六烯酸（DHA）、花生四烯酸（AA）、乳铁蛋白、磷脂

美慧宝婴儿配方羊奶粉（0-6月龄，1段）…… 注意事项

- 贮藏方法: 置于阴凉、干燥、干燥处保存，请勿放在高温或潮湿处，勿存放于冰箱内。
- 开罐后请将盖口封严，防止微生物及异味污染或杂物掉入，以免影响品质，建议于两周内食用完。
- 奶粉冲调后应立即上眼喂，喂奶时请抱着小宝宝，吃剩下的奶水须倒掉，请勿留作下次喂哺。
- 不正确的冲调方式或不恰当的奶液浓度，可能会使宝宝得不到适量的营养，导致宝宝不适。

美慧宝婴儿配方羊奶粉（0-6月龄，1段）喂哺用量建议表……根据平均喂哺量

宝宝年龄	温开水(毫升)	奶粉匙数(平匙)	每天喂哺次数
0~2周	60	2	8
2~4周	120	4	7
4~8周	150	5	6
8~12周	180	6	5
3~6月龄	210	7	5

标签编号：20250519-M1-618

美慧宝婴儿配方羊奶粉（0-6月龄，1段）

奶具消毒及调奶方法

I. 请先洗净双手，再用瓶刷将奶瓶等器具清洗干净，然后将奶具放在沸水中煮五分钟，彻底消毒。

II. 先将煮沸的开水冷却至50℃以下，然后参照《喂哺用量建议表》将适量的水倒入已消毒过的奶瓶中。

III. 参照《喂哺用量建议表》，用明一专用奶粉量匙（约4.5g/平匙）添加所需的奶粉量。

IV. 用匙搅拌均匀或盖好奶瓶瓶口，直至奶粉完全溶解，再将奶液滴在手背上试温，温度适宜即可喂食。

营养成分表 NUTRITION INFORMATION					
项目 / Items	单位 / Units	每100千焦	每100克	项目 / Items	单位 / Units
能量 / Energy	千焦 (kJ)	100	2065	能量 / Energy	千焦 (kJ)
蛋白质 / Protein	克 (g)	0.52	10.74	蛋白质 / Protein	克 (g)
脂肪 / Fat	克 (g)	1.19	24.57	脂肪 / Fat	克 (g)
维 生 素					
维生素A / Vitamin A	微克视黄醇当量 (μg RE)	17	351	维生素A / Vitamin A	微克 (μg)
维生素D / Vitamin D	微克 (μg)	0.57	11.77	维生素D / Vitamin D	微克 (μg)
维生素E / Vitamin E	毫克 (mg)	0.30	6.20	维生素E / Vitamin E	毫克 (mg)
维生素K / Vitamin K	微克 (μg)	2.61	53.90	维生素K / Vitamin K	微克 (μg)
维生素B1 / Vitamin B1	微克 (μg)	21	434	维生素B1 / Vitamin B1	微克 (μg)
维生素B2 / Vitamin B2	微克 (μg)	22	454	维生素B2 / Vitamin B2	微克 (μg)
维生素B6 / Vitamin B6	微克 (μg)	15.4	318.0	维生素B6 / Vitamin B6	微克 (μg)
矿 物 质					
钠 / Sodium	毫克 (mg)	8	165	钠 / Sodium	毫克 (mg)
钾 / Potassium	毫克 (mg)	18	372	钾 / Potassium	毫克 (mg)
铜 / Copper	微克 (μg)	14.3	295.3	铜 / Copper	微克 (μg)
镁 / Magnesium	毫克 (mg)	1.3	26.8	镁 / Magnesium	毫克 (mg)
铁 / Iron	毫克 (mg)	0.18	3.72	铁 / Iron	毫克 (mg)
锌 / Zinc	毫克 (mg)	0.16	3.30	锌 / Zinc	毫克 (mg)
可 选 择 成 分					
肌醇 / Inositol	毫克 (mg)	2.2	45.8	膳食纤维 / Dietary Fiber	毫克 (mg)
左旋肉碱 / L-Carnitine	毫克 (mg)	0.5	10.9	低聚半乳糖 / Galacto-Oligosaccharides	毫克 (mg)
二十二碳六烯酸 / DHA	毫克 (mg)	3.9	80.5	低聚果糖 / Fructo-Oligosaccharide	毫克 (mg)
二十碳四烯酸 / AA	毫克 (mg)	5.8	119.8	乳铁蛋白 / Lactoferrin	毫克 (mg)

1段

国食注字YP20230243

婴儿配方羊奶粉(0-6月龄, 1段)

净含量: 618克

对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

即食状态下每100mL含13.5g配方乳粉

产品标准号: GB10765-2021

产品类别: 婴儿配方奶粉

产品属性: 乳基粉状配方食品

生产日期 (PRO)、保质期 (EXP)、批号 (LOT) 见罐底喷码

产品检验合格证号同批号

曾用名: 小太羊

美慧宝婴儿配方羊奶粉（0-6月龄，1段）配料表

脱盐乳清粉（来源羊乳）、食用植物调和油（低芥酸菜籽油、葵花籽油、大豆油、玉米油、椰子油）、全脂羊奶粉、低聚果糖（FOS）、低聚半乳糖（GOS）、动物双歧杆菌乳亚种B-12、动物双歧杆菌乳亚种HN019、葡萄糖基果糖、脂肪化糖、dl-α-酮酸生育酚、植物甲氧基、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氯化钠、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸钠、D-生物素、氯化胆碱、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钾、碳酸氢钾、碘酸钾、亚硒酸钠、肌醇、左旋肉碱、石炭酸盐、二十二碳六烯酸（DHA）、花生四烯酸（AA）、乳铁蛋白、磷脂

美慧宝婴儿配方羊奶粉（0-6月龄，1段）注意事项

I. 贮藏方法：置于阴凉、干燥、干燥处保存，请勿放在高温或潮湿处，勿存放于冰箱内。

II. 开罐后请盖紧塑料盖，防止微生物及异味污染或杂物掉入，以免影响品质，建议于两周内食用完。

III. 奶粉冲调后应立即上眼，喂奶时请抱着小宝宝，吃剩下的奶水须倒掉，请勿留作下次喂哺。

IV. 婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时请选择用本品。

* 未经煮沸的水或未消毒的奶具或不恰当的浓度，可能会导致宝宝不适。调奶时请依照喂哺表和奶具消毒及调奶方法指示正确操作。

* 调奶时请用明一专用奶粉量匙。如用少于或多于指定份量的奶粉，可能会使宝宝得不到适量的营养。

生产商: 明一乳业（齐齐哈尔）有限公司

地址: 黑龙江省齐齐哈尔市碾子山区工业园区

产地: 黑龙江省齐齐哈尔市

生产许可证号: SC10523020750457

咨询热线: 400-6611-111


更多资讯, 敬请登录: www.wissun.com.cn



如您有任何疑问或疑问, 请致函 E-mail: mingyi@wissun.com

友情提示: 罐盖内宜明一奶粉专用量匙

美慧宝婴儿配方羊奶粉（0-6月龄，1段）喂哺用量建议表——根据平均喂哺量			
宝 宝 年 龄	温开水（毫升）	奶粉匙数（平匙）	每天喂哺次数
0-2 周	60	2	8
2-4 周	120	4	7
4-8 周	150	5	6
8-12 周	180	6	5
3-6 月龄	210	7	5



标签编号：20250519-M2-618

美慧宝较大婴儿配方羊奶粉（6-12月龄，2段）

奶具消毒及调奶方法

I. 请先洗净双手，再用瓶刷将奶瓶等器具清洗干净，然后将奶具放在沸水中煮五分钟，彻底消毒。

II. 先将煮沸的热水冷却至50℃以下，然后参照《喂哺用量建议表》将适量的水倒入已消毒过的奶瓶中。

III. 参照《喂哺用量建议表》，用明一专用奶粉量匙（约4.5g/平匙）添加所需的奶粉量。

IV. 用匙搅拌均匀或盖好奶瓶瓶口，直至奶粉完全溶解，再将奶液滴在手背上试温，温度适宜即可喂食。

1

2

3

4

营养成分表 NUTRITION INFORMATION					
项目 / Items	单位 / Units	每100千焦	每100克	项目 / Items	单位 / Units
能量 / Energy	千焦 (kJ)	100	2066	亚油酸 / Linoleic acid	克 (g)
蛋白质 / Protein	克 (g)	0.59	12.19	α-亚麻酸 / α-Linolenic acid	毫克 (mg)
脂肪 / Fat	克 (g)	1.16	23.96	碳水化合物 / Carbohydrate	克 (g)
维 生 素					
维生素A / Vitamin A	微克视黄醇当量 (μg RE)	20	413	维生素B ₂ / Vitamin B ₂	微克 (μg)
维生素D / Vitamin D	微克 (μg)	0.57	11.78	烟酸 (烟酰胺) / Nicotin	微克 (μg)
维生素E / Vitamin E	毫克α-生育酚 (mg α-TE)	0.25	5.17	叶酸 / Folic acid	微克 (μg)
维生素K ₁ / Vitamin K ₁	微克 (μg)	2.62	54.13	泛酸 / Pantothenic acid	微克 (μg)
维生素B ₁ / Vitamin B ₁	微克 (μg)	24	496	维生素C / Vitamin C	毫克 (mg)
维生素B ₆ / Vitamin B ₆	微克 (μg)	27	558	生物素 / Biotin	微克 (μg)
维生素B ₁₂ / Vitamin B ₁₂	微克 (μg)	15.0	309.9	胆碱 / Choline	毫克 (mg)
矿 物 质					
钠 / Sodium	毫克 (mg)	6	124	锰 / Manganese	微克 (μg)
钾 / Potassium	毫克 (mg)	19	393	钙 / Calcium	毫克 (mg)
铜 / Copper	微克 (μg)	10.0	206.6	磷 / Phosphorus	毫克 (mg)
镁 / Magnesium	毫克 (mg)	1.5	31.0	碘 / Iodine	微克 (μg)
铁 / Iron	毫克 (mg)	0.28	5.78	氯 / Chloride	毫克 (mg)
锌 / Zinc	毫克 (mg)	0.17	3.5	硒 / Selenium	微克 (μg)
可 选 择 成 分					
肌醇 / Inositol	毫克 (mg)	2.2	45.5	膳食纤维 / Dietary Fiber	毫克 (mg)
左旋肉碱 / L-Carnitine	毫克 (mg)	0.5	10.3	低聚半乳糖 / Galacto-Oligosaccharides	毫克 (mg)
二十二碳六烯酸 / DHA	毫克 (mg)	3.9	80.6	低聚果糖 / Fructo-Oligosaccharide	毫克 (mg)
二十碳四烯酸 / AA	毫克 (mg)	3.9	80.6	乳铁蛋白 / Lactoferrin	毫克 (mg)

明一

WISSUN

美慧宝®

2段

国食注字YP20230244

较大婴儿配方羊奶粉(6-12月龄, 2段)

净含量: 618克

食用本品时，须配合添加辅助食品。
即食状态下每100mL含13.5g配方乳粉

产品标准号: GB10766-2021
产品类别: 较大婴儿配方奶粉
产品属性: 乳基粉状配方食品
生产日期 (PRO)、保质期 (EXP)、批号 (LOT) 见罐底喷码
产品检验合格证号同批号
曾用名: 小太羊®

美慧宝较大婴儿配方羊奶粉（6-12月龄，2段）…… 配料表

脱盐乳清粉（来源羊乳）、全脂羊奶粉、食用植物调和油（低芥酸菜籽油、葵花籽油、大豆油、玉米油、椰子油）、低聚果糖（FOS）、低聚半乳糖（GOS）、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种HN019、酸视黄酯、胆钙化醇、d1-α-酮酸生育酚、植物甲萘酚、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氯化胆碱、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸钠、D-生物素、氯化胆碱、氯化钾、硫酸铜、硫酸铁、硫酸亚铁、硫酸锰、硫酸钙、磷酸氢钙、磷酸钾、亚硫酸钠、肌醇、左旋肉碱酒石酸盐、二十二碳六烯酸（DHA）、花生四烯酸（AA）、乳铁蛋白、磷脂

美慧宝较大婴儿配方羊奶粉（6-12月龄，2段）…… 注意事项

I. 贮藏方法：置于阴凉、干燥、干燥处保存，请勿放在高温或潮湿处，勿存放于冰箱内。

II. 开罐后请盖紧塑料盖，防止微生物及异味污染或杂物掉入，以免影响品质，建议于两周内食用完。

III. 奶粉冲泡后应马上喂哺，喂哺时请抱着小宝宝，吃剩下的奶水须倒掉，请勿留作下次喂哺。

IV. 6月龄以上的较大婴儿食用本产品时，应配合添加辅助食品。

* 未经煮沸的水或未消毒的奶具或不恰当的浓度，可能会引起宝宝不适。调奶时请依照喂哺表和奶具消毒及调奶方法指示正确操作。


* 调奶时请用明一专用奶粉量匙。如用少于或多于指定份量的奶粉，可能会使宝宝得不到适量的营养。

咨询热线：400-6611-111
更多资讯，敬请登录：www.wissun.com.cn

6 972510 180395

如有任何建议或疑问，请致函
E-mail: mingyi@wissun.com
友情提示：罐盖内声明一奶粉专用量匙

美慧宝较大婴儿配方羊奶粉（6-12月龄，2段）喂哺用量建议表——根据平均喂哺量			
宝 宝 年 龄	温开水(毫升)	奶粉匙数(平匙)	每天喂哺次数
6 ~ 12 月 龄	210	7	5
* 喂哺时可根据宝宝的发育和健康状况，在营养师的指导下适当增减食用量及次数。			



10.6cm

10.2cm

标签编号：20250519-M3-618

美慧宝幼儿配方羊奶粉（12-36月龄，3段）

奶具消毒及调奶方法

I. 请先洗净双手，再用瓶刷将奶瓶等器具清洗干净，然后将奶具放在沸水中煮五分钟，彻底消毒。

II. 先将煮沸的热水冷却至50℃以下，然后参照《喂哺用量建议表》将适量的水倒入已消毒过的奶瓶中。

III. 参照《喂哺用量建议表》，用明一专用奶粉量匙（约4.5g/平匙）添加所需的奶粉量。

IV. 用匙搅拌均匀或盖好奶瓶瓶口，直至奶粉完全溶解，再将奶液滴在手背上试温，温度适宜即可喂哺。

1

2

3

4

营养成分表 NUTRITION INFORMATION					
项目 / Items	单位 / Units	每100千焦	每100克	项目 / Items	单位 / Units
能量 / Energy	千焦 (kJ)	100	2032	亚油酸 / Linoleic acid	克 (g)
蛋白质 / Protein	克 (g)	0.67	13.61	α-亚麻酸 / α-Linolenic acid	毫克 (mg)
脂肪 / Fat	克 (g)	1.17	23.77	碳水化合物 / Carbohydrate	克 (g)
维 生 素					
维生素A / Vitamin A	微克视黄醇当量 (μg RE)	20	406	维生素B ₆ / Vitamin B ₆	微克 (μg)
维生素D / Vitamin D	微克 (μg)	0.58	11.79	维生素B ₁₂ / Vitamin B ₁₂	微克 (μg)
维生素E / Vitamin E	毫克α-生育酚当量 (mg α-TE)	0.25	5.08	烟酸 (烟酰胺) / Nicotin	微克 (μg)
维生素K ₁ / Vitamin K ₁	微克 (μg)	2.60	52.83	叶酸 / Folic acid	微克 (μg)
维生素B ₁ / Vitamin B ₁	微克 (μg)	24	488	泛酸 / Pantothenic acid	微克 (μg)
维生素B ₂ / Vitamin B ₂	微克 (μg)	20	406	维生素C / Vitamin C	毫克 (mg)
矿 物 质					
钠 / Sodium	毫克 (mg)	4	81	锌 / Zinc	毫克 (mg)
钾 / Potassium	毫克 (mg)	18	366	钙 / Calcium	毫克 (mg)
铜 / Copper	微克 (μg)	12.0	243.8	磷 / Phosphorus	毫克 (mg)
镁 / Magnesium	毫克 (mg)	1.6	32.5	碘 / Iodine	微克 (μg)
铁 / Iron	毫克 (mg)	0.33	6.71	氯 / Chloride	毫克 (mg)
可 选 择 成 分					
硒 / Selenium	微克 (μg)	0.72	14.63	膳食纤维 / Dietary Fiber	毫克 (mg)
胆碱 / Choline	毫克 (mg)	4.9	99.6	低聚半乳糖 / Galacto-Oligosaccharides	毫克 (mg)
锰 / Manganese	微克 (μg)	3.22	65.43	低聚果糖 / Fructo-Oligosaccharide	毫克 (mg)
肌醇 / Inositol	毫克 (mg)	2.2	44.7	乳铁蛋白 / Lactoferrin	毫克 (mg)
左旋肉碱 / L-Carnitine	毫克 (mg)	0.5	10.2		
二十二碳六烯酸 / DHA	毫克 (mg)	1.5	30.5		
二十碳四烯酸 / AA	毫克 (mg)	1.5	30.5		

明一

WISSUN

美慧宝®

3

段

国食注字YP20230245

净含量: 618克

幼儿配方羊奶粉(12-36月龄, 3段)

食用本品时，须配合添加辅助食品。

即食状态下每100mL含13.5g配方乳粉

产品标准号: GB10767-2021

产品类别: 幼儿配方奶粉

产品属性: 乳基粉状配方食品

生产日期 (PRO)、保质期 (EXP)、批号 (LOT) 见罐底喷码

产品检验合格证号同批号

曾用名: 小太羊®

美慧宝幼儿配方羊奶粉（12-36月龄，3段） 配料表

脱盐乳清粉（来源羊乳）、全脂羊奶粉、食用植物调和油（低芥酸菜籽油、葵花籽油、大豆油、玉米油、椰子油）、浓缩乳清蛋白粉（来源羊乳）、低聚果糖（FOS）、低聚半乳糖（GOS）、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种N019、醋酸视黄醇、脂肪化醇、di-α-磷酸生育酚、植物甲氧基、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸钠、D-生物素、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、碳酸钙、磷酸氢钙、碘酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、硫酸锰、肌醇、左旋肉碱酒石酸盐、二十二碳六烯酸（DHA）、花生四烯酸（AA）、乳铁蛋白、磷脂

美慧宝幼儿配方羊奶粉（12-36月龄，3段） 注意事项

I. 贮藏方法：置于阴凉、干净、干燥处保存，请勿放在高温或潮湿处，勿存放于冰箱内。

II. 开罐后请盖紧塑料盖，防止微生物及异味污染或杂物掉入，以免影响品质，建议于两周内食用完。

III. 奶粉冲调后应立即上眼，吃剩下的奶水须倒掉，请勿留作下次喂哺。

IV. 宝宝12月龄后食用本品时，须配合添加辅助食品。这时需要将奶嘴孔适度放大，使宝宝能轻松吸食。

※ 未经煮沸的水或未消毒的奶具或不恰当的浓度，可能会引起宝宝不适。调奶时请依照喂哺表和奶具消毒及调奶方法指示正确操作。

※ 调奶时请用明一专用奶粉量匙。如用少于或多于指定份量的奶粉，可能会使宝宝得不到适量的营养。

美慧宝幼儿配方羊奶粉（12-36月龄，3段）喂哺用量建议表——根据平均喂哺量

宝 宝 年 龄	温开水(毫升)	奶粉匙数(平匙)	每天喂哺次数
12 ~ 36 月 龄	210	7	4


※ 喂哺时可根据宝宝的发育和健康状况，在营养师的指导下适当增减食用量及次数。

咨询热线: 400-6611-111

更多资讯, 敬请登录: www.wissun.com.cn

6 972510 180401

如您有什么建议或疑问，请致函 E-mail: mingyi@wissun.com 友情提示 罐盖内申明一奶粉专用量匙



标签编号：20241230-K1-800

卡尼迪婴儿配方羊奶粉（0-6月龄，1段）

奶具消毒及调奶方法

I. 请先洗净双手，再用瓶刷将奶瓶等器具清洗干净，然后将奶具放在沸水中煮五分钟，彻底消毒。

II. 先将煮沸的热水冷却至50℃左右，然后参照《喂哺用量建议表》将适量的水倒入已消毒过的奶瓶中。

III. 参照《喂哺用量建议表》，用明一专用奶粉量匙（以4.5g/平匙计）添加所需的奶粉量。

IV. 用匙搅拌均匀或盖好奶瓶摇匀，直至奶粉完全溶解，再将奶液滴在手背上试温，温度适宜即可喂食。

1

2

3

4

营养成分表 NUTRITION INFORMATION							
项目 / Items	单位 / Units	每100千焦	每100克	项目 / Items	单位 / Units	每100千焦	每100克
能量 / Energy	千焦 (kJ)	100	2072	亚油酸 / Linoleic acid	克 (g)	0.08	1.66
蛋白质 / Protein	克 (g)	0.51	10.53	(E-亚麻酸) / (E-Linolenic acid	毫克 (mg)	14	290
脂肪 / Fat	克 (g)	1.20	24.94	碳水化合物 / Carbohydrate	克 (g)	2.7	55.7
维 生 素							
维生素A / Vitamin A	视黄醇当量 (μg RE)	18	373	维生素B ₂ / Vitamin B ₂	微克 (μg)	0.050	1.036
维生素D / Vitamin D	微克 (μg)	0.50	10.36	烟酸 (烟酰胺) / Niacin	微克 (μg)	135	2797
维生素E / Vitamin E	毫克 (L-生育酚当量 (mg (L-TE)	0.24	4.97	叶酸 / Folic acid	微克 (μg)	3.2	66.3
维生素K ₁ / Vitamin K ₁	微克 (μg)	1.96	40.61	泛酸 / Pantothenic acid	微克 (μg)	127	2631
维生素B ₁ / Vitamin B ₁	微克 (μg)	18	373	维生素C / Vitamin C	毫克 (mg)	3.1	64.2
维生素B ₆ / Vitamin B ₆	微克 (μg)	28	580	生物素 / Biotin	微克 (μg)	0.45	9.32
维生素B ₁₂ / Vitamin B ₁₂	微克 (μg)	12.7	263.1	胆碱 / Choline	毫克 (mg)	5.1	105.7
矿 物 质							
钠 / Sodium	毫克 (mg)	8	166	锰 / Manganese	微克 (μg)	4.71	97.59
钾 / Potassium	毫克 (mg)	19	394	钙 / Calcium	毫克 (mg)	15	311
铜 / Copper	微克 (μg)	14.8	306.7	磷 / Phosphorus	毫克 (mg)	8	166
镁 / Magnesium	毫克 (mg)	1.3	26.9	碘 / Iodine	微克 (μg)	3.9	80.8
铁 / Iron	毫克 (mg)	0.17	3.52	氯 / Chloride	毫克 (mg)	18	373
锌 / Zinc	毫克 (mg)	0.17	3.52	硒 / Selenium	微克 (μg)	0.74	15.33
可 选 择 成 分							
肌醇 / Inositol	毫克 (mg)	1.8	37.3	膳食纤维 / Dietary Fiber	毫克 (mg)	51.4	1065
左旋肉碱 / L-Carnitine	毫克 (mg)	0.5	10.4	低聚半乳糖 / Galacto-Oligosaccharides	毫克 (mg)	91.7	1900
二十二碳六烯酸 / DHA	毫克 (mg)	4.9	101.5	低聚果糖 / Fructo-Oligosaccharide	克 (g)	0.32	6.63
二十碳四烯酸 / AA	毫克 (mg)	6.4	132.6	1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯 / 1,3-bis(sn)-2-palmitoyl glyceride	微克 (μg)	3.0	62.2



卡尼迪



1段

国食注字YP20230302

婴儿配方羊奶粉(0-6月龄, 1段)

净含量: 800克

对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

即食状态下每100mL含13.5g配方乳粉

产品标准号: GB 10765-2021
产品类别: 婴儿配方奶粉
产品属性: 乳基粉状配方食品
保质期: 二年
生产日期 / 批号: 见罐底喷码
产品检验合格证号同批号
曾用名: 卡普尼



扫一扫了解更多资讯

生产商: 明一乳业(齐齐哈尔)有限公司
地址: 黑龙江省齐齐哈尔市碾子山区工业园区
产地: 黑龙江省齐齐哈尔市
生产许可证号: SC10523020750457

咨询热线: 400-6611-111
更多资讯, 敬请登录: www.wissun.com.cn



如您有什么建议或疑问, 请致函
E-mail: mingyi@wissun.com
友情提示 罐盖内置明一奶粉专用量匙

卡尼迪婴儿配方羊奶粉（0-6月龄，1段）

配料表
脱盐乳清粉（来源羊乳）、食用植物调和油（1, 3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油）、全脂羊奶粉、低聚果糖（FOS）、低聚半乳糖（GOS）、酪酸视黄醇、胆钙化醇、d-α-磷酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、富钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸钠、D-生物素、氯化胆碱、氯化钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸氢钙、碘酸钾、亚硒酸钠、肌醇、左旋肉碱酒石酸盐、二十二碳六烯酸（DHA）、花生四烯酸（AA）、叶黄素、磷脂

卡尼迪婴儿配方羊奶粉（0-6月龄，1段）

注意事项
I. 贮藏方法: 置于阴凉、干净、干燥处保存，请勿放在高温或潮湿处，勿存放于冰箱内。
II. 开罐后请盖紧塑料盖，防止微生物及异味污染或杂物掉入，以免影响品质，建议于两周内食用完。
III. 奶粉冲调后应立即上喂哺，喂奶时请抱着宝宝，吃剩下的奶水须倒掉，请勿留作下次喂哺。
IV. 婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时请选择本产品。

* 未经煮沸的水或未消毒的奶具或不恰当的浓度，可能会引致宝宝不适。调奶时请依照喂哺表和奶具消毒及调奶方法指示正确操作。
* 调奶时请用明一专用奶粉量匙。如用少于或多于指定份量的奶粉，可能会使宝宝得不到适量的营养。

卡尼迪婴儿配方羊奶粉（0-6月龄，1段）喂哺用量建议表 根据平均喂哺量

宝 宝 年 龄	温开水 (毫升)	奶粉匙数 (平匙)	每天喂哺次数
0~2 周	60	2	8
2~4 周	120	4	7
4~8 周	150	5	6
8~12 周	180	6	5
3~6 月龄	210	7	5

扫码关注公众号
了解更多信息



明一奶粉官方微信

10.2cm

10.6cm

标签编号：20241230-K2-800

卡尼迪较大婴儿配方羊奶粉（6-12月龄，2段）

奶具消毒及调奶方法

I. 请先洗净双手，再用瓶刷将奶瓶等器具清洗干净，然后将奶具放在沸水中煮五分钟，彻底消毒。

II. 先将煮沸的热水冷却至50℃左右，然后参照《喂哺用量建议表》将适量的水倒入已消毒过的奶瓶中。

III. 参照《喂哺用量建议表》，用明一专用奶粉量匙（以4.5g/平匙计）添加所需的奶粉量。

IV. 用匙搅拌均匀或盖好奶瓶摇匀，直至奶粉完全溶解，再将奶液滴在手背上试温，温度适宜即可喂食。

1

2

3

4

营养成分表 NUTRITION INFORMATION

项目 / Items	单位 / Units	每100千焦	每100克	项目 / Items	单位 / Units	每100千焦	每100克
能量 / Energy	千焦 (kJ)	100	2052	亚油酸 / Linoleic acid	克 (g)	0.08	1.64
蛋白质 / Protein	克 (g)	0.57	11.65	(E-亚麻酸 / E-Linolenic acid	毫克 (mg)	13	267
脂肪 / Fat	克 (g)	1.18	24.30	碳水化合物 / Carbohydrate	克 (g)	2.7	54.8
维 生 素							
维生素A / Vitamin A	视黄醇当量 (μg RE)	20	410	维生素B ₂ / Vitamin B ₂	微克 (μg)	0.050	1.026
维生素D / Vitamin D	微克 (μg)	0.51	10.47	烟酸 (烟酰胺) / Nicotin	微克 (μg)	136	2791
维生素E / Vitamin E	毫克 (L-生育酚当量 (mg (L-TE)	0.19	3.90	叶酸 / Folic acid	微克 (μg)	3.2	65.7
维生素K ₁ / Vitamin K ₁	微克 (μg)	1.97	40.42	泛酸 / Pantothenic acid	微克 (μg)	129	2647
维生素B ₁ / Vitamin B ₁	微克 (μg)	20	410	维生素C / Vitamin C	毫克 (mg)	3.1	63.6
维生素B ₆ / Vitamin B ₆	微克 (μg)	32	657	生物素 / Biotin	微克 (μg)	0.47	9.64
维生素B ₁₂ / Vitamin B ₁₂	微克 (μg)	12.8	262.7	胆碱 / Choline	毫克 (mg)	5.0	102.6
矿 物 质							
钠 / Sodium	毫克 (mg)	6	123	锰 / Manganese	微克 (μg)	4.79	98.29
钾 / Potassium	毫克 (mg)	22	451	钙 / Calcium	毫克 (mg)	21	431
铜 / Copper	微克 (μg)	13.2	270.9	磷 / Phosphorus	毫克 (mg)	11	226
镁 / Magnesium	毫克 (mg)	1.5	30.8	碘 / Iodine	微克 (μg)	4.2	86.2
铁 / Iron	毫克 (mg)	0.25	5.13	氯 / Chloride	毫克 (mg)	17	349
锌 / Zinc	毫克 (mg)	0.17	3.49	硒 / Selenium	微克 (μg)	0.76	15.60
可 选 择 成 分							
肌醇 / Inositol	毫克 (mg)	1.8	36.9	膳食纤维 / Dietary Fiber	毫克 (mg)		
左旋肉碱 / L-Carnitine	毫克 (mg)	0.5	10.3	低聚半乳糖 / Galacto-Oligosaccharides	毫克 (mg)	52.1	1070
二十二碳六烯酸 / DHA	毫克 (mg)	4.9	100.5	低聚果糖 / Fructo-Oligosaccharide	毫克 (mg)	91.6	1880
二十碳四烯酸 / AA	毫克 (mg)	6.6	135.4	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯 / 1,3-di-oleoyl-2-palmitoyl triglyceride	克 (g)	0.29	5.95
				叶黄素 / Lutein	微克 (μg)	8.0	164.2

明一 WISSUN

卡尼迪®

2段

国食注字YP20230303

较大婴儿配方羊奶粉(6-12月龄, 2段)

净含量: 800克

食用本品时，须配合添加辅助食品。

即食状态下每100mL含13.5g配方乳粉

产品标准号: GB 10766-2021

产品类别: 较大婴儿配方奶粉

产品属性: 乳基粉状配方食品

保质期: 二年

生产日期 / 批号: 见罐底喷码

产品检验合格证号同批号

曾用名: 卡普尼®

卡尼迪较大婴儿配方羊奶粉（6-12月龄，2段）…… 配料表

脱盐乳清粉（来源羊乳）、全脂羊奶粉、食用植物油和油（1, 3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油）、低聚果糖（FOS）、低聚半乳糖（GOS）、醋酸视黄醇、胆钙化醇、dl-α-脂酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、富钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸钠、D-生物素、氯化胆碱、氯化钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸氢钙、碘酸钾、亚硒酸钠、肌醇、左旋肉碱酒石酸盐、二十二碳六烯酸（DHA）、花生四烯酸（AA）、叶黄素、磷脂

卡尼迪较大婴儿配方羊奶粉（6-12月龄，2段）…… 注意事项

I. 贮藏方法：置于阴凉、干净、干燥处保存。请勿放在高温或潮湿处，勿存放于冰箱内。

II. 开罐后请盖紧塑料盖，防止微生物及异味污染或杂物掉入，以免影响品质，建议于两周内食用完。

III. 奶粉冲调后应马上喂哺，喂奶时请抱着宝宝，吃剩下的奶须倒掉，请勿留作下次喂哺。

IV. 6月龄以上的较大婴儿食用本产品时，应配合添加辅助食品。

生产厂商: 明一乳业（齐齐哈尔）有限公司

地址: 黑龙江省齐齐哈尔市碾子山区工业园区

产地: 黑龙江省齐齐哈尔市

生产许可证号: SC10523020750457

咨询热线: 400-6611-111

更多资讯, 敬请登录: www.wissun.com.cn

6 972510 180012

如您有什么建议或疑问，请致函 E-mail: mingyi@wissun.com 友情提示 罐盖内置明一奶粉专用量匙

卡尼迪较大婴儿配方羊奶粉（6-12月龄，2段）喂哺用量建议表——根据平均喂哺量

宝 宝 年 龄	温开水(毫升)	奶粉匙数(平匙)	每天喂哺次数
6~12月龄	210	7	5

* 喂哺时可根据宝宝的发育和健康状况，在营养师的指导下适当增减食用量及次数。

扫码关注公众号
了解更多信息



明一奶粉官方微信

10.2cm

10.6cm

标签编号: 20241230-K3-800

卡尼迪幼儿配方羊奶粉(12-36月龄, 3段) 奶具消毒及调奶方法

- I. 请先洗净双手，再用刷子将奶瓶等器具清洗干净，然后将奶具放在沸水中煮五分钟，彻底消毒。
 - II. 先将煮好的沸水冷却至40℃左右，然后参照《喂哺用建议表》将适量的水倒入已消毒过的奶瓶中。
 - III. 参照《喂哺用建议表》，用同一专用奶粉量匙（以4.5g/平匙计）添加所需的奶粉量。
 - IV. 用匙搅拌均匀或盖好奶瓶盖，直至奶粉完全溶解，再将奶瓶滴在手背上试温，温度适宜即可喂食。



营养成分表 NUTRITION INFORMATION

項目 / Items	單位 / Units	每100千焦	每100克	項目 / Items	單位 / Units	每100千焦	每100克
能量 / Energy	千焦 (kJ)	100	2069	亞油酸 / Linoleic acid	克 (g)	0.08	1.66
蛋白質 / Protein	克 (g)	0.67	13.90	(L-亞麻酸 / L-Linolenic acid	毫克 (mg)	13	269
脂肪 / Fat	克 (g)	1.23	25.51	碳水化合物 / Carbohydrate	克 (g)	2.4	50.4

维生素

维生素A / Vitamin A	视黄醇当量值 (μg RE)	19	393	维生素B ₁ / Vitamin B ₁	微克 (μg)	13.6	281.4
维生素B ₂ / Vitamin B ₂	微克 (μg)	0.51	10.55	维生素B ₆ / Vitamin B ₆	微克 (μg)	0.050	1.035
维生素E / Vitamin E	毫克(α-生育酚当量)(mg (α-T-E))	0.19	3.93	烟酸 (烟酰胺) / Niacin	微克 (μg)	127	2628
				叶酸 / Folic acid	微克 (μg)	2.5	51.7
维生素K / Vitamin K	微克 (μg)	1.93	39.93	泛酸 / Pantothenic acid	微克 (μg)	127	2628
维生素B ₁₂ / Vitamin B ₁₂	微克 (μg)	20	414	维生素C / Vitamin C	毫克 (mg)	3.0	62.1
维生素B ₇ / Vitamin B ₇	微克 (μg)	24	497	生物素 / Biotin	微克 (μg)	0.45	9.21

矿物质

钠 / Sodium	毫克 (mg)	4	83	锌 / Zinc	毫克 (mg)	0.16	3.31
钾 / Potassium	毫克 (mg)	21	434	钙 / Calcium	毫克 (mg)	20	414
铜 / Copper	微克 (µg)	14.7	304.1	磷 / Phosphorus	毫克 (mg)	11	228
镁 / Magnesium	毫克 (mg)	1.6	33.1	碘 / Iodine	微克 (µg)	4.2	86.9
铁 / Iron	毫克 (mg)	0.30	6.21	氯 / Chloride	毫克 (mg)	13	269

可选择成分

酶 / Selenium	微克 (µg)	0.69	14.28	膳食纤维 / Dietary Fiber			
胆碱 / Choline	毫克 (mg)	4.8	99.3	低聚半乳糖	毫克 (mg)	49.3	1020
锰 / Manganese	µg	3.29	68.07	Galacto-Oligosaccharides			
肌醇 / Inositol	毫克 (mg)	1.8	37.2	低聚果糖	毫克 (mg)	142.6	2950
左旋肉碱 / L-Carnitine	毫克 (mg)	0.5	10.3	Fructo-Oligosaccharide			
二十二碳六烯酸 / DHA	毫克 (mg)	1	35.2	1,3-二油酰-2-棕榈酰甘油三酯	克 (g)	0.29	6.00
二十碳四烯酸 / AA	毫克 (mg)	1.9	39.3	1,3-二油酰-2-棕榈酰甘油三酯			



卡尼迪®



净含量:
800克

段

国食注字YP20230304

幼儿配方羊奶粉(12-36月龄, 3段)

食用本品时，须配合添加辅助食品。

即食状态下每100mL含13.5g配方乳粉

产品标准号: GB 10767-2021

产品类别: 幼儿配方奶粉

产品属性: 乳基粉状配方食品

保质期: 二年

生产日期 / 批号: 见罐底喷码

产品检验合格证号同批号

曾用名：卡普尼®



扫一扫了解更多资讯

生产商: 明一乳业(齐齐哈尔)有限公司

地址: 黑龙江省齐齐哈尔市碾子山区工业园区

产地: 黑龙江省齐齐哈尔市

生产许可证号: SC10523020750457

咨询热线: 400-6611-111

更多资讯, 敬请登录: www.wissun.com.cn



6 972510 180029

如您有什么建议或疑问, 请致函
E-mail: mingyi@wissun.com
友情提示 罐盖内置明一奶粉专用量匙

卡尼迪幼儿配方羊奶粉(12-36月龄, 3段) 配料表

脱乳素粉(来瑞洋乳)、全脂羊奶粉、食用植物油和油(1,3-二甘油-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、浓缩乳清蛋白(来瑞洋乳)

低聚果糖(FOS)、低聚半乳糖(GOS)、酸酐视黄醇、胆钙化醇、d-α-酮酸生育醇、植物甲萘酮、盐酸吡啶胺、核黄素、盐酸吡哆醇、肌肽、烟酰胺叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸钠、D-生物素、氯化钾、碳酸钾、硫酸铁硫酸亚铁、硫酸锌、碳酸钙、磷酸氢钙、碘酸钾、亚硒酸钠、氯化亚锡、硫酸亚锡、肌醇、左旋肉碱酒石酸盐、二十二碳六烯酸(DHA)、花生四烯酸(AA)、叶黄素、磷脂

卡尼迪幼儿配方羊奶粉(12-36月龄, 3段) 注意事项

1. 贮藏方法：置于阴凉、干净、干燥处保存，请勿放在高温或潮湿处，勿存放于冰箱内。
2. 开罐后请盖紧塑料盖，防止微生物及异味污染或杂物掉入，以免影响品质，建议于两周内食用完。
3. 奶粉冲调后应马上喂哺，吃剩下的奶水须倒掉，请勿留下作下次喂哺。
4. 宝宝12月龄后食用本品时，须配合添加辅助食品。这时需要将奶调至适度放大，使宝宝能轻松吸食。

- * 未经煮沸的水或未消毒的奶具或不恰当浓度，可能会引起宝宝不适。调奶时请依照喂哺表和奶具消毒及调奶方法指示正确操作。
- * 调奶时请用明一专用奶粉量匙。如用少于或多于指定份量的奶粉，可能会使宝宝得不到适量的营养。

卡尼油® 幼儿配方羊奶粉 (12-36 月龄, 3 段) 哺喂用量建议表... 根据平均哺喂量

宝 宝 年 龄	温开水(毫升)	奶粉匙数(平匙)	每天喂哺次数
12~36月龄	210	7	4

* 喂哺时可根据宝宝的发育和健康状况，在营养师的指导下适当增减食
用量及次数。

扫码关注公众号
了解更多信息



明一奶粉官方微信

10.2cm

10.6cm

标签编号：20241126-K1-100

卡尼迪婴儿配方羊奶粉（0-6月龄，1段）

奶具消毒及调奶方法

I. 请先洗净双手，再用瓶刷将奶瓶等器具清洗干净，然后将奶具放在沸水中煮五分钟，彻底消毒。

II. 先将煮沸的热水冷却至50℃左右，然后参照《喂哺用量建议表》将适量的水倒入已消毒过的奶瓶中。

III. 参照《喂哺用量建议表》，用明一专用奶粉量匙（以4.5g/平匙计）添加所需的奶粉量。

IV. 用匙搅拌均匀或盖好奶瓶摇匀，直至奶粉完全溶解，再将奶液滴在手背上试温，温度适宜即可喂哺。

1

2

3

4

营养成分表 NUTRITION INFORMATION

项目	单位	每100千焦	每100克	项目	单位	每100千焦	每100克
能量	千焦	100	2072	亚油酸	克	0.08	1.66
蛋白质	克	0.51	10.53	α-亚麻酸	毫克	14	290
脂肪	克	1.20	24.94	碳水化合物	克	2.7	55.7
维生素							
维生素A	微克视黄醇当量	18	373	维生素B ₁₂	微克	0.050	1.036
维生素D	微克	0.50	10.36	烟酸（烟酰胺）	毫克	135	2797
维生素E	毫克α-生育酚当量	0.24	4.97	叶酸	微克	3.2	66.3
维生素K ₁	微克	1.96	40.61	泛酸	毫克	127	2631
维生素B ₁	微克	18	373	维生素C	毫克	3.1	64.2
维生素B ₂	微克	28	580	生物素	微克	0.45	9.32
维生素B ₆	微克	12.7	263.1	胆碱	毫克	5.1	105.7
矿物质							
钠	毫克	8	166	锰	微克	4.71	97.59
钾	毫克	19	394	钙	毫克	15	311
铜	微克	14.8	306.7	磷	毫克	8	166
镁	毫克	1.3	26.9	碘	微克	3.9	80.8
铁	毫克	0.17	3.52	氯	毫克	18	373
锌	毫克	0.17	3.52	硒	微克	0.74	15.33
可选择成分							
肌醇	毫克	1.8	37.3	膳食纤维	毫克	51.4	1065
左旋肉碱	毫克	0.5	10.4	低聚半乳糖	毫克	91.7	1900
二十二碳六烯酸/DHA	毫克	4.9	101.5	低聚果糖	毫克	0.32	6.63
二十碳四烯酸/AA	毫克	6.4	132.6	1,3-二油酸	克		
				2-棕榈酸甘油三酯	克		
				叶黄素	微克	3.0	62.2



卡尼迪®

1 段

国食注字YP20230302

婴儿配方羊奶粉(0-6月龄,1段)

净含量:
100克

对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳。在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

即食状态下每100mL含13.5g配方乳粉

产品标准号:GB10765-2021

产品类别:婴儿配方奶粉

产品属性:乳基粉状配方食品

保质期:二年

生产日期/批号:见罐底喷码

产品检验合格证号同批号

生产商:明一乳业(齐齐哈尔)有限公司

地址:黑龙江省齐齐哈尔市碾子山区工业园区

产地:黑龙江省齐齐哈尔市

生产许可证号:SC10523020750457

咨询热线:400-6611-111

更多资讯,敬请登录:www.wissun.com.cn



卡尼迪婴儿配方羊奶粉（0-6月龄，1段）……配料表

脱盐乳清粉（来源羊乳）、食用植物调和油（1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油）、全脂羊奶粉、低聚果糖（FOS）、低聚半乳糖（GOS）、醋酸视黄酯、胆钙化醇、d-α-醋酸生育酚、植物甲萘酚、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、葡萄糖、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸钠、D-生物素、氯化胆碱、氯化钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸氢钙、碘酸钾、亚硒酸钠、肌醇、左旋肉碱酒石酸盐、二十二碳六烯酸（DHA）、花生四烯酸（AA）、叶黄素、磷脂

卡尼迪婴儿配方羊奶粉（0-6月龄，1段）……注意事项

- 贮藏方法：置于阴凉、干燥处保存，请勿放在高温或潮湿处，勿存放于冰箱内。
- 开罐后请将盖口封严，防止微生物及异味污染或杂物掉入，以免影响品质，建议于两周内食用完。
- 奶粉冲调后应立即上眼哺，喂奶时请抱着小宝宝，吃剩下的奶水须倒掉，请勿留作下次眼哺。
- 不正确的冲调方式或不恰当的奶液浓度，可能会使宝宝得不到适量的营养，导致宝宝不适。

卡尼迪婴儿配方羊奶粉（0-6月龄，1段）喂哺用量建议表……根据平均喂哺量

宝宝年龄	温开水(毫升)	奶粉匙数(平匙)	每天喂哺次数
0~2周	60	2	8
2~4周	120	4	7
4~8周	150	5	6
8~12周	180	6	5
3~6月龄	210	7	5