

配料表 Ingredients

脱盐乳清粉、全脂乳粉、食用植物调和油（1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油）、葵花籽油、乳糖、脱脂乳粉、乳清蛋白粉、核桃油、磷脂、无水奶油

乳铁蛋白、花生四烯酸（ARA）、二十二碳六烯酸（DHA）、牛磺酸、核苷酸（5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠）、肌醇、左旋肉碱、叶黄素、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种HN019

维生素：维生素A（醋酸视黄酯）、维生素D（胆钙化醇）、维生素E（dl-α-醋酸生育酚）、维生素K₁（植物甲萘醌）、维生素B₁（盐酸硫胺素）、维生素B₂（核黄素）、维生素B₆（盐酸吡哆醇）、维生素B₁₂（氰钴胺）、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、维生素C（L-抗坏血酸）、氯化胆碱

矿物质：硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸镁、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠、柠檬酸钠、氯化钾、磷酸三钙、碳酸钙

贮藏方法 Storage method

未开封的奶粉可于常温贮存，并于保质期内食用。开罐后请务必盖严罐盖并置于阴凉干燥处。请勿置于冰箱内。开封后请于一个月内食用完。

全国消费者咨询服务热线：
400 998 8509

官方网址：

<http://www.anutric.com>

E-mail: service@anutric.com



扫一扫
关注官方微信
了解更多知识及活动

制造商：黑龙江鞍达实业集团股份有限公司

生产地址：黑龙江省绥化市安达市铁西区 产地：黑龙江省绥化市

营养成分表 Nutrition Facts

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2106
蛋白质	g	0.54	11.45
脂肪	g	1.19	24.97
亚油酸	g	0.12	2.54
α-亚麻酸	mg	15	316
碳水化合物	g	2.8	58.1
维生素			
维生素A	μg RE	18	369
维生素D	μg	0.60	12.64
维生素E	mg α-TE	0.40	8.50
维生素K ₁	μg	1.69	35.50
维生素B ₁	μg	29	607
维生素B ₂	μg	37	785
维生素B ₆	μg	14.7	309.6
维生素B ₁₂	μg	0.076	1.610
烟酸(烟酰胺)	μg	123	2585
叶酸	μg	3.6	76.4
泛酸	μg	120	2528
维生素C	mg	3.0	63.9
生物素	μg	0.54	11.36
胆碱	mg	6.0	126.4
矿物质			
钠	mg	9	185
钾	mg	21	448
铜	μg	17.9	376.6
镁	mg	1.5	31.6
铁	mg	0.16	3.40
锌	mg	0.15	3.16
锰	μg	3.27	68.94
钙	mg	15	316
磷	mg	9	198
碘	μg	4.8	100.7
氯	mg	15	316
硒	μg	0.90	18.96
可选择成分			
肌醇	mg	2.5	51.7
牛磺酸	mg	1.3	27.5
左旋肉碱	mg	0.8	16.9
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	95.0
二十碳四烯酸(ARA)	mg	4.7	100.0
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.2	4.2
叶黄素	μg	4	85
核苷酸	mg	1.3	27.4
乳铁蛋白	mg	4.8	101.6

即食状态下，每100mL含婴儿配方奶粉：13.2克

鞍达安纽希

婴儿配方奶粉

(0-6月龄, 1段)



净含量: 800g

国食注字YP20240085

重要提示 Reminder

对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，
在母乳不足或无母乳时可食用本产品。



冲调方法 Directions

1	冲调前请洗净双手，并将所有用具放在沸水中煮沸至少五分钟，干燥至无水分备用。
2	将煮沸的水冷却至50°C左右(温开水)。
3	参照喂哺表将正确水量倒入消毒过的奶瓶。
4	使用消毒干燥后的量匙参照喂哺表量取正确份量的奶粉加入奶瓶中。先加水后加奶粉。
5	拧紧奶瓶盖后，晃动直至奶粉溶解。在喂哺前请先将奶水滴在手腕上，以确定温度是否适合宝宝饮用后再进行喂哺。

喂哺表 Feeding Chart

下列喂哺表是根据平均的需要量而定。如果发现婴幼儿食用配方奶粉后，有任何过敏反应，应立即停止食用该奶粉，去医院检查，听从医生的建议。一平量匙奶粉净含量约为4.5克。

宝宝月龄	每次喂量		日喂次数
	量匙数	温开水量	
第1周	2	60毫升(mL)	7-8
第2-4周	3	90毫升(mL)	6-7
第5-6周	4	120毫升(mL)	5-6
第7-12周	5	150毫升(mL)	5-6
第4个月	6	180毫升(mL)	5-6
第5-6个月	7	210毫升(mL)	5-6

注：喂剩或加热后超过2小时的奶液易受污染，请丢弃勿再用。

全脂乳粉原产国：新西兰 New Zealand
产品类别及属性：婴儿配方食品(乳基粉状)
食品生产许可证编号：SC10523128150256
产品执行标准：GB 10765-2021
保质期：2年
生产日期、产品批号：见罐底
合格证号：同批号



配料表 Ingredients

脱盐乳清粉、全脂乳粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、葵花籽油、乳糖、脱脂乳粉、乳清蛋白、核桃油、磷脂、无水奶油

乳铁蛋白、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、牛磺酸、核苷酸(5'-胞苷二钠、5'-尿苷二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷二钠、5'-鸟苷二钠)、肌醇、左旋肉碱、叶黄素、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种HN019

维生素:维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K₁(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸)、氯化胆碱

矿物质:硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸镁、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠、柠檬酸钠、氯化钾、磷酸三钙、碳酸钙

贮藏方法 Storage method

未开封的奶粉可于常温贮存,并于保质期内食用。开罐后请务必盖严罐盖并置于阴凉干燥处。请勿置于冰箱内。开封后请于一个月内食用完。

全国消费者咨询服务热线:
400 998 8509

官方网址:
<http://www.anutric.com>
E-mail: service@anutric.com



扫一扫
关注官方微信
了解更多知识及活动

制造商:黑龙江鞍达实业集团股份有限公司
生产地址:黑龙江省绥化市安达市铁西区
产地:黑龙江省绥化市

营养成分表 Nutrition Facts

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2106
蛋白质	g	0.54	11.45
脂肪	g	1.19	24.97
亚油酸	g	0.12	2.54
α-亚麻酸	mg	15	316
碳水化合物	g	2.8	58.1
维生素			
维生素A	μg RE	18	369
维生素D	μg	0.60	12.64
维生素E	mg α-TE	0.40	8.50
维生素K ₁	μg	1.69	35.50
维生素B ₁	μg	29	607
维生素B ₂	μg	37	785
维生素B ₆	μg	14.7	309.6
维生素B ₁₂	μg	0.076	1.610
烟酸(烟酰胺)	μg	123	2585
叶酸	μg	3.6	76.4
泛酸	μg	120	2528
维生素C	mg	3.0	63.9
生物素	μg	0.54	11.36
胆碱	mg	6.0	126.4
矿物质			
钠	mg	9	185
钾	mg	21	448
铜	μg	17.9	376.6
镁	mg	1.5	31.6
铁	mg	0.16	3.40
锌	mg	0.15	3.16
锰	μg	3.27	68.94
钙	mg	15	316
磷	mg	9	198
碘	μg	4.8	100.7
氯	mg	15	316
硒	μg	0.90	18.96
可选择成分			
肌醇	mg	2.5	51.7
牛磺酸	mg	1.3	27.5
左旋肉碱	mg	0.8	16.9
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	95.0
二十碳四烯酸(ARA)	mg	4.7	100.0
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.2	4.2
叶黄素	μg	4	85
核苷酸	mg	1.3	27.4
乳铁蛋白	mg	4.8	101.6

即食状态下,每100mL含婴儿配方奶粉:13.2克

鞍达安纽希

婴儿配方奶粉

(0-6月龄,1段)



净含量: 400g

国食注字YP20240085

重要提示 Reminder

对于0-6月龄的婴儿最理想的食品
是母乳,在母乳不足或无母乳时可
食用本产品。



冲调方法 Directions

- 1 冲调前请洗净双手,并将所有用具放在沸水中煮沸至少五分钟,干燥至无水备用。
- 2 将煮沸的水冷却至50°C左右(温开水)。
- 3 参照喂哺表将正确水量倒入消毒过的奶瓶。
- 4 使用消毒干燥后的量匙参照喂哺表量取正确份量的奶粉加入奶瓶中。先加水后加奶粉。
- 5 拧紧奶瓶盖后,晃动直至奶粉溶解。在喂哺前请先将奶水滴在手腕上,以确定温度是否适合宝宝饮用后再进行喂哺。

喂哺表 Feeding Chart

下列喂哺表是根据平均的需要量而定。如果发现婴幼儿食用配方奶粉后,有任何过敏反应,应立即停止食用该奶粉,去医院检查,听从医生的建议。一平量匙奶粉净含量约为4.5克。

宝宝月龄	每次喂量		日喂次数
	量匙数	温开水量	
第1周	2	60毫升(mL)	7-8
第2-4周	3	90毫升(mL)	6-7
第5-6周	4	120毫升(mL)	5-6
第7-12周	5	150毫升(mL)	5-6
第4个月	6	180毫升(mL)	5-6
第5-6个月	7	210毫升(mL)	5-6

注:喂剩或加热后超过2小时的奶液易受污染,请丢弃勿再食用。

全脂乳粉原产国:新西兰 New Zealand
产品类别及属性:婴儿配方食品(乳基粉状)
食品生产许可证编号:SC10523128150256
产品执行标准:GB 10765-2021
保质期:2年
生产日期、产品批号:见罐底
合格证号:同批号



重要提示 Reminder

对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，
在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

营养成分表 Nutrition Facts

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2106	钠	mg	9	185
蛋白质	g	0.54	11.45	钾	mg	21	448
脂肪	g	1.19	24.97	铜	μg	17.9	376.6
亚油酸	g	0.12	2.54	镁	mg	1.5	31.6
α-亚麻酸	mg	15	316	铁	mg	0.16	3.40
碳水化合物	g	2.8	58.1	锌	mg	0.15	3.16
维生素				锰	μg	3.27	68.94
维生素A	μg RE	18	369	钙	mg	15	316
维生素D	μg	0.60	12.64	磷	mg	9	198
维生素E	mg α-TE	0.40	8.50	碘	μg	4.8	100.7
维生素K ₁	μg	1.69	35.50	硒	mg	15	316
维生素B ₁	μg	29	607		μg	0.90	18.96
维生素B ₂	μg	37	785	可选择成分			
维生素B ₆	μg	14.7	309.6	肌醇	mg	2.5	51.7
维生素B ₁₂	μg	0.076	1.610	牛磺酸	mg	1.3	27.5
烟酸(烟酰胺)	μg	123	2585	左旋肉碱	mg	0.8	16.9
叶酸	μg	3.6	76.4	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	95.0
泛酸	μg	120	2528	二十碳四烯酸(ARA)	mg	4.7	100.0
维生素C	mg	3.0	63.9	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.2	4.2
生物素	μg	0.54	11.36	叶黄素	μg	4	85
胆碱	mg	6.0	126.4	核苷酸	mg	1.3	27.4
矿物质				乳铁蛋白	mg	4.8	101.6

即食状态下，每100mL含婴儿配方奶粉：13.2克
全脂乳粉原产国：新西兰 New Zealand
制造商：黑龙江鞍达实业集团股份有限公司
生产地址：黑龙江省绥化市安达市铁西区
产地：黑龙江省绥化市

产品类别及属性：婴儿配方食品(乳基粉状)
食品生产许可证编号：SC10523128150256
产品执行标准：GB 10765-2021
保质期：2年
生产日期、产品批号：见罐底
合格证号：同批号

鞍达安纽希

婴儿配方奶粉

(0-6月龄, 1段)



净含量: 85g

国食注字YP20240085

配料表 Ingredients

脱盐乳清粉、全脂乳粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、葵花籽油、乳糖、脱脂乳粉、乳清蛋白粉、核桃油、磷脂、无水奶油

乳铁蛋白、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、牛磺酸、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、肌醇、左旋肉碱、叶黄素、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种HN019

维生素：维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K₁(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸)、氯化胆碱

矿物质：硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸镁、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠、柠檬酸钠、氯化钾、磷酸三钙、碳酸钙

冲调方法 Directions

- 冲调前请洗净双手，并将所有用具放在沸水中煮沸至少五分钟，干燥至无水备用。
- 将煮沸的水冷却至50°C左右(温开水)。
- 参照喂哺表将正确水量倒入消毒过的奶瓶。
- 使用消毒干燥后的量匙参照喂哺表量取正确份量的奶粉加入奶瓶中。先加水后加奶粉。
- 拧紧奶瓶盖后，晃动直至奶粉溶解。在喂哺前请先将奶水滴在手腕上，以确定温度是否适合宝宝饮用后再进行喂哺。

喂哺表 Feeding Chart

下列喂哺表是根据平均的需要量而定。如果发现婴幼儿食用配方奶粉后，有任何过敏反应，应立即停止食用该奶粉，去医院检查，听从医生的建议。一量匙奶粉净含量约为4.5克。

宝宝月龄	每次喂量		日喂次数
	量匙数	温开水量	
第1周	2	60毫升(mL)	7-8
第2-4周	3	90毫升(mL)	6-7
第5-6周	4	120毫升(mL)	5-6
第7-12周	5	150毫升(mL)	5-6
第4个月	6	180毫升(mL)	5-6
第5-6个月	7	210毫升(mL)	5-6

注：喂哺或加热后超过2小时的奶液易受污染，请丢弃勿再食用。

贮藏方法 Storage method

未开封的奶粉可于常温贮存，并于保质期内食用。开罐后请务必盖严罐盖并置于阴凉干燥处。请勿置于冰箱内。开封后请于一个月内食用完。



扫一扫

关注官方微信

了解更多知识及活动



6 974631 451101

全国消费者咨询服务热线:400 998 8509

官方网站: <http://www.anutric.com>E-mail: service@anutric.com

配料表 Ingredients

脱盐乳清粉、全脂乳粉、食用植物油调和油（1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油）、乳糖、脱脂乳粉、葵花籽油、乳清蛋白粉、核桃油、无水奶油、磷脂

乳铁蛋白、花生四烯酸（ARA）、二十二碳六烯酸（DHA）、牛磺酸、核苷酸（5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠）、肌醇、左旋肉碱、叶黄素、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种HN019

维生素：维生素A（醋酸视黄酯）、维生素D（胆钙化醇）、维生素E（dl-α-醋酸生育酚）、维生素K₁（植物甲萘醌）、维生素B₁（盐酸硫胺素）、维生素B₂（核黄素）、维生素B₆（盐酸吡哆醇）、维生素B₁₂（氰钴胺）、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、维生素C（L-抗坏血酸）、氯化胆碱

矿物质：硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠、氯化钾、磷酸三钙、碳酸钙

贮藏方法 Storage method

未开封的奶粉可于常温贮存，并于保质期内食用。开罐后请务必盖严罐盖并置于阴凉干燥处。请勿置于冰箱内。开封后请于一个月内食用完。

全国消费者咨询服务热线：
400 998 8509

官方网站：

<http://www.anutric.com>

E-mail: service@anutric.com



扫一扫

关注官方微信

了解更多知识及活动

制造商：黑龙江鞍达实业集团股份有限公司

生产地址：黑龙江省绥化市安达市铁西区 产地：黑龙江省绥化市

营养成分表 Nutrition Facts

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2035
蛋白质	g	0.62	12.70
脂肪	g	1.06	21.47
亚油酸	g	0.10	2.02
α-亚麻酸	mg	15	306
碳水化合物	g	3.0	60.3
维生素			
维生素A	μg RE	23	459
维生素D	μg	0.60	12.28
维生素E	mg α-TE	0.37	7.49
维生素K ₁	μg	1.75	35.56
维生素B ₁	μg	27	557
维生素B ₂	μg	38	781
维生素B ₆	μg	13.8	280.0
维生素B ₁₂	μg	0.101	2.060
烟酸(烟酰胺)	μg	138	2800
叶酸	μg	3.2	65.3
泛酸	μg	120	2444
维生素C	mg	3.1	64.0
生物素	μg	0.51	10.47
胆碱	mg	6.4	130.9
矿物质			
钠	mg	3	66
钾	mg	23	459
铜	μg	10.5	213.8
镁	mg	1.7	34.9
铁	mg	0.30	6.11
锌	mg	0.15	3.05
锰	μg	4.24	86.30
钙	mg	21	433
磷	mg	13	271
碘	μg	5.3	108.0
氯	mg	11	234
硒	μg	0.64	13.00
可选择成分			
肌醇	mg	2.8	56.9
牛磺酸	mg	1.4	27.5
左旋肉碱	mg	0.8	16.9
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	92.0
二十碳四烯酸(ARA)	mg	4.9	100.0
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.2	3.3
叶黄素	μg	12	242
核苷酸	mg	1.3	27.4
乳铁蛋白	mg	5.0	101.6

即食状态下，每100mL含较大婴儿配方奶粉：13.8克

鞍达安纽希

较大婴儿配方奶粉

(6-12月龄, 2段)



净含量: 800g

国食注字YP20240086

重要提示 Reminder

- 含1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯
- 二十二碳六烯酸(DHA) 有助于婴儿视力的正常发育
- 含叶黄素、核苷酸、左旋肉碱、肌醇



冲调方法 Directions

1	冲调前请洗净双手，并将所有用具放在沸水中煮沸至少五分钟，干燥至无水备用。
2	将煮沸的水冷却至 50°C 左右（温开水）。
3	参照喂哺表将正确水量倒入消毒过的奶瓶。
4	使用消毒干燥后的量匙参照喂哺量表取正确份量的奶粉加入奶瓶中。先加水后加奶粉。
5	拧紧奶瓶盖后，晃动直至奶粉溶解。在喂哺前请先将奶水滴在手腕上，以确定温度是否适合宝宝饮用后再进行喂哺。

喂哺表 Feeding Chart

下列喂哺表是根据平均的需要量而定。如果发现婴幼儿食用配方奶粉后，有任何过敏反应，应立即停止食用该奶粉，去医院检查，听从医生的建议。一平量匙奶粉净含量约为 4.5克。

宝宝月龄	每次喂量		日喂次数
	量匙数	温开水量	
6-12个月	7	210毫升(mL)	4-5

注：6个月龄以上婴儿食用本产品时，须配合添加辅食食品。喂哺或加热后超过2小时的奶液易受污染，请丢弃勿再食用。

全脂乳粉原产国：新西兰 New Zealand
产品类别及属性：较大婴儿配方食品（乳基粉状）
食品生产许可证编号：SC10523128150256
产品执行标准：GB 10766-2021
保质期：2年
生产日期、产品批号：见罐底
合格证号：同批号



配料表 Ingredients

脱盐乳清粉、全脂乳粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、乳糖、脱脂乳粉、葵花籽油、乳清蛋白粉、核桃油、无水奶油、磷脂

乳铁蛋白、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、牛磺酸、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、肌醇、左旋肉碱、叶黄素、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种HN019

维生素:维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K₁(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸)、氯化胆碱

矿物质:硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸镁、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠、氯化钾、磷酸三钙、碳酸钙

贮藏方法 Storage method

未开封的奶粉可于常温贮存,并于保质期内食用。开罐后请务必盖严罐盖并置于阴凉干燥处。请勿置于冰箱内。开封后请于一个月内食用完。

全国消费者咨询热线:
400 998 8509

官方网址:
<http://www.anutric.com>
E-mail: service@anutric.com



扫一扫
关注官方微信
了解更多知识及活动

制造商:黑龙江鞍达实业集团股份有限公司
生产地址:黑龙江省绥化市安达市铁西区
产地:黑龙江省绥化市

营养成分表 Nutrition Facts

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2035
蛋白质	g	0.62	12.70
脂肪	g	1.06	21.47
亚油酸	g	0.10	2.02
α-亚麻酸	mg	15	306
碳水化合物	g	3.0	60.3
维生素			
维生素A	μg RE	23	459
维生素D	μg	0.60	12.28
维生素E	mg α-TE	0.37	7.49
维生素K ₁	μg	1.75	35.56
维生素B ₁	μg	27	557
维生素B ₂	μg	38	781
维生素B ₆	μg	13.8	280.0
维生素B ₁₂	μg	0.101	2.060
烟酸(烟酰胺)	μg	138	2800
叶酸	μg	3.2	65.3
泛酸	μg	120	2444
维生素C	mg	3.1	64.0
生物素	μg	0.51	10.47
胆碱	mg	6.4	130.9
矿物质			
钠	mg	3	66
钾	mg	23	459
铜	μg	10.5	213.8
镁	mg	1.7	34.9
铁	mg	0.30	6.11
锌	mg	0.15	3.05
锰	μg	4.24	86.30
钙	mg	21	433
磷	mg	13	271
碘	μg	5.3	108.0
氯	mg	11	234
硒	μg	0.64	13.00
可选择成分			
肌醇	mg	2.8	56.9
牛磺酸	mg	1.4	27.5
左旋肉碱	mg	0.8	16.9
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	92.0
二十碳四烯酸(ARA)	mg	4.9	100.0
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.2	3.3
叶黄素	μg	12	242
核苷酸	mg	1.3	27.4
乳铁蛋白	mg	5.0	101.6

即食状态下,每100mL含较大婴儿配方奶粉:13.8克

鞍达安纽希

较大婴儿配方奶粉

(6-12月龄,2段)



净含量: 400g

国食注字YP20240086

重要提示 Reminder

- 含1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯
- 二十二碳六烯酸(DHA)
有助于婴儿视力的正常发育
- 含叶黄素、核苷酸、左旋肉碱、肌醇



冲调方法 Directions

- 冲调前请洗净双手,并将所有用具放在沸水中煮沸至少五分钟,干燥至无水分备用。
- 将煮沸的水冷却至50°C左右(温开水)。
- 参照喂哺表将正确水量倒入消毒过的奶瓶。
- 使用消毒干燥后的量匙参照喂哺表量取正确份量的奶粉加入奶瓶中。先加水后加奶粉。
- 拧紧奶瓶盖后,晃动直至奶粉溶解。在喂哺前请先将奶水滴在手腕上,以确定温度是否适合宝宝饮用后再进行喂哺。

喂哺表 Feeding Chart

下列喂哺表是根据平均的需要量而定。如果发现婴幼儿食用配方奶粉后,有任何过敏反应,应立即停止食用该奶粉,去医院检查,听从医生的建议。一平量匙奶粉净含量约为4.5克。

宝宝月龄	每次喂量		日喂次数
	量匙数	温开水量	
6-12个月	7	210毫升(mL)	4-5

注:6个月龄以上婴儿食用本产品时,须配合添加辅助食品。喂乳或加热后超过2小时的奶液易受污染,请丢弃勿再食用。

全脂乳粉原产国:新西兰 New Zealand
产品类别及属性:较大婴儿配方食品(乳基粉状)
食品生产许可证编号:SC10523128150256
产品执行标准:GB 10766-2021
保质期:2年
生产日期、产品批号:见罐底
合格证号:同批号



重要提示 Reminder

- 含1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯
- 二十二碳六烯酸(DHA)
有助于婴儿视力的正常发育
- 含叶黄素、核苷酸、左旋肉碱、肌醇

营养成分表 Nutrition Facts

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2035
蛋白质	g	0.62	12.70
脂肪	g	1.06	21.47
亚油酸	g	0.10	2.02
α -亚麻酸	mg	15	306
碳水化合物	g	3.0	60.3
维生素			
维生素A	$\mu\text{g RE}$	23	459
维生素D	μg	0.60	12.28
维生素E	$\text{mg } \alpha\text{-TE}$	0.37	7.49
维生素K ₁	μg	1.75	35.56
维生素B ₁	μg	27	557
维生素B ₂	μg	38	781
维生素B ₆	μg	13.8	280.0
维生素B ₁₂	μg	0.101	2.060
烟酸(烟酰胺)	μg	138	2800
叶酸	μg	3.2	65.3
泛酸	μg	120	2444
维生素C	mg	3.1	64.0
生物素	μg	0.51	10.47
胆碱	mg	6.4	130.9
矿物质			
钠	mg	3	66
钾	mg	23	459
铜	μg	10.5	213.8
镁	mg	1.7	34.9
铁	mg	0.30	6.11
锌	mg	0.15	3.05
锰	μg	4.24	86.30
钙	mg	21	433
磷	mg	13	271
碘	μg	5.3	108.0
氯	mg	11	234
硒	μg	0.64	13.00
可选择成分			
肌醇	mg	2.8	56.9
牛磺酸	mg	1.4	27.5
左旋肉碱	mg	0.8	16.9
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	92.0
二十碳四烯酸(ARA)	mg	4.9	100.0
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.2	3.3
叶黄素	μg	12	242
核苷酸	mg	1.3	27.4
乳铁蛋白	mg	5.0	101.6

即食状态下,每100mL含较大婴儿配方奶粉:13.8克
全脂乳粉原产国:新西兰 New Zealand
制造商:黑龙江鞍达实业集团股份有限公司
生产地址:黑龙江省绥化市安达市铁西区
产地:黑龙江省绥化市

产品类别及属性:较大婴儿配方食品(乳基粉状)
食品生产许可证编号:SC10523128150256
产品执行标准:GB 10766-2021
保质期:2年
生产日期、产品批号:见罐底
合格证号:同批号

鞍达安纽希

较大婴儿配方奶粉 (6-12月龄, 2段)



净含量: 85g

国食注字YP20240086

配料表 Ingredients

脱盐乳清粉、全脂乳粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、乳糖、脱脂乳粉、葵花籽油、乳清蛋白粉、核桃油、无水奶油、磷脂

乳铁蛋白、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、牛磺酸、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、肌醇、左旋肉碱、叶黄素、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种HN019

维生素: 维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl- α -醋酸生育酚)、维生素K₁(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸)、氯化胆碱

矿物质: 硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸镁、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠、氯化钾、磷酸三钙、碳酸钙

冲调方法 Directions

1. 冲调前请洗净双手,并将所有用具放在沸水中煮沸至少五分钟,干燥至无水分备用。
2. 将煮沸的水冷却至50°C左右(温开水)。
3. 参照喂哺表将正确水量倒入消毒过的奶瓶。
4. 使用消毒干燥后的量匙参照喂哺表量取正确份量的奶粉加入奶瓶中。先加水后加奶粉。
5. 拧紧奶瓶盖后,晃动直至奶粉溶解。在喂哺前请先将奶水滴在手腕上,以确定温度是否适合宝宝饮用后再进行喂哺。

喂哺表 Feeding Chart

下列喂哺表是根据平均的需要量而定。如果发现婴幼儿食用配方奶粉后,有任何过敏反应,应立即停止食用该奶粉,去医院检查,听从医生的建议。一平量匙奶粉净含量约为4.5克。

宝宝月龄	每次喂量		日喂次数
	量匙数	温开水量	
6-12个月	7	210毫升(mL)	4-5

注:6个月龄以上婴儿食用本产品时,须配合添加辅食。喂剩或加热后超过2小时的奶液易受污染,请丢弃勿再食用。

贮藏方法 Storage method

未开封的奶粉可于常温贮存,并于保质期内食用。开罐后请务必盖严罐盖并置于阴凉干燥处。请勿置于冰箱内。开封后请于一个月内食用完。



扫一扫
关注官方微信
了解更多知识及活动



6 974631 451217

全国消费者咨询服务热线:400 998 8509
官方网址: <http://www.anutric.com>
E-mail: service@anutric.com

配料表 Ingredients

脱盐乳清粉、全脂乳粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、脱脂乳粉、乳糖、葵花籽油、乳清蛋白粉、核桃油、无水奶油、磷脂

乳铁蛋白、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、牛磺酸、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、肌醇、左旋肉碱、叶黄素、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种HN019

维生素: 维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K₁(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸)、氯化胆碱

矿物质: 硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸镁、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠、氯化钾、磷酸三钙、碳酸钾

贮藏方法 Storage method

未开封的奶粉可于常温贮存,并于保质期内食用。开罐后请务必盖严罐盖并置于阴凉干燥处。请勿置于冰箱内。开封后请于一个月内食用完。

全国消费者咨询服务热线:
400 998 8509

官方网址:
<http://www.anutric.com>
E-mail: service@anutric.com



扫一扫
关注官方微信
了解更多知识及活动

制造商: 黑龙江鞍达实业集团股份有限公司

生产地址: 黑龙江省绥化市安达市铁西区 产地: 黑龙江省绥化市

营养成分表 Nutrition Facts

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1994
蛋白质	g	0.72	14.40
脂肪	g	0.98	19.53
亚油酸	g	0.10	1.99
α-亚麻酸	mg	15	300
碳水化合物	g	3.0	60.4
维生素			
维生素A	μg RE	23	449
维生素D	μg	0.60	11.96
维生素E	mg α-TE	0.38	7.49
维生素K ₁	μg	1.78	35.58
维生素B ₁	μg	28	565
维生素B ₂	μg	41	824
维生素B ₆	μg	13.8	274.2
维生素B ₁₂	μg	0.110	2.186
烟酸(烟酰胺)	μg	138	2742
叶酸	μg	3.3	65.3
泛酸	μg	120	2393
维生素C	mg	3.2	63.1
生物素	μg	0.55	10.94
矿物质			
钠	mg	4	79
钾	mg	23	449
铜	μg	10.2	204.1
镁	mg	1.8	36.6
铁	mg	0.30	5.98
锌	mg	0.14	2.83
钙	mg	21	424
磷	mg	13	265
碘	μg	5.6	110.7
氯	mg	12	242
可选择成分			
硒	μg	0.60	11.96
胆碱	mg	6.7	134.2
锰	μg	4.35	86.66
肌醇	mg	2.9	58.0
牛磺酸	mg	1.4	27.5
左旋肉碱	mg	0.9	17.1
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.2	64.0
二十碳四烯酸(ARA)	mg	4.8	96.0
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.2	3.3
叶黄素	μg	12	242
核苷酸	mg	1.4	27.4
乳铁蛋白	mg	5.1	101.6

即食状态下,每100mL含幼儿配方奶粉:13.8克

鞍达安纽希

幼儿配方奶粉

(12-36月龄,3段)



净含量: 800g

国食注字YP20240087

重要提示 Reminder

- 含1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯
- 含叶黄素、核苷酸、胆碱
- 含肌醇、左旋肉碱、硒、锰



冲调方法 Directions

1	冲调前请洗净双手,并将所有用具放在沸水中煮沸至少五分钟,干燥至无水备用。
2	将煮沸的水冷却至 50°C 左右(温开水)。
3	参照喂哺表将正确水量倒入消毒过的奶瓶。
4	使用消毒干燥后的量匙参照喂哺量表取正确份量的奶粉加入奶瓶中。先加水后加奶粉。
5	拧紧奶瓶盖后,晃动直至奶粉溶解。在喂哺前请先将奶水滴在手腕上,以确定温度是否适合宝宝饮用后再进行喂哺。

喂哺表 Feeding Chart

下列喂哺表是根据平均的需要量而定。如果发现婴幼儿食用配方奶粉后,有任何过敏反应,应立即停止食用该奶粉,去医院检查,听从医生的建议。一平量匙奶粉净含量约为 4.5 克。

宝宝月龄	每次喂量		日喂次数
	量匙数	温开水量	
12-36个月	8	240毫升(mL)	3-4

注:喂哺或加热后超过2小时的奶液易受污染,请丢弃勿再食用。

全脂乳粉原产国:新西兰 New Zealand
产品类别及属性:幼儿配方食品(乳基粉状)
食品生产许可证编号:SC10523128150256
产品执行标准:GB 10767-2021
保质期:2年
生产日期、产品批号:见罐底
合格证号:同批号



配料表 Ingredients

脱盐乳清粉、全脂乳粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、脱脂乳粉、乳糖、葵花籽油、乳清蛋白粉、核桃油、无水奶油、磷脂

乳铁蛋白、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、牛磺酸、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、肌醇、左旋肉碱、叶黄素、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种HN019

维生素:维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(di-α-醋酸生育酚)、维生素K₁(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸)、氯化胆碱

矿物质:硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸镁、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠、氯化钾、磷酸三钙、碳酸钙

贮藏方法 Storage method

未开封的奶粉可于常温贮存,并于保质期内食用。
开罐后请务必盖严罐盖并置于阴凉干燥处。请勿置于冰箱内,开封后请于一个月内食用完。

全国消费者咨询服务热线:
400 998 8509

官方网站:
<http://www.anutric.com>
E-mail: service@anutric.com



扫一扫
关注官方微信
了解更多知识及活动

制造商:黑龙江鞍达实业集团股份有限公司
生产地址:黑龙江省绥化市安达市铁西区
产地:黑龙江省绥化市

营养成分表 Nutrition Facts

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1994
蛋白质	g	0.72	14.40
脂肪	g	0.98	19.53
亚油酸	g	0.10	1.99
α-亚麻酸	mg	15	300
碳水化合物	g	3.0	60.4
维生素			
维生素A	μg RE	23	449
维生素D	μg	0.60	11.96
维生素E	mg α-TE	0.38	7.49
维生素K ₁	μg	1.78	35.58
维生素B ₁	μg	28	565
维生素B ₂	μg	41	824
维生素B ₆	μg	13.8	274.2
维生素B ₁₂	μg	0.110	2.186
烟酸(烟酰胺)	μg	138	2742
叶酸	μg	3.3	65.3
泛酸	μg	120	2393
维生素C	mg	3.2	63.1
生物素	μg	0.55	10.94
矿物质			
钠	mg	4	79
钾	mg	23	449
铜	μg	10.2	204.1
镁	mg	1.8	36.6
铁	mg	0.30	5.98
锌	mg	0.14	2.83
钙	mg	21	424
磷	mg	13	265
碘	μg	5.6	110.7
氯	mg	12	242
可选择成分			
硒	μg	0.60	11.96
胆碱	mg	6.7	134.2
锰	μg	4.35	86.66
肌醇	mg	2.9	58.0
牛磺酸	mg	1.4	27.5
左旋肉碱	mg	0.9	17.1
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.2	64.0
二十碳四烯酸(ARA)	mg	4.8	96.0
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.2	3.3
叶黄素	μg	12	242
核苷酸	mg	1.4	27.4
乳铁蛋白	mg	5.1	101.6

即食状态下,每100mL含幼儿配方奶粉:13.8克

鞍达安纽希

幼儿配方奶粉

(12-36月龄,3段)



净含量: 400g

国食注字YP20240087

重要提示 Reminder

- 含1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯
- 含叶黄素、核苷酸、胆碱
- 含肌醇、左旋肉碱、硒、锰



冲调方法 Directions

- 冲调前请洗净双手,并将所有用具放在沸水中煮沸至少五分钟,干燥至无水分备用。
- 将煮沸的水冷却至50°C左右(温开水)。
- 参照喂哺表将正确水量倒入消毒过的奶瓶。
- 使用消毒干燥后的量匙参照喂哺表量取正确份量的奶粉加入奶瓶中。先加水后加奶粉。
- 拧紧奶瓶盖后,晃动直至奶粉溶解。在喂哺前请先将奶水滴在手腕上,以确定温度是否适合宝宝饮用后再进行喂哺。

喂哺表 Feeding Chart

下列喂哺表是根据平均的需要量而定。如果发现婴幼儿食用配方奶粉后,有任何过敏反应,应立即停止食用该奶粉,去医院检查,听从医生的建议。一平量匙奶粉净含量约为4.5克。

宝宝月龄	每次喂量		日喂次数
	量匙数	温开水量	
12-36个月	8	240毫升(mL)	3-4

注:喂乳或加热后超过2小时的奶液易受污染,请丢弃勿再食用。

全脂乳粉原产国:新西兰 New Zealand
产品类别及属性:幼儿配方食品(乳基粉状)
食品生产许可证编号:SC10523128150256
产品执行标准:GB 10767-2021
保质期:2年
生产日期、产品批号:见罐底
合格证号:同批号



6 974631 451576

重要提示 Reminder

- 含1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯
- 含叶黄素、核苷酸、胆碱
- 含肌醇、左旋肉碱、硒、锰

营养成分表 Nutrition Facts

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1994	钠	mg	4	79
蛋白质	g	0.72	14.40	钾	mg	23	449
脂肪	g	0.98	19.53	铜	μg	10.2	204.1
亚油酸	g	0.10	1.99	镁	mg	1.8	36.6
α-亚麻酸	mg	15	300	铁	mg	0.30	5.98
碳水化合物	g	3.0	60.4	锌	mg	0.14	2.83
维生素				钙	mg	21	424
维生素A	μg RE	23	449	磷	mg	13	265
维生素D	μg	0.60	11.96	碘	μg	5.6	110.7
维生素E	mg α-TE	0.38	7.49	氯	mg	12	242
维生素K ₁	μg	1.78	35.58	可选择成分			
维生素B ₁	μg	28	565	硒	μg	0.60	11.96
维生素B ₂	μg	41	824	胆碱	mg	6.7	134.2
维生素B ₆	μg	13.8	274.2	锰	μg	4.35	86.66
维生素B ₁₂	μg	0.110	2.186	肌醇	mg	2.9	58.0
烟酸(烟酰胺)	μg	138	2742	牛磺酸	mg	1.4	27.5
叶酸	μg	3.3	65.3	左旋肉碱	mg	0.9	17.1
泛酸	μg	120	2393	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.2	64.0
维生素C	mg	3.2	63.1	二十碳四烯酸(ARA)	mg	4.8	96.0
生物素	μg	0.55	10.94	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.2	3.3
矿物质				叶黄素	μg	12	242
				核苷酸	mg	1.4	27.4
				乳铁蛋白	mg	5.1	101.6

即食状态下,每100mL含幼儿配方奶粉:13.8克
全脂乳粉原产国:新西兰 New Zealand
制造商:黑龙江鞍达实业集团股份有限公司
生产地址:黑龙江省绥化市安达市铁西区
产地:黑龙江省绥化市

产品类别及属性:幼儿配方食品(乳基粉状)
食品生产许可证编号:SC10523128150256
产品执行标准:GB 10767-2021
保质期:2年
生产日期、产品批号:见罐底
合格证号:同批号

鞍达安纽希

幼儿配方奶粉

(12-36月龄,3段)



净含量: 85g

国食注字YP20240087

配料表 Ingredients

脱盐乳清粉、全脂乳粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、脱脂乳粉、乳糖、葵花籽油、乳清蛋白粉、核桃油、无水奶油、磷脂

乳铁蛋白、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、牛磺酸、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、肌醇、左旋肉碱、叶黄素、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种HN019

维生素:维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K₁(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、D-生物素、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸)、氯化胆碱

矿物质:硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸镁、硫酸铜、硫酸锰、碘酸钾、亚硒酸钠、氯化钾、磷酸三钙、碳酸钙

冲调方法 Directions

- 冲调前请洗净双手,并将所有用具放在沸水中煮沸至少五分钟,干燥至无水备用。
- 将煮沸的水冷却至50°C左右(温开水)。
- 参照喂哺表将正确水量倒入消毒过的奶瓶。
- 使用消毒干燥后的量匙参照喂哺表量取正确份量的奶粉加入奶瓶中。先加水后加奶粉。
- 拧紧奶瓶盖后,晃动直至奶粉溶解。在喂哺前请先将奶水滴在手腕上,以确定温度是否适合宝宝饮用后再进行喂哺。

喂哺表 Feeding Chart

下列喂哺表是根据平均的需要量而定。如果发现婴幼儿食用配方奶粉后,有任何过敏反应,应立即停止食用该奶粉,去医院检查,听从医生的建议。一平量匙奶粉净含量约为4.5克。

宝宝月龄	每次喂量		日喂次数
	量匙数	温开水量	
12-36个月	8	240毫升(mL)	3-4

注:喂乳或加热后超过2小时的奶液易受污染,请丢弃勿再食用。

贮藏方法 Storage method

未开封的奶粉可于常温贮存,并于保质期内食用。开罐后请务必盖严罐盖并置于阴凉干燥处。请勿置于冰箱内。开封后请于一个月内食用完。



扫一扫
关注官方微信
了解更多知识及活动



6 974631 451224

配料表 Ingredients

脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、全脂羊乳粉、脱脂羊乳粉、葵花籽油、乳糖、核桃油、磷脂

乳铁蛋白、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、核苷酸(5'-胞苷二钠、5'-尿苷二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷二钠、5'-鸟苷二钠)、牛磺酸、肌醇、左旋肉碱、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种HN019

维生素: 维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K₁(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸)、D-生物素、氯化胆碱

矿物质: 硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸镁、亚硒酸钠、硫酸铜、碘酸钾、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、柠檬酸钠、氯化钾

贮藏方法 Storage method

未开封的奶粉可于常温贮存,并于保质期内食用。开罐后请务必盖严罐盖并置于阴凉干燥处,请勿置于冰箱内。开封后请于一个月内食用完。

全国消费者咨询服务热线:
400 998 8509

安纽希中文官网:
<http://www.anutric.com>
E-mail: service@anutric.com



扫一扫
关注安纽希官方微信
了解更多知识及活动

制造商: 黑龙江鞍达实业集团股份有限公司
生产地址: 黑龙江省绥化市安达市铁西区 产地: 黑龙江省绥化市

营养成分表 Nutrition Facts

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2105
蛋白质	g	0.56	11.74
脂肪	g	1.19	24.95
亚油酸	g	0.12	2.60
α-亚麻酸	mg	15	316
碳水化合物	g	2.7	57.8
维生素			
维生素A	μg RE	18	369
维生素D	μg	0.60	12.64
维生素E	mg α-TE	0.40	8.43
维生素K ₁	μg	1.26	26.57
维生素B ₁	μg	24	511
维生素B ₂	μg	30	637
维生素B ₆	μg	12.3	259.7
维生素B ₁₂	μg	0.048	1.020
烟酸(烟酰胺)	μg	121	2540
叶酸	μg	3.6	76.4
泛酸	μg	120	2527
维生素C	mg	3.0	63.7
生物素	μg	0.54	11.46
胆碱	mg	6.7	141.9

矿物质

钠	mg	9	185
钾	mg	21	448
铜	μg	17.9	376.4
镁	mg	1.5	31.6
铁	mg	0.16	3.43
锌	mg	0.15	3.16
锰	μg	4.28	90.06
钙	mg	15	316
磷	mg	9	198
碘	μg	5.8	123.1
氯	mg	15	316
硒	μg	0.90	18.95

可选择成分

肌醇	mg	3.3	70.5
牛磺酸	mg	1.4	30.2
左旋肉碱	mg	0.4	8.2
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	95.0
二十碳四烯酸(ARA)	mg	4.8	100.0
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.2	4.2
核苷酸	mg	1.3	27.4
乳铁蛋白	mg	4.8	101.6

即食状态下, 每100mL含婴儿配方羊乳粉: 13.2克

anutric
安纽希

伊卡蓓尔 婴儿配方羊乳粉 (0-6月龄, 1段)

净含量: 700g

国食注字YP20240088

重要提示 Reminder

对于0-6月龄的婴儿最理想的食物
是母乳, 在母乳不足或无母乳时可
食用本产品。



冲调方法 Directions

- 1 冲调前请洗净双手, 并将所有用具放在沸水中煮沸至少五分钟, 干燥至无水分备用。
- 2 将煮沸的水冷却至 50°C 左右(温开水)。
- 3 参照喂哺表将正确水量倒入消毒过的奶瓶。
- 4 使用消毒干燥后的量匙参照喂哺表量取正确份量的奶粉加入奶瓶中。先加水后加奶粉。
- 5 拧紧奶瓶盖后, 晃动直至奶粉溶解。在喂哺前请先将奶水滴在手腕上, 以确定温度是否适合宝宝饮用后再进行喂哺。


喂哺表 Feeding Chart

下列喂哺表是根据平均的需要量而定。如果发现婴幼儿食用配方奶粉后, 有任何过敏反应, 应立即停止食用该奶粉, 去医院检查, 听从医生的建议。一平量匙奶粉净含量约为 4.5 克。

宝宝月龄	每次喂量		日喂次数
	量匙数	温开水量	
第1周	2	60毫升(mL)	7-8
第2-4周	3	90毫升(mL)	6-7
第5-6周	4	120毫升(mL)	5-6
第7-12周	5	150毫升(mL)	5-6
第4个月	6	180毫升(mL)	5-6
第5-6个月	7	210毫升(mL)	5-6

注: 喂哺或加热后超过2小时的奶液易受污染, 请丢弃勿再食用。

全脂羊乳粉原产国: 新西兰 New Zealand
产品类别及属性: 婴儿配方食品(乳基粉状)
食品生产许可证编号: SC10523128150256
产品执行标准: GB 10765-2021
保质期: 2年
生产日期、产品批号: 见罐底
合格证号: 同批号



重要提示 Reminder

对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，
在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

营养成分表 Nutrition Facts

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2105	钠	mg	9	185
蛋白质	g	0.56	11.74	钾	mg	21	448
脂肪	g	1.19	24.95	铜	μg	17.9	376.4
亚油酸	g	0.12	2.60	镁	mg	1.5	31.6
α-亚麻酸	mg	15	316	铁	mg	0.16	3.43
碳水化合物	g	2.7	57.8	锌	mg	0.15	3.16
维生素				锰	μg	4.28	90.06
维生素A	μg RE	18	369	钙	mg	15	316
维生素D	μg	0.60	12.64	磷	mg	9	198
维生素E	mg α-TE	0.40	8.43	碘	μg	5.8	123.1
维生素K ₁	μg	1.26	26.57	氯	mg	15	316
维生素B ₁	μg	24	511	硒	μg	0.90	18.95
维生素B ₂	μg	30	637	可选择成分			
维生素B ₆	μg	12.3	259.7	肌醇	mg	3.3	70.5
维生素B ₁₂	μg	0.048	1.020	牛磺酸	mg	1.4	30.2
烟酸(烟酰胺)	μg	121	2540	左旋肉碱	mg	0.4	8.2
叶酸	μg	3.6	76.4	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	95.0
泛酸	μg	120	2527	二十碳四烯酸(ARA)	mg	4.8	100.0
维生素C	mg	3.0	63.7	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油二酯	g	0.2	4.2
生物素	μg	0.54	11.46	核苷酸	mg	1.3	27.4
胆碱	mg	6.7	141.9	乳铁蛋白	mg	4.8	101.6
矿物质							

即食状态下,每100mL含婴儿配方羊乳粉:13.2克
全脂羊乳粉原产国:新西兰 New Zealand
制造商:黑龙江鞍达实业集团股份有限公司
生产地址:黑龙江省绥化市安达市铁西区
产地:黑龙江省绥化市

产品类别及属性:婴儿配方食品(乳基粉状)
食品生产许可证编号:SC10523128150256
产品执行标准:GB 10765-2021
保质期:2年
生产日期、产品批号:见罐底
合格证号:同批号

anutric
安纽希®

伊卡蓓尔

婴儿配方羊乳粉
(0-6月龄, 1段)

国食注字YP20240088

净含量: 85g

配料表 Ingredients

脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油二酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、全脂羊乳粉、脱脂羊乳粉、葵花籽油、乳糖、核桃油、磷脂

乳铁蛋白、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、牛磺酸、肌醇、左旋肉碱、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种HN019

维生素: 维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K₁(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸)、D-生物素、氯化胆碱

矿物质: 硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸镁、亚硒酸钠、硫酸铜、碘酸钾、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、柠檬酸钠、氯化钾

冲调方法 Directions

- 1 冲调前请洗净双手,并将所有用具放在沸水中煮沸至少五分钟,干燥至无水备用。
- 2 将煮沸的水冷却至50°C左右(温开水)。
- 3 参照喂哺表将正确水量倒入消毒过的奶瓶。
- 4 使用消毒干燥后的量匙参照喂哺表量取正确份量的奶粉加入奶瓶中。先加水后加奶粉。
- 5 拧紧奶瓶盖后,晃动直至奶粉溶解。在喂哺前请先将奶水滴在手腕上,以确定温度是否适合宝宝饮用后再进行喂哺。

喂哺表 Feeding Chart

下列的喂哺表是根据平均的需要量而定。如果发现婴幼儿食用配方奶粉后,有任何过敏反应,应立即停止食用该奶粉,去医院检查,听从医生的建议。一平量匙奶粉净含量约为4.5克。

宝宝月龄	每次喂量		日喂次数
	量匙数	温开水量	
第1周	2	60毫升(mL)	7-8
第2-4周	3	90毫升(mL)	6-7
第5-6周	4	120毫升(mL)	5-6
第7-12周	5	150毫升(mL)	5-6
第4个月	6	180毫升(mL)	5-6
第5-6个月	7	210毫升(mL)	5-6

注:喂剩或加热后超过2小时的奶液易受污染,请丢弃勿再食用。

全国消费者咨询服务热线:400 998 8509
安纽希中文官网: <http://www.anutric.com>
E-mail: service@anutric.com

贮藏方法 Storage method

未开封的奶粉可于常温贮存,并于保质期内食用。开罐后请务必盖严罐盖并置于阴凉干燥处。请勿置于冰箱内。开封后请于一个月内食用完。



6 974631 451613

配料表 Ingredients

脱盐羊乳清粉、全脂羊乳粉、乳糖、食用植物调和油（1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油）、脱脂羊乳粉、葵花籽油、核桃油、磷脂

乳铁蛋白、花生四烯酸（ARA）、二十二碳六烯酸（DHA）、核苷酸（5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠）、牛磺酸、肌醇、左旋肉碱、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种HN019

维生素：维生素A（醋酸视黄酯）、维生素D（胆钙化醇）、维生素E（dl-α-醋酸生育酚）、维生素K₁（植物甲萘醌）、维生素B₁（盐酸硫胺素）、维生素B₂（核黄素）、维生素B₆（盐酸吡哆醇）、维生素B₁₂（氰钴胺）、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、维生素C（L-抗坏血酸）、D-生物素、氯化胆碱

矿物质：硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸镁、亚硒酸钠、硫酸铜、碘酸钾、硫酸锰、碳酸钾、磷酸三钙、柠檬酸钠、氯化钾

贮藏方法 Storage method

未开封的奶粉可于常温贮存，并于保质期内食用。开罐后请务必盖严罐盖并置于阴凉干燥处，请勿置于冰箱内。开封后请于一个月内食用完。

全国消费者咨询服务热线：
400 998 8509

安纽希中文官网：
<http://www.anutric.com>
E-mail: service@anutric.com



制造商：黑龙江鞍达实业集团股份有限公司
生产地址：黑龙江省绥化市安达市铁西区 产地：黑龙江省绥化市

营养成分表 Nutrition Facts

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2020
蛋白质	g	0.56	11.24
脂肪	g	1.05	21.12
亚油酸	g	0.10	2.09
α-亚麻酸	mg	15	304
碳水化合物	g	3.0	61.6
维生素			
维生素A	μg RE	23	455
维生素D	μg	0.60	12.12
维生素E	mg α-TE	0.36	7.29
维生素K ₁	μg	1.32	26.62
维生素B ₁	μg	27	538
维生素B ₂	μg	28	564
维生素B ₆	μg	13.8	277.9
维生素B ₁₂	μg	0.084	1.699
烟酸(烟酰胺)	μg	147	2978
叶酸	μg	3.2	65.3
泛酸	μg	120	2425
维生素C	mg	3.2	63.7
生物素	μg	0.74	14.92
胆碱	mg	6.3	126.4
矿物质			
钠	mg	5	103
钾	mg	23	455
铜	μg	11.3	228.7
镁	mg	1.6	32.5
铁	mg	0.30	6.06
锌	mg	0.15	3.03
锰	μg	4.63	93.53
钙	mg	21	430
磷	mg	13	269
碘	μg	5.7	114.3
氯	mg	13	262
硒	μg	0.70	14.08
可选择成分			
肌醇	mg	3.1	62.2
牛磺酸	mg	1.4	27.7
左旋肉碱	mg	0.4	7.6
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.6	92.0
二十碳四烯酸(ARA)	mg	5.0	100.0
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.2	3.3
核苷酸	mg	1.4	27.4
乳铁蛋白	mg	5.0	101.6

即食状态下，每100mL含较大婴儿配方羊乳粉：13.8克



伊卡蓓尔 较大婴儿配方羊乳粉 (6-12月龄, 2段)

国食注字YP20240089

净含量: 700g

重要提示 Reminder

含1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯
二十二碳六烯酸(DHA)
有助于婴儿视力的正常发育
含核苷酸、左旋肉碱、肌醇



冲调方法 Directions

1	冲调前请洗净双手，并将所有用具放在沸水中煮沸至少五分钟，干燥至无水分备用。
2	将煮沸的水冷却至 50°C 左右(温开水)。
3	参照喂哺表将正确水量倒入消毒过的奶瓶。
4	使用消毒干燥后的量匙参照喂哺表量取正确份量的奶粉加入奶瓶中。先加水后加奶粉。
5	拧紧奶瓶盖后，晃动直至奶粉溶解。在喂哺前请先将奶水滴在手腕上，以确定温度是否适合宝宝饮用后再进行喂哺。

喂哺表 Feeding Chart

下列喂哺表是根据平均的需要量而定。如果发现婴幼儿食用配方奶粉后，有任何过敏反应，应立即停止食用该奶粉，去医院检查，听从医生的建议。一平量匙奶粉净含量约为 4.5克。

宝宝月龄	每次喂量		日喂次数
	量匙数	温开水量	
6-12个月	7	210毫升(mL)	4-5

注：6个月龄以上婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。喂哺或加热后超过2小时的奶液易受污染，请丢弃不再食用。

全脂羊乳粉原产国：新西兰 New Zealand
产品类别及属性：较大婴儿配方食品(乳基粉状)
食品生产许可证编号：SC10523128150256
产品执行标准：GB 10766-2021
保质期：2年
生产日期、产品批号：见罐底
合格证号：同批号



配料表 Ingredients

脱盐羊乳清粉、全脂羊乳粉、乳糖、食用植物调和油 (1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、脱脂羊乳粉、葵花籽油、核桃油、磷脂

乳铁蛋白、花生四烯酸 (ARA)、二十二碳六烯酸 (DHA)、核苷酸 (5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、牛磺酸、肌醇、左旋肉碱、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种HN019

维生素: 维生素A (醋酸视黄酯)、维生素D (胆钙化醇)、维生素E (dl-α-醋酸生育酚)、维生素K₁ (植物甲萘醌)、维生素B₁ (盐酸硫胺素)、维生素B₂ (核黄素)、维生素B₆ (盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂ (氰钴胺)、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、维生素C (L-抗坏血酸)、D-生物素、氯化胆碱

矿物质: 硫酸亚铁、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸铜、碘酸钾、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、柠檬酸钠、氯化钾

贮藏方法 Storage method

未开封的奶粉可于常温贮存, 并于保质期内食用。开罐后请务必盖严罐盖并置于阴凉干燥处。请勿置于冰箱内。开封后请于一个月内食用完。

全国消费者咨询服务热线:
400 998 8509

安纽希中文官网:
<http://www.anutric.com>
E-mail: service@anutric.com



扫一扫
关注安纽希官方微信
了解更多知识及活动

制造商: 黑龙江鞍达实业集团股份有限公司
生产地址: 黑龙江省绥化市安达市铁西区 产地: 黑龙江省绥化市

营养成分表 Nutrition Facts

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2035
蛋白质	g	0.64	13.02
脂肪	g	1.07	21.87
亚油酸	g	0.10	2.10
α-亚麻酸	mg	15	306
碳水化合物	g	2.9	59.1
维生素			
维生素A	μg RE	23	458
维生素D	μg	0.60	12.22
维生素E	mg α-TE	0.36	7.29
维生素K ₁	μg	1.31	26.63
维生素B ₁	μg	27	543
维生素B ₂	μg	28	573
维生素B ₆	μg	13.8	279.9
维生素B ₁₂	μg	0.083	1.699
烟酸(烟酰胺)	μg	148	3015
叶酸	μg	3.2	65.3
泛酸	μg	120	2443
维生素C	mg	3.1	62.8
生物素	μg	0.76	15.51
矿物质			
钠	mg	5	100
钾	mg	23	458
铜	μg	11.4	232.2
镁	mg	1.8	35.7
铁	mg	0.30	6.11
锌	mg	0.15	3.03
钙	mg	21	433
磷	mg	13	271
碘	μg	5.3	108.8
氯	mg	15	315
可选择成分			
硒	μg	0.72	14.64
胆碱	mg	6.2	126.7
锰	μg	4.64	94.36
肌醇	mg	3.2	64.3
牛磺酸	mg	1.3	26.0
左旋肉碱	mg	0.4	7.7
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.1	64.0
二十碳四烯酸(ARA)	mg	4.7	96.0
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.2	3.3
核苷酸	mg	1.3	27.4
乳铁蛋白	mg	5.0	101.6

即食状态下, 每100mL含幼儿配方羊乳粉: 13.8克



国食注字YP20240090

净含量: 700g

重要提示 Reminder

含1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯

含核苷酸、胆碱

含肌醇、左旋肉碱、硒、锰



冲调方法 Directions

- 1 冲调前请洗净双手, 并将所有用具放在沸水中煮沸至少五分钟, 干燥至无水分备用。
- 2 将煮沸的水冷却至 50°C 左右 (温开水)。
- 3 参照喂哺表将正确水量倒入消毒过的奶瓶。
- 4 使用消毒干燥后的量匙参照喂哺表量取正确份量的奶粉加入奶瓶中。先加水后加奶粉。
- 5 拧紧奶瓶盖后, 晃动直至奶粉溶解。在喂哺前请先将奶水滴在手腕上, 以确定温度是否适合宝宝饮用后再进行喂哺。


喂哺表 Feeding Chart

下列喂哺表是根据平均的需要量而定。如果发现婴幼儿食用配方奶粉后, 有任何过敏反应, 应立即停止食用该奶粉, 去医院检查, 听从医生的建议。一平量匙奶粉净含量约为 4.5 克。

宝宝月龄	每次喂量		日喂次数
	量匙数	温开水量	
12-36个月	8	240毫升 (mL)	3-4

注: 喂乳或加热后超过2小时的奶液易受污染, 请丢弃勿再食用。

全脂羊乳粉原产国: 新西兰 New Zealand
产品类别及属性: 幼儿配方食品 (乳基粉状)
食品生产许可证编号: SC10523128150256
产品执行标准: GB 10767-2021
保质期: 2年
生产日期、产品批号: 见罐底
合格证号: 同批号



6 974631 451811

配料表 Ingredients

脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、全脂羊乳粉、脱脂羊乳粉、葵花籽油、乳糖、核桃油、磷脂

花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、酪蛋白磷酸肽、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、肌醇、左旋肉碱、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种HN019

维生素: 维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K₁(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸)、D-生物素、氯化胆碱

矿物质: 硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸镁、亚硒酸钠、硫酸铜、碘酸钾、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、柠檬酸钠、氯化钾

贮藏方法 Storage method

未开封的奶粉可于常温贮存,并于保质期内食用。开罐后请务必盖严罐盖并置于阴凉干燥处。请勿置于冰箱内。开封后请于一个月内食用完。

全国消费者咨询服务热线:
400 998 8509

安纽希中文官网:

<http://www.anutric.com>

E-mail: service@anutric.com



扫一扫
关注安纽希官方微信
了解更多知识及活动

制造商: 黑龙江联达实业集团股份有限公司

生产地址: 黑龙江省绥化市安达市铁西区 产地: 黑龙江省绥化市

营养成分表 Nutrition Facts

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2105
蛋白质	g	0.56	11.74
脂肪	g	1.19	24.95
亚油酸	g	0.12	2.60
α-亚麻酸	mg	15	316
碳水化合物	g	2.7	57.8
维生素			
维生素A	μg RE	18	369
维生素D	μg	0.60	12.64
维生素E	mg α-TE	0.40	8.43
维生素K ₁	μg	1.26	26.57
维生素B ₁	μg	24	511
维生素B ₂	μg	30	637
维生素B ₆	μg	12.3	259.7
维生素B ₁₂	μg	0.048	1.020
烟酸(烟酰胺)	μg	121	2540
叶酸	μg	3.6	76.4
泛酸	μg	120	2527
维生素C	mg	3.0	63.7
生物素	μg	0.54	11.46
胆碱	mg	6.7	141.9
矿物质			
钠	mg	9	185
钾	mg	21	448
铜	μg	17.9	376.4
镁	mg	1.5	31.6
铁	mg	0.16	3.43
锌	mg	0.15	3.16
锰	μg	4.28	90.06
钙	mg	15	316
磷	mg	9	198
碘	μg	5.8	123.1
氯	mg	15	316
硒	μg	0.90	18.95
可选择成分			
肌醇	mg	3.3	70.5
左旋肉碱	mg	0.4	8.2
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	95.0
二十碳四烯酸(ARA)	mg	4.8	100.0
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.2	4.2
叶黄素	μg	6	119
核苷酸	mg	1.3	27.4
酪蛋白磷酸肽	mg	2.9	61.6

即食状态下,每100mL含婴儿配方羊乳粉:13.2克

anutric
安纽希

安纽希 婴儿配方羊乳粉 (0-6月龄,1段)

净含量: 800g

国食注字YP20240091

重要提示 Reminder

对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳,
在母乳不足或无母乳时可食用本产品。



冲调方法 Directions

1	冲调前请洗净双手,并将所有用具放在沸水中煮沸至少五分钟,干燥至无水备用。
2	将煮沸的水冷却至 50°C 左右(温开水)。
3	参照喂哺表将正确水量倒入消毒过的奶瓶。
4	使用消毒干燥后的量匙参照喂哺表量取正确份量的奶粉加入奶瓶中。先加水后加奶粉。
5	拧紧奶瓶盖后,晃动直至奶粉溶解。在喂哺前请先将奶水滴在手腕上,以确定温度是否适合宝宝饮用后再进行喂哺。

喂哺表 Feeding Chart

下列喂哺表是根据平均的需要量而定。如果发现婴幼儿食用配方奶粉后,有任何过敏反应,应立即停止食用该奶粉,去医院检查,听从医生的建议。一平量匙奶粉净含量约为 4.5克。

宝宝月龄	每次喂量		日喂次数
	量匙数	温开水量	
第1周	2	60毫升(mL)	7-8
第2-4周	3	90毫升(mL)	6-7
第5-6周	4	120毫升(mL)	5-6
第7-12周	5	150毫升(mL)	5-6
第4个月	6	180毫升(mL)	5-6
第5-6个月	7	210毫升(mL)	5-6

注:喂哺或加热后超过2小时的奶液易受污染,请丢弃勿再食用。

全脂羊乳粉原产国:新西兰 New Zealand
产品类别及属性:婴儿配方食品(乳基粉状)
食品生产许可证编号:SC10523128150256
产品执行标准:GB 10765-2021
保质期:2年
生产日期、产品批号:见罐底
合格证号:同批号



配料表 Ingredients

脱盐羊乳清粉、食用植物调和油 (1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、全脂羊乳粉、脱脂羊乳粉、葵花籽油、乳糖、核桃油、磷脂

花生四烯酸 (ARA)、二十二碳六烯酸 (DHA)、酸蛋白磷酸肽、叶黄素、核苷酸 (5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、肌醇、左旋肉碱、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种HN019

维生素: 维生素A (醋酸视黄酯)、维生素D (胆钙化醇)、维生素E (dl-α-醋酸生育酚)、维生素K₁ (植物甲萘醌)、维生素B₁ (盐酸硫胺素)、维生素B₂ (核黄素)、维生素B₆ (盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂ (氰钴胺)、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、维生素C (L-抗坏血酸)、D-生物素、氯化胆碱

矿物质: 硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸镁、亚硒酸钠、硫酸铜、磷酸钾、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、柠檬酸钠、氯化钾

贮藏方法 Storage method

未开封的奶粉可于常温贮存, 并于保质期内食用。
开罐后请务必盖严罐盖并置于阴凉干燥处。请勿置于冰箱内。开封后请于一个月内食用完。



全国消费者咨询服务热线:

400 998 8509



安纽希中文官网:

<http://www.anutric.com>

E-mail: service@anutric.com



扫一扫

关注安纽希官方微信

了解更多知识及活动

制造商: 黑龙江安达实业集团股份有限公司

生产地址: 黑龙江省绥化市安达市铁西区

产地: 黑龙江省绥化市

营养成分表 Nutrition Facts

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2105
蛋白质	g	0.56	11.74
脂肪	g	1.19	24.95
亚油酸	g	0.12	2.60
α-亚麻酸	mg	15	316
碳水化合物	g	2.7	57.8

维生素

维生素A	μg RE	18	369
维生素D	μg	0.60	12.64
维生素E	mg α-TE	0.40	8.43
维生素K ₁	μg	1.26	26.57
维生素B ₁	μg	24	511
维生素B ₂	μg	30	637
维生素B ₆	μg	12.3	259.7
维生素B ₁₂	μg	0.048	1.020
烟酸(烟酰胺)	μg	121	2540
叶酸	μg	3.6	76.4
泛酸	μg	120	2527
维生素C	mg	3.0	63.7
生物素	μg	0.54	11.46
胆碱	mg	6.7	141.9

矿物质

钠	mg	9	185
钾	mg	21	448
铜	μg	17.9	376.4
镁	mg	1.5	31.6
铁	mg	0.16	3.43
锌	mg	0.15	3.16
锰	μg	4.28	90.06
钙	mg	15	316
磷	mg	9	198
碘	μg	5.8	123.1
氯	mg	15	316
硒	μg	0.90	18.95

可选择成分

肌醇	mg	3.3	70.5
左旋肉碱	mg	0.4	8.2
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	95.0
二十碳四烯酸(ARA)	mg	4.8	100.0
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.2	4.2
叶黄素	μg	6	119
核苷酸	mg	1.3	27.4
酪蛋白磷酸肽	mg	2.9	61.6

即食状态下, 每100mL含婴儿配方羊乳粉: 13.2克

anutric
安纽希

安纽希 婴儿配方羊乳粉 (0-6月龄, 1段)

净含量: 400g

国食注字YP20240091

重要提示 Reminder

对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳,
在母乳不足或无母乳时可食用本产品。



冲调方法 Directions

- 1 冲调前请洗净双手, 并将所有用具放在沸水中煮沸至少五分钟, 干燥至无水分备用。
- 2 将煮沸的水冷却至 50°C 左右 (温开水)。
- 3 参照喂哺表将正确水量倒入消毒过的奶瓶。
- 4 使用消毒干燥后的量匙参照喂哺表量取正确份量的奶粉加入奶瓶中。先加水后加奶粉。
- 5 拧紧奶瓶盖后, 晃动直至奶粉溶解。在喂哺前请先将奶水滴在手腕上, 以确定温度是否适合宝宝饮用后再进行喂哺。

喂哺表 Feeding Chart

下列喂哺表是根据平均的需要量而定。如果发现婴幼儿食用配方奶粉后, 有任何过敏反应, 应立即停止食用该奶粉, 去医院检查, 听从医生的建议。一平量匙奶粉净含量约为4.5克。

宝宝月龄	每次喂量		日喂次数
	量匙数	温开水量	
第1周	2	60毫升(mL)	7-8
第2-4周	3	90毫升(mL)	6-7
第5-6周	4	120毫升(mL)	5-6
第7-12周	5	150毫升(mL)	5-6
第4个月	6	180毫升(mL)	5-6
第5-6个月	7	210毫升(mL)	5-6

注: 喂剩或加热后超过2小时的奶液易受污染, 请丢弃勿再食用。

全脂羊乳粉原产国: 新西兰 New Zealand
产品类别及属性: 婴儿配方食品 (乳基粉状)
食品生产许可证编号: SC10523128150256
产品执行标准: GB 10765-2021
保质期: 2年
生产日期、产品批号: 见罐底
合格证号: 同批号



重要提示 Reminder

对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，
在母乳不足或无母乳时可食用本产品。



营养成分表 Nutrition Facts

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2105	钠	mg	9	185
蛋白质	g	0.56	11.74	钾	mg	21	448
脂肪	g	1.19	24.95	铜	μg	17.9	376.4
亚油酸	g	0.12	2.60	镁	mg	1.5	31.6
α-亚麻酸	mg	15	316	铁	mg	0.16	3.43
碳水化合物	g	2.7	57.8	锌	mg	0.15	3.16
维生素				锰	μg	4.28	90.06
维生素A	μg RE	18	369	钙	mg	15	316
维生素D	μg	0.60	12.64	磷	mg	9	198
维生素E	mg α-TE	0.40	8.43	碘	μg	5.8	123.1
维生素K ₁	μg	1.26	26.57	氯	mg	15	316
维生素B ₁	μg	24	511	硒	μg	0.90	18.95
维生素B ₂	μg	30	637	可选择成分			
维生素B ₆	μg	12.3	259.7	肌醇	mg	3.3	70.5
维生素B ₁₂	μg	0.048	1.020	左旋肉碱	mg	0.4	8.2
烟酸(烟酰胺)	μg	121	2540	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.5	95.0
叶酸	μg	3.6	76.4	二十碳四烯酸(ARA)	mg	4.8	100.0
泛酸	μg	120	2527	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油二酯	g	0.2	4.2
维生素C	mg	3.0	63.7	叶黄素	μg	6	119
生物素	μg	0.54	11.46	核苷酸	mg	1.3	27.4
胆碱	mg	6.7	141.9	酪蛋白磷酸肽	mg	2.9	61.6
矿物质							

即食状态下,每100mL含婴儿配方羊乳粉:13.2克
全脂羊乳粉原产国:新西兰 New Zealand
制造商:黑龙江鞍达实业集团股份有限公司
生产地址:黑龙江省绥化市安达市铁西区
产地:黑龙江省绥化市

产品类别及属性:婴儿配方食品(乳基粉类)
食品生产许可证编号:SC10523128150256
产品执行标准:GB 10765-2021
保质期:2年
生产日期、产品批号:见罐底
合格证号:同批号

anutric
安纽希



安纽希 婴儿配方羊乳粉 (0-6月龄, 1段)

净含量: 85g

国食注字YP20240091

配料表 Ingredients

脱盐羊乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油二酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、全脂羊乳粉、脱脂羊乳粉、葵花籽油、乳糖、核桃油、磷脂

花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、酪蛋白磷酸肽、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、肌醇、左旋肉碱、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种HN019

维生素:维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K₁(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸)、D-生物素、氯化胆碱

矿物质:硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸镁、亚硒酸钠、硫酸铜、碘酸钾、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、柠檬酸钠、氯化钾

冲调方法 Directions

- 1 冲调前请洗净双手,并将所有用具放在沸水中煮沸至少五分钟,干燥至无水分备用。
- 2 将煮沸的水冷却至50°C左右(温开水)。
- 3 参照喂哺表将正确水量倒入消毒过的奶瓶。
- 4 使用消毒干燥后的量匙参照喂哺表量取正确份量的奶粉加入奶瓶中。先加水后加奶粉。
- 5 拧紧奶瓶盖后,晃动直至奶粉溶解。在喂哺前请先将奶水滴在手腕上,以确定温度是否适合宝宝饮用后再进行喂哺。

喂哺表 Feeding Chart

下列喂哺表是根据平均的需要量而定。如果发现婴幼儿食用配方奶粉后,有任何过敏反应,应立即停止食用该奶粉,去医院检查,听从医生的建议。一平量匙奶粉净含量约为4.5克。

宝宝月龄	每次喂量		日喂次数
	量匙数	温开水量	
第1周	2	60毫升(mL)	7-8
第2-4周	3	90毫升(mL)	6-7
第5-6周	4	120毫升(mL)	5-6
第7-12周	5	150毫升(mL)	5-6
第4个月	6	180毫升(mL)	5-6
第5-6个月	7	210毫升(mL)	5-6

注:喂哺或加热后超过2小时的奶液易受污染,请丢弃勿再食用。

贮藏方法 Storage method

未开封的奶粉可于常温贮存,并于保质期内食用。开罐后请务必盖严罐盖并置于阴凉干燥处。请勿置于冰箱内。开封后请于一个月内食用完。



扫一扫

关注安纽希官方微信

了解更多知识及活动

全国消费者咨询服务热线:400 998 8509
安纽希中文官网: <http://www.anutric.com>
E-mail: service@anutric.com



6 974631 451644

配料表 Ingredients

脱盐羊乳清粉、全脂羊乳粉、乳糖、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、脱脂羊乳粉、葵花籽油、核桃油、磷脂

花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、酪蛋白磷酸肽、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、肌醇、左旋肉碱、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种HN019

维生素: 维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K₁(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸)、D-生物素、氯化胆碱

矿物质: 硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸镁、亚硒酸钠、硫酸铜、碘酸钾、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、柠檬酸钠、氯化钾

贮藏方法 Storage method

未开封的奶粉可于常温贮存,并于保质期内食用。开罐后请务必盖严罐盖并置于阴凉干燥处。请勿置于冰箱内。开封后请于一个月内食用完。

全国消费者咨询服务热线:
400 998 8509

安纽希中文官网:
<http://www.anutric.com>
E-mail: service@anutric.com



扫一扫
关注安纽希官方微信
了解更多知识及活动

制造商: 黑龙江联达实业集团股份有限公司
生产地址: 黑龙江省绥化市安达市铁西区 产地: 黑龙江省绥化市

营养成分表 Nutrition Facts

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2020
蛋白质	g	0.56	11.24
脂肪	g	1.05	21.12
亚油酸	g	0.10	2.09
α-亚麻酸	mg	15	304
碳水化合物	g	3.0	61.6
维生素			
维生素A	μg RE	23	455
维生素D	μg	0.60	12.12
维生素E	mg α-TE	0.36	7.29
维生素K ₁	μg	1.32	26.62
维生素B ₁	μg	27	538
维生素B ₂	μg	28	564
维生素B ₆	μg	13.8	277.9
维生素B ₁₂	μg	0.084	1.699
烟酸(烟酰胺)	μg	147	2978
叶酸	μg	3.2	65.3
泛酸	μg	120	2425
维生素C	mg	3.2	63.7
生物素	μg	0.74	14.92
胆碱	mg	6.3	126.4
矿物质			
钠	mg	5	103
钾	mg	23	455
铜	μg	11.3	228.7
镁	mg	1.6	32.5
铁	mg	0.30	6.06
锌	mg	0.15	3.03
锰	μg	4.63	93.53
钙	mg	21	430
磷	mg	13	269
碘	μg	5.7	114.3
氯	mg	13	262
硒	μg	0.70	14.08
可选择成分			
肌醇	mg	3.1	62.2
左旋肉碱	mg	0.4	7.6
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.6	92.0
二十碳四烯酸(ARA)	mg	5.0	100.0
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.2	3.3
叶黄素	μg	12	238
核苷酸	mg	1.4	27.4
酪蛋白磷酸肽	mg	3.0	61.6

anutric
安纽希

安纽希
较大婴儿配方羊乳粉
(6-12月龄, 2段)

净含量: 800g

国食注字YP20240092

重要提示 Reminder

- 含1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯
- 二十二碳六烯酸(DHA)
有助于婴儿视力的正常发育
- 含叶黄素、核苷酸、左旋肉碱、肌醇



冲调方法 Directions

1	冲调前请洗净双手, 并将所有用具放在沸水中煮沸至少五分钟, 干燥至无水备用。
2	将煮沸的水冷却至 50°C 左右(温开水)。
3	参照喂哺表将正确水量倒入消毒过的奶瓶。
4	使用消毒干燥后的量匙参照喂哺表量取正确份量的奶粉加入奶瓶中。先加水后加奶粉。
5	拧紧奶瓶盖后, 晃动直至奶粉溶解。在喂哺前请先将奶水滴在手腕上, 以确定温度是否适合宝宝饮用后再进行喂哺。

全脂羊乳粉原产国: 新西兰 New Zealand
产品类别及属性: 较大婴儿配方食品(乳基粉状)
食品生产许可证编号: SC10523128150256
产品执行标准: GB 10766-2021
保质期: 2年
生产日期、产品批号: 见罐底
合格证号: 同批号

喂哺表 Feeding Chart

下列喂哺表是根据平均的需要量而定。如果发现婴幼儿食用配方奶粉后, 有任何过敏反应, 应立即停止食用该奶粉, 去医院检查, 听从医生的建议。一平量匙奶粉净含量约为 4.5克。

宝宝月龄	每次喂量		日喂次数
	量匙数	温开水量	
6-12个月	7	210毫升(mL)	4-5

注: 6个月龄以上婴儿食用本产品时, 须配合添加辅助食品。喂哺或加热后超过2小时的奶液易受污染, 请丢弃勿再食用。



6 974631 450265

配料表 Ingredients

脱盐羊乳清粉、全脂羊乳粉、乳糖、食用植物油和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、脱脂羊乳粉、葵花籽油、核桃油、磷脂

花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、酪蛋白磷酸肽、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、肌醇、左旋肉碱、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种HN019

维生素: 维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(di-α-醋酸生育酚)、维生素K₁(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸)、D-生物素、氯化胆碱

矿物质: 硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸镁、亚硒酸钠、硫酸铜、碘酸钾、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、柠檬酸钠、氯化钾

贮藏方法 Storage method

未开封的奶粉可于常温贮存,并于保质期内食用。开罐后请务必盖严罐盖并置于阴凉干燥处,请勿置于冰箱内;开封后请于一个月内食用完。



全国消费者咨询服务热线:
400 998 8509



安纽希中文官网:
<http://www.anutric.com>
E-mail: service@anutric.com



扫一扫
关注安纽希官方微信
了解更多知识及活动

制造商: 黑龙江鞍达实业集团股份有限公司
生产地址: 黑龙江省绥化市安达市铁西区
产地: 黑龙江省绥化市

营养成分表 Nutrition Facts

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2020
蛋白质	g	0.56	11.24
脂肪	g	1.05	21.12
亚油酸	g	0.10	2.09
α-亚麻酸	mg	15	304
碳水化合物	g	3.0	61.6
维生素			
维生素A	μg RE	23	455
维生素D	μg	0.60	12.12
维生素E	mg α-TE	0.36	7.29
维生素K ₁	μg	1.32	26.62
维生素B ₁	μg	27	538
维生素B ₂	μg	28	564
维生素B ₆	μg	13.8	277.9
维生素B ₁₂	μg	0.084	1.699
烟酸(烟酰胺)	μg	147	2978
叶酸	μg	3.2	65.3
泛酸	μg	120	2425
维生素C	mg	3.2	63.7
生物素	μg	0.74	14.92
胆碱	mg	6.3	126.4
矿物质			
钠	mg	5	103
钾	mg	23	455
铜	μg	11.3	228.7
镁	mg	1.6	32.5
铁	mg	0.30	6.06
锌	mg	0.15	3.03
锰	μg	4.63	93.53
钙	mg	21	430
磷	mg	13	269
碘	μg	5.7	114.3
氯	mg	13	262
硒	μg	0.70	14.08
可选择成分			
肌醇	mg	3.1	62.2
左旋肉碱	mg	0.4	7.6
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.6	92.0
二十碳四烯酸(ARA)	mg	5.0	100.0
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.2	3.3
叶黄素	μg	12	238
核苷酸	mg	1.4	27.4
酪蛋白磷酸肽	mg	3.0	61.6

即食状态下,每100mL含较大婴儿配方羊乳粉:13.8克

anutric
安纽希

安纽希

较大婴儿配方羊乳粉

(6-12月龄, 2段)

净含量: 400g

国食注字YP20240092

重要提示 Reminder

- 含1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯
- 二十二碳六烯酸(DHA)
有助于婴儿视力的正常发育
- 含叶黄素、核苷酸、左旋肉碱、肌醇



冲调方法 Directions

- 冲调前请洗净双手,并将所有用具放在沸水中煮沸至少五分钟,干燥至无水后备用。
- 将煮沸的水冷却至50℃左右(温开水)。
- 参照喂哺表将正确水量倒入消毒过的奶瓶。
- 使用消毒干燥后的量匙参照喂哺表量取正确份量的奶粉加入奶瓶中。先加水后加奶粉。
- 拧紧奶瓶盖后,晃动直至奶粉溶解。在喂哺前请先将奶水滴在手腕上,以确定温度是否适合宝宝饮用后再进行喂哺。


喂哺表 Feeding Chart

下列喂哺表是根据平均的需要量而定。如果发现婴幼儿食用配方奶粉后,有任何过敏反应,应立即停止食用该奶粉,去医院检查,听从医生的建议。一平量匙奶粉净含量约为4.5克。

宝宝月龄	每次喂量		日喂次数
	量匙数	温开水量	
6-12个月	7	210毫升(mL)	4-5

注:6个月龄以上婴儿食用本产品时,须配合添加辅助食品。喂乳或加热后超过2小时的奶液易受污染,请丢弃勿再食用。

全脂羊乳粉原产国:新西兰 New Zealand
产品类别及属性:较大婴儿配方食品(乳基粉状)
食品生产许可证编号:SC10523128150256
产品执行标准:GB 10766-2021
保质期:2年
生产日期、产品批号:见罐底
合格证号:同批号



6 974631 451446

重要提示 Reminder

- 含1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯
二十二碳六烯酸(DHA)
有助于婴儿视力的正常发育
含叶黄素、核苷酸、左旋肉碱、肌醇

营养成分表 Nutrition Facts

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2020	钠	mg	5	103
蛋白质	g	0.56	11.24	钾	mg	23	455
脂肪	g	1.05	21.12	铜	μg	11.3	228.7
亚油酸	g	0.10	2.09	镁	mg	1.6	32.5
α-亚麻酸	mg	15	304	铁	mg	0.30	6.06
碳水化合物	g	3.0	61.6	锌	mg	0.15	3.03
维生素				锰	μg	4.63	93.53
维生素A	μg RE	23	455	钙	mg	21	430
维生素D	μg	0.60	12.12	磷	mg	13	269
维生素E	mg α-TE	0.36	7.29	碘	μg	5.7	114.3
维生素K ₁	μg	1.32	26.62	氯	mg	13	262
维生素B ₁	μg	27	538	硒	μg	0.70	14.08
维生素B ₂	μg	28	564	可选择成分			
维生素B ₆	μg	13.8	277.9	肌醇	mg	3.1	62.2
维生素B ₁₂	μg	0.084	1.699	左旋肉碱	mg	0.4	7.6
烟酸(烟酰胺)	μg	147	2978	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.6	92.0
叶酸	μg	3.2	65.3	二十碳四烯酸(ARA)	mg	5.0	100.0
泛酸	μg	120	2425	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.2	3.3
维生素C	mg	3.2	63.7	叶黄素	μg	12	238
生物素	μg	0.74	14.92	核苷酸	mg	1.4	27.4
胆碱	mg	6.3	126.4	酪蛋白磷酸肽	mg	3.0	61.6
矿物质							

即食状态下,每100mL含较大婴儿配方羊乳粉:13.8克
全脂羊乳粉原产国:新西兰 New Zealand
制造商:黑龙江鞍达实业集团股份有限公司
生产地址:黑龙江省绥化市安达市铁西区
产地:黑龙江省绥化市

产品类别及属性:较大婴儿配方食品(乳基粉状)
食品生产许可证编号:SC10523128150256
产品执行标准:GB 10766-2021
保质期:2年
生产日期、产品批号:见罐底
合格证号:同批号

anutric
安纽希

安纽希

较大婴儿配方羊乳粉

(6-12月龄, 2段)

净含量: 85g

国食注字YP20240092

配料表 Ingredients

脱盐羊乳清粉、全脂羊乳粉、乳糖、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、脱脂羊乳粉、葵花籽油、核桃油、磷脂
花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、酪蛋白磷酸肽、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、肌醇、左旋肉碱、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种HN019
维生素:维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K₁(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸)、D-生物素、氯化胆碱
矿物质:硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸镁、亚硒酸钠、硫酸铜、碘酸钾、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、柠檬酸钠、氯化钾

冲调方法 Directions

- 1 冲调前请洗净双手,并将所有用具放在沸水中煮沸至少五分钟,干燥至无水备用。
- 2 将煮沸的水冷却至50°C左右(温开水)。
- 3 参照喂哺表将正确水量倒入消毒过的奶瓶。
- 4 使用消毒干燥后的量匙参照喂哺表量取正确份量的奶粉加入奶瓶中。先加水后加奶粉。
- 5 拧紧奶瓶盖后,晃动直至奶粉溶解。在喂哺前请先将奶水滴在手腕上,以确定温度是否适合宝宝饮用后再进行喂哺。

喂哺表 Feeding Chart

下列喂哺表是根据平均的需要量而定。如果发现婴幼儿食用配方奶粉后,有任何过敏反应,应立即停止食用该奶粉,去医院检查,听从医生的建议。一平量匙奶粉净含量约为4.5克。

宝宝月龄	每次喂量		日喂次数
	量匙数	温开水量	
6-12个月	7	210毫升(mL)	4-5

注:6个月龄以上婴儿食用本产品时,须配合添加辅助食品。喂哺或加热后超过2小时的奶液易受污染,请丢弃勿再食用。

贮藏方法 Storage method

未开封的奶粉可于常温贮存,并于保质期内食用。开罐后请务必盖严罐盖并置于阴凉干燥处。请勿置于冰箱内。开封后请于一个月内食用完。



扫一扫
关注安纽希官方微信
了解更多知识及活动

全国消费者咨询服务热线:400 998 8509
安纽希中文官网: <http://www.anutric.com>
E-mail: service@anutric.com



6 974631 451385

配料表 Ingredients

脱盐羊乳清粉、全脂羊乳粉、乳糖、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油二酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、脱脂羊乳粉、葵花籽油、核桃油、磷脂

花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、酪蛋白磷酸肽、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、肌醇、左旋肉碱、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种HN019

维生素: 维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K₁(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸)、D-生物素、氯化胆碱

矿物质: 硫酸亚铁、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸铜、碘酸钾、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、柠檬酸钠、氯化钾

贮藏方法 Storage method

未开封的奶粉可于常温贮存,并于保质期内食用。开罐后请务必盖严罐盖并置于阴凉干燥处。请勿置于冰箱内。开封后请于一个月内食用完。

全国消费者咨询服务热线:
400 998 8509

安纽希中文官网:
<http://www.anutric.com>
E-mail: service@anutric.com



扫一扫
关注安纽希官方微信
了解更多知识及活动

制造商: 黑龙江安达实业集团股份有限公司

生产地址: 黑龙江省绥化市安达市铁西区 产地: 黑龙江省绥化市

营养成分表 Nutrition Facts

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2035
蛋白质	g	0.64	13.02
脂肪	g	1.07	21.87
亚油酸	g	0.10	2.10
α-亚麻酸	mg	15	306
碳水化合物	g	2.9	59.1
维生素			
维生素A	μg RE	23	458
维生素D	μg	0.60	12.22
维生素E	mg α-TE	0.36	7.29
维生素K ₁	μg	1.31	26.63
维生素B ₁	μg	27	543
维生素B ₂	μg	28	573
维生素B ₆	μg	13.8	279.9
维生素B ₁₂	μg	0.083	1.689
烟酸(烟酰胺)	μg	148	3015
叶酸	μg	3.2	65.3
泛酸	μg	120	2443
维生素C	mg	3.1	62.8
生物素	μg	0.76	15.51
矿物质			
钠	mg	5	100
钾	mg	23	458
铜	μg	11.4	232.2
镁	mg	1.8	35.7
铁	mg	0.30	6.11
锌	mg	0.15	3.03
钙	mg	21	433
磷	mg	13	271
碘	μg	5.3	108.8
氯	mg	15	315
可选择成分			
硒	μg	0.72	14.64
胆碱	mg	6.2	126.7
锰	μg	4.64	94.36
肌醇	mg	3.2	64.3
左旋肉碱	mg	0.4	7.7
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.1	64.0
二十碳四烯酸(ARA)	mg	4.7	96.0
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.2	3.3
叶黄素	μg	12	238
核苷酸	mg	1.3	27.4
酪蛋白磷酸肽	mg	3.0	61.6

即食状态下, 每100mL含幼儿配方羊乳粉: 13.8克

anutric
安纽希

安纽希

幼儿配方羊乳粉

(12-36月龄, 3段)

净含量: 800g

国食注字YP20240093

重要提示 Reminder

- 含1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯
- 含叶黄素、核苷酸、胆碱
- 含肌醇、左旋肉碱、硒、锰



冲调方法 Directions

- 冲调前请洗净双手, 并将所有用具放在沸水中煮沸至少五分钟, 干燥至无水备用。
- 将煮沸的水冷却至 50°C 左右(温开水)。
- 参照喂哺表将正确水量倒入消毒过的奶瓶。
- 使用消毒干燥后的量匙参照喂哺表量取正确份量的奶粉加入奶瓶中。先加水后加奶粉。
- 拧紧奶瓶盖后, 晃动直至奶粉溶解。在喂哺前请先将奶水滴在手腕上, 以确定温度是否适合宝宝饮用后再进行喂哺。

喂哺表 Feeding Chart

下列的喂哺表是根据平均的需要量而定。如果发现婴幼儿食用配方奶粉后, 有任何过敏反应, 应立即停止食用该奶粉, 去医院检查, 听从医生的建议。一平量匙奶粉净含量约为4.5克。

宝宝月龄	每次喂量		日喂次数
	量匙数	温开水量	
12-36个月	8	240毫升(mL)	3-4

注: 喂剩或加热后超过2小时的奶液易受污染, 请丢弃勿再食用。

全脂羊乳粉原产国: 新西兰 New Zealand
产品类别及属性: 幼儿配方食品(乳基粉状)
食品生产许可证编号: SC10523128150256
产品执行标准: GB 10767-2021
保质期: 2年
生产日期、产品批号: 见罐底
合格证号: 同批号



配料表 Ingredients

脱盐羊乳清粉、全脂羊乳粉、乳糖、食用植物油和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、脱脂羊乳粉、葵花籽油、核桃油、磷脂

花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、酪蛋白磷酸肽、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、肌醇、左旋肉碱、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种HN019

维生素: 维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K₁(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸)、D-生物素、氯化胆碱

矿物质: 硫酸亚铁、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸铜、碘酸钾、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、柠檬酸钠、氯化钾

贮藏方法 Storage method

未开封的奶粉可于常温贮存,并于保质期内食用。开罐后请务必盖严罐盖并置于阴凉干燥处。请勿置于冰箱内。开封后请于一个月内食用完。

全国消费者咨询服务热线:
400 998 8509

安纽希中文官网:
<http://www.anutric.com>
E-mail: service@anutric.com



制造商: 黑龙江鞍达实业集团股份有限公司
生产地址: 黑龙江省绥化市安达市铁西區
产地: 黑龙江省绥化市

营养成分表 Nutrition Facts

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2035
蛋白质	g	0.64	13.02
脂肪	g	1.07	21.87
亚油酸	g	0.10	2.10
α-亚麻酸	mg	15	306
碳水化合物	g	2.9	59.1
维生素			
维生素A	μg RE	23	458
维生素D	μg	0.60	12.22
维生素E	mg α-TE	0.36	7.29
维生素K ₁	μg	1.31	26.63
维生素B ₁	μg	27	543
维生素B ₂	μg	28	573
维生素B ₆	μg	13.8	279.9
维生素B ₁₂	μg	0.083	1.699
烟酸(烟酰胺)	μg	148	3015
叶酸	μg	3.2	65.3
泛酸	μg	120	2443
维生素C	mg	3.1	62.8
生物素	μg	0.76	15.51
矿物质			
钠	mg	5	100
钾	mg	23	458
铜	μg	11.4	232.2
镁	mg	1.8	35.7
铁	mg	0.30	6.11
锌	mg	0.15	3.03
钙	mg	21	433
磷	mg	13	271
碘	μg	5.3	108.8
氯	mg	15	315
可选择成分			
硒	μg	0.72	14.64
胆碱	mg	6.2	126.7
锰	μg	4.64	94.36
肌醇	mg	3.2	64.3
左旋肉碱	mg	0.4	7.7
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.1	64.0
二十碳四烯酸(ARA)	mg	4.7	96.0
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.2	3.3
叶黄素	μg	12	238
核苷酸	mg	1.3	27.4
酪蛋白磷酸肽	mg	3.0	61.6

即食状态下,每100mL含幼儿配方羊乳粉:13.8克

anutric
安纽希

安纽希

幼儿配方羊乳粉

(12-36月龄, 3段)

净含量: 400g

国食注字YP20240093

重要提示 Reminder

- 含1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯
- 含叶黄素、核苷酸、胆碱
- 含肌醇、左旋肉碱、硒、锰



冲调方法 Directions

- 冲调前请洗净双手,并将所有用具放在沸水中煮沸至少五分钟,干燥至无水分备用。
- 将煮沸的水冷却至 50°C 左右(温开水)。
- 参照喂哺表将正确水量倒入消毒过的奶瓶。
- 使用消毒干燥后的量匙参照喂哺表量取正确份量的奶粉加入奶瓶中。先加水后加奶粉。
- 拧紧奶瓶盖后,晃动直至奶粉溶解。在喂哺前请先将奶水滴在手腕上,以确定温度是否适合宝宝饮用后再进行喂哺。

喂哺表 Feeding Chart

下列的喂哺表是根据平均的需要量而定。如果发现婴幼儿食用配方奶粉后,有任何过敏反应,应立即停止食用该奶粉,去医院检查,听从医生的建议。一平量匙奶粉净含量约为4.5克。

宝宝月龄	每次喂量		日喂次数
	量匙数	温开水量	
12-36个月	8	240毫升(mL)	3-4

注:喂乳或加热后超过2小时的奶液易受污染,请丢弃勿再食用。

全脂羊乳粉原产国:新西兰 New Zealand
产品类别及属性:幼儿配方食品(乳基粉状)
食品生产许可证编号:SC10523128150256
产品执行标准:GB 10767-2021
保质期:2年
生产日期、产品批号:见罐底
合格证号:同批号



重要提示 Reminder

- 含1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯
- 含叶黄素、核苷酸、胆碱
- 含肌醇、左旋肉碱、硒、锰



anutric
安纽希



安纽希 幼儿配方羊乳粉 (12-36月龄, 3段)

净含量: 85g

国食注字YP20240093

营养成分表 Nutrition Facts

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2035	钠	mg	5	100
蛋白质	g	0.64	13.02	钾	mg	23	458
脂肪	g	1.07	21.87	铜	µg	11.4	232.2
亚油酸	g	0.10	2.10	镁	mg	1.8	35.7
α-亚麻酸	mg	15	306	铁	mg	0.30	6.11
碳水化合物	g	2.9	59.1	锌	mg	0.15	3.03
维生素				钙	mg	21	433
维生素A	µg RE	23	458	磷	mg	13	271
维生素D	µg	0.60	12.22	碘	µg	5.3	108.8
维生素E	mg α-TE	0.36	7.29	氯	mg	15	315
维生素K ₁	µg	1.31	26.63	可选择成分			
维生素B ₁	µg	27	543	硒	µg	0.72	14.64
维生素B ₂	µg	28	573	胆碱	mg	6.2	126.7
维生素B ₆	µg	13.8	279.9	锰	µg	4.64	94.36
维生素B ₁₂	µg	0.083	1.699	肌醇	mg	3.2	64.3
烟酸(烟酰胺)	µg	148	3015	左旋肉碱	mg	0.4	7.7
叶酸	µg	3.2	65.3	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.1	64.0
泛酸	µg	120	2443	二十碳四烯酸(ARA)	mg	4.7	96.0
维生素C	mg	3.1	62.8	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.2	3.3
生物素	µg	0.76	15.51	叶黄素	µg	12	238
矿物质				核苷酸	mg	1.3	27.4
				酪蛋白磷酸肽	mg	3.0	61.6

即食状态下,每100mL含幼儿配方羊乳粉:13.8克
全脂羊乳粉原产国:新西兰 New Zealand
制造商:黑龙江安达实业集团股份有限公司
生产地址:黑龙江省绥化市安达市铁西区
产地:黑龙江省绥化市

产品类别及属性:幼儿配方食品(乳基粉类)
食品生产许可证编号:SC10523128150256
产品执行标准:GB 10767-2021
保质期:2年
生产日期、产品批号:见罐底
合格证号:同批号

配料表 Ingredients

脱盐羊乳清粉、全脂羊乳粉、乳糖、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、脱脂羊乳粉、葵花籽油、核桃油、磷脂

花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、酪蛋白磷酸肽、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、肌醇、左旋肉碱、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、动物双歧杆菌乳亚种HN019

维生素:维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素K₁(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸)、D-生物素、氯化胆碱

矿物质:硫酸亚铁、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸铜、碘酸钾、硫酸锰、碳酸钾、磷酸三钙、柠檬酸钠、氯化钾

冲调方法 Directions

- 1 冲调前请洗净双手,并将所有用具放在沸水中煮沸至少五分钟,干燥至无水备用。
- 2 将煮沸的水冷却至50°C左右(温开水)。
- 3 参照喂哺表将正确水量倒入消毒过的奶瓶。
- 4 使用消毒干燥后的量匙参照喂哺表量取正确份量的奶粉加入奶瓶中。先加水后加奶粉。
- 5 拧紧奶瓶盖后,晃动直至奶粉溶解。在喂哺前请先将奶水滴在手腕上,以确定温度是否适合宝宝饮用后再进行喂哺。

喂哺表 Feeding Chart

下列的喂哺表是根据平均的需要量而定。如果发现婴幼儿食用配方奶粉后,有任何过敏反应,应立即停止食用该奶粉,去医院检查,听从医生的建议。一平量匙奶粉净含量约为4.5克。

宝宝月龄	每次喂量		日喂次数
	量匙数	温开水量	
12-36个月	8	240毫升(mL)	3-4

注:喂乳或加热后超过2小时的奶液易受污染,请丢弃勿再食用。

贮藏方法 Storage method

未开封的奶粉可于常温贮存,并于保质期内食用。开罐后请务必盖严罐盖并置于阴凉干燥处。请勿置于冰箱内。开封后请于一个月内食用完。



扫一扫
关注安纽希官方微信
了解更多知识及活动



6 974631 451606