

标签编号: AJRY-01

喂哺建议表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(mL)	专用平匙数
0-1周	8	30	1
1-2周	7	60	2
2周-1月龄	6	90	3
1-2月龄	5-6	120	4
2-4月龄	5	150	5
4-6月龄	5	180	6

注: 请使用本品随附专用量匙, 1平匙奶粉≈4.5g

也可根据宝宝个体差异, 按照医生建议, 调整喂哺量。未经医生建议请勿随意改变喂哺量。
请按照喂哺建议表中所建议的比例用量冲调, 未经医生建议请勿改变冲调浓度。

食用方法

1. 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净, 使用前用沸水煮至少5分钟, 待用。
冲调前请清洗双手并保持环境卫生。
2. 将饮用水煮沸5分钟, 冷却至50°C左右。
3. 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量, 将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。
4. 将所需的奶粉加入到奶瓶中。
5. 盖紧奶瓶, 轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
6. 待奶液温度适宜时, 再给宝宝喂奶。

重要声明

对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳, 在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

温馨提示

- 请按以上方法冲调奶粉, 方法不当可能会影响宝宝健康。
- 冲调好的奶液应在1小时内喂完, 剩余的奶液应弃去。
- 冲调好的奶液勿放入微波炉内加热, 以免烫伤。
- 本品含有乳糖和蛋白质, 乳糖不耐和蛋白质过敏体质严重的宝宝慎用或遵医嘱。



咨询热线:(周一至周五9:00-17:00)

400-6798-911

www.inboschina.com @

(官方二维码)

6 1948894 025539

英博®

1 段
净含量: 800克
国食注字 YP20240022



婴儿配方羊奶粉
(0-6月龄, 1段)



配料表

脱盐乳清粉(来源羊乳)、全脂羊奶粉、食用植物油和油(1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、菜籽油、棕榈仁油、葵花籽油、磷脂)、低聚果糖、聚葡萄糖、磷脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氯钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、碘酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸(DHA)、花生四烯酸(ARA)、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸胞苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

生产商: 黑龙江安嘉乳业有限公司

地 址: 黑龙江省铁力农场场直二八九大街9号

产 地: 黑龙江省伊春市

食品生产许可证编号: SC10523300800298

营销热线: 0571-86852110

产品标准代号: GB 10765-2021

产品类别、属性: 乳基婴儿配方乳粉

保质期: 24个月

批号、生产日期及保质期(至): 见罐底

检验合格证号: 同批号

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2065
蛋白质	g	0.58	11.90
脂肪	g	1.23	25.30
亚油酸	g	0.15	3.10
α-亚麻酸	mg	24	496
碳水化合物	g	2.5	52.4
维生素			
维生素A	μg RE	21	425
维生素D	μg	0.57	11.79
维生素E	μg α-TE	0.28	5.76
维生素K	μg	2.12	43.75
维生素B ₁	μg	19	402
维生素B ₂	μg	39	796
维生素B ₆	μg	23.1	476.8
维生素B ₁₂	μg	0.079	1.630
烟酸(烟酰胺)	μg	203	4202
叶酸	μg	5.2	106.8
泛酸	μg	182	3767
维生素C	mg	3.7	76.0
生物素	μg	1.00	20.70
胆碱	mg	8.4	174.0
矿物质			
钠	mg	7	145
钾	mg	22	450
铜	μg	20.3	419.0
镁	mg	2.3	47.7
铁	mg	0.18	3.82
锌	mg	0.18	3.78
锰	mg	8.09	167.00
钙	mg	16	326
磷	mg	11	221
碘	μg	5.7	117.5
氯	mg	17	342
硒	μg	1.02	21.00
可选择成分			
肌醇	mg	2.9	60.0
牛磺酸	mg	1.5	30.0
左旋肉碱	mg	0.6	11.5
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.1	84.5
二十碳四烯酸(ARA)	mg	4.8	99.2
低聚果糖	mg	135.59	2800.00
聚葡萄糖	mg	82.32	1700.00
1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	g	0.22	4.5
叶黄素	mg	5.0	103.0
核苷酸	mg	1.0	20.0
乳铁蛋白	mg	1.0	20.0

贮藏方法: 本产品应贮藏于阴凉干燥处, 勿放入冰箱内;
每次食用后及时将罐口封严, 开罐后请在一个月内食用完毕。

标签编号: AJRY-02

喂哺建议表			
月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(mL)	专用平匙数
0-1周	8	30	1
1-2周	7	60	2
2周-1月龄	6	90	3
1-2月龄	5-6	120	4
2-4月龄	5	150	5
4-6月龄	5	180	6

注:请使用本品随附专用量匙,1平匙奶粉≈4.5g

也可根据宝宝个体差异,按照医生建议,调整喂哺量。未经医生建议请勿随意改变喂哺量。
请按照喂哺建议表中所建议的比例用量冲调,未经医生建议请勿改变冲调浓度。

英博®



食用方法


1. 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净, 使用前用沸水煮至少5分钟, 待用。
冲调前请清洗双手并保持环境卫生。
2. 将饮用水煮沸5分钟, 冷却至50℃左右。
3. 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量, 将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。
4. 将所需的奶粉加入到奶瓶中。
5. 盖紧奶瓶, 轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
6. 待奶液温度适宜时, 再给宝宝喂奶。

重要声明

对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳, 在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

温馨提示

- 请按以上方法冲调奶粉, 方法不当可能会影响宝宝健康。
- 冲调好的奶液应在1小时内喂哺完, 剩余的奶液应弃去。
- 冲调好的奶液勿放入微波炉内加热, 以免烫伤。
- 本品含有乳糖和蛋白质, 乳糖不耐和蛋白质过敏体质严重的宝宝慎用或遵医嘱。



咨询热线:(周一至周五9:00-17:00)
400-6798-911
www.inboschina.com

6 948894 025676

1 段
净含量:500克
国食注字 YP20240022

婴儿配方羊奶粉
(0-6月龄,1段)

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2065
蛋白质	g	0.58	11.90
脂肪	g	1.23	25.30
亚油酸	g	0.15	3.10
α-亚麻酸	mg	24	496
碳水化合物	g	2.5	52.4
维生素			
维生素A	μg RE	21	425
维生素D	μg	0.57	11.79
维生素E	mg α-TE	0.28	5.76
维生素K ₁	μg	2.12	43.75
维生素B ₁	μg	19	402
维生素B ₂	μg	39	796
维生素B ₆	μg	23.1	476.8
维生素B ₁₂	μg	0.079	1.630
烟酸(烟酰胺)	μg	203	4202
叶酸	μg	5.2	106.8
泛酸	μg	182	3767
维生素C	mg	3.7	76.0
生物素	μg	1.00	20.70
胆碱	mg	8.4	174.0
矿物质			
铜	mg	7	145
锌	mg	22	450
铁	mg	20.3	419.0
镁	mg	2.3	47.7
碘	mg	0.18	3.82
硒	mg	0.18	3.78
钙	mg	8.09	167.00
磷	mg	16	326
钠	mg	11	221
氯	mg	5.7	117.5
钾	mg	17	342
溴	mg	1.02	21.00
可选择成分			
肌醇	mg	2.9	60.0
牛磺酸	mg	1.5	30.0
左旋肉碱	mg	0.6	11.5
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.1	84.5
二十碳四烯酸(ARA)	mg	4.8	99.2
低聚果糖	mg	135.59	2800.00
聚葡萄糖	mg	82.32	1700.00
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.22	4.5
叶黄素	mg	5.0	103.0
核苷酸	mg	1.0	20.0
乳铁蛋白	mg	1.0	20.0

贮藏方法: 本产品应贮藏于阴凉干燥处, 勿放入冰箱内;
每次食用后应及时将罐口封严, 开罐后请在一个月内食用完毕。

生产商: 黑龙江安嘉乳业有限公司
地 址: 黑龙江省铁力农场直二八九大街9号
产 地: 黑龙江省伊春市
食品生产许可证编号: SC10523300800298
营销热线: 0571-86852110
产品标准代号: GB 10765-2021
产品类别、属性: 乳基婴儿配方乳粉
保质期: 24个月
批号、生产日期及保质期(至): 见罐底
检验合格证号、同批号

喂哺建议表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(mL)	专用平匙数
0-1周	8	30	1
1-2周	7	60	2
2周-1月龄	6	90	3
1-2月龄	5-6	120	4
2-4月龄	5	150	5
4-6月龄	5	180	6

注: 请使用本品随附专用量匙, 1平匙奶粉≈4.5g

也可根据宝宝个体差异, 按照医生建议, 调整喂哺量。未经医生建议请勿随意改变喂哺量。
请按照喂哺建议表中所建议的比例用量冲调, 未经医生建议请勿改变冲调浓度。

食用方法

1. 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净, 使用前用沸水煮至少5分钟, 待用。
冲调前请清洗双手并保持环境卫生。
2. 将饮用水煮沸5分钟, 冷却至50°C左右。
3. 依据宝宝月龄及喂哺的推荐量, 将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。
4. 将所需的奶粉加入到奶瓶中。
5. 盖紧奶瓶, 轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
6. 待奶液温度适宜时, 再给宝宝喂奶。

重要声明

对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳, 在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

温馨提示

- 请按以上方法冲调奶粉, 方法不当可能会影响宝宝健康。
- 冲调好的奶液应在1小时内喂哺完, 剩余的奶液应弃去。
- 冲调好的奶液勿放入微波炉内加热, 以免烫伤。
- 本品含有乳糖和蛋白质, 乳糖不耐和蛋白质过敏体质严重的宝宝慎用或遵医嘱。



咨询热线(周一至周五9:00-17:00)

400-6798-911

www.inboschina.com

(官方二维码) 6 1948894 025669

英博®



1
段

净含量:100克
国食注字 YP20240022

婴儿配方羊奶粉
(0-6月龄, 1段)



配料表

脱盐乳清粉(来源羊乳)、全脂羊奶粉、食用植物油和油(1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯、菜籽油、棕榈仁油、葵花籽油、磷脂)、低聚果糖、聚葡萄糖、磷脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氯钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、碘酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸(DHA)、花生四烯酸(ARA)、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

生产商: 黑龙江安嘉乳业有限公司

地址: 黑龙江省铁力农场场直二八九大街9号

产地: 黑龙江省伊春市

食品生产许可证编号: SC10523300800298

营销热线: 0571-86852110

产品标准代号: GB 10765-2021

产品类别/属性: 乳基婴儿配方奶粉

保质期: 24个月

批号、生产日期及保质期(至): 见罐底

检验合格证号: 同批号

贮藏方法: 本产品应贮藏于阴凉干燥处, 勿放入冰箱内;
每次食用后及时将罐口封严, 开罐后请在一个月内食用完毕。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2065
蛋白质	g	0.58	11.90
脂肪	g	1.23	25.30
亚油酸	g	0.15	3.10
α-亚麻酸	mg	24	496
碳水化合物	g	2.5	52.4
维生素			
维生素A	μg RE	21	425
维生素D	μg	0.57	11.79
维生素E	mg α-TE	0.28	5.76
维生素K ₁	μg	2.12	43.75
维生素D ₃	μg	19	402
维生素B ₂	μg	39	796
维生素B ₆	μg	23.1	476.8
维生素B ₁₂	μg	0.079	1.630
烟酸(烟酰胺)	mg	203	4202
叶酸	μg	5.2	106.8
泛酸	mg	182	3767
维生素C	mg	3.7	76.0
生物素	μg	1.00	20.70
胆碱	mg	8.4	174.0
矿物质			
钠	mg	7	145
钾	mg	22	450
铜	μg	20.3	419.0
镁	mg	2.3	47.7
铁	mg	0.18	3.82
锌	mg	0.18	3.78
锰	μg	8.09	167.00
钙	mg	16	326
磷	mg	11	221
碘	μg	5.7	117.5
镁	mg	17	342
氯	μg	1.02	21.00
可选择成分			
肌醇	mg	2.9	60.0
牛磺酸	mg	1.5	30.0
左旋肉碱	mg	0.6	11.5
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.1	84.5
二十碳四烯酸(ARA)	mg	4.8	99.2
低聚果糖	mg	135.59	2800.00
聚葡萄糖	mg	82.32	1700.00
1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯	g	0.22	4.5
叶黄素	μg	5.0	103.0
核苷酸	mg	1.0	20.0
乳铁蛋白	mg	1.0	20.0

喂哺建议表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(mL)	专用平匙数
6-7个月	5	150	5
7-10个月	4-5	150-180	5-6
10-12个月	4	180	5

注: 请使用本品随附专用量匙, 1平匙奶粉≈4.5g

也可根据宝宝个体差异, 按照医生建议, 调整喂哺量。未经医生建议请勿随意改变喂哺量。
请按照喂哺建议表中所建议的比例用量冲调, 未经医生建议请勿改变冲调浓度。

食用方法

1. 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净, 使用前用沸水煮至少5分钟, 待用。
冲调前请清洗双手并保持环境卫生。
2. 将饮用水煮沸5分钟, 冷却至50°C左右。
3. 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量, 将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。
4. 将所需的奶粉加入到奶瓶中。
5. 盖紧奶瓶, 轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
6. 待奶液温度适宜时, 再给宝宝喂奶。

重要声明

6个月龄以上婴儿食用本产品时, 须配合添加辅助食品。

温馨提示

- 请按以上方法冲调奶粉, 方法不当可能会影响宝宝健康。
- 冲调好的奶液应在1小时内喂哺完, 剩余的奶液应弃去。
- 冲调好的奶液勿放入微波炉内加热, 以免烫伤。
- 本品含有乳糖和蛋白质, 乳糖不耐和蛋白质过敏体质严重的宝宝慎用或遵医嘱。



咨询热线:(周一至周五9:00-17:00)

400-6798-911

www.inboschina.com @

(官方二维码) 6 1948894 025522

英博®

2 段
净含量: 800克
国食注字 YP20240023较大婴儿配方羊奶粉
(6-12月龄, 2段)

配料表

脱盐乳清粉(来源羊乳)、全脂羊奶粉、食用植物油和油(1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯、菜籽油、棕榈仁油、葵花籽油、磷脂)、低聚果糖、聚葡萄糖、磷脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氯钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、碘酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸(DHA)、花生四烯酸(ARA)、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳业种Bb-12。

生产商: 黑龙江安嘉乳业有限公司
地址: 黑龙江省铁力农场场直二八大街9号
产地: 黑龙江省伊春市
食品生产许可证编号: SC10523300800298
营销热线: 0571-86852110
产品标准代号: GB 10766-2021
产品类别、属性: 乳基较大婴儿配方乳粉
保质期: 24个月
批号、生产日期及保质期(至): 见罐底
检验合格证号: 同批号

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1974
蛋白质	g	0.68	13.40
脂肪	g	1.06	20.90
亚油酸	g	0.10	2.07
α-亚麻酸	mg	18	349
碳水化合物	g	2.8	55.1
维生素			
维生素A	μg RE	23	453
维生素D	μg	0.55	10.95
维生素E	mg α-TE	0.23	4.48
维生素K	μg	2.04	40.30
维生素B ₁	μg	26	505
维生素B ₂	μg	42	822
维生素B ₆	μg	27.7	546.0
维生素B ₉	μg	0.082	1.620
烟酸(烟酰胺)	μg	176	3480
叶酸	μg	3.6	71.4
泛酸	μg	170	3364
维生素C	mg	3.7	73.1
生物素	μg	0.91	18.00
胆碱	mg	7.1	140.0
矿物质			
钠	mg	6	117
钾	mg	26	508
铜	mg	16.1	317.8
镁	mg	1.9	38.1
铁	mg	0.28	5.53
锌	mg	0.20	3.97
锰	mg	8.31	164.00
钙	mg	20	395
磷	mg	13	261
碘	mg	5.9	117.1
氯	mg	18	351
硒	mg	0.89	17.50
可选择成分			
肌醇	mg	3.0	60.0
牛磺酸	mg	1.5	30.0
左旋肉碱	mg	0.6	12.4
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.2	82.8
二十碳四烯酸(ARA)	mg	5.0	98.6
低聚果糖	mg	141.84	2800.00
聚葡萄糖	mg	86.12	1700.00
1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯	g	0.14	2.8
叶黄素	μg	10.1	200.0
核苷酸	mg	1.0	20.0
乳铁蛋白	mg	1.0	20.0

贮藏方法: 本产品应贮藏于阴凉干燥处, 勿放入冰箱内;
每次食用后及时将罐口封严, 开罐后请在一个月内食用完毕。

标签编号: AJRY-05

喂养建议表			
月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(mL)	专用平匙数
6-7个月	5	150	5
7-10个月	4-5	150-180	5-6
10-12个月	4	180	5

注:请使用本品随附专用量匙,1平匙奶粉≈4.5g

也可根据宝宝个体差异,按照医生建议,调整喂哺量。未经医生建议请勿随意改变喂哺量。
请按照喂哺建议表中所建议的比例用量冲调,未经医生建议请勿改变冲调浓度。

食用方法


1. 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净,使用前用沸水煮至少5分钟,待用。
冲调前请清洗双手并保持环境卫生。
2. 将饮用水煮沸5分钟,冷却至50℃左右。
3. 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量,将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。
4. 将所需的奶粉加入到奶瓶中。
5. 盖紧奶瓶,轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
6. 待奶液温度适宜时,再给宝宝喂奶。

重要声明

6个月龄以上婴儿食用本产品时,须配合添加辅助食品。

温馨提示

- 请按以上方法冲调奶粉,方法不当可能会影响宝宝健康。
- 冲调好的奶液应在1小时内喂哺完,剩余的奶液应弃去。
- 冲调好的奶液勿放入微波炉内加热,以免烫伤。
- 本品含有乳糖和蛋白质,乳糖不耐和蛋白质过敏体质严重的宝宝慎用或遵医嘱。



咨询热线:(周一至周五9:00-17:00)
400-6798-911

www.inboschina.com

(官方二维码)

61948894025683

2段
净含量:500克
国食注字 YP20240023

英博®



较大婴儿配方羊奶粉
(6-12月龄,2段)



配料表

脱盐乳清粉(来源羊乳)、全脂羊奶粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、菜籽油、棕榈仁油、葵花籽油、磷脂)、低聚果糖、聚葡萄糖、磷脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl- α -醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫酸素、核黄素、盐酸吡哆醇、氯化钴、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、柠檬酸钠、氯化钾、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸(DHA)、花生四烯酸(ARA)、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

生产商:黑龙江安嘉乳业有限公司
地址:黑龙江省铁力农场场直二八九大街9号
产地:黑龙江省伊春市
食品生产许可证编号:SC10523300800298
营销热线:0571-86852110
产品标准代号:GB 10766-2021
产品类别、属性:乳基较大婴儿配方乳粉
保质期:24个月
批号、生产日期及保质期(至):见罐底
检验合格证号、同批号

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1974
蛋白质	g	0.68	13.40
脂肪	g	1.06	20.90
亚油酸	g	0.10	2.07
α -亚麻酸	mg	18	349
碳水化合物	g	2.8	55.1
维生素			
维生素A	μg RE	23	453
维生素D	μg	0.55	10.95
维生素E	mg α-TE	0.23	4.48
维生素K ₁	μg	2.04	40.30
维生素B ₁	μg	26	505
维生素B ₂	μg	42	822
维生素B ₆	μg	27.7	546.0
维生素B ₁₂	μg	0.082	1.620
烟酸(烟酰胺)	μg	176	3480
叶酸	μg	3.6	71.4
泛酸	μg	170	3364
维生素C	mg	3.7	73.1
生物素	μg	0.91	18.00
胆碱	mg	7.1	140.0
矿物质			
钠	mg	6	117
钾	mg	26	508
镁	mg	16.1	317.8
钙	mg	1.9	38.1
锌	mg	0.28	5.53
铁	mg	0.20	3.97
铜	mg	8.31	164.00
锰	mg	20	395
碘	mg	13	261
氯	mg	5.9	117.1
硒	mg	18	351
可选择成分			
肌醇	mg	3.0	60.0
牛磺酸	mg	1.5	30.0
左旋肉碱	mg	0.6	12.4
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.2	82.8
二十碳四烯酸(ARA)	mg	5.0	98.6
低聚果糖	mg	141.84	2800.00
聚葡萄糖	mg	86.12	1700.00
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.14	2.8
叶黄素	μg	10.1	200.0
核苷酸	mg	1.0	20.0
乳铁蛋白	mg	1.0	20.0

贮藏方法:本产品应贮藏于阴凉干燥处,勿放入冰箱内;
每次食用后及时将罐口封严,开罐后请在一个月内食用完毕。

喂哺建议表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(mL)	专用平匙数
12-24个月	2-3	180-210	6-7
24-36个月	2	210	7
注: 请使用本品随附专用量匙, 1平匙奶粉约4.5g。			

也可根据宝宝个体差异, 按照医生建议, 调整喂哺量。未经医生建议请勿随意改变喂哺量。
请按照喂哺建议表中所建议的比例用量冲调, 未经医生建议请勿改变冲调浓度。

食用方法

1. 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净, 使用前用沸水煮至少5分钟, 待用。
冲调前请清洗双手并保持环境卫生。
2. 将饮用水煮沸5分钟, 冷却至50°C左右。
3. 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量, 将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。
4. 将所需的奶粉加入到奶瓶中。
5. 盖紧奶瓶, 轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
6. 待奶液温度适宜时, 再给宝宝喂奶。

温馨提示

- 请按以上方法冲调奶粉, 方法不当可能会影响宝宝健康。
- 冲调好的奶液应在1小时内喂哺完, 剩余的奶液应丢弃。
- 冲调好的奶液勿放入微波炉内加热, 以免烫伤。
- 本品含有乳糖和蛋白质, 乳糖不耐和蛋白质过敏体质严重的宝宝慎用或遵医嘱。



咨询热线:(周一至周五9:00-17:00)
400-6798-911

[@](http://www.inboschina.com)

6 948894 025515

英博®

3 段
净含量: 800克
国食注字 YP20240024



幼儿配方羊奶粉
(12-36月龄, 3段)



配料表

脱盐乳清粉(来源羊乳)、全脂羊奶粉、食用植物油和油(1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯、菜籽油、棕榈仁油、葵花籽油、磷脂)、低聚果糖、聚葡萄糖、磷脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、醋酸胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、碘酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸(DHA)、花生四烯酸(ARA)、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

生产商: 黑龙江安嘉乳业有限公司
地址: 黑龙江省铁力农场场直二八九大街9号
产地: 黑龙江省伊春市
食品生产许可证编号: SC10523300800298
营销热线: 0571-86852110
产品标准代号: GB 10767-2021
产品类别、属性: 乳基幼儿配方乳粉
保质期: 24个月
批号、生产日期及保质期(至): 见罐底
检验合格证号: 同批号

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1994
蛋白质	g	0.74	14.70
脂肪	g	1.10	21.90
亚油酸	g	0.10	1.91
α-亚麻酸	mg	17	341
碳水化合物	g	2.6	52.8
维生素			
维生素A	μg RE	24	480
维生素D	μg	0.56	11.10
维生素E	mg α-TE	0.22	4.45
维生素K ₁	μg	2.03	40.40
维生素B ₁	μg	25	503
维生素B ₂	μg	41	819
维生素B ₆	μg	27.0	538.0
维生素B ₁₂	μg	0.079	1.580
烟酸(烟酰胺)	μg	179	3560
叶酸	μg	4.4	87.5
泛酸	μg	172	3437
维生素C	mg	3.6	72.7
生物素	μg	1.16	23.20
矿物质			
钠	mg	6	126
钾	mg	27	535
铜	μg	15.7	314.0
镁	mg	2.1	42.0
铁	mg	0.31	6.27
锌	mg	0.20	4.00
钙	mg	21	427
磷	mg	15	308
碘	μg	5.9	118.2
氯	mg	20	400
可选择成分			
硒	μg	0.90	17.85
胆碱	mg	8.7	174.0
锰	μg	7.94	158.40
肌醇	mg	3.0	60.0
牛磺酸	mg	1.5	30.0
左旋肉碱	mg	0.6	12.7
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	1.0	20.0
二十碳四烯酸(ARA)	mg	1.4	27.5
低聚果糖	mg	140.42	2800.00
聚葡萄糖	mg	85.26	1700.00
1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯	g	0.14	2.7
叶黄素	μg	10.0	200.0
核苷酸	mg	1.0	20.0
乳铁蛋白	mg	1.0	20.0
贮藏方法:			
贮藏方法:			

贮藏方法: 本产品应贮藏于阴凉干燥处, 勿放入冰箱内;
每次食用后及时将罐口封严, 开罐后请在一个月内食用完毕。

标签编号: AJRY-07

喂哺建议表			
月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(mL)	专用平匙数
12-24个月	2-3	180-210	6-7
24-36个月	2	210	7

注: 请使用本品随附专用量匙, 1平匙奶粉≈4.5g

也可根据宝宝个体差异, 按照医生建议, 调整喂哺量。未经医生建议请勿随意改变喂哺量。
请按照喂哺建议表中所建议的比例用量冲调, 未经医生建议请勿改变冲调浓度。

英博®

信 悅




食用方法

1. 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净, 使用前用沸水煮至少5分钟, 待用。
冲调前请清洗双手并保持环境卫生。
2. 将饮用水煮沸5分钟, 冷却至50℃左右。
3. 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量, 将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。
4. 将所需的奶粉加入到奶瓶中。
5. 盖紧奶瓶, 轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
6. 待奶液温度适宜时, 再给宝宝喂奶。

温馨提示

- 请按以上方法冲调奶粉, 方法不当可能会影响宝宝健康。
- 冲调好的奶液应在1小时内喂哺完, 剩余的奶液应弃去。
- 冲调好的奶液勿放入微波炉内加热, 以免烫伤。
- 本品含有乳糖和蛋白质, 乳糖不耐和蛋白质过敏体质严重的宝宝慎用或遵医嘱。



咨询热线:(周一至周五9:00-17:00)
400-6798-911

www.inboschina.com

(官方二维码)

6 948894 025690

3 段
净含量:500克
国食注字 YP20240024

幼儿配方羊奶粉
(12-36月龄, 3段)



配料表

脱盐乳清粉(来源羊乳)、全脂羊奶粉、食用植物油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、菜籽油、棕榈仁油、葵花籽油、磷脂)、低聚果糖、聚葡萄糖、磷脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、醋钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸(DHA)、花生四烯酸(ARA)、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

生产商: 黑龙江安嘉乳业有限公司
地址: 黑龙江省铁力农场场直二八大街9号
产地: 黑龙江省伊春市
食品生产许可证编号: SC10523300800298
营销热线: 0571-86852110
产品标准代号: GB 10767-2021
产品类别、属性: 乳基幼儿配方乳粉
保质期: 24个月
批号、生产日期及保质期(至): 见罐底
检验合格证号: 同批号

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1994
蛋白质	g	0.74	14.70
脂肪	g	1.10	21.90
亚油酸	g	0.10	1.91
α-亚麻酸	mg	17	341
碳水化合物	g	2.6	52.8
维生素			
维生素A	μg RE	24	480
维生素D	μg	0.56	11.10
维生素E	mg α-TE	0.22	4.45
维生素K ₁	μg	2.03	40.40
维生素B ₁	μg	25	503
维生素B ₂	μg	41	819
维生素B ₆	μg	27.0	538.0
维生素B ₁₂	μg	0.079	1.580
烟酸(烟酰胺)	μg	179	3560
叶酸	μg	4.4	87.5
泛酸	μg	172	3437
维生素C	mg	3.6	72.7
生物素	μg	1.16	23.20
矿物质			
钠	mg	6	126
钾	mg	27	535
铜	μg	15.7	314.0
镁	mg	2.1	42.0
铁	mg	0.31	6.27
锌	mg	0.20	4.00
钙	mg	21	427
镁	mg	15	308
磷	mg	5.9	118.2
碘	mg	20	400
可选择成分			
酒	μg	0.90	17.85
胆碱	mg	8.7	174.0
镁	mg	7.94	158.40
肌醇	mg	3.0	60.0
牛磺酸	mg	1.5	30.0
左旋肉碱	mg	0.6	12.7
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	1.0	20.0
二十碳四烯酸(ARA)	mg	1.4	27.5
低聚果糖	mg	140.42	2800.00
聚葡萄糖	mg	85.26	1700.00
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.14	2.7
叶黄素	mg	10.0	200.0
核苷酸	mg	1.0	20.0
乳铁蛋白	mg	1.0	20.0

贮藏方法: 本产品应贮藏于阴凉干燥处, 勿放入冰箱内;
每次食用后应及时将罐口封严, 开罐后请在一个月内食用完毕。

喂哺建议表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(mL)	专用平匙数
0-1周	8	30	1
1-2周	7	60	2
2周-1月龄	6	90	3
1-2月龄	5-6	120	4
2-4月龄	5	150	5
4-6月龄	5	180	6

注: 请使用本品随附专用量匙, 1平匙奶粉≈4.5g

也可根据宝宝个体差异, 按照医生建议, 调整喂哺量。未经医生建议请勿随意改变喂哺量。
请按照喂哺建议表中所建议的比例用量冲调, 未经医生建议请勿改变冲调浓度。

食用方法

1. 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净, 使用前用沸水煮至少5分钟, 待用。
2. 将饮用水煮5分钟, 冷却至50°C左右。
3. 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量, 将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。
4. 将所需的奶粉加入到奶瓶中。
5. 盖紧奶瓶, 轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
6. 待奶液温度适宜时, 再给宝宝喂奶。

重要声明

对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳, 在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

温馨提示

- 请按以上方法冲调奶粉, 方法不当可能会影响宝宝健康。
- 冲调好的奶液应在1小时内喂完, 剩余的奶液应弃去。
- 冲调好的奶液勿放入微波炉内加热, 以免烫伤。
- 本品含有乳糖和蛋白质, 乳糖不耐和蛋白质过敏体质严重的宝宝慎用或遵医嘱。



(官方二维码)



咨询热线:(周一至周五9:00-17:00)
400-6798-911
www.inboschina.com @

英博®

信顺


英博 SEBILER®



بۇ اۇلار رسېلىن سۇ جەھەرى
婴儿配方奶粉
(0~6 ئايللىقچە ماں چىلىدۇ, 1-باقىچە)
(0-6月龄, 1段)

1
段

净含量: 800克
国食注字 YP20240025



配料表

脱盐乳清粉、全脂奶粉、食用植物调和油 (1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、菜籽油、棕榈仁油、葵花籽油、磷脂)、乳糖、无水奶油、低聚果糖、浓缩乳清蛋白粉、聚葡萄糖、乳清蛋白粉、水解乳清蛋白粉、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫酸胺、核黄素、盐酸吡哆醇、氯钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、柠檬酸钠、氯化钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸 (DHA)、花生四烯酸 (ARA)、叶黄素、核苷酸 (5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12。

项目	单位	每100g برىكى نەچىسىدە فۈرۈنلەنلىكىست	每100kJ برىكى نەچىسىدە فۈرۈنلەنلىكىست	每100g برىكى نەچىسىدە فۈرۈنلەنلىكىست
能量	kJ	100	2067	نېتىپىك
蛋白质	g	0.54	11.10	ئاپسال
乳清蛋白	g	0.35	7.25	سۈنۈت ئاپسال
脂肪	g	1.25	25.90	مۇتى
亚油酸	g	0.14	2.82	مۇتى سەكلىنىڭ
α-亚麻酸	mg	21	430	لەپەپلەن سەكلىنىڭ
碳水化合物	g	2.5	52.0	كۈزۈن سەكلىنىڭ
维生素				ئەشىن
维生素A	μg RE	18	372	ئەشىن
维生素D	μg	0.57	11.81	ئەشىن
维生素E	mg α-TE	0.24	4.90	ئەشىن
维生素K ₁	μg	2.31	47.80	ئەشىن
维生素B ₁	μg	20	422	ئەشىن
维生素B ₂	μg	43	892	ئەشىن
维生素B ₆	μg	19.4	401.0	ئەشىن
维生素B ₁₂	μg	0.078	1.620	ئەشىن
烟酸(烟酰胺)	mg	202	4172	تەكۈن سەكلىنىڭ
叶酸	μg	5.1	104.5	قۇن سەكلىنىڭ
泛酸	μg	170	3519	قۇن سەكلىنىڭ
维生素C	mg	3.7	77.5	ئەشىن
生物素	μg	1.00	20.70	بىولېلىكىست
胆碱	mg	6.5	135.0	چۈن
矿物质				سەرلىقىدا
钠	mg	9	180	نەتىپىك
钾	mg	18	377	كەپ
镁	μg	18.3	378.0	سەس
镁	mg	1.8	36.2	مەگىز
铁	mg	0.19	3.96	تەپلىر
锌	mg	0.19	3.94	سەنگ
锰	mg	4.64	96.00	مەڭلەن
钙	mg	16	326	كەلەپى
磷	mg	11	234	فۈرۈر
碘	μg	4.4	90.0	دۈر
氯	mg	19	383	خۇر
硒	μg	0.97	20.00	پەلەن
可选择成分				خالىقىدا تەركىلىپ
肌醇	mg	1.8	37.9	ئۇزىزلىك
牛磺酸	mg	2.1	44.0	ئۇزىز
左旋肉碱	mg	0.4	9.1	پەلەن كەپ
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.0	83.7	DHA
二十碳四烯酸(ARA)	mg	4.4	90.4	ARA
低聚果糖	mg	135.46	2800.00	تەپلىرىن مېزىن
聚葡萄糖	mg	82.24	1700.00	پەلەن كەپ
1,3-二油酸				دەپلىپىك كەپ
2-棕榈酸甘油三酯	g	0.17	3.5	ئىشىزلىك بىلەن
叶黄素	μg	4.0	82.0	كەپلىپ
核苷酸	mg	1.0	21.0	ئۆكۈزىن
乳铁蛋白	mg	1.0	20.0	لەپەپلەن ئاپسال

贮藏方法: 本产品应贮藏于阴凉干燥处, 勿放入冰箱内;
每次食用后及时将罐口封严, 开罐后请在一个月内食用完毕。

喂哺建议表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(mL)	专用平匙数
0-1周	8	30	1
1-2周	7	60	2
2周-1月龄	6	90	3
1-2月龄	5-6	120	4
2-4月龄	5	150	5
4-6月龄	5	180	6

注: 使用本品随附专用量匙, 1平匙奶粉≈4.5g

也可根据宝宝个体差异, 按照医生建议, 调整喂哺量。未经医生建议, 请勿随意改变喂哺量。
请按照喂哺建议表中所建议的比例用量冲调, 未经医生建议, 请勿改变冲调浓度。

食用方法


1. 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净, 使用前用沸水煮至少5分钟, 待用。
冲调前请清洗双手并保持环境卫生。
2. 将饮用水煮沸5分钟, 冷却至50°C左右。
3. 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量, 将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。
4. 将所需的奶粉加入到奶瓶中。
5. 盖紧奶瓶, 轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
6. 待奶液温度适宜时, 再给宝宝喂奶。

重要声明

对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳, 在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

温馨提示

- 请按以上方法冲调奶粉, 方法不当可能会影响宝宝健康。
- 冲调好的奶液应在1小时内喂哺完, 剩余的奶液应弃去。
- 冲调好的奶液勿放入微波炉内加热, 以免烫伤。
- 本品含有乳糖和蛋白质, 乳糖不耐和蛋白质过敏体质的宝宝慎用或遵医嘱。



咨询热线(周一至周五9:00-17:00)
400-6798-911
www.inboschina.com

6 948894 025713
(官方二维码)

英博®

信顺


SEEBELER



بۇغاچاڭ سۈپە جەھىز
婴儿配方奶粉
(0-6月龄, 1段)
(0-6月龄, 1段)

1 段

净含量: 500克
国食注字 YP20240025



配料表

脱盐乳清粉、全脂奶粉、食用植物调和油(1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯、菜籽油、棕榈油、葵花籽油、磷脂)、乳糖、无水奶油、低聚果糖、浓缩乳清蛋白粉、聚葡萄糖、乳清蛋白粉、水解乳清蛋白粉、醋酸初黄酮、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氯钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、柠檬酸钠、氯化钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、磷酸钙、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸(DHA)、花生四烯酸(ARA)、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳杆菌Bb-12。

生产商: 黑龙江安嘉乳业有限公司
地址: 黑龙江省铁力农场场直二八九大街9号
产地: 黑龙江省伊春市
食品生产许可证编号: SC10523300800298
营销热线: 0571-86652110
产品标准代号: GB 10765-2021
产品类别、属性: 乳基婴儿配方乳粉
保质期: 24个月
批号、生产日期及保质期(至): 见罐底
检验合格证号: 同批号

营养成分表		
项目	单位 每100kJ kJ	
能量	100kJ 2067	
蛋白质	9 0.54 9 0.35	
脂肪	9 1.25 9 2.82	
亚油酸	mg 21 mg 430	
α-亚麻酸	mg 2.5 mg 52.0	
碳水化合物	9 2.5 9 5.0	
维生素	μg RE 维生素A 维生素D 维生素E 维生素K 维生素B ₁ 维生素B ₂ 维生素B ₆ 维生素B ₁₂ 烟酸(烟酰胺) 叶酸 泛酸 维生素C 生物素 胆碱 矿物质	18 372 μg 0.57 11.81 mg α-TE 0.24 4.90 μg 2.31 47.80 μg 20 422 μg 43 892 μg 19.4 401.0 μg 0.078 1.620 4712 μg 5.1 104.5 μg 170 3519 μg 3.7 77.5 μg 1.00 20.70 μg 6.5 135.0 mg 9 180 mg 18 377 μg 18.3 378.0 mg 1.8 36.2 mg 0.19 3.96 μg 0.19 3.94 μg 4.64 96.00 mg 16 326 mg 11 234 μg 4.4 90.0 μg 19 383 μg 0.97 20.00 ملائج نور سيلر 肌醇 牛磺酸 左旋肉碱 二十碳六烯酸(DHA) 二十碳五烯酸(ARA) 低聚果糖 聚葡萄糖 1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯 叶黄素 核苷酸 乳铁蛋白 维他命 维他命D 维他命E 维他命K 维他命B1 维他命B2 维他命B6 维他命B12 烟酸(烟酰胺) 叶酸 泛酸 维他命C 生物素 胆碱 镁 钾 钙 磷 铜 锌 硒 碘 铁 硫酸锌 硫酸锰 磷酸钙 磷酸三钙 碘酸钾 亚硒酸 氯化胆碱 肌醇 牛磺酸 左旋肉碱 二十二碳六烯酸 花生四烯酸 叶黄素 核苷酸 乳铁蛋白 动物双歧杆菌乳杆菌 Bb-12 维他命 维他命D 维他命E 维他命K 维他命B1 维他命B2 维他命B6 维他命B12 烟酸(烟酰胺) 叶酸 泛酸 维他命C 生物素 胆碱 镁 钾 钙 磷 铜 锌 硒 碘 铁 硫酸锌 硫酸锰 磷酸钙 磷酸三钙 碘酸钾 亚硒酸 氯化胆碱 肌醇 牛磺酸 左旋肉碱 二十二碳六烯酸 花生四烯酸 叶黄素 核苷酸 乳铁蛋白 动物双歧杆菌乳杆菌 Bb-12 维他命 维他命D 维他命E 维他命K 维他命B1 维他命B2 维他命B6 维他命B12 烟酸(烟酰胺) 叶酸 泛酸 维他命C 生物素 胆碱 镁 钾 钙 磷 铜 锌 硒 碘 铁 硫酸锌 硫酸锰 磷酸钙 磷酸三钙 碘酸钾 亚硒酸 氯化胆碱 肌醇 牛磺酸 左旋肉碱 二十二碳六烯酸 花生四烯酸 叶黄素 核苷酸 乳铁蛋白 动物双歧杆菌乳杆菌 Bb-12 维他命 维他命D 维他命E 维他命K 维他命B1 维他命B2 维他命B6 维他命B12 烟酸(烟酰胺) 叶酸 泛酸 维他命C 生物素 胆碱 镁 钾 钙 磷 铜 锌 硒 碘 铁 硫酸锌 硫酸锰 磷酸钙 磷酸三钙 碘酸钾 亚硒酸 氯化胆碱 肌醇 牛磺酸 左旋肉碱 二十二碳六烯酸 花生四烯酸 叶黄素 核苷酸 乳铁蛋白 动物双歧杆菌乳杆菌 Bb-12 维他命 维他命D 维他命E 维他命K 维他命B1 维他命B2 维他命B6 维他命B12 烟酸(烟酰胺) 叶酸 泛酸 维他命C 生物素 胆碱 镁 钾 钙 磷 铜 锌 硒 碘 铁 硫酸锌 硫酸锰 磷酸钙 磷酸三钙 碘酸钾 亚硒酸 氯化胆碱 肌醇 牛磺酸 左旋肉碱 二十二碳六烯酸 花生四烯酸 叶黄素 核苷酸 乳铁蛋白 动物双歧杆菌乳杆菌 Bb-12 维他命 维他命D 维他命E 维他命K 维他命B1 维他命B2 维他命B6 维他命B12 烟酸(烟酰胺) 叶酸 泛酸 维他命C 生物素 胆碱 镁 钾 钙 磷 铜 锌 硒 碘 铁 硫酸锌 硫酸锰 磷酸钙 磷酸三钙 碘酸钾 亚硒酸 氯化胆碱 肌醇 牛磺酸 左旋肉碱 二十二碳六烯酸 花生四烯酸 叶黄素 核苷酸 乳铁蛋白 动物双歧杆菌乳杆菌 Bb-12 维他命 维他命D 维他命E 维他命K 维他命B1 维他命B2 维他命B6 维他命B12 烟酸(烟酰胺) 叶酸 泛酸 维他命C 生物素 胆碱 镁 钾 钙 磷 铜 锌 硒 碘 铁 硫酸锌 硫酸锰 磷酸钙 磷酸三钙 碘酸钾 亚硒酸 氯化胆碱 肌醇 牛磺酸 左旋肉碱 二十二碳六烯酸 花生四烯酸 叶黄素 核苷酸 乳铁蛋白 动物双歧杆菌乳杆菌 Bb-12 维他命 维他命D 维他命E 维他命K 维他命B1 维他命B2 维他命B6 维他命B12 烟酸(烟酰胺) 叶酸 泛酸 维他命C 生物素 胆碱 镁 钾 钙 磷 铜 锌 硒 碘 铁 硫酸锌 硫酸锰 磷酸钙 磷酸三钙 碘酸钾 亚硒酸 氯化胆碱 肌醇 牛磺酸 左旋肉碱 二十二碳六烯酸 花生四烯酸 叶黄素 核苷酸 乳铁蛋白 动物双歧杆菌乳杆菌 Bb-12 维他命 维他命D 维他命E 维他命K 维他命B1 维他命B2 维他命B6 维他命B12 烟酸(烟酰胺) 叶酸 泛酸 维他命C 生物素 胆碱 镁 钾 钙 磷 铜 锌 硒 碘 铁 硫酸锌 硫酸锰 磷酸钙 磷酸三钙 碘酸钾 亚硒酸 氯化胆碱 肌醇 牛磺酸 左旋肉碱 二十二碳六烯酸 花生四烯酸 叶黄素 核苷酸 乳铁蛋白 动物双歧杆菌乳杆菌 Bb-12 维他命 维他命D 维他命E 维他命K 维他命B1 维他命B2 维他命B6 维他命B12 烟酸(烟酰胺) 叶酸 泛酸 维他命C 生物素 胆碱 镁 钾 钙 磷 铜 锌 硒 碘 铁 硫酸锌 硫酸锰 磷酸钙 磷酸三钙 碘酸钾 亚硒酸 氯化胆碱 肌醇 牛磺酸 左旋肉碱 二十二碳六烯酸 花生四烯酸 叶黄素 核苷酸 乳铁蛋白 动物双歧杆菌乳杆菌 Bb-12 维他命 维他命D 维他命E 维他命K 维他命B1 维他命B2 维他命B6 维他命B12 烟酸(烟酰胺) 叶酸 泛酸 维他命C 生物素 胆碱 镁 钾 钙 磷 铜 锌 硒 碘 铁 硫酸锌 硫酸锰 磷酸钙 磷酸三钙 碘酸钾 亚硒酸 氯化胆碱 肌醇 牛磺酸 左旋肉碱 二十二碳六烯酸 花生四烯酸 叶黄素 核苷酸 乳铁蛋白 动物双歧杆菌乳杆菌 Bb-12 维他命 维他命D 维他命E 维他命K 维他命B1 维他命B2 维他命B6 维他命B12 烟酸(烟酰胺) 叶酸 泛酸 维他命C 生物素 胆碱 镁 钾 钙 磷 铜 锌 硒 碘 铁 硫酸锌 硫酸锰 磷酸钙 磷酸三钙 碘酸钾 亚硒酸 氯化胆碱 肌醇 牛磺酸 左旋肉碱 二十二碳六烯酸 花生四烯酸 叶黄素 核苷酸 乳铁蛋白 动物双歧杆菌乳杆菌 Bb-12 维他命 维他命D 维他命E 维他命K 维他命B1 维他命B2 维他命B6 维他命B12 烟酸(烟酰胺) 叶酸 泛酸 维他命C 生物素 胆碱 镁 钾 钙 磷 铜 锌 硒 碘 铁 硫酸锌 硫酸锰 磷酸钙 磷酸三钙 碘酸钾 亚硒酸 氯化胆碱 肌醇 牛磺酸 左旋肉碱 二十二碳六烯酸 花生四烯酸 叶黄素 核苷酸 乳铁蛋白 动物双歧杆菌乳杆菌 Bb-12 维他命 维他命D 维他命E 维他命K 维他命B1 维他命B2 维他命B6 维他命B12 烟酸(烟酰胺) 叶酸 泛酸 维他命C 生物素 胆碱 镁 钾 钙 磷 铜 锌 硒 碘 铁 硫酸锌 硫酸锰 磷酸钙 磷酸三钙 碘酸钾 亚硒酸 氯化胆碱 肌醇 牛磺酸 左旋肉碱 二十二碳六烯酸 花生四烯酸 叶黄素 核苷酸 乳铁蛋白 动物双歧杆菌乳杆菌 Bb-12 维他命 维他命D 维他命E 维他命K 维他命B1 维他命B2 维他命B6 维他命B12 烟酸(烟酰胺) 叶酸 泛酸 维他命C 生物素 胆碱 镁 钾 钙 磷 铜 锌 硒 碘 铁 硫酸锌 硫酸锰 磷酸钙 磷酸三钙 碘酸钾 亚硒酸 氯化胆碱 肌醇 牛磺酸 左旋肉碱 二十二碳六烯酸 花生四烯酸 叶黄素 核苷酸 乳铁蛋白 动物双歧杆菌乳杆菌 Bb-12 维他命 维他命D 维他命E 维他命K 维他命B1 维他命B2 维他命B6 维他命B12 烟酸(烟酰胺) 叶酸 泛酸 维他命C 生物素 胆碱 镁 钾 钙 磷 铜 锌 硒 碘 铁 硫酸锌 硫酸锰 磷酸钙 磷酸三钙 碘酸钾 亚硒酸 氯化胆碱 肌醇 牛磺酸 左旋肉碱 二十二碳六烯酸 花生四烯酸 叶黄素 核苷酸 乳铁蛋白 动物双歧杆菌乳杆菌 Bb-12 维他命 维他命D 维他命E 维他命K 维他命B1 维他命B2 维他命B6 维他命B12 烟酸(烟酰胺) 叶酸 泛酸 维他命C 生物素 胆碱 镁 钾 钙 磷 铜 锌 硒 碘 铁 硫酸锌 硫酸锰 磷酸钙 磷酸三钙 碘酸钾 亚硒酸 氯化胆碱 肌醇 牛磺酸 左旋肉碱 二十二碳六烯酸 花生四烯酸 叶黄素 核苷酸 乳铁蛋白 动物双歧杆菌乳杆菌 Bb-12 维他命 维他命D 维他命E 维他命K 维他命B1 维他命B2 维他命B6 维他命B12 烟酸(烟酰胺) 叶酸 泛酸 维他命C 生物素 胆碱 镁 钾 钙 磷 铜 锌 硒 碘 铁 硫酸锌 硫酸锰 磷酸钙 磷酸三钙 碘酸钾 亚硒酸 氯化胆碱 肌醇 牛磺酸 左旋肉碱 二十二碳六烯酸 花生四烯酸 叶黄素 核苷酸 乳铁蛋白 动物双歧杆菌乳杆菌 Bb-12 维他命 维他命D 维他命E 维他命K 维他命B1 维他命B2 维他命B6 维他命B12 烟酸(烟酰胺) 叶酸 泛酸 维他命C 生物素 胆碱 镁 钾 钙 磷 铜 锌 硒 碘 铁 硫酸锌 硫酸锰 磷酸钙 磷酸三钙 碘酸钾 亚硒酸 氯化胆碱 肌醇 牛磺酸 左旋肉碱 二十二碳六烯酸 花生四烯酸 叶黄素 核苷酸 乳铁蛋白 动物双歧杆菌乳杆菌 Bb-12 维他命 维他命D 维他命E 维他命K 维他命B1 维他命B2 维他命B6 维他命B12 烟酸(烟酰胺) 叶酸 泛酸 维他命C 生物素 胆碱 镁 钾 钙 磷 铜 锌 硒 碘 铁 硫酸锌 硫酸锰 磷酸钙 磷酸三钙 碘酸钾 亚硒酸 氯化胆碱 肌醇 牛磺酸 左旋肉碱 二十二碳六烯酸 花生四烯酸 叶黄素 核苷酸 乳铁蛋白 动物双歧杆菌乳杆菌 Bb-12 维他命 维他命D 维他命E 维他命K 维他命B1 维他命B2 维他命B6 维他命B12 烟酸(烟酰胺) 叶酸 泛酸 维他命C 生物素 胆碱 镁 钾 钙 磷 铜 锌 硒 碘 铁 硫酸锌 硫酸锰 磷酸钙 磷酸三钙 碘酸钾 亚硒酸 氯化胆碱 肌醇 牛磺酸 左旋肉碱 二十二碳六烯酸 花生四烯酸 叶黄素 核苷酸 乳铁蛋白 动物双歧杆菌乳杆菌 Bb-12 维他命 维他命D 维他命E 维他命K 维他命B1 维他命B2 维他命B6 维他命B12 烟酸(烟酰胺) 叶酸 泛酸 维他命C 生物素 胆碱 镁 钾 钙 磷 铜 锌 硒 碘 铁 硫酸锌 硫酸锰 磷酸钙 磷酸三钙 碘酸钾 亚硒酸 氯化胆碱 肌醇 牛磺酸 左旋肉碱 二十二碳六烯酸 花生四烯酸 叶黄素 核苷酸 乳铁蛋白 动物双歧杆菌乳杆菌 Bb-12 维他命 维他命D 维他命E 维他命K 维他命B1 维他命B2 维他命B6 维他命B12 烟酸(烟酰胺) 叶酸 泛酸 维他命C 生物素 胆碱 镁 钾 钙 磷 铜 锌 硒 碘 铁 硫酸锌 硫酸锰 磷酸钙 磷酸三钙 碘酸钾 亚硒酸 氯化胆碱 肌醇 牛磺酸 左旋肉碱 二十二碳六烯酸 花生四烯酸 叶黄素 核苷酸 乳铁蛋白 动物双歧杆菌乳杆菌 Bb-12 维他命 维他命D 维他命E 维他命K 维他命B1 维他命B2 维他命B6 维他命B12 烟酸(烟酰胺) 叶酸 泛酸 维他命C 生物素 胆碱 镁 钾 钙 磷 铜 锌 硒 碘 铁 硫酸锌 硫酸锰 磷酸钙 磷酸三钙 碘酸钾 亚硒酸 氯化胆碱 肌醇 牛磺酸 左旋肉碱 二十二碳六烯酸 花生四烯酸 叶黄素 核苷酸 乳铁蛋白 动物双歧杆菌乳杆菌 Bb-12 维他命 维他命D 维他命E 维他命K 维他命B1 维他命B2 维他命B6 维他命B12 烟酸(烟酰胺) 叶酸 泛酸 维他命C 生物素 胆碱 镁 钾 钙 磷 铜 锌 硒 碘 铁 硫酸锌 硫酸锰 磷酸钙 磷酸三钙 碘酸钾 亚硒酸 氯化胆碱 肌醇 牛磺酸 左旋肉碱 二十二碳六烯酸 花生四烯酸 叶黄素 核苷酸 乳铁蛋白 动物双歧杆菌乳杆菌 Bb-12 维他命 维他命D 维他命E 维他命K 维他命B1 维他命B2 维他命B6 维他命B12 烟酸(烟酰胺) 叶酸 泛酸 维他命C 生物素 胆碱 镁 钾 钙 磷 铜 锌 硒 碘 铁 硫酸锌 硫酸锰 磷酸钙 磷酸三钙 碘酸钾 亚硒酸 氯化胆碱 肌醇 牛磺酸 左旋肉碱 二十二碳六烯酸 花生四烯酸 叶黄素 核苷酸 乳铁蛋白 动物双歧杆菌乳杆菌 Bb-12 维他命 维他命D 维他命E 维他命K 维他命B1 维他命B2 维他命B6 维他命B12 烟酸(烟酰胺) 叶酸 泛酸 维他命C 生物素 胆碱 镁 钾 钙 磷 铜 锌 硒 碘 铁 硫酸锌 硫酸锰 磷酸钙 磷酸三钙 碘酸钾 亚硒酸 氯化胆碱 肌醇 牛磺酸 左旋肉碱 二十二碳六烯酸 花生四烯酸 叶黄素 核苷酸 乳铁蛋白 动物双歧杆菌乳杆菌 Bb-12 维他命 维他命D 维他命E 维他命K 维他命B1 维他命B2 维他命B6 维他命B12 烟酸(烟酰胺) 叶酸 泛酸 维他命C 生物素 胆碱 镁 钾 钙 磷 铜 锌 硒 碘 铁 硫酸锌 硫酸锰 磷酸钙 磷酸三钙 碘酸钾 亚硒酸 氯化胆碱 肌醇 牛磺酸 左旋肉碱 二十二碳六烯酸 花生四烯酸 叶黄素 核苷酸 乳铁蛋白 动物双歧杆菌乳杆菌 Bb-12 维他命 维他命D 维他命E 维他命K 维他命B1 维他命B2 维他命B6 维他命B12 烟酸(烟酰胺) 叶酸 泛酸 维他命C 生物素 胆碱 镁 钾 钙 磷 铜 锌 硒 碘 铁 硫酸锌 硫酸锰 磷酸钙 磷酸三钙 碘酸钾 亚硒酸 氯化胆碱 肌醇 牛磺酸 左旋肉碱 二十二碳六烯酸 花生四烯酸 叶黄素 核苷酸 乳铁蛋白 动物双歧杆菌乳杆菌 Bb-12 维他命 维他命D 维他命E 维他命K 维他命B1 维他命B2 维他命B6 维他命B12 烟酸(烟酰胺) 叶酸 泛酸 维他命C 生物素 胆碱 镁 钾 钙 磷 铜 锌 硒 碘 铁 硫酸锌 硫酸锰 磷酸钙 磷酸三钙 碘酸钾 亚硒酸 氯化胆碱 肌醇 牛磺酸 左旋肉碱 二十二碳六烯酸 花生四烯酸 叶黄素 核苷酸 乳铁蛋白 动物双歧杆菌乳杆菌 Bb-12 维他命 维他命D 维他命E 维他命K 维他命B1 维他命B2 维他命B6 维他命B12 烟酸(烟酰胺) 叶酸 泛酸 维他命C 生物素 胆碱 镁 钾 钙 磷 铜 锌 硒 碘 铁 硫酸锌 硫酸锰 磷酸钙 磷酸三钙 碘酸钾 亚硒酸 氯化胆碱 肌醇 牛磺酸 左旋肉碱 二十二碳六烯酸 花生四烯酸 叶黄素 核苷酸 乳铁蛋白 动物双歧杆菌乳杆菌 Bb-12 维他命 维他命D 维他命E 维他命K 维他命B1 维他命B2 维他命B6 维他命B12 烟酸(烟酰胺) 叶酸 泛酸 维他命C 生物素 胆碱 镁 钾 钙 磷 铜 锌 硒 碘 铁 硫酸锌 硫酸锰 磷酸钙 磷酸三钙 碘酸钾 亚硒酸 氯化胆碱 肌醇 牛磺酸 左旋肉碱 二十二碳六烯酸 花生四烯酸 叶黄素 核苷酸 乳铁蛋白 动物双歧杆菌乳杆菌 Bb-12 维他命 维他命D 维他命E 维他命K 维他命B1 维他命B2 维他命B6 维他命B12 烟酸(烟酰胺) 叶酸 泛酸 维他命C 生物素 胆碱 镁 钾 钙 磷 铜 锌 硒 碘 铁 硫酸锌 硫酸锰 磷酸钙 磷酸三钙 碘酸钾 亚硒酸 氯化胆碱 肌醇 牛磺酸 左旋肉碱 二十二碳六烯酸 花生四烯酸 叶黄素 核苷酸 乳铁蛋白 动物双歧杆菌乳杆菌 Bb-12 维他命 维他命D 维他命E 维他命K 维他命B1 维他命B2 维他命B6 维他命B12 烟酸(烟酰胺) 叶酸 泛酸 维他命C 生物素 胆碱 镁 钾 钙 磷 铜 锌 硒 碘 铁 硫酸锌 硫酸锰 磷酸钙 磷酸三钙 碘酸钾 亚硒酸 氯化胆碱 肌醇 牛磺酸 左旋肉碱 二十二碳六烯酸 花生四烯酸 叶黄素 核苷酸 乳铁蛋白 动物双歧杆菌乳杆菌 Bb-12 维他命 维他命D 维他命E 维他命K 维他命B1 维他命B2 维他命B6 维他命B12 烟酸(烟酰胺) 叶酸 泛酸 维他命C 生物素 胆碱 镁 钾 钙 磷 铜 锌 硒 碘 铁 硫酸锌 硫酸锰 磷酸钙 磷酸三钙 碘酸钾 亚硒酸 氯化胆碱 肌醇 牛磺酸 左旋肉碱 二十二碳六烯酸 花生四烯酸 叶黄素 核苷酸 乳铁蛋白 动物双歧杆菌乳杆菌 Bb-12 维他命 维他命D 维他命E 维他命K 维他命B1 维他命B2 维他命B6 维他命B12 烟酸(烟酰胺) 叶酸 泛酸 维他命C 生物素 胆碱 镁 钾 钙 磷 铜 锌 硒 碘 铁 硫酸锌 硫酸锰 磷酸钙 磷酸三钙 碘酸钾 亚硒酸 氯化胆碱 肌醇 牛磺酸 左旋肉碱 二十二碳六烯酸 花生四烯酸 叶黄素 核苷酸 乳铁蛋白 动物双歧杆菌乳杆菌 Bb-12 维他命 维他命D 维他命E 维他命K 维他命B1 维他命B2 维他命B6 维他命B12 烟酸(烟酰胺) 叶酸 泛酸 维他命C 生物素 胆碱 镁 钾 钙 磷 铜 锌 硒 碘 铁 硫酸锌 硫酸锰 磷酸钙 磷酸三钙 碘酸钾 亚硒酸 氯化胆碱 肌醇 牛磺酸 左旋肉碱 二十二碳六烯酸 花生四烯酸 叶黄素 核苷酸 乳铁蛋白 动物双歧杆菌乳杆菌 Bb-12 维他命 维他命D 维他命E 维他命K 维他命B1 维他命B2 维他命B6 维他命B12 烟酸(烟酰胺) 叶酸 泛酸 维他命C 生物素 胆碱 镁 钾 钙 磷 铜 锌 硒 碘 铁 硫酸锌 硫酸锰 磷酸钙 磷酸三钙 碘酸钾 亚硒酸 氯化胆碱 肌醇 牛磺酸 左旋肉碱 二十二碳六烯酸 花生四烯酸 叶黄素 核苷酸 乳铁蛋白 动物双歧杆菌乳杆菌 Bb-12 维他命 维他命D 维他命E 维他命K 维他命B1 维他命B2 维他命B6 维他命B12 烟酸(烟酰胺) 叶酸 泛酸 维他命C 生物素 胆碱 镁 钾 钙 磷 铜 锌 硒 碘 铁 硫酸锌

喂哺建议表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(mL)	专用平匙数
0-1周	8	30	1
1-2周	7	60	2
2周-1月龄	6	90	3
1-2月龄	5-6	120	4
2-4月龄	5	150	5
4-6月龄	5	180	6

注: 请使用本品随附专用量匙, 1平匙奶粉≈4.5g

也可根据宝宝个体差异, 按照医生建议, 调整喂哺量。未经医生建议请勿随意改变喂哺量。请按照喂哺建议表中所建议的比例用量冲调, 未经医生建议请勿改变冲调浓度。

食用方法


1. 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净, 使用前用沸水煮至少5分钟, 待用。冲调前请清洗双手并保持环境卫生。
2. 将饮用水煮沸5分钟, 冷却至50°C左右。
3. 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量, 将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。
4. 将所需的奶粉加入到奶瓶中。
5. 盖紧奶瓶, 轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
6. 待奶液温度适宜时, 再给宝宝喂奶。

重要声明

对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳, 在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

温馨提示

- 请按以上方法冲调奶粉, 方法不当可能会影响宝宝健康。
- 冲调好的奶液应在1小时内喂哺完, 剩余的奶液应弃去。
- 冲调好的奶液勿放入微波炉内加热, 以免烫伤。
- 本品含有乳糖和蛋白质, 乳糖不耐和蛋白质过敏体质严重的宝宝慎用或遵医嘱。



咨询热线:(周一至周五9:00-17:00)

400-6798-911

www.inboschina.com

英博®

佶顺


彩乐SEBILER



婴儿配方奶粉
(0-6月龄, 1段)
(0-6月龄, 1段)

1
段

净含量: 100克
国食注字 YP20240025



配料表

脱盐乳清粉、全脂奶粉、食用植物调和油 (1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、菜籽油、棕榈仁油、葵花籽油、磷脂)、乳糖、无水奶油、低聚果糖、浓缩乳清蛋白粉、聚葡萄糖、乳清蛋白粉、水解乳清蛋白粉、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氯钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、柠檬酸钠、氯化钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸 (DHA)、花生四烯酸(ARA)、叶黄素、核苷酸 (5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2067
蛋白质	g	0.54	11.10
脂肪	g	0.35	7.25
亚油酸	g	1.25	25.90
α-亚麻酸	mg	0.14	2.82
碳水化合物	g	21	430
维生素A	μg RE	2.5	52.0
维生素D	μg	18	372
维生素E	mg α-TE	0.57	11.81
维生素K ₁	μg	0.24	4.90
维生素C	mg	2.31	47.80
维生素B ₁	μg	20	422
维生素B ₂	μg	43	892
维生素B ₆	μg	19.4	401.0
维生素B ₁₂	μg	0.078	1.620
胆钙化醇	μg	202	4172
叶酸	μg	5.1	104.5
泛酸	μg	170	3519
维生素C	mg	3.7	77.5
生物素	μg	1.00	20.70
胆碱	mg	6.5	135.0
矿物质			
钠	mg	9	180
钾	mg	18	377
镁	mg	18.3	378.0
钙	mg	1.8	36.2
磷	mg	0.19	3.96
硒	mg	0.19	3.94
镁	mg	4.64	96.00
碘	mg	16	320
铜	mg	11	234
锌	mg	4.4	90.0
铁	mg	19	383
硒	μg	0.97	20.00
可选择成分			
胆钙化醇	μg	1.8	37.9
牛磺酸	mg	2.1	44.0
左旋肉碱	mg	0.4	9.1
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.0	83.7
二十碳四烯酸(ARA)	mg	4.4	90.4
低聚果糖	mg	135.46	2800.00
聚葡萄糖	mg	82.24	1700.00
1,3-二油酸	g	0.17	3.5
2-棕榈酸甘油三酯	g	0.40	82.0
叶黄素	mg	1.0	21.0
核苷酸	mg	1.0	20.0
乳铁蛋白	mg	1.0	20.0

贮藏方法: 本产品应贮藏于阴凉干燥处, 勿放入冰箱内; 每次食用后及时将罐口封严, 开罐后请在一个月内食用完毕。

喂哺建议表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(mL)	专用平匙数
0-1周	8	30	1
1-2周	7	60	2
2周-1月龄	6	90	3
1-2月龄	5-6	120	4
2-4月龄	5	150	5
4-6月龄	5	180	6

注: 请使用本品随附专用量匙, 1平匙奶粉约4.5g。

也可根据宝宝个体差异, 按照医生建议, 调整喂哺量。未经医生建议请勿随意改变喂哺量。
请按照喂哺建议表中所建议的比例用量冲调, 未经医生建议请勿改变冲调浓度。

食用方法

1. 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净, 使用前用沸水煮至少5分钟, 待用。
冲调前请清洗双手并保持环境卫生。
2. 将饮用水煮沸5分钟, 冷却至50°C左右。
3. 根据宝宝月龄及喂哺量的推荐量, 将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。
4. 将所需的奶粉加入到奶瓶中。
5. 盖紧奶瓶, 轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
6. 待奶液温度适宜时, 再给宝宝喂奶。

重要声明

对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳, 在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

温馨提示

- 请按以上方法冲调奶粉, 方法不当可能会影响宝宝健康。
- 冲调好的奶液应在1小时内喂哺完, 剩余的奶液应弃去。
- 冲调好的奶液勿放入微波炉内加热, 以免烫伤。
- 本品含有乳糖和蛋白质, 乳糖不耐和蛋白质过敏体质严重的宝宝慎用或遵医嘱。



咨询热线(周一至周五9:00-17:00)
400-6798-911
www.inboschina.com

(官方二维码) 6948894025911

英博®

信顺


英博®
INBOSSCHER



婴儿配方奶粉
0-6月龄, 1段
(0-6月龄, 1段)

1
段

净含量: 400克
国食注字 YP20240025



配料表

脱盐乳清粉、全脂奶粉、食用植物油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、菜籽油、棕榈油、葵花籽油、磷脂)、乳糖、无水奶油、低聚果糖、浓缩乳清蛋白粉、聚葡萄糖、乳清蛋白粉、水解乳清蛋白粉、醋酸初黄酮、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫酸素、核黄素、盐酸吡哆醇、氯化胆胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、柠檬酸钠、氯化钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、硫酸钙、硫酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸(DHA)、花生四烯酸(ARA)、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

生产商: 黑龙江安嘉乳业有限公司
地址: 黑龙江省铁力农场场直二八九大街9号
产地: 黑龙江省伊春市
食品生产许可证编号: SC10523300800298
营销热线: 0571-86852110
产品标准代号: GB 10765-2021
产品类别、属性: 乳基婴儿配方乳粉
保质期: 18个月
批号、生产日期及保质期(至): 见盒身
检验合格证号、同批号

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2067
蛋白质	g	0.54	11.10
乳清蛋白	g	0.35	7.25
脂肪	g	1.25	25.90
亚油酸	g	0.14	2.82
α-亚麻酸	mg	21	430
碳水化合物	g	2.5	52.0
维生素			
维生素A	μg RE	18	372
维生素D	μg	0.57	11.81
维生素E	mg α-TE	0.24	4.90
维生素K1	μg	2.31	47.80
维生素B1	mg	20	422
维生素B2	mg	43	892
维生素B3	mg	19.4	401.0
维生素B5	mg	0.078	1.620
烟酸(烟酰胺)	mg	202	4172
叶酸	μg	5.1	104.5
泛酸	mg	170	3519
维生素C	mg	3.7	77.5
生物素	mg	1.00	20.70
胆碱	mg	6.5	135.0
矿物质			
钠	mg	9	180
钾	mg	18	377
镁	mg	18.3	378.0
钙	mg	1.8	36.2
铁	mg	0.19	3.96
锌	mg	0.19	3.94
锰	mg	4.64	96.00
碘	mg	16	326
磷	mg	11	234
碘	mg	4.4	90.0
氯	mg	19	383
硒	mg	0.97	20.00
可选择成分			
胆醇	mg	1.8	37.9
牛磺酸	mg	2.1	44.0
左旋肉碱	mg	0.4	9.1
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.0	83.7
二十碳四稀酸(ARA)	mg	4.4	90.4
低聚果糖	mg	135.46	2800.00
聚葡萄糖	mg	82.24	1700.00
1,3-二油酸	mg		
2-棕榈酸甘油三酯	g	0.17	3.5
叶黄素	mg	4.0	82.0
核苷酸	mg	1.0	21.0
乳铁蛋白	mg	1.0	20.0
贮藏方法			
贮藏方法			

标签编号: AJRY-12

喂哺建议表		每次使用量	
月龄	每日喂哺次数	温开水用量(mL)	专用平匙数
6-7个月	5	150	5
7-9个月	4-5	150-180	5-6
9-12个月	4	180	5



信顺



食用方法

1. 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净。使用前用沸水煮至少5分钟，待用。
冲调前请洗净双手并保持环境卫生。
 2. 将饮用水煮沸5分钟，冷却至50℃左右。
 3. 依据宝宝月龄及喂哺量的推荐量，将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。
 4. 将所需的奶粉加入到奶瓶中。
 5. 盖紧奶瓶，轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
 6. 待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。

重要声明

6个月龄以上婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。

温馨提示

- 请按以上方法冲调奶粉，方法不当可能会影响宝宝健康。
 - 冲调好的奶液应在1小时内喂完，剩余的奶液应弃去。
 - 冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。
 - 本品含有乳糖和蛋白质，乳糖不耐和蛋白质过敏体质严重的宝宝慎用或遵医嘱。



咨询热线:(周一至周五9:00-17:00)

400-6798-911

www.inboschchina.com ©


(官方二维码)

A standard linear barcode is located in the top right corner of the page. It consists of vertical black bars of varying widths on a white background.

جۇڭچە سۇس جۇھىرى 较大婴儿配方奶粉 (6-12月龄, 2段)

2
版

净含量:800克
国食注字 YP20240026



配料表

脱盐乳清粉、全脂奶粉、食用植物调和油(1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯、菜籽油、棕榈仁油、葵花籽油、磷脂)、乳糖、无水奶油、低聚果糖、聚葡萄糖、乳清蛋白粉、水解乳清蛋白粉、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸(DHA)、花生四烯酸(ARA)、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

生产商：黑龙江安嘉乳业有限公司
地址：黑龙江省铁力农场场直二八九大街9号
产地：黑龙江省伊春市
食品生产许可证编号：SC10523300800298
营销热线：0571-86852110
产品标准代号：GB 10766-2021
产品类别、属性：乳基较大婴儿配方奶粉
保质期：24个月
批号、生产日期及保质期（至）：见罐底
检验合格证号：同批号

项目	单位	每100kJ		每100g		ئۇزۇزۇن ئەپلىكىت
		卡路里 kJ	热卡 100kJ	卡路里 100g	热卡 100g	
能量		100	1984	100	1984	ئېرىپە
蛋白质	g	0.65	12.80	1.15	21.0	ئاپسۇل
乳清蛋白	g	0.32	6.28	0.55	10.5	سۇت ئاپسۇل
脂肪	g	1.14	22.60	1.80	32.0	مۇن
亚油酸	g	0.09	1.84	0.15	2.7	مۇي كەسلاسى
α-亚麻酸	mg	14	287	25	48.0	ئەپلىكىت ئەپلىكىت
碳水化合物	g	2.7	52.6	4.5	85.0	كاربۆن-سۇرېرىكەس
维生素						ئۇزۇزۇن
维生素A	μg RE	21	414	35	67.0	ئۇزۇزۇن
维生素D	μg	0.56	11.10	0.75	14.0	ئۇزۇزۇن
维生素E	mg α-TE	0.23	4.61	0.30	5.6	ئۇزۇزۇن
维生素K ₁	μg	2.22	44.00	2.50	48.0	ئۇزۇزۇن
维生素B ₁	μg	26	516	30	57.0	ئۇزۇزۇن
维生素B ₂	μg	54	1064	60	112.0	ئۇزۇزۇن
维生素B ₆	μg	26.6	527.0	30	55.0	ئۇزۇزۇن
维生素B ₁₂	μg	0.105	2.080	0.12	2.20	ئۇزۇزۇن
烟酸(烟酰胺)	μg	171	3386	200	398.0	ئۇزۇزۇن كەسلاسى
叶酸	μg	5.3	105.3	6.5	12.0	بۇرۇپ كەسلاسى
泛酸	μg	172	3422	180	340.0	قان كەسلاسى
维生素C	mg	3.5	70.4	4.0	7.2	ئۇزۇزۇن
生物素	μg	1.02	20.30	1.20	22.0	بىتىلىپلىشىت
胆碱	mg	8.7	172.0	10.0	20.0	خۇارى
矿物质						ئىشلۈر ماددا
钠	mg	7	144	8	16.0	ئانلىرى
钾	mg	24	467	28	53.0	كالىمۇ
铜	μg	13.6	270.0	15	28.0	سەس
镁	mg	2.1	41.3	2.5	4.5	مەگىسى
铁	mg	0.33	6.50	0.38	7.2	ئۇزۇلۇر
锌	mg	0.20	4.00	0.25	5.0	سەنگىك
锰	μg	8.17	162.00	9.5	19.0	مەنگىك
钙	mg	21	410	25	48.0	كانتسىسى
磷	mg	16	315	18	34.0	فۇسۇر
碘	μg	4.2	83.0	4.8	9.0	بىرۇد
氮	mg	18	360	20	40.0	خۇرۇ
植	μg	0.91	18.00	1.0	2.0	سېلىن
可选成分						خىلاڭىن ئەرگىلىرى
肌醇	mg	2.2	44.1	2.5	48.0	ئۇزۇزۇن
牛磺酸	mg	2.2	43.0	2.5	47.0	ئۇزۇزۇن
左旋肉碱	mg	0.5	9.5	0.5	9.5	تىپ كەسلاسى
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.2	84.1	4.5	85.0	DHA
二十碳四烯酸(ARA)	mg	4.7	93.3	5.0	96.0	ARA
低聚果糖	mg	141.13	2800.00	150	2900.0	پۈزۈپ بىرەپلىرىنىۋە ئۇزۇزۇن
聚葡萄糖	mg	85.69	1700.00	90	1800.0	پۈزۈپ كاربوا
1,3-二油酸						دەنلىك كەسلاسى
2-棕榈酸甘油三酯	g	0.13	2.5	0.15	3.0	ئىرىڭىشىدە ئەپلىكىت
叶黄素	μg	8.3	165.0	8.5	170.0	كەسلاسى
核苷酸	mg	1.1	21.0	1.2	22.0	تىكايىنەت
乳铁蛋白	mg	1.0	20.0	1.0	20.0	لەتكۈزۈن ئەپلىكىت

标签编号: AJRY-13

喂哺建议表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(mL)	专用平匙数
6-7个月	5	150	5
7-9个月	4-5	150-180	5-6
9-12个月	4	180	5

注:请使用本品随附专用量匙,1平匙奶粉≈4.5g

也可根据宝宝个体差异,按照医生建议,调整喂哺量。未经医生建议请勿随意改变喂哺量。
请按照喂哺建议表中所建议的比例用量冲调,未经医生建议请勿改变冲调浓度。

食用方法


1. 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净,使用前用沸水煮至少5分钟,待用。
冲调前请清洗双手并保持环境卫生。
2. 将饮用水煮沸5分钟,冷却至50℃左右。
3. 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量,将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。
4. 将所需的奶粉加入到奶瓶中。
5. 盖紧奶瓶,轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
6. 待奶液温度适宜时,再给宝宝喂奶。

重要声明

6个月龄以上婴儿食用本产品时,须配合添加辅助食品。

温馨提示

- 请按以上方法冲调奶粉,方法不当可能会影响宝宝健康。
- 冲调好的奶液应在1小时内喂哺完,剩余的奶液应弃去。
- 冲调好的奶液勿放入微波炉内加热,以免烫伤。
- 本品含有乳糖和蛋白质,乳糖不耐和蛋白质过敏体质的宝宝慎用或遵医嘱。



咨询热线(周一至周五9:00-17:00)
400-6798-911
www.inboschina.com ©

6 948894 025720

英博

佶顺

英博
SEEBELER





جۇڭاڭارىشىسىن سۇب جۇڭەرى
较大婴儿配方奶粉

6-12 (6-12月龄, 2段)

2 段

净含量: 500克
国食注字 YP20240026



配料表

脱盐乳清粉、全脂奶粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、菜籽油、棕榈仁油、葵花籽油、磷脂)、乳糖、无水奶油、低聚果糖、聚葡萄糖、乳清蛋白粉、水解乳清蛋白粉、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl- α -醋酸生育酚、植物甲萘醒、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、碘酸钾、亚硝酸钠、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸(DHA)、花生四烯酸(ARA)、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠)、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1984
蛋白质	g	0.65	12.80
乳清蛋白	g	0.32	6.28
脂肪	g	1.14	22.60
亚油酸	g	0.09	1.84
α-亚麻酸	mg	14	287
碳水化合物	g	2.7	52.6
维生素			
维生素A	μg RE	21	414
维生素D	μg	0.56	11.10
维生素E	mg α-TE	0.23	4.61
维生素K ₁	μg	2.22	44.00
维生素B ₁	μg	26	516
维生素B ₂	μg	54	1064
维生素B ₆	μg	26.6	527.0
维生素B ₁₂	μg	0.105	2.080
烟酸(烟酰胺)	μg	171	3386
叶酸	μg	5.3	105.3
泛酸	μg	172	3422
维生素C	mg	3.5	70.4
生物素	μg	1.02	20.30
胆碱	mg	8.7	172.0
矿物质			
钠	mg	7	144
钾	mg	24	467
镁	mg	13.6	270.0
钙	mg	21	41.3
锌	mg	0.33	6.50
硒	mg	0.20	4.00
碘	mg	8.17	162.00
锰	mg	21	410
磷	mg	16	315
铁	mg	4.2	83.0
铜	mg	18	360
氯化胆碱	mg	0.91	18.00
可选择成分			
肌醇	mg	22	44.1
牛磺酸	mg	22	43.0
左旋肉碱	mg	0.5	9.5
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.2	84.1
二十碳四稀酸(ARA)	mg	4.7	93.3
低聚果糖	mg	141.13	2800.00
聚葡萄糖	mg	85.69	1700.00
1,3-二油酸			
2-棕榈酸甘油三酯	g	0.13	2.5
叶黄素	μg	8.3	165.0
核苷酸	mg	1.1	21.0
乳铁蛋白	mg	1.0	20.0

贮藏方法: 本产品应贮于阴凉干燥处,勿放入冰箱内;
每次食用后应及时将罐口封严,开罐后请在一个月内食用完毕。

喂哺建议表			
月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(mL)	专用平匙数
6-7个月	5	150	5
7-9个月	4-5	150-180	5-6
9-12个月	4	180	5

注: 请使用本品随附专用量匙, 1平匙奶粉≈4.5g

也可根据宝宝个体差异, 按照医生建议, 调整喂哺量。未经医生建议请勿随意改变喂哺量。
请按照喂哺建议表中所建议的比例用量冲调, 未经医生建议请勿改变冲调浓度。

食用方法


1. 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净, 使用前用沸水煮至少5分钟, 待用。
冲调前请清洗双手并保持环境卫生。
2. 将饮用水煮沸5分钟, 冷却至50℃左右。
3. 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量, 将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。
4. 将所需的奶粉加入到奶瓶中。
5. 盖紧奶瓶, 轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
6. 待奶液温度适宜时, 再给宝宝喂奶。

重要声明

6个月龄以上婴儿食用本产品时, 须配合添加辅助食品。

温馨提示

- 请按以上方法冲调奶粉, 方法不当可能会影响宝宝健康。
- 冲调好的奶液应在1小时内喂哺完, 剩余的奶液应弃去。
- 冲调好的奶液勿放入微波炉内加热, 以免烫伤。
- 本品含有乳糖和蛋白质, 乳糖不耐和蛋白质过敏体质严重的宝宝慎用或遵医嘱。



咨询热线(周一至周五9:00-17:00)
400-6798-911
www.inboschina.com

(官方二维码) 6 1948894 0259281

英博®

佶顺

英博
SEBILER





جۇڭاڭار سېسىلىس سۇپ جەھەرى
较大婴儿配方奶粉

6-12 (6-12)
(6-12月龄, 2段)

2段

净含量: 400克
国食注字 YP20240026



配料表

脱盐乳清粉、全脂奶粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、菜籽油、棕榈仁油、葵花籽油、磷脂)、乳糖、无水奶油、低聚果糖、聚葡萄糖、乳清蛋白粉、水解乳清蛋白粉、醋酸胆黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲基萘、盐酸胆碱素、核黄素、盐酸咖啡醇、氯钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、磷酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸(DHA)、花生四烯酸(ARA)、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

生产商: 黑龙江安嘉乳业有限公司

地址: 黑龙江省铁力农场场直二八九大街9号

产地: 黑龙江省伊春市

食品生产许可证编号: SC10523300800298

营销热线: 0571-866852110

产品标准代号: GB 10766-2021

产品类别、属性: 乳基较大婴儿配方乳粉

保质期: 18个月

批号、生产日期及保质期(至): 见盒身

检验合格证号: 同批号

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1984
蛋白质	g	0.65	12.80
乳清蛋白	g	0.32	6.28
脂肪	g	1.14	22.60
亚油酸	g	0.09	1.84
c-亚麻酸	mg	14	287
碳水化合物	g	2.7	52.6
维生素			
维生素A	μg RE	21	414
维生素D	μg	0.56	11.10
维生素E	mg α-TE	0.23	4.61
维生素K1	μg	2.22	44.00
维生素B1	mg	26	516
维生素B2	mg	54	1064
维生素B3	mg	26.6	527.0
维生素B12	μg	0.105	2.080
烟酸(烟酰胺)	mg	171	3386
叶酸	μg	5.3	105.3
泛酸	mg	172	3422
维生素C	mg	3.5	70.4
生物素	μg	1.02	20.30
胆碱	mg	8.7	172.0
矿物质			
钠	mg	7	144
钾	mg	24	467
镁	mg	13.6	270.0
钙	mg	21	41.3
磷	mg	0.33	6.50
锰	mg	0.20	4.00
锌	mg	8.17	162.00
碘	mg	21	410
碘	mg	16	315
碘	mg	4.2	83.0
碘	mg	18	360
碘	μg	0.91	18.00
可选择成分			
胆醇	mg	22	44.1
牛磺酸	mg	2.2	43.0
左旋肉碱	mg	0.5	9.5
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.2	84.1
二十碳四烯酸(ARA)	mg	4.7	93.3
低聚果糖	mg	141.13	2800.00
聚葡萄糖	mg	85.69	1700.00
1,3-二油酸			
2-棕榈酸甘油三酯	g	0.13	2.5
叶黄素	mg	8.3	165.0
核苷酸	mg	1.1	21.0
乳铁蛋白	mg	1.0	20.0
贮藏方法			
贮藏方法: 本产品应贮藏于阴凉干燥处, 请放入冰箱内; 每次食用后应及时将袋口封严, 开袋后请在一个月内食用完毕。			

喂哺建议表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(mL)	专用平匙数
12-24 个月	2-3	180-210	6-7
24-36 个月	2	210	7

注: 请使用本品随附专用量匙, 1平匙奶粉≈4.5g



也可根据宝宝个体差异, 按照医生建议, 调整喂哺量。未经医生建议请勿随意改变喂哺量。请按照喂哺建议表中所建议的比例用量冲调, 未经医生建议请勿改变冲调浓度。

英博®

信顺



英博 SEBILER®



食用方法

1. 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净, 使用前用沸水煮至少5分钟, 待用。
2. 冲调前请清洗双手并保持环境卫生。
3. 将饮用水煮沸5分钟, 冷却至50°C左右。
4. 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量, 将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。
5. 将所需的奶粉加入到奶瓶中。
6. 盖紧奶瓶, 轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
7. 待奶液温度适宜时, 再给宝宝喂奶。

温馨提示

- 请按以上方法冲调奶粉, 方法不当可能会影响宝宝健康。
- 冲调好的奶液应在1小时内喂哺完, 剩余的奶液应弃去。
- 冲调好的奶液勿放入微波炉内加热, 以免烫伤。
- 本品含有乳糖和蛋白质, 乳糖不耐和蛋白质过敏体质严重的宝宝慎用或遵医嘱。



(官方二维码)



咨询热线:(周一至周五9:00-17:00)

400-6798-911

www.inboschina.com @

بۇاڭلار رسېسىلىن سۇ جۇھەرى
幼儿配方奶粉
 12~36 (ئايلىقچە ماس كېلىدۇز, 3- باسقۇچ)
(12-36月龄, 3段)

3
段

净含量: 800克
国食注字 YP20240027

生产商: 黑龙江安嘉乳业有限公司
地址: 黑龙江省铁力农场场直二八九大街9号
产地: 黑龙江省伊春市
食品生产许可证编号: SC10523300800298
营销热线: 0571-86852110
产品标准代号: GB 10767-2021
产品类别、属性: 乳基幼儿配方乳粉
保质期: 24个月
批号、生产日期及保质期(至): 见罐底
检验合格证号: 同批号

营养成分表

项目	单位	每100kJ 100卡路里	每100g 每100克
能量	kJ	100	1996
蛋白质	g	0.66	13.10
脂肪	g	1.17	23.30
亚油酸	g	0.09	1.88
α-亚麻酸	mg	14	283
碳水化合物	g	2.6	51.5
维生素			
维生素A	μg RE	21	410
维生素D	μg	0.55	10.90
维生素E	mg α-TE	0.23	4.55
维生素K ₁	μg	2.18	43.60
维生素B ₁	μg	26	519
维生素B ₂	μg	54	1079
维生素B ₆	μg	23.1	462.0
维生素B ₁₂	μg	0.108	2.160
烟酸(烟酰胺)	μg	170	3387
叶酸	μg	5.0	100.0
泛酸	μg	175	3492
维生素C	mg	3.4	66.9
生物素	μg	1.20	23.90
矿物质			
钠	mg	7	141
钾	mg	20	408
铜	μg	14.0	279.0
镁	mg	2.0	40.1
铁	mg	0.33	6.62
锌	mg	0.19	3.70
钙	mg	23	462
磷	mg	17	343
碘	μg	4.1	82.0
氯	mg	17	341
可选择成分			
硒	μg	0.95	19.00
胆碱	mg	8.5	169.0
锰	mg	8.02	160.00
肌醇	mg	2.3	45.3
牛磺酸	mg	2.2	43.0
左旋肉碱	mg	0.6	11.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	1.0	20.0
二十碳四烯酸(ARA)	mg	1.4	27.0
低聚果糖	mg	140.28	2800.00
聚葡萄糖	mg	85.17	1700.00
1,3-二油酸			
2-棕榈酸甘油三酯	g	0.13	2.5
叶黄素	μg	8.2	164.0
核苷酸	mg	1.0	20.0
乳铁蛋白	mg	1.0	20.0

贮藏方法: 本产品应贮藏于阴凉干燥处, 勿放入冰箱内;
每次食用后及时将罐口封严, 开罐后请在一个月内食用完毕。

喂哺建议表			
月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(mL)	专用平匙数
12-24个月	2-3	180-210	6-7
24-36个月	2	210	7


注: 请使用本品随附专用量匙, 1平匙奶粉约4.5g

也可根据宝宝个体差异, 按照医生建议, 调整喂哺量。未经医生建议请勿随意改变喂哺量。
请按照喂哺建议表中所建议的比例用量冲调, 未经医生建议请勿改变冲调浓度。

食用方法	
1. 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净, 使用前用沸水煮至少5分钟, 待用。	冲调前请清洗双手并保持环境卫生。
2. 将饮用水煮沸5分钟, 冷却至50°C左右。	
3. 依据宝宝月龄及喂哺量的推荐量, 将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。	
4. 将所需的奶粉加入到奶瓶中。	
5. 盖紧奶瓶, 轻轻摇动直至奶粉完全溶解。	
6. 待奶液温度适宜时, 再给宝宝喂奶。	

温馨提示	
● 请按以上方法冲调奶粉, 方法不当可能会影响宝宝健康。	
● 冲调好的奶液应在1小时内喂完, 剩余的奶液应弃去。	
● 冲调好的奶液勿放入微波炉内加热, 以免烫伤。	
● 本品含有乳糖和蛋白质, 乳糖不耐和蛋白质过敏体质的宝宝慎用或遵医嘱。	

官方二维码



咨询热线(周一至周五9:00-17:00)
400-6798-911
www.inboschina.com

6 948894 025737

英博®

佶顺



英博®
SEBILER



幼兒配方奶粉
(12-36月齡, 3段)

3 段

净含量: 500克
国食注字 YP20240027



配料表

全脂奶粉、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1.3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、菜籽油、棕榈仁油、葵花籽油、磷脂)、乳糖、无水奶油、低聚果糖、聚葡萄糖、乳清蛋白粉、水解乳清蛋白粉、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸软脂素、核黄素、盐酸吡哆醇、氯化胆碱、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、碳酸钙、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠、硫酸锰、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸(DHA)、花生四烯酸(ARA)、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、乳铁蛋白、动物双歧杆菌亚种Bb-12。

生产商: 黑龙江安嘉乳业有限公司
地址: 黑龙江省铁力农场场直二八九大街9号
产地: 黑龙江省伊春市
食品生产许可证编号: SC10523300800298
营销热线: 0571-86852110
产品标准代号: GB 10767-2021
产品类别、属性: 乳基幼儿配方乳粉
保质期: 24个月
批号、生产日期及保质期(至): 见罐底
检验合格证号: 同批号

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1996
蛋白质	g	0.66	13.10
脂肪	g	1.17	23.30
亚油酸	g	0.09	1.88
α-亚麻酸	mg	14	283
碳水化合物	g	2.6	51.5
维生素			
维生素A	μg RE	21	410
维生素D	μg	0.55	10.90
维生素E	mg α-TE	0.23	4.55
维生素K1	μg	2.18	43.60
维生素B1	μg	26	519
维生素B2	μg	54	1079
维生素B6	μg	23.1	462.0
维生素B12	μg	0.108	2.160
烟酸(烟酰胺)	μg	170	3387
叶酸	μg	5.0	100.0
泛酸	μg	175	3492
维生素C	mg	3.4	66.9
生物素	μg	1.20	23.90
矿物质			
钠	mg	7	141
钾	mg	20	408
镁	μg	14.0	279.0
钙	mg	2.0	40.1
铁	mg	0.33	6.62
锌	mg	0.19	3.70
铜	mg	23	462
锰	mg	17	343
碘	μg	4.1	82.0
硒	mg	17	341
可选择成分			
胆碱	mg	0.95	19.00
胆碱	mg	8.5	169.0
胆碱	mg	8.02	160.00
肌醇	mg	23	45.3
牛磺酸	mg	22	43.0
左旋肉碱	mg	0.6	11.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	1.0	20.0
二十二碳六烯酸(ARA)	mg	1.4	27.0
低聚果糖	mg	140.28	2800.00
聚葡萄糖	mg	85.17	1700.00
1,3-二油酸			
2-棕榈酸甘油三酯	g	0.13	2.5
叶黄素	μg	8.2	164.0
核苷酸	mg	1.0	20.0
乳铁蛋白	mg	1.0	20.0

贮藏方法: 本产品应贮藏于阴凉干燥处, 不放入冰箱内;
每次食用后及时将罐口封严, 开罐后请在一个月内食用完毕。


喂哺建议表			
月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(mL)	专用平匙数
12-24个月	2-3	180-210	6-7
24-36个月	2	210	7

注:请使用本品随附专用量匙,1平匙奶粉≈4.5g

也可根据宝宝个体差异,按照医生建议,调整喂哺量,未经医生建议请勿随意改变喂哺量。请按照喂哺建议表中所建议的比例用量冲调,未经医生建议请勿改变冲调浓度。

食用方法	
1. 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净,使用前用沸水煮至少5分钟,待用。	冲调前请清洗双手并保持环境卫生。
2. 将饮用水煮沸5分钟,冷却至50℃左右。	
3. 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量,将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。	
4. 将所需的奶粉加入到奶瓶中。	
5. 盖紧奶瓶,轻轻摇动直至奶粉完全溶解。	
6. 待奶液温度适宜时,再给宝宝喂奶。	

温馨提示	
● 请按以上方法冲调奶粉,方法不当可能会影响宝宝健康。	
● 冲调好的奶液应在1小时内喂哺完,剩余的奶液应弃去。	
● 冲调好的奶液勿放入微波炉内加热,以免烫伤。	
● 本品含有乳糖和蛋白质,乳糖不耐和蛋白质过敏体质的宝宝慎用或遵医嘱。	



咨询热线(周一至周五9:00-17:00)
400-6798-911
www.inboschchina.com

6 948894 0259351

英博®

信顺





12-36月龄,3段
幼儿配方奶粉
(12-36月龄,3段)

3 段

净含量:400克
国食注字 YP20240027

英博
SEIBLER



配料表

全脂奶粉、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、菜籽油、棕榈油、葵花籽油、磷脂)、乳糖、无水奶油、低聚果糖、聚葡萄糖、乳清蛋白粉、水解乳清蛋白粉、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氢钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、碳酸钙、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠、硫酸镁、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸(DHA)、花生四烯酸(ARA)、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1996
蛋白质	g	0.66	13.10
脂肪	g	1.17	23.30
亚油酸	g	0.09	1.88
α-亚麻酸	mg	14	283
碳水化合物	g	2.6	51.5
维生素			
维生素A	μg RE	21	410
维生素D	μg	0.55	10.90
维生素E	mg α-TE	0.23	4.55
维生素K ₁	μg	2.18	43.60
维生素B ₁	μg	26	519
维生素B ₂	μg	54	1079
维生素B ₆	μg	23.1	462.0
维生素B ₁₂	μg	0.108	2.160
烟酸(烟酰胺)	μg	170	3387
叶酸	μg	5.0	100.0
3'-氯	μg	175	3492
维生素C	mg	3.4	66.9
生物素	μg	1.20	23.90
矿物质			
钠	mg	7	141
钾	mg	20	408
镁	μg	14.0	279.0
钙	mg	2.0	40.1
锌	mg	0.33	6.62
碘	mg	0.19	3.70
硒	mg	23	462
铁	mg	17	343
磷	mg	4.1	82.0
氯	mg	17	341
可选择成分			
胆碱	μg	0.95	19.00
胆碱	mg	8.5	169.0
胆碱	μg	8.02	160.00
肌醇	mg	2.3	45.3
牛磺酸	mg	22	43.0
左旋肉碱	mg	0.6	11.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	1.0	20.0
二十碳四烯酸(ARA)	mg	1.4	27.0
低聚果糖	mg	140.28	2800.00
聚葡萄糖	mg	85.17	1700.00
1,3-二油酸			
2-棕榈酸甘油三酯	g	0.13	2.5
叶黄素	μg	8.2	164.0
核苷酸	mg	1.0	20.0
乳铁蛋白	mg	1.0	20.0

贮藏方法:本产品应贮藏于阴凉干燥处,勿放入冰箱内;每次食用后及时将袋口封严,开袋后请在一个月内食用完毕。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2025
蛋白质	g	0.58	11.80
脂肪	g	1.16	23.40
亚油酸	g	0.16	3.20
α-亚麻酸	mg	26	523
碳水化合物	g	2.7	54.2
维生素			
维生素A	μg RE	21	424
维生素D	μg	0.57	11.64
维生素E	mg α-TE	0.28	5.69
维生素K ₁	μg	2.06	41.80
维生素B ₁	μg	21	425
维生素B ₂	μg	39	795
维生素B ₆	μg	23.4	473.0
维生素B ₁₂	μg	0.080	1.620
烟酸(烟酰胺)	μg	208	4202
叶酸	μg	5.2	106.0
泛酸	μg	196	3959
维生素C	mg	3.7	75.9
生物素	μg	0.97	19.70
胆碱	mg	8.5	173.0
矿物质			
钠	mg	7	142
钾	mg	21	427
铜	μg	20.0	405.0
镁	mg	2.7	55.0
铁	mg	0.20	4.07
锌	mg	0.19	3.90
锰	μg	7.51	152.00
钙	mg	15	312
磷	mg	11	218
碘	μg	5.5	111.6
氯	mg	16	320
硒	μg	0.99	20.00
可选择成分			
牛磺酸	mg	1.5	30.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.1	83.7
二十二碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.7	94.9
低聚果糖	mg	148.15	3000.00
聚葡萄糖	mg	83.95	1700.00
1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	g	0.17	3.5
叶黄素	μg	4.0	81.0

贮藏方法: 本产品应贮藏于阴凉干燥处, 勿放入冰箱内;
每次食用后及时将罐口封严, 开罐后请在一个月内食用完毕。

贝因美®

小羊蓝蓝

婴儿配方羊奶粉 (0-6月龄, 1段)



净含量:800克



国食注字:YP20240028

配料表

脱盐乳清粉(来源羊乳)、全脂羊奶粉、食用植物调和油(1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、菜籽油、棕榈仁油、葵花籽油、磷脂)、低聚果糖、聚葡萄糖、核桃油、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氯钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、碘酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、牛磺酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、叶黄素、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

喂哺建议表

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水量(mL)	专用平匙数	
0-1周	30	1	8
1-2周	60	2	7
2周-1月	60	2	6
1-2月	120	4	5
2-4月	150	5	5
4-6月	150	5	5

注: 请使用本品随附专用量匙, 1平匙奶粉≈4.5g

也可根据宝宝个体差异, 按照医生建议, 调整喂哺量。未经医生建议请勿随意改变喂哺量。
请按照喂哺建议表中所建议的比例用量冲调, 未经医生建议请勿改变冲调浓度。

食用方法

生产商: 黑龙江安嘉乳业有限公司
地址: 黑龙江省铁力农场场直二八九大街9号
产地: 黑龙江省伊春市
食品生产许可证编号: SC10523300800298
产品标准代号: GB 10765-2021
产品类别、属性: 乳基婴儿配方奶粉
保质期: 24个月
批号、生产日期及保质期(至): 见罐底
检验合格证号: 同批号
曾用商品名称: 贝儿快柔

1. 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净, 使用前用沸水煮至少5分钟, 待用。冲调前请清洗双手并保持环境卫生。
2. 将饮用水煮沸5分钟, 冷却至50℃左右。
3. 依据宝宝月龄及喂哺量的推荐量, 将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。
4. 将所需的奶粉加入到奶瓶中。
5. 盖紧奶瓶, 轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
6. 待奶液温度适宜时, 再给宝宝喂奶。

重要声明

对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳, 在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

温馨提示

- 请按以上方法冲调奶粉, 方法不当可能会影响宝宝健康。
- 冲调好的奶液应在1小时内喂哺完, 剩余的奶液应弃去。
- 冲调好的奶液勿放入微波炉内加热, 以免烫伤。
- 本品含有乳糖和乳蛋白质, 乳糖不耐和乳蛋白过敏体质严重的宝宝慎用或遵医嘱。



6 948894 025508

咨询热线:(周一至周五9:00-17:00)

400-996-0502

贝因美®

小羊蓝蓝

婴儿配方羊奶粉

(0-6月龄, 1段)



1段

净含量:400克



国食注字:YP20240028

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2025
蛋白质	g	0.58	11.80
脂肪	g	1.16	23.40
亚油酸	g	0.16	3.20
α-亚麻酸	mg	26	523
碳水化合物	g	2.7	54.2
维生素			
维生素A	μg RE	21	424
维生素D	μg	0.57	11.64
维生素E	μg α-TE	0.28	5.69
维生素K ₁	μg	2.06	41.80
维生素B ₁	μg	21	425
维生素B ₂	μg	39	795
维生素B ₆	μg	23.4	473.0
维生素B ₁₂	μg	0.080	1.620
烟酸(烟酰胺)	mg	208	4202
叶酸	μg	5.2	106.0
泛酸	μg	196	3959
维生素C	mg	3.7	75.9
生物素	μg	0.97	19.70
胆碱	mg	8.5	173.0
矿物质			
钠	mg	7	142
钾	mg	21	427
铜	μg	20.0	405.0
镁	mg	2.7	55.0
铁	mg	0.20	4.07
锌	mg	0.19	3.90
锰	mg	7.51	152.00
钙	mg	15	312
磷	mg	11	218
碘	μg	5.5	111.6
硒	mg	16	320
氯化碘	μg	0.99	20.00
可选择成分			
牛磺酸	mg	1.5	30.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.1	83.7
二十二碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.7	94.9
低聚果糖	mg	148.15	3000.00
聚葡萄糖	mg	83.95	1700.00
1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	mg	0.17	3.5
叶黄素	μg	4.0	81.0

配料表

脱盐乳清粉(来源羊乳)、全脂羊奶粉、食用植物调和油(1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、菜籽油、棕榈仁油、葵花籽油、磷脂)、低聚果糖、聚葡萄糖、核桃油、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氯钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、碘酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、牛磺酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、叶黄素、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水量(mL)	专用平匙数	
0-1周	30	1	8
1-2周	60	2	7
2周-1月	60	2	6
1-2月	120	4	5
2-4月	150	5	5
4-6月	150	5	5

注:请使用本品附带专用量匙,1平匙奶粉≈4.5g
也可根据宝宝个体差异,按照医生建议,调整喂哺量。未经医生建议请勿随意改变喂哺量。
请按照喂哺建议表中所建议的比例用量冲调,未经医生建议请勿改变冲调浓度。

食用方法

- 1.将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净,使用前用沸水煮至少5分钟,待用。冲调前请清洗双手并保持环境卫生。
- 2.将饮用水煮沸5分钟,冷却至50℃左右。
- 3.依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量,将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。
- 4.将所需的奶粉加入到奶瓶中。
- 5.盖紧奶瓶,轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- 6.待奶液温度适宜时,再给宝宝喂奶。

温馨提示

- 请按以上方法冲调奶粉,方法不当可能会影响宝宝健康。
- 冲调好的奶液应在1小时内喂完,剩余的奶液应弃去。
- 冲调好的奶液勿放入微波炉内加热,以免烫伤。
- 本品含有乳糖和乳蛋白,乳糖不耐和乳蛋白过敏体质严重的宝宝慎用或遵医嘱。

重要声明

对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。



6948894 000864

咨询热线:(周一至周五9:00-17:00)

400-996-0502

贝因美®

小羊蓝蓝

婴儿配方羊奶粉
(0-6月龄, 1段)

1 段

净含量:100克

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2025
蛋白质	g	0.58	11.80
脂肪	g	1.16	23.40
亚油酸	g	0.16	3.20
α-亚麻酸	mg	26	523
碳水化合物	g	2.7	54.2
维生素			
维生素A	μg RE	21	424
维生素D	μg Hg	0.57	11.64
维生素E	mg α-TE	0.28	5.69
维生素K ₁	μg Hg	2.06	41.80
维生素B ₁	μg Hg	21	425
维生素B ₂	μg Hg	39	795
维生素B ₆	mg Hg	23.4	473.0
维生素B ₁₂	μg Hg	0.080	1.620
烟酸(烟酰胺)	mg Hg	208	4202
叶酸	mg Hg	5.2	106.0
泛酸	mg Hg	196	3959
维生素C	mg Hg	3.7	75.9
生物素	mg Hg	0.97	19.70
胆碱	mg Hg	8.5	173.0
矿物质			
钠	mg Hg	7	142
钾	mg Hg	21	427
铜	mg Hg	20.0	405.0
镁	mg Hg	27	55.0
铁	mg Hg	0.20	4.07
锌	mg Hg	0.19	3.90
锰	μg Hg	7.51	152.00
钙	mg Hg	15	312
磷	mg Hg	11	218
碘	mg Hg	5.5	111.6
氯	mg Hg	16	320
硒	μg Hg	0.99	20.00
可选择成分			
牛磺酸	mg Hg	1.5	30.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg Hg	4.1	83.7
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg Hg	4.7	94.9
低聚果糖	mg Hg	148.15	3000.00
聚葡萄糖	mg Hg	83.95	1700.00
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g Hg	0.17	3.5
叶黄素	μg Hg	4.0	81.0

国食注字:YP20240028

配料表

脱盐乳清粉(来源羊乳)、全脂羊奶粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、菜籽油、棕榈仁油、葵花籽油、磷脂)、低聚果糖、聚葡萄糖、核桃油、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、醋酸胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、牛磺酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、叶黄素、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

喂哺建议表

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水量(mL)	专用平匙数	
0-1周	30	1	8
1-2周	60	2	7
2周-1月	60	2	6
1-2月	120	4	5
2-4月	150	5	5
4-6月	150	5	5

注:请使用本品随附专用量匙,1平匙奶粉~4.5g
也可根据宝宝个体差异,按照医生建议,调整喂哺量。未经医生建议请勿随意改变喂哺量。
请按照喂哺建议表中所建议的比例用量冲调,未经医生建议请勿改变冲调浓度。

食用方法

- 1.将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净, 使用前用沸水煮至少5分钟, 待用。
冲调前请清洗双手并保持环境卫生。
- 2.将饮用水煮沸5分钟, 冷却至50℃左右。
- 3.依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量, 将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。
- 4.将所需的奶粉加入到奶瓶中。
- 5.盖紧奶瓶, 轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- 6.待奶液温度适宜时, 再给宝宝喂奶。

重要声明

对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳, 在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

温馨提示

- 请按以上方法冲调奶粉, 方法不当可能会影响宝宝健康。
- 冲调好的奶液应在1小时内喂哺完, 剩余的奶液应弃去。
- 冲调好的奶液勿放入微波炉内加热, 以免烫伤。
- 本品含有乳糖和乳蛋白质, 乳糖不耐和乳蛋白过敏体质严重的宝宝慎用或遵医嘱。



咨询热线:(周一至周五9:00-17:00)

400-996-0502

6 948894 025621

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1968
蛋白质	g	0.65	12.80
脂肪	g	1.05	20.60
亚油酸	g	0.14	2.76
α-亚麻酸	mg	22	440
碳水化合物	g	2.8	55.9
维生素			
维生素A	μg RE	24	475
维生素D	μg	0.55	10.86
维生素E	mg α-TE	0.24	4.72
维生素K ₁	μg	2.11	41.50
维生素B ₁	μg	26	520
维生素B ₂	μg	43	839
维生素B ₆	μg	29.7	584.0
维生素B ₁₂	μg	0.083	1.630
烟酸(烟酰胺)	μg	177	3478
叶酸	μg	4.4	86.0
泛酸	μg	214	4209
维生素C	mg	3.7	73.6
生物素	μg	0.91	18.00
胆碱	mg	9.0	177.0
矿物质			
钠	mg	6	120
钾	mg	24	475
铜	μg	14.2	279.0
镁	mg	2.6	52.0
铁	mg	0.33	6.57
锌	mg	0.21	4.15
锰	μg	8.43	166.00
钙	mg	20	384
磷	mg	14	268
碘	μg	5.6	110.4
氯	mg	18	356
硒	μg	0.91	18.00
可选择成分			
牛磺酸	mg	1.5	30.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.2	83.6
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.9	96.6
低聚果糖	mg	152.44	3000.00
聚葡萄糖	mg	86.38	1700.00
1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	g	0.13	2.6
叶黄素	μg	9.0	178.0

贮藏方法: 本产品应贮藏于阴凉干燥处, 勿放入冰箱内;
每次食用后及时将罐口封严, 开罐后请在一个月内食用完毕。

贝因美®

小羊蓝蓝

较大婴儿配方羊奶粉 (6-12月龄, 2段)



国食注字:YP20240029

配料表

脱盐乳清粉(来源羊乳)、全脂羊奶粉、食用植物调和油(1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯, 菜籽油、棕榈仁油、葵花籽油、磷脂)、低聚果糖、聚葡萄糖、核桃油、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫酸镁、核黄素、盐酸吡哆醇、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、碘酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、牛磺酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、叶黄素、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

喂哺建议表

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水量(mL)	专用平匙数	
6-7月	150	5	5-6
7-9月	150-180	5-6	4-5
9-12月	180	6	4

注: 请使用本品随附专用量匙, 1平匙奶粉≈4.5g

也可根据宝宝个体差异, 按照医生建议, 调整喂哺量。未经医生建议请勿随意改变喂哺量。
请按照喂哺建议表中所建议的比例用量冲调, 未经医生建议请勿改变冲调浓度。

食用方法

1. 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净, 使用前用沸水煮至少5分钟, 待用。
冲调前请洗净双手并保持环境卫生。
2. 将饮用水煮沸5分钟, 冷却至50°C左右。
3. 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量, 将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。
4. 将所需的奶粉加入到奶瓶中。
5. 盖紧奶瓶, 轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
6. 待奶液温度适宜时, 再给宝宝喂奶。

重要声明

6个月龄以上婴儿食用本产品时, 须配合添加辅助食品。

温馨提示

- 请按以上方法冲调奶粉, 方法不当可能会影响宝宝健康。
- 冲调好的奶液应在1小时内喂完, 剩余的奶液应丢弃。
- 冲调好的奶液勿放入微波炉内加热, 以免烫伤。
- 本品含有乳糖和乳蛋白质, 乳糖不耐和乳蛋白过敏体质严重的宝宝慎用或遵医嘱。



6 948894 025584

咨询热线:(周一至周五9:00-17:00)

400-996-0502

贝因美®

小羊蓝蓝

较大婴儿配方羊奶粉 (6-12月龄, 2段)



国食注字:YP20240029

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1968
蛋白质	g	0.65	12.80
脂肪	g	1.05	20.60
亚油酸	g	0.14	2.76
α-亚麻酸	mg	22	440
碳水化合物	g	2.8	55.9
维生素A	μg RE	24	475
维生素D	μg	0.55	10.86
维生素E	μg α-TE	0.24	4.72
维生素K ₁	μg	2.11	41.50
维生素B ₁	μg	26	520
维生素B ₂	μg	43	839
维生素B ₆	μg	29.7	584.0
维生素B ₁₂	μg	0.083	1.630
烟酸(烟酰胺)	mg	177	3478
叶酸	mg	4.4	86.0
泛酸	mg	214	4209
维生素C	mg	3.7	73.6
生物素	mg	0.91	18.00
胆碱	mg	9.0	177.0
矿物质			
钠	mg	6	120
钾	mg	24	475
镁	mg	14.2	279.0
钙	mg	2.6	52.0
铁	mg	0.33	6.57
锌	mg	0.21	4.15
锰	mg	8.43	166.00
碘	mg	20	384
硒	mg	14	268
铜	mg	5.6	110.4
钼	mg	18	356
氯	mg	0.91	18.00
可选择成分			
牛磺酸	mg	1.5	30.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.2	83.6
二十二碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.9	96.6
低聚果糖	mg	152.44	3000.00
聚葡萄糖	mg	86.38	1700.00
1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	g	0.13	2.6
叶黄素	μg	9.0	178.0

配料表

脱盐乳清粉(来源羊乳)、全脂羊奶粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、菜籽油、棕榈油、葵花籽油、磷脂)、低聚果糖、聚葡萄糖、核桃油、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氯钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸-D-生物素、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、碘酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、牛磺酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、叶黄素、动物双歧杆菌亚种Bb-12。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水量(mL)	专用平匙数	
6-7月	150	5	5-6
7-9月	150-180	5-6	4-5
9-12月	180	6	4

注:请使用本品随附专用量匙,1平匙奶粉≈4.5g

也可根据宝宝个体差异,按照医生建议,调整喂哺量。未经医生建议请勿随意改变喂哺量。
请按照喂哺建议表中所建议的比例用量冲调,未经医生建议请勿改变冲调浓度。

食用方法

- 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净,使用前用沸水煮至少5分钟,待用。
冲调前请清洗双手并保持环境卫生。
- 将饮用水煮沸分钟,冷却至50°C左右。
- 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量,将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。
- 将所需的奶粉加入到奶瓶中。
- 盖紧奶瓶,轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- 待奶液温度适宜时,再给宝宝喂奶。

温馨提示

- 请按以上方法冲调奶粉,方法不当可能会影响宝宝健康。
- 冲调好的奶液应在1小时内喂哺完,剩余的奶液应弃去。
- 冲调好的奶液勿放入微波炉内加热,以免烫伤。
- 本品含有乳糖和乳蛋白,乳糖不耐和乳蛋白过敏体质严重的宝宝慎用或遵医嘱。

重要声明

6个月龄以上婴儿食用本产品时,须配合添加辅助食品。



咨询热线:(周一至周五9:00-17:00)

400-996-0502

贝因美®

小羊蓝蓝

较大婴儿配方羊奶粉
(6-12月龄, 2段)

2段

净含量:100克

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1968
蛋白质	g	0.65	12.80
脂肪	g	1.05	20.60
亚油酸	mg	0.14	2.76
α-亚麻酸	mg	22	440
碳水化合物	g	2.8	55.9
维生素			
维生素A	μg RE	24	475
维生素D	μg	0.55	10.86
维生素E	mg α-TE	0.24	4.72
维生素K ₁	mg	2.11	41.50
维生素B ₁	mg	26	520
维生素B ₂	mg	43	839
维生素B ₆	mg	29.7	584.0
维生素B ₁₂	mg	0.083	1.630
烟酸(烟酰胺)	mg	177	3478
叶酸	mg	4.4	86.0
泛酸	mg	214	4209
维生素C	mg	3.7	73.6
生物素	mg	0.91	18.00
胆碱	mg	9.0	177.0
矿物质			
钠	mg	6	120
钾	mg	24	475
铜	mg	14.2	279.0
镁	mg	2.6	52.0
铁	mg	0.33	6.57
锌	mg	0.21	4.15
锰	μg	8.43	166.00
钙	mg	20	384
磷	mg	14	268
碘	mg	5.6	110.4
氯	mg	18	356
硒	μg	0.91	18.00
可选择成分			
牛磺酸	mg	1.5	30.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.2	83.6
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.9	96.6
低聚果糖	mg	152.44	3000.00
聚葡萄糖	mg	86.38	1700.00
1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	mg	0.13	2.6
叶黄素	μg	9.0	178.0

配料表

脱盐乳清粉(来源羊乳)、全脂羊奶粉、食用植物调和油(1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯、菜籽油、棕榈仁油、葵花籽油、磷脂)、低聚果糖、聚葡萄糖、核桃油、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氯钻胶、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸铁、硫酸锰、碳酸钙、碘酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、牛磺酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、叶黄素、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

喂哺建议表

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水量(mL)	专用平匙数	
6-7月	150	5	5-6
7-9月	150-180	5-6	4-5
9-12月	180	6	4

注:请使用本品随时专用量匙,1平匙奶粉约4.5g

也可根据宝宝个体差异,按照医生建议,调整喂哺量。未经医生建议请勿随意改变喂哺量。
请按照喂哺建议表中所建议的比例用量冲调,未经医生建议请勿改变冲调浓度。

食用方法

- 1.将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净,使用前用沸水煮至少5分钟,待用。
冲调前请清洗双手并保持环境卫生。
- 2.将饮用水煮沸5分钟,冷却至50℃左右。
- 3.依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量,将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。
- 4.将所需的奶粉加入到奶瓶中。
- 5.盖紧奶瓶,轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- 6.待奶液温度适宜时,再给宝宝喂奶。

重要声明

6个月龄以上婴儿食用本产品时,须配合添加辅助食品。

温馨提示

- 请按以上方法冲调奶粉,方法不当可能会影响宝宝健康。
- 冲调好的奶液应在1小时内喂完,剩余的奶液应弃去。
- 冲调好的奶液勿放入微波炉内加热,以免烫伤。
- 本品含有乳糖和乳蛋白,乳糖不耐和乳蛋白过敏体质严重的宝宝慎用或遵医嘱。



咨询热线:(周一至周五9:00-17:00)

400-996-0502

国食注字:YP20240029

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2010
蛋白质	g	0.69	13.80
脂肪	g	1.13	22.70
亚油酸	g	0.14	2.76
α-亚麻酸	mg	22	448
碳水化合物	g	2.6	52.8
维生素			
维生素A	μg RE	24	482
维生素D	μg	0.54	10.86
维生素E	mg α-TE	0.24	4.73
维生素K ₁	μg	2.10	42.30
维生素B ₁	μg	26	518
维生素B ₂	μg	40	813
维生素B ₆	μg	27.7	557.0
维生素B ₁₂	μg	0.099	1.980
烟酸(烟酰胺)	μg	173	3471
叶酸	μg	4.6	93.0
泛酸	μg	168	3378
维生素C	mg	3.5	71.0
生物素	μg	1.12	22.60
矿物质			
钠	mg	6	122
钾	mg	27	535
铜	μg	14.3	288.0
镁	mg	2.4	48.6
铁	mg	0.33	6.56
锌	mg	0.20	4.10
钙	mg	21	413
磷	mg	14	290
碘	μg	5.6	112.0
氯	mg	21	414
可选择成分			
硒	μg	0.95	19.00
胆碱	mg	8.7	175.0
锰	μg	8.66	174.00
牛磺酸	mg	1.5	30.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.2	84.3
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.9	98.0
低聚果糖	mg	149.25	3000.00
聚葡萄糖	mg	84.58	1700.00
1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	g	0.14	2.8
叶黄素	μg	9.5	190.0

贮藏方法: 本产品应贮藏于阴凉干燥处, 勿放入冰箱内;
每次食用后及时将罐口封严, 开罐后请在一个月内食用完毕。

贝因美®

小羊蓝蓝

幼儿配方羊奶粉

(12-36月龄, 3段)



国食注字:YP20240030

配料表

脱盐乳清粉(来源羊乳)、全脂羊奶粉、食用植物调和油(1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、菜籽油、棕榈仁油、葵花籽油、磷脂)、低聚果糖、聚葡萄糖、核桃油、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氯钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、碘酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、牛磺酸、二十二碳六烯酸油(发酵法)、花生四烯酸、叶黄素、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

生产商: 黑龙江安嘉乳业有限公司
地址: 黑龙江省铁力农场场直二八九大街9号
产地: 黑龙江省伊春市
食品生产许可证编号:
SC10523300800298
产品标准代号: GB 10767-2021
产品类别、属性: 乳基幼儿配方乳粉
保质期: 24个月
批号、生产日期及保质期(至): 见罐底
检验合格证号: 同批号
曾用商品名称: 贝儿悦柔

喂哺建议表

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水量(mL)	专用平匙数	
12-24月	180-210	6-7	2-3
24-36月	210	7	2

注: 请使用本品随附专用量匙, 1平匙奶粉≈4.5g

也可根据宝宝个体差异, 按照医生建议, 调整喂哺量。未经医生建议请勿随意改变喂哺量。
请按照喂哺建议表中所建议的比例用量冲调, 未经医生建议请勿改变冲调浓度。

食用方法

1. 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净, 使用前用沸水煮至少5分钟, 待用。
2. 将饮用水煮沸5分钟, 冷却至50°C左右。
3. 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量, 将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。
4. 将所需的奶粉加入到奶瓶中。
5. 盖紧奶瓶, 轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
6. 待奶液温度适宜时, 再给宝宝喂奶。

温馨提示

- 请按以上方法冲调奶粉, 方法不当可能会影响宝宝健康。
- 冲调好的奶液应在1小时内喂哺完, 剩余的奶液应弃去。
- 冲调好的奶液勿放入微波炉内加热, 以免烫伤。
- 本品含有乳糖和乳蛋白质, 乳糖不耐和乳蛋白过敏体质严重的宝宝慎用或遵医嘱。



6 948894 025577

咨询热线:(周一至周五9:00-17:00)

400-996-0502

标签编号: AJRY-25

贝因美®

小羊蓝蓝

幼儿配方羊奶粉

(12-36月龄, 3段)



3段

净含量:400克

国食注字:YP20240030

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2010
蛋白质	g	0.69	13.80
脂肪	g	1.13	22.70
亚油酸	g	0.14	2.76
α-亚麻酸	mg	22	448
碳水化合物	g	2.6	52.8
维生素			
维生素A	μg RE	24	482
维生素D	μg	0.54	10.86
维生素E	mg α-TE	0.24	4.73
维生素K ₁	μg	2.10	42.30
维生素B ₁	mg	26	518
维生素B ₂	mg	40	813
维生素B ₆	mg	27.7	557.0
维生素B ₁₂	mg	0.099	1.980
烟酸(烟酰胺)	mg	173	3471
叶酸	mg	4.6	93.0
泛酸	mg	168	3378
维生素C	mg	3.5	71.0
生物素	μg	1.12	22.60
矿物质			
钠	mg	6	122
钾	mg	27	535
铜	mg	14.3	288.0
镁	mg	2.4	48.6
铁	mg	0.33	6.56
锌	mg	0.20	4.10
钙	mg	21	413
磷	mg	14	290
碘	mg	5.6	112.0
氯	mg	21	414
可选择成分			
胆碱	μg	0.95	19.00
胆碱	mg	8.7	175.0
牛磺酸	μg	8.66	174.00
牛磺酸	mg	1.5	30.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.2	84.3
二十二碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.9	98.0
低聚果糖	mg	149.25	3000.00
聚葡萄糖	mg	84.58	1700.00
1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	g	0.14	2.8
叶黄素	μg	9.5	190.0

配料表

脱盐乳清粉(来源羊乳)、全脂羊奶粉、食用植物调和油(1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、菜籽油、棕榈仁油、葵花籽油、磷脂)、低聚果糖、聚葡萄糖、核桃油、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲素醍、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氯钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、碘酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、牛磺酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、叶黄素、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

喂哺建议表

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水量(mL)	专用平匙数	
12-24月	180-210	6-7	2-3
24-36月	210	7	2

注: 请使用本品随附专用量匙, 1平匙奶粉≈4.5g

也可根据宝宝个体差异, 按照医生建议, 调整喂哺量。未经医生建议请勿随意改变喂哺量。
请按照喂哺建议表中所建议的比例用量冲调, 未经医生建议请勿改变冲调浓度。

食用方法

1. 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净, 使用前用沸水煮至少5分钟, 待用。
2. 将饮用水煮沸5分钟, 冷却至50°C左右。
3. 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量, 将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。
4. 将所需的奶粉加入到奶瓶中。
5. 盖紧奶瓶, 轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
6. 待奶液温度适宜时, 再给宝宝喂奶。

温馨提示

- 请按以上方法冲调奶粉, 方法不当可能会影响宝宝健康。
- 冲调好的奶液应在1小时内喂哺完, 剩余的奶液应弃去。
- 冲调好的奶液勿放入微波炉内加热, 以免烫伤。
- 本品含有乳糖和乳蛋白质, 乳糖不耐和乳蛋白过敏体质的宝宝慎用或遵医嘱。



咨询热线:(周一至周五9:00-17:00)

400-996-0502

贝因美®

小羊蓝蓝

幼儿配方羊奶粉
(12-36月龄, 3段)

3段

净含量:100克

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2010
蛋白质	g	0.69	13.80
脂肪	g	1.13	22.70
亚油酸	mg	0.14	2.76
α-亚麻酸	mg	22	448
碳水化合物	g	2.6	52.8
维生素			
维生素A	μg RE	24	482
维生素D	μg H9	0.54	10.86
维生素E	mg α-TE	0.24	4.73
维生素K	mg H9	2.10	42.30
维生素B1	mg H9	26	518
维生素B2	mg H9	40	813
维生素B6	mg H9	27.7	557.0
维生素B12	mg H9	0.099	1.980
烟酸(烟酰胺)	mg H9	173	3471
叶酸	mg H9	4.6	93.0
泛酸	mg H9	168	3378
维生素C	mg H9	3.5	71.0
生物素	mg H9	1.12	22.60
矿物质			
钠	mg	6	122
钾	mg	27	535
铜	mg	14.3	288.0
镁	mg	2.4	48.6
铁	mg	0.33	6.56
锌	mg	0.20	4.10
钙	mg	21	413
磷	mg	14	290
碘	mg	5.6	112.0
氯	mg	21	414
可选择成分			
硒	μg	0.95	19.00
胆碱	mg	8.7	175.0
锰	μg	8.66	174.00
牛磺酸	mg	1.5	30.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.2	84.3
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.9	98.0
低聚果糖	mg	149.25	3000.00
聚葡萄糖	mg	84.58	1700.00
1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	g	0.14	2.8
叶黄素	kg	9.5	190.0

国食注字:YP20240030

配料表

脱盐乳清粉(来源羊乳)、全脂羊奶粉、食用植物调和油(1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、菜籽油、棕榈仁油、葵花籽油、磷脂)、低聚果糖、聚葡萄糖、核桃油、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物茶氨酸、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、葡萄糖、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、碘酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、牛磺酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、叶黄素、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

喂哺建议表

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水量(mL)	专用平匙数	
12-24月	180-210	6-7	2-3
24-36月	210	7	2

注: 请使用本品随附专用量匙, 1平匙奶粉约4.5g

也可根据宝宝个体差异, 按照医生建议, 调整喂哺量。未经医生建议请随意改变喂哺量。
请按照喂哺建议表中所建议的比例用量冲调, 未经医生建议请勿改变冲调浓度。

食用方法

- 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净, 使用前用沸水煮至少5分钟, 待用。
- 冲调前请清洗双手并保持环境卫生。
- 将饮用水煮沸5分钟, 冷却至50°C左右。
- 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量, 将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。
- 将所需的奶粉加入到奶瓶中。
- 盖紧奶瓶, 轻轻摇动直至奶粉完全溶解。

生产商: 黑龙江安嘉乳业有限公司

地址: 黑龙江省铁力农场

场直二八九大街9号

产地: 黑龙江省伊春市

食品生产许可证编号:

SC10523300800298

产品标准代号: GB10767-2021

产品类别、属性: 乳基幼儿配方奶粉

保质期: 24个月

批号、生产日期及保质期
(至): 见罐底

检验合格证号: 同批号

贮藏方法: 本产品应贮藏于阴凉干燥处, 勿放入冰箱内; 每次食用后及时将罐口封严, 开罐后请在一个月内食用完毕。

曾用商品名称: 贝儿悦柔

温馨提示

- 请按以上方法冲调奶粉, 方法不当可能会影响宝宝健康。
- 冲调好的奶液应在1小时内喂哺完, 剩余的奶液应弃去。
- 冲调好的奶液勿放入微波炉内加热, 以免烫伤。
- 本品含有乳糖和乳蛋白, 乳糖不耐和乳蛋白过敏体质严重的宝宝慎用或遵医嘱。



6 948894 025751

咨询热线(周一至周五9:00-17:00)

400-996-0502