

喂哺建议表			
年龄	每次喂哺量	每日喂哺次数	
	温开水量(ml)	量勺数(平勺)	
0-2周	60	2	7-8
2-4周	90	3	6-7
1-2月	120	4	5-6
2-3月	150	5	5-6
3-4月	180	6	5-6
4-6月	210	7	4-5

△参照此表取适量温开水和奶粉，此表是根据平均需要量而定，仅供参考；
最适宜的溶解温度是45°C~50°C；每平勺奶粉约4.35克。
100ml 奶液 = 13.05g 奶粉 + 90ml 温开水



贮存说明

- 本品应存放在阴凉干燥通风处。
- 奶粉开罐后请务必盖严，切记！请勿放入冰箱内保存。
- 开罐后请在一个月内食用完。



温馨提示

- 对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品；
- 请勿擅自改变奶的浓度，浓度不恰当宝宝会得不到适当的营养；
- 冲调奶粉时，如有奶粉泡沬或挂壁均属正常现象，请放心食用；
- 奶粉冲调好后，待温度适宜时给宝宝食用，喂哺剩余的奶液请弃掉，勿留于下次食用；
- 宝宝在两餐之间要适当补充水。



1段

净含量: 72克

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2108
蛋白质	g	0.51	10.8
乳清蛋白	g	0.41	8.6
脂肪	g	1.25	26.4
亚油酸	g	0.20	4.16
α-亚麻酸	mg	20.2	425
碳水化合物	g	2.58	54.3
维生素			
维生素A	μg RE	17.5	368
维生素D	μg	0.60	12.6
维生素E	mg α-TE	0.23	4.86
维生素K ₁	μg	1.22	25.8
维生素B ₁	μg	17.5	368
维生素B ₂	μg	23.8	502
维生素B ₆	μg	10.5	222
维生素B ₁₂	μg	0.050	1.05
烟酸	μg	137	2880
叶酸	μg	3.63	76.5
泛酸	μg	120	2530
维生素C	mg	3.00	63.3
生物素	μg	0.45	9.5
胆碱	mg	6.21	131
矿物质			
钠	mg	8.30	175
钾	mg	21.8	459
铜	μg	17.6	370
镁	mg	1.52	32.0
铁	mg	0.16	3.35
锌	mg	0.15	3.22
锰	μg	1.84	38.8
钙	mg	15.9	335
磷	mg	10.0	210
碘	μg	4.48	94.5
氯	mg	16.6	350
硒	μg	0.90	18.9
可选择成分			
肌醇	mg	1.79	37.8
左旋肉碱	mg	0.37	7.90
二十二碳六烯酸	mg	4.30	90.6
二十碳四烯酸	mg	5.03	106
低聚半乳糖	g	0.13	2.70
低聚果糖	g	0.014	0.30
叶黄素	μg	3.32	70.0



棒棒羊1-72

配料表

脱盐乳清粉（来源羊乳）、食用植物调和油（玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油）、全脂羊乳粉、低聚半乳糖、橄榄油、奶油、低聚果糖、磷脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、混合生育酚浓缩物、植物茶氨酸、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、D-泛酸钙、叶酸、D-生物素、氯化胆碱、左旋肉碱、肌醇、硫酸亚铁、硫酸锌、碘酸钾、硫酸铜、硫酸锰、亚硒酸钠、硫酸镁、碳酸钙、磷酸氢钙、柠檬酸钠、柠檬酸钾、氯化钾、L-抗坏血酸钠、磷酸三钙、叶黄素、二十二碳六烯酸、花生四烯酸、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12

产品信息

生产商：北安宜品努卡乳业有限公司
地址：黑龙江省黑河市北安市铁西区工业园区
产地：黑龙江·黑河
食品生产许可证编号：SC10523118150120
产品类别及属性：乳基粉状 婴儿配方食品
产品标准号：GB 10765-2021
保质期：18个月
生产日期、批号及保质期至：见罐底
销售热线：400-885-0296

喂哺建议表			
年龄	每次喂哺量 温开水量(ml)	量勺数(平勺)	每日喂哺次数
0-2周	60	2	7-8
2-4周	90	3	6-7
1-2月	120	4	5-6
2-3月	150	5	5-6
3-4月	180	6	5-6
4-6月	210	7	4-5

△ 参照此表取适量温开水和奶粉，此表是根据平均需要量而定，仅供参考；
最适宜的溶解温度是45°C~50°C；每平勺奶粉约4.35克。
100ml 奶液=13.05g 奶粉+90ml 温开水



冲调方法



- 消毒：将奶瓶和奶嘴放入沸水中煮5分钟进行消毒；
- 将水注入奶瓶：饮用水煮沸后，冷却至45°C~50°C，参照喂哺建议表，将适量的水倒入消过毒的奶瓶中；
- 将奶粉加入奶瓶：参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中；
- 摇晃奶瓶：盖紧奶瓶，并摇动奶瓶直至奶粉充分溶解；
- 测温：喂哺前，请将奶液滴在手腕内侧检测温度是否适合宝宝食用；
- 清洗：喂哺后剩余奶液请丢弃，清洗奶瓶和奶嘴。

贮存说明

- 本品应存放在阴凉干燥通风处。
- 奶粉开罐后请务必盖严，切记！请勿放入冰箱内保存。
- 开罐后请在一个月内食用完。



营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2108
蛋白质	g	0.51	10.8
乳清蛋白	g	0.41	8.6
脂肪	g	1.25	26.4
亚油酸	g	0.20	4.16
α-亚麻酸	mg	20.2	425
碳水化合物	g	2.58	54.3
维生素			
维生素A	μg RE	17.5	368
维生素D	μg	0.60	12.6
维生素E	mg α-TE	0.23	4.86
维生素K ₁	μg	1.22	25.8
维生素B ₁	μg	17.5	368
维生素B ₂	μg	23.8	502
维生素B ₆	μg	10.5	222
维生素B ₁₂	μg	0.050	1.05
烟酸	μg	137	2880
叶酸	μg	3.63	76.5
泛酸	μg	120	2530
维生素C	mg	3.00	63.3
生物素	μg	0.45	9.5
胆碱	mg	6.21	131
矿物质			
钠	mg	8.30	175
钾	mg	21.8	459
铜	μg	17.6	370
镁	mg	1.52	32.0
铁	mg	0.16	3.35
锌	mg	0.15	3.22
锰	μg	1.84	38.8
钙	mg	15.9	335
磷	mg	10.0	210
碘	μg	4.48	94.5
氯	mg	16.6	350
硒	μg	0.90	18.9
可选择成分			
肌醇	mg	1.79	37.8
左旋肉碱	mg	0.37	7.90
二十二碳六烯酸	mg	4.30	90.6
二十碳四烯酸	mg	5.03	106
低聚半乳糖	g	0.13	2.70
低聚果糖	g	0.014	0.30
叶黄素	μg	3.32	70.0

配料表			
脱盐乳清粉（来源羊乳）、食用植物调和油（玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油）、全脂羊乳粉、低聚半乳糖、橄榄油、奶油、低聚果糖、磷脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、混合生育酚浓缩物、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、D-泛酸钙、叶酸、D-生物素、氯化胆碱、左旋肉碱、肌醇、硫酸亚铁、硫酸锌、碘酸钾、硫酸铜、硫酸锰、亚硒酸钠、硫酸镁、碳酸钙、磷酸氢钙、柠檬酸钠、柠檬酸钾、氯化钾、L-抗坏血酸钠、磷酸三钙、叶黄素、二十二碳六烯酸、花生四烯酸、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12			

产品信息			
生产商：	北安宜品努卡乳业有限公司	地址：	黑龙江省黑河市北安市铁西区工业园区
产地：	黑龙江·黑河	食品生产许可证编号：	SC10523118150120
产品类别及属性：	乳基粉状婴儿配方食品	产品标准号：	GB 10765-2021
保质期：	24个月	生产日期、批号及保质期至：	见罐底
销售热线：	400-885-0296		



棒棒羊1-400

喂哺建议表			
年龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水量(ml)	量勺数(平勺)	
0-2周	60	2	7-8
2-4周	90	3	6-7
1-2月	120	4	5-6
2-3月	150	5	5-6
3-4月	180	6	5-6
4-6月	210	7	4-5

⚠ 参照此表取适量温开水和奶粉，此表是根据平均需要量而定，仅供参考；
最适宜的溶解温度是45°C~50°C；每平勺奶粉约4.35克。
100ml 奶液=13.05g 奶粉 + 90ml 温开水

冲调方法



温馨提示

- 对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品；
- 请勿擅自改变奶的浓度，浓度不恰当宝宝会得不到适当的营养；
- 冲调奶粉时，如有奶粉泡沫或挂壁均属正常现象，请放心食用；
- 奶粉冲调好后，待温度适宜时给宝宝食用，喂哺剩余的奶液请弃掉，勿留于下次食用；
- 宝宝在两餐之间要适当补充水；
- 摇晃奶瓶：盖紧奶瓶，并摇动奶瓶直至奶粉充分溶解；
- 测温：喂哺前，请将奶液滴在手腕内侧检测温度是否适合宝宝食用；
- 清洗：喂哺后剩余奶液请丢弃，清洗奶瓶和奶嘴。

贮存说明

- 本品应存放在阴凉干燥通风处。
- 奶粉开罐后请务必盖严，切记！请勿放入冰箱内保存。
- 开罐后请在一个月内食用完。



营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2108
蛋白质	g	0.51	10.8
乳清蛋白	g	0.41	8.6
脂肪	g	1.25	26.4
亚油酸	g	0.20	4.16
α-亚麻酸	mg	20.2	425
碳水化合物	g	2.58	54.3
维生素			
维生素A	μg RE	17.5	368
维生素D	μg	0.60	12.6
维生素E	mg α-TE	0.23	4.86
维生素K ₁	μg	1.22	25.8
维生素B ₁	μg	17.5	368
维生素B ₂	μg	23.8	502
维生素B ₆	μg	10.5	222
维生素B ₁₂	μg	0.050	1.05
烟酸	μg	137	2880
叶酸	μg	3.63	76.5
泛酸	μg	120	2530
维生素C	mg	3.00	63.3
生物素	μg	0.45	9.5
胆碱	mg	6.21	131
矿物质			
钠	mg	8.30	175
钾	mg	21.8	459
铜	μg	17.6	370
镁	mg	1.52	32.0
铁	mg	0.16	3.35
锌	mg	0.15	3.22
锰	μg	1.84	38.8
钙	mg	15.9	335
磷	mg	10.0	210
碘	μg	4.48	94.5
氯	mg	16.6	350
硒	μg	0.90	18.9
可选择成分			
肌醇	mg	1.79	37.8
左旋肉碱	mg	0.37	7.90
二十二碳六烯酸	mg	4.30	90.6
二十碳四烯酸	mg	5.03	106
低聚半乳糖	g	0.13	2.70
低聚果糖	g	0.014	0.30
叶黄素	μg	3.32	70.0

配料表

脱盐乳清粉（来源羊乳）、食用植物调和油（玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油）、全脂羊乳粉、低聚半乳糖、橄榄油、奶油、低聚果糖、磷脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-a-醋酸生育酚、混合生育酚浓缩物、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氯钴胺、烟酰胺、D-泛酸钙、叶酸、D-生物素、氯化胆碱、左旋肉碱、肌醇、硫酸亚铁、硫酸锌、碘酸钾、硫酸铜、硫酸镁、亚硒酸钠、硫酸镁、磷酸钙、磷酸氢钙、柠檬酸钠、柠檬酸钾、氯化钾、L-抗坏血酸钠、磷酸三钙、叶黄素、二十二碳六烯酸、花生四烯酸、动物双歧杆菌乳业亚种 Bb-12

产品信息

生产商：北安宜品努卡乳业有限公司
地址：黑龙江省黑河市北安市铁西区工业园区
产地：黑龙江·黑河
食品生产许可证编号：SC10523118150120
产品类别及属性：乳基粉状 婴儿配方食品
产品标准号：GB 10765-2021
保质期：24个月
生产日期、批号及保质期至：见罐底
销售热线：400-885-0296



棒棒羊1-800

喂哺建议表		
年龄	每次喂哺量	每日喂哺次数
0-2周	60	2
2-4周	90	3
1-2月	120	4
2-3月	150	5
3-4月	180	6
4-6月	210	7
△参考此表取适量温开水和奶粉，此表是根据平均需要量而定，仅供参考；最适宜的溶解温度是45°C-50°C；每平勺奶粉约4.35克。 100ml奶液=13.05g奶粉+90ml温开水		



冲调方法



1. 消毒：将奶瓶和奶嘴放入沸水中煮5分钟进行消毒；
2. 将水注入奶瓶：饮用水煮沸后，冷却至45°C-50°C，参照喂哺建议表，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中；
3. 将奶粉加入奶瓶：参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中；
4. 摆晃奶瓶，盖紧奶瓶，并摇动奶瓶直至奶粉充分溶解；
5. 测温：喂哺前，请将奶液滴在手腕内侧检测温度是否适合宝宝食用；
6. 清洗：喂哺后剩余奶粉请丢弃，清洗奶瓶和奶嘴。

贮存说明

- 本品应存放在阴凉干燥通风处。
- 奶粉开罐后请务必盖严，切记：请勿放入冰箱内保存。
- 开罐后请在一个月内食用完。

1段



净含量: 200克

营养成分表		
项目	单位	每100kJ 每100g
能量	kJ	100 2108
蛋白质	g	0.51 10.8
乳清蛋白	g	0.41 8.6
脂肪	g	1.25 26.4
亚油酸	g	0.20 4.16
α-亚麻酸	mg	20.2 425
碳水化合物	g	2.58 54.3
维生素		
维生素A	μg RE	17.5 368
维生素D	μg	0.60 12.6
维生素E	mg α-TE	0.23 4.86
维生素K ₁	μg	1.22 25.8
维生素B ₁	μg	17.5 368
维生素B ₂	μg	23.8 502
维生素B ₆	μg	10.5 222
维生素B ₁₂	μg	0.050 1.05
烟酸	mg	137 2880
叶酸	mg	3.63 76.5
泛酸	mg	120 2530
维生素C	mg	3.00 63.3
生物素	mg	0.45 9.5
胆碱	mg	6.21 131
矿物质		
钠	mg	8.30 175
钾	mg	21.8 459
镁	mg	17.6 370
钙	mg	1.52 32.0
磷	mg	0.16 3.35
铁	mg	0.15 3.22
锌	mg	1.84 38.8
锰	mg	15.9 335
碘	mg	10.0 210
硒	mg	4.48 94.5
氯	mg	16.6 350
溴	mg	0.90 18.9
可选择成分		
肌醇	mg	1.79 37.8
左旋肉碱	mg	0.37 7.90
二十二碳六烯酸	mg	4.30 90.6
二十碳四烯酸	mg	5.03 106
低聚半乳糖	g	0.13 2.70
低聚果糖	g	0.014 0.30
叶黄素	μg	3.32 70.0

脱盐乳清粉（来源羊乳）、食用植物调和油（玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油）、全脂羊奶粉、低聚半乳糖、橄榄油、奶油、低聚果糖、磷脂、醋酸视听酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、混合生育酚浓缩物、植物甲壳素、盐酸硫酸软骨素、盐酸叶多糖、葡糖胺、烟酰胺、D-泛酸钙、叶酸、D-生物素、氯化胆碱、左旋肉碱、肌醇、硫酸亚铁、硫酸锌、碘酸钾、硫酸铜、硫酸锰、亚硒酸钠、硫酸镁、碳酸钙、磷酸氢钙、柠檬酸钠、柠檬酸钾、氯化钾、L-抗坏血酸钠、磷酸三钙、叶黄素、二十二碳六烯酸、花生四烯酸、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12

生产商：北安宜品努卡乳业有限公司
地址：黑龙江省黑河市北安市铁西区工业园区
产地：黑龙江·黑河
食品生产许可证编号：SC10523118150120
产品类别及属性：乳基粉状婴儿配方食品
产品标准号：GB 10765-2021
保质期：24个月
生产日期、批号及保质期至：见罐底
销售热线：400-885-0296



棒棒羊1-200

棒棒羊较大婴儿配方羊奶粉

- 含左旋肉碱
- 含肌醇

冲调方法



1. 消毒：将奶瓶和奶嘴放入沸水中煮 5 分钟进行消毒；
2. 将水注入奶瓶：饮用水煮沸后，冷却至 45°C~50°C，参照喂哺建议表，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中；
3. 将奶粉加入奶瓶：参照喂哺建议表，使用专用量勺将奶粉加入奶瓶中；
4. 摆晃奶瓶：盖紧奶瓶，并摇动奶瓶直至奶粉充分溶解；
5. 测温：喂哺前，请将奶液滴在手腕内侧检测温度是否适合宝宝食用；
6. 清洗：喂哺后剩余奶液请丢弃，清洗奶瓶和奶嘴。

贮存说明

- 本品应存放在阴凉干燥通风处。
- 奶粉开罐后请务必盖严，切记！请勿放入冰箱内保存。
- 开罐后请在一个月内食用完。



喂哺建议表

年龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水量(ml)	量勺数(平勺)	
6-8月	210	7	3-4
8-12月	240	8	3

▲参照此表取适量温开水和奶粉，此表是根据平均需要量而定，仅供参考；
最适宜的溶解温度是 45°C~50°C；每平勺奶粉约 4.5 克。
100ml 奶液 = 13.5g 奶粉 + 90ml 温开水

温馨提示

- 母乳喂养永远是最好的喂养方式，在母乳不足或无母乳时可食用本产品，较大婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品；
- 请勿擅自改变奶的浓度，浓度不恰当宝宝会得不到适当的营养；
- 冲调奶粉时，如有奶粉泡沫或挂壁均属正常现象，请放心食用；
- 奶粉冲调好后，待温度适宜时给宝宝食用，喂哺剩余的奶液请弃掉，勿留于下次食用；
- 宝宝在两餐之间要适当补充水。

宜品®

国食注字
YP20230268

棒棒羊

较大婴儿配方羊奶粉

(6-12月龄, 2段)



2段

净含量: 72克

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2014
蛋白质	g	0.63	12.7
乳清蛋白	g	0.44	8.8
脂肪	g	1.08	21.7
亚油酸	g	0.16	3.25
α-亚麻酸	mg	17.5	353
碳水化合物	g	2.84	57.1
维生素			
维生素A	μg RE	22.3	450
维生素D	μg	0.60	12.0
维生素E	mg α-TE	0.21	4.23
维生素K ₁	μg	1.33	26.7
维生素B ₁	μg	17.6	355
维生素B ₂	μg	26.3	530
维生素B ₆	μg	13.7	275
维生素B ₁₂	μg	0.060	1.20
烟酸	μg	137	2750
叶酸	μg	2.99	60.3
泛酸	μg	121	2430
维生素C	mg	3.04	61.2
生物素	μg	0.52	10.5
胆碱	mg	6.01	121
矿物质			
钠	mg	7.89	159
钾	mg	22.3	450
铜	μg	10.4	210
镁	mg	1.51	30.5
铁	mg	0.30	6.00
锌	mg	0.15	3.01
锰	μg	1.98	39.8
钙	mg	21.4	430
磷	mg	12.4	250
碘	μg	4.50	90.6
氯	mg	17.4	350
硒	μg	0.60	12.1
可选择成分			
肌醇	mg	1.26	25.3
左旋肉碱	mg	0.54	10.8
二十二碳六烯酸	mg	4.47	90.1
二十碳四烯酸	mg	4.97	100
低聚半乳糖	g	0.13	2.70
低聚果糖	g	0.015	0.30
叶黄素	μg	8.69	175

配料表

脱盐乳清粉（来源羊乳）、食用植物调和油（玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油）、全脂羊乳粉、脱脂羊乳粉、低聚半乳糖、奶油、橄榄油、低聚果糖、磷脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、混合生育酚浓缩物、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、D-泛酸钙、叶酸、D-生物素、氯化胆碱、左旋肉碱、肌醇、硫酸亚铁、硫酸锌、碘酸钾、硫酸铜、硫酸锰、亚硒酸钠、硫酸镁、碳酸钙、磷酸氢钙、柠檬酸钠、柠檬酸钾、氯化钾、L-抗坏血酸钠、磷酸三钙、叶黄素、二十二碳六烯酸、花生四烯酸、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12

产品信息

生产商：北安宜品努卡乳业有限公司
地址：黑龙江省黑河市北安市铁西区工业园区
产地：黑龙江·黑河
食品生产许可证编号：SC10523118150120
产品类别及属性：乳基粉状较大婴儿配方食品
产品标准号：GB 10766-2021
保质期：18个月
生产日期、批号及保质期至：见罐底
销售热线：400-885-0296



棒棒羊2-72

棒棒羊较大婴儿配方羊奶粉

含左旋肉碱

含肌醇

冲调方法



喂哺建议表

年龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水量(ml)	量勺数(平勺)	
6-8月	210	7	3-4
8-12月	240	8	3

⚠ 参照此表取适量温开水和奶粉，此表是根据平均需要量而定，仅供参考；
最适宜的溶解温度是 45° C~50° C；每平勺奶粉约 4.5 克。
100ml 奶液 = 13.5g 奶粉 + 90ml 温开水

贮存说明

- 本品应存放在阴凉干燥通风处。
- 奶粉开罐后请务必盖严，切记！请勿放入冰箱内保存。
- 开罐后请在一个月内食用完。

温馨提示

- 母乳喂养永远是最好的喂养方式，在母乳不足或无母乳时可食用本产品，较大婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品；
- 请勿擅自改变奶的浓度，浓度不恰当宝宝会得不到适当的营养；
- 冲调奶粉时，如有奶粉泡沫或挂壁均属正常现象，请放心食用；
- 奶粉冲调好后，待温度适宜时给宝宝食用，喂哺剩余的奶液请弃掉，勿留于下次食用；
- 宝宝在两餐之间要适当补充水。

2段



净含量：400克

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2014
蛋白质	g	0.63	12.7
乳清蛋白	g	0.44	8.8
脂肪	g	1.08	21.7
亚油酸	g	0.16	3.25
α-亚麻酸	mg	17.5	353
碳水化合物	g	2.84	57.1
维生素			
维生素A	μg RE	22.3	450
维生素D	μg	0.60	12.0
维生素E	mg α-TE	0.21	4.23
维生素K ₁	μg	1.33	26.7
维生素B ₁	μg	17.6	355
维生素B ₂	μg	26.3	530
维生素B ₆	μg	13.7	275
维生素B ₁₂	μg	0.060	1.20
烟酸	μg	137	2750
叶酸	μg	2.99	60.3
泛酸	μg	121	2430
维生素C	mg	3.04	61.2
生物素	μg	0.52	10.5
胆碱	mg	6.01	121
矿物质			
钠	mg	7.89	159
钾	mg	22.3	450
铜	μg	10.4	210
镁	mg	1.51	30.5
铁	mg	0.30	6.00
锌	mg	0.15	3.01
锰	μg	1.98	39.8
钙	mg	21.4	430
磷	mg	12.4	250
碘	μg	4.50	90.6
氯	mg	17.4	350
硒	μg	0.60	12.1
可选择成分			
肌醇	mg	1.26	25.3
左旋肉碱	mg	0.54	10.8
二十二碳六烯酸	mg	4.47	90.1
二十碳四烯酸	mg	4.97	100
低聚半乳糖	g	0.13	2.70
低聚果糖	g	0.015	0.30
叶黄素	μg	8.69	175



6 947050506103 >

配料表

脱盐乳清粉（来源羊乳）、食用植物调和油（玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油）、全脂羊乳粉、脱脂羊乳粉、低聚半乳糖、奶油、橄榄油、低聚果糖、磷脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、混合生育酚浓缩物、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、D-泛酸钙、叶酸、D-生物素、氯化胆碱、左旋肉碱、肌醇、硫酸亚铁、硫酸锌、碘酸钾、硫酸铜、硫酸锰、亚硒酸钠、硫酸镁、碳酸钙、磷酸氢钙、柠檬酸钠、柠檬酸钾、氯化钾、L-抗坏血酸钠、磷酸三钙、叶黄素、二十二碳六烯酸、花生四烯酸、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12

产品信息


生产商：北安宜品努卡乳业有限公司
地址：黑龙江省黑河市北安市铁西区工业园区
产地：黑龙江·黑河
食品生产许可证编号：SC10523118150120
产品类别及属性：乳基粉状较大婴儿配方食品
产品标准号：GB 10766-2021
保质期：24个月
生产日期、批号及保质期至：见罐底
销售热线：400-885-0296



棒棒羊2-400



- 消毒：将奶瓶和奶嘴放入沸水中煮 5 分钟进行消毒；
- 将水注入奶瓶：饮用水煮沸后，冷却至 45°C~50°C，参照喂哺建议表，将适量的水倒入消过毒的奶瓶中；
- 将奶粉加入奶瓶：参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中；
- 摇晃奶瓶：盖紧奶瓶，并摇动奶瓶直至奶粉充分溶解；
- 测温：喂哺前，请将奶液滴在手腕内侧检测温度是否适合宝宝食用；
- 清洗：喂哺后剩余奶液请丢弃，清洗奶瓶和奶嘴。



年龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水量(ml)	量勺数(平勺)	
6-8月	210	7	3-4
8-12月	240	8	3

△ 参照此表取适量温开水和奶粉，此表是根据平均需要量而定，仅供参考；最适宜的溶解温度是 45°C~50°C；每平勺奶粉约 4.5 克。100ml 奶液 = 13.5g 奶粉 + 90ml 温开水

温馨提示

- 母乳喂养永远是最好的喂养方式，在母乳不足或无母乳时可食用本产品，较大婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品；
- 请勿擅自改变奶的浓度，浓度不恰当宝宝会得不到适当的营养；
- 冲调奶粉时，如有奶粉泡沫或挂壁均属正常现象，请放心食用；
- 奶粉冲调好后，待温度适宜时给宝宝食用，喂哺剩余的奶液请丢弃，勿留于下次食用；
- 宝宝在两餐之间要适当补充水。



营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2014
蛋白质	g	0.63	12.7
乳清蛋白	g	0.44	8.8
脂肪	g	1.08	21.7
亚油酸	g	0.16	3.25
α-亚麻酸	mg	17.5	353
碳水化合物	g	2.84	57.1
维生素			
维生素A	μg RE	22.3	450
维生素D	μg	0.60	12.0
维生素E	mg α-TE	0.21	4.23
维生素K ₁	μg	1.33	26.7
维生素B ₁	μg	17.6	355
维生素B ₂	μg	26.3	530
维生素B ₆	μg	13.7	275
维生素B ₁₂	μg	0.060	1.20
烟酸	μg	137	2750
叶酸	μg	2.99	60.3
泛酸	μg	121	2430
维生素C	mg	3.04	61.2
生物素	μg	0.52	10.5
胆碱	mg	6.01	121
矿物质			
钠	mg	7.89	159
钾	mg	22.3	450
铜	μg	10.4	210
镁	mg	1.51	30.5
铁	mg	0.30	6.00
锌	mg	0.15	3.01
锰	μg	1.98	39.8
钙	mg	21.4	430
磷	mg	12.4	250
碘	μg	4.50	90.6
氯	mg	17.4	350
硒	μg	0.60	12.1
可选择成分			
肌醇	mg	1.26	25.3
左旋肉碱	mg	0.54	10.8
二十二碳六烯酸	mg	4.47	90.1
二十碳四烯酸	mg	4.97	100
低聚半乳糖	g	0.13	2.70
低聚果糖	g	0.015	0.30
叶黄素	μg	8.69	175

配料表			
脱盐乳清粉（来源羊乳）、食用植物调和油（玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油）、全脂羊乳粉、脱脂羊乳粉、低聚半乳糖、奶油、橄榄油、低聚果糖、磷脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、混合生育酚浓缩物、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氯钴胺、烟酰胺、D-泛酸钙、叶酸、D-生物素、氯化胆碱、左旋肉碱、肌醇、硫酸亚铁、硫酸锌、磷酸钾、硫酸铜、硫酸锰、亚硒酸钠、硫酸镁、碳酸钙、磷酸氢钙、柠檬酸钠、氯化钾、L-抗坏血酸钠、磷酸三钙、叶黄素、二十二碳六烯酸、花生四烯酸、动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12			

产品信息			
生产商：北安宜品努卡乳业有限公司			
地址：黑龙江省黑河市北安市铁西区工业园区			
产地：黑龙江·黑河			
食品生产许可证编号：SC10523118150120			
产品类别及属性：乳基粉状较大婴儿配方食品			
产品标准号：GB 10766-2021			
保质期：24个月			
生产日期、批号及保质期至：见罐底			
销售热线：400-885-0296			



棒棒羊2-800



喂哺建议表		
年龄	每次喂哺量	每日喂哺次数
6-8月	210	7 3-4
8-12月	240	8 3

△参考此表取适量温开水和奶粉，此表是根据平均需要量而定，仅供参考；最适宜的溶解温度是45°C~50°C，每平勺奶粉约4.5克。100ml 奶液 = 3.5g 奶粉 + 90ml 温开水

- 消毒：将奶瓶和奶嘴放入沸水中煮5分钟进行消毒；
- 将水注入奶瓶：饮用水煮沸后，冷却至45°C~50°C，参照喂哺建议表，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中；
- 将奶粉加入奶瓶：参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中；
- 摇晃奶瓶：盖紧奶瓶，并摇动奶瓶直至奶粉充分溶解；
- 测温：喂哺前，请将奶液滴在手腕内侧检测温度是否适合宝宝食用；
- 清洗：喂哺后剩余奶液请丢弃，清洗奶瓶和奶嘴。



营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2014
蛋白质	g	0.63	12.7
乳清蛋白	g	0.44	8.8
脂肪	g	1.08	21.7
亚油酸	g	0.16	3.25
α-亚麻酸	mg	17.5	353
碳水化合物	g	2.84	57.1
维生素			
维生素A	μg RE	22.3	450
维生素D	μg	0.60	12.0
维生素E	mg α-TE	0.21	4.23
维生素K ₁	μg	1.33	26.7
维生素B ₁	μg	17.6	355
维生素B ₂	μg	26.3	530
维生素B ₆	μg	13.7	275
维生素B ₁₂	μg	0.060	1.20
烟酸	μg	137	2750
叶酸	μg	2.99	60.3
泛酸	μg	121	2430
维生素C	mg	3.04	61.2
生物素	μg	0.52	10.5
胆碱	mg	6.01	121
矿物质			
钠	mg	7.89	159
钾	mg	22.3	450
铜	μg	10.4	210
镁	mg	1.51	30.5
铁	mg	0.30	6.00
锌	mg	0.15	3.01
钙	mg	1.98	39.8
磷	mg	21.4	430
碘	mg	12.4	250
氟	mg	4.50	90.6
硒	μg	17.4	350
氯	mg	0.60	12.1
可选择成分			
肌醇	mg	1.26	25.3
左旋肉碱	mg	0.54	10.8
-十一-碳八烯酸	mg	4.47	90.1
-十四-碳四烯酸	mg	4.97	100
低聚半乳糖	g	0.13	2.70
低聚果糖	g	0.015	0.30
叶黄素	μg	8.69	175

脱盐乳清粉（来源羊乳）、食用植物调和油（玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油）、全脂羊乳粉、脱脂羊乳粉、低聚半乳糖、奶油、橄榄油、低聚果糖、碳水化合物、α-亚麻酸、γ-亚麻酸、dL-α-醋酸生育酚、混合生育酚浓缩物、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、D-泛酸钙、叶酸、D-生物素、氯化胆碱、左旋肉碱、肌醇、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸钾、硫酸镁、亚硒酸钠、硫酸镁、碳酸钙、磷酸氢钙、柠檬酸钠、柠檬酸钾、氯化钾、L-抗坏血酸钠、磷酸三钙、叶黄素、二十二碳六烯酸、花生四烯酸、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12

产品信息		
生产商：北安宜品努卡乳业有限公司		
地址：黑龙江省黑河市北安市铁西区工业园区		
产地：黑龙江·黑河		
食品生产许可证编号：SC10523118150120		
产品类别及属性：乳基粉状 较大婴儿配方食品		
产品标准号：GB 10766-2021		
保质期：24个月		
生产日期、批号及保质期至：见罐底		
销售热线：400-885-0296		



棒棒羊2-200

棒棒羊幼儿配方羊奶粉

- 含左旋肉碱
- 含肌醇
- 含胆碱
- 含硒

冲调方法



喂哺建议表

年龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水量(ml)	量勺数(平勺)	
12-36月	210	7	2-3

1. 消毒：将喂哺器具放入沸水中煮 5 分钟进行消毒；
2. 冷却沸水：饮用水煮沸后，冷却至 45°C~50°C，参照喂哺建议表，在奶杯中加入适量的水；
3. 加入奶粉：参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶杯中；
4. 搅拌：将奶粉搅拌至充分溶解；
5. 测温：当奶液温度适宜时即可进行喂哺；
6. 清洗：喂哺后剩余奶液请丢弃，清洗喂哺器具。

贮存说明

- 本品应存放在阴凉干燥通风处。
- 奶粉开罐后请务必盖严，切记！请勿放入冰箱内保存。开罐后请在一个月内食用完。



宜品®

棒棒羊 幼儿配方羊奶粉 (12-36月龄, 3段)



3段

净含量: 72克

国食注字
YP20230269

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2004
蛋白质	g	0.69	13.9
脂肪	g	1.06	21.2
亚油酸	g	0.16	3.18
α-亚麻酸	mg	15.3	307
碳水化合物	g	2.81	56.4
维生素			
维生素A	μg RE	22.5	450
维生素D	μg	0.60	12.0
维生素E	mg α-TE	0.23	4.51
维生素K ₁	μg	1.32	26.5
维生素B ₁	μg	17.6	352
维生素B ₂	μg	27.5	552
维生素B ₆	μg	13.8	276
维生素B ₁₂	μg	0.057	1.15
烟酸	μg	140	2813
叶酸	μg	3.10	62.2
泛酸	μg	122	2436
维生素C	mg	3.00	60.2
生物素	μg	0.53	10.7
矿物质			
钠	mg	7.49	150
钾	mg	22.6	452
铜	μg	8.98	180
镁	mg	1.79	35.9
铁	mg	0.30	6.10
锌	mg	0.13	2.68
钙	mg	21.3	426
磷	mg	13.0	260
碘	μg	2.87	57.6
氯	mg	16.5	330
可选择成分			
硒	μg	0.61	12.3
胆碱	mg	6.04	121
锰	μg	1.58	31.7
肌醇	mg	1.28	25.6
左旋肉碱	mg	0.38	7.60
二十二碳六烯酸	mg	4.03	80.8
二十碳四烯酸	mg	4.51	90.3
低聚半乳糖	g	0.13	2.70
低聚果糖	g	0.015	0.30
叶黄素	μg	8.53	171

配料表

脱盐乳清粉（来源羊乳）、食用植物调和油（玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油）、脱脂羊乳粉、全脂羊乳粉、低聚半乳糖、奶油、橄榄油、低聚果糖、磷脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、混合生育酚浓缩物、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、D-泛酸钙、叶酸、D-生物素、氯化胆碱、左旋肉碱、肌醇、硫酸亚铁、硫酸锌、碘酸钾、硫酸铜、硫酸锰、亚硒酸钠、硫酸镁、碳酸钙、柠檬酸钾、柠檬酸钠、氯化钾、L-抗坏血酸钠、磷酸三钙、叶黄素、二十二碳六烯酸、花生四烯酸、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12

产品信息

生产商：北安宜品努卡乳业有限公司
地址：黑龙江省黑河市北安市铁西区工业园区
产地：黑龙江·黑河

食品生产许可证编号：SC10523118150120

产品类别及属性：乳基粉状 幼儿配方食品

产品标准号：GB 10767-2021

保质期：18个月

生产日期、批号及保质期至：见罐底

销售热线：400-885-0296



棒棒羊3-72

棒棒羊幼儿配方羊奶粉

含左旋肉碱

含胆碱

含肌醇

含硒

冲调方法



- 消毒：将喂哺器具放入沸水中煮 5 分钟进行消毒；
- 冷却沸水：饮用水水煮沸后，冷却至 45°C~50°C，参照喂哺建议表，在奶杯中加入适量的水；
- 加入奶粉：参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶杯中；
- 搅拌：将奶粉搅拌至充分溶解；
- 测温：当奶液温度适宜时即可进行喂哺；
- 清洗：喂哺后剩余奶液请丢弃，清洗喂哺器具。

贮存说明

- 本品应存放在阴凉干燥通风处。
- 奶粉开罐后请务必盖严，切记！请勿放入冰箱内保存。
- 开罐后请在一个月内食用完。



喂哺建议表

年龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水量(ml)	量勺数(平勺)	
12-36月	210	7	2-3

⚠ 参照此表取适量温开水和奶粉，此表是根据平均需要量而定，仅供参考；
最适宜的溶解温度是 45°C~50°C；每平勺奶粉约 4.5 克。
100ml 奶液 = 13.5g 奶粉 + 90ml 温开水

温馨提示

- 母乳喂养永远是最好的喂养方式，在母乳不足或无母乳时可食用本产品；
- 请勿擅自改变奶的浓度，浓度不恰当宝宝会得不到适当的营养；
- 冲调奶粉时，如有奶粉泡沫或挂壁均属正常现象，请放心食用；
- 奶粉冲调好后，待温度适宜时给宝宝食用，喂哺剩余的奶液请弃掉，勿留于下次食用；
- 宝宝在两餐之间要适当补充水。

3段



净含量: 400克

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2004
蛋白质	g	0.69	13.9
脂肪	g	1.06	21.2
亚油酸	g	0.16	3.18
α-亚麻酸	mg	15.3	307
碳水化合物	g	2.81	56.4
维生素			
维生素A	μg RE	22.5	450
维生素D	μg	0.60	12.0
维生素E	mg α-TE	0.23	4.51
维生素K ₁	μg	1.32	26.5
维生素B ₁	μg	17.6	352
维生素B ₂	μg	27.5	552
维生素B ₆	μg	13.8	276
维生素B ₁₂	μg	0.057	1.15
烟酸	μg	140	2813
叶酸	μg	3.10	62.2
泛酸	μg	122	2436
维生素C	mg	3.00	60.2
生物素	μg	0.53	10.7
矿物质			
钠	mg	7.49	150
钾	mg	22.6	452
铜	μg	8.98	180
镁	mg	1.79	35.9
铁	mg	0.30	6.10
锌	mg	0.13	2.68
钙	mg	21.3	426
磷	mg	13.0	260
碘	μg	2.87	57.6
氯	mg	16.5	330
可选择成分			
硒	μg	0.61	12.3
胆碱	mg	6.04	121
锰	μg	1.58	31.7
肌醇	mg	1.28	25.6
左旋肉碱	mg	0.38	7.60
二十二碳六烯酸	mg	4.03	80.8
二十碳四烯酸	mg	4.51	90.3
低聚半乳糖	g	0.13	2.70
低聚果糖	g	0.015	0.30
叶黄素	μg	8.53	171

配料表

脱盐乳清粉（来源羊乳）、食用植物调和油（玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油）、脱脂羊乳粉、全脂羊乳粉、低聚半乳糖、奶油、橄榄油、低聚果糖、磷脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、混合生育酚浓缩物、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、D-泛酸钙、叶酸、D-生物素、氯化胆碱、左旋肉碱、肌醇、硫酸亚铁、硫酸锌、碘酸钾、硫酸铜、硫酸锰、亚硒酸钠、硫酸镁、碳酸钙、柠檬酸钾、柠檬酸钠、氯化钾、L-抗坏血酸钠、磷酸三钙、叶黄素、二十二碳六烯酸、花生四烯酸、动物双歧杆菌亚种Bb-12

产品信息

生产商：北安宜品努卡乳业有限公司
地址：黑龙江省黑河市北安市铁西区工业园区
产地：黑龙江·黑河
食品生产许可证编号：SC10523118150120
产品类别及属性：乳基粉状 幼儿配方食品
产品标准号：GB 10767-2021
保质期：24个月
生产日期、批号及保质期至：见罐底
销售热线：400-885-0296



棒棒羊3-400

棒棒羊幼儿配方羊奶粉

✓含左旋肉碱 ✓含肌醇
✓含胆碱 ✓含硒

冲调方法

1. 消毒：将喂哺器具放入沸水中煮 5 分钟进行消毒；
2. 冷却沸水：饮用水煮沸后，冷却至 45°C~50°C，参考喂哺建议表，在奶杯中加入适量的水；
3. 加入奶粉：参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶杯中；
4. 搅拌：将奶粉搅拌至充分溶解；
5. 测温：当奶液温度适宜时即可进行喂哺；
6. 清洗：喂哺后剩余奶液请丢弃，清洗喂哺器具。

贮存说明

- 本品应存放在阴凉干燥通风处。
- 奶粉开罐后请务必盖严，切记！请勿放入冰箱内保存。
- 开罐后请在一个月内食用完。



年龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水量(ml)	量勺数(平勺)	
12-36月	210	7	2-3

△ 参照此表取适量温开水和奶粉，此表是根据平均需要量而定，仅供参考；
最适宜的溶解温度是 45°C~50°C；每平勺奶粉约 4.5 克。
100ml 奶液 = 13.5g 奶粉 + 90ml 温开水

温馨提示

- 母乳喂养永远是最好的喂养方式，在母乳不足或无母乳时可食用本产品；
- 请勿擅自改变奶的浓度，浓度不恰当宝宝会得不到适当的营养；
- 冲调奶粉时，如有奶粉泡沫或挂壁均属正常现象，请放心食用；
- 奶粉冲调好后，待温度适宜时给宝宝食用，喂哺剩余的奶液请丢弃，勿留于下次食用；
- 宝宝在两餐之间要适当补充水。

3段



净含量: 800克

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2004
蛋白质	g	0.69	13.9
脂肪	g	1.06	21.2
亚油酸	g	0.16	3.18
α-亚麻酸	mg	15.3	307
碳水化合物	g	2.81	56.4
维生素			
维生素A	μg RE	22.5	450
维生素D	μg	0.60	12.0
维生素E	mg α-TE	0.23	4.51
维生素K ₁	μg	1.32	26.5
维生素B ₁	μg	17.6	352
维生素B ₂	μg	27.5	552
维生素B ₆	μg	13.8	276
维生素B ₁₂	μg	0.057	1.15
烟酸	μg	140	2813
叶酸	μg	3.10	62.2
泛酸	μg	122	2436
维生素C	mg	3.00	60.2
生物素	μg	0.53	10.7
矿物质			
钠	mg	7.49	150
钾	mg	22.6	452
铜	μg	8.98	180
镁	mg	1.79	35.9
铁	mg	0.30	6.10
锌	mg	0.13	2.68
钙	mg	21.3	426
磷	mg	13.0	260
碘	μg	2.87	57.6
氯	mg	16.5	330
可选择成分			
硒	μg	0.61	12.3
胆碱	mg	6.04	121
锰	μg	1.58	31.7
肌醇	mg	1.28	25.6
左旋肉碱	mg	0.38	7.60
二十二碳六烯酸	mg	4.03	80.8
二十碳四烯酸	mg	4.51	90.3
低聚半乳糖	g	0.13	2.70
低聚果糖	g	0.015	0.30
叶黄素	μg	8.53	171

配料表

脱盐乳清粉（来源羊乳）、食用植物调和油（玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油）、脱脂羊乳粉、全脂羊乳粉、低聚半乳糖、奶油、橄榄油、低聚果糖、磷脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、混合生育酚浓缩物、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、D-泛酸钙、叶酸、D-生物素、氯化胆碱、左旋肉碱、肌醇、硫酸亚铁、硫酸锌、碘酸钾、硫酸镁、亚硒酸钠、硫酸镁、碳酸钙、柠檬酸钾、柠檬酸钠、氯化钾、L-抗坏血酸钠、磷酸三钙、叶黄素、二十二碳六烯酸、花生四烯酸、动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12

产品信息

生产商：北安宜品努卡乳业有限公司
地址：黑龙江省黑河市北安市铁西区工业园区
产地：黑龙江·黑河
食品生产许可证编号：SC10523118150120
产品类别及属性：乳基粉状 幼儿配方食品
产品标准号：GB 10767-2021
保质期：24个月
生产日期、批号及保质期至：见罐底
销售热线：400-885-0296



6 947050506080 >

棒棒羊3-800




- 消毒：将喂养器具放入沸水中煮5分钟进行消毒；
- 冷却沸水：饮用水煮沸后，冷却至45°C~50°C，参照喂哺建议表，在奶杯中加入适量的水；
- 加入奶粉：参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶杯中；
- 搅拌：将奶粉搅拌至充分溶解；
- 测温：当奶液温度适宜时即可进行喂哺；
- 清洗：喂哺后剩余奶液请丢弃，清洗喂哺器具。



喂哺建议表		
年龄	每次喂哺量	
	温开水量(ml)	量勺数(平勺)
12-36月	210	7 2-3

△参照此表取适量温开水和奶粉，此表是根据平均需要量而定，仅供参考；
最适宜的溶解温度是45°C~50°C，每平勺奶粉约4.5克。
 $100\text{ml 奶液} = 13.5\text{g 奶粉} + 90\text{ml 温开水}$



3段



棒棒羊

幼儿配方羊奶粉 (12-36月龄, 3段)




净含量: 200克

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2004
蛋白质	g	0.69	13.9
脂肪	g	1.06	21.2
亚油酸	g	0.16	3.18
α-亚麻酸	mg	15.3	307
碳水化合物	g	2.81	56.4
维生素			
维生素A	μg RE	22.5	450
维生素D	μg	0.60	12.0
维生素E	mg α-TE	0.23	4.51
维生素K ₁	μg	1.32	26.5
维生素B ₁	μg	17.6	352
维生素B ₂	μg	27.5	552
维生素B ₆	μg	13.8	276
维生素B ₁₂	μg	0.057	1.15
烟酸	μg	140	2813
叶酸	μg	3.10	62.2
泛酸	μg	122	2436
维生素C	mg	3.00	60.2
生物素	μg	0.53	10.7
矿物质			
钠	mg	7.49	150
钾	mg	22.6	452
铜	μg	8.98	180
镁	mg	1.79	35.9
铁	mg	0.30	6.10
锌	mg	0.13	2.68
钙	mg	21.3	426
磷	mg	13.0	260
碘	μg	2.87	57.6
氯	mg	16.5	330
可选择成分			
硒	μg	0.61	12.3
胆碱	mg	6.04	121
锰	μg	1.58	31.7
肌醇	mg	1.28	25.6
左旋肉碱	mg	0.38	7.60
二十二碳六烯酸	mg	4.03	80.8
二十碳四烯酸	mg	4.51	90.3
低聚半乳糖	g	0.13	2.70
低聚果糖	g	0.015	0.30
叶黄素	μg	8.53	171

配料表		
脱盐乳清粉（来源羊乳）、食用植物油和油（玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油）、脱脂羊乳粉、全脂羊乳粉、低聚半乳糖、奶油、橄榄油、低聚果糖、磷脂、醋酸胆黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、混合生育酚浓缩物、植物甲萘醌、盐酸硫酸素、核黄素、盐酸吡哆醇、氯化钴、烟酰胺、D-泛酸钙、叶酸、D-生物素、氯化胆碱、左旋肉碱、肌醇、硫酸亚铁、硫酸锌、碘酸钾、硫酸铜、硫酸锰、亚硒酸钠、硫酸镁、碳酸钙、柠檬酸钾、柠檬酸钠、氯化钾、L-抗坏血酸钠、磷酸三钙、叶黄素、二十二碳六烯酸、花生四烯酸、动物双歧杆菌乳业种Bb-12		

产品信息

生产商：北安宜品努卡乳业有限公司
地址：黑龙江省黑河市北安市铁西区工业园区
产地：黑龙江·黑河
食品生产许可证编号：SC10523118150120
产品类别及属性：乳基粉状幼儿配方食品
产品标准号：GB 10767-2021
保质期：24个月
生产日期、批号及保质期至：见罐底
销售热线：400-885-0296



6 947050506141>

棒棒羊3-200

喂哺建议表			
年龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水量(ml)	量勺数(平勺)	
0-2周	60	2	7-8
2-4周	90	3	6-7
1-2月	120	4	5-6
2-3月	150	5	5-6
3-4月	180	6	5-6
4-6月	210	7	4-5

▲ 参照此表取适量温开水和奶粉，此表是根据平均需要量而定，仅供参考；
最适宜的溶解温度是45℃-50℃；每平勺奶粉约4.35克。
100mL 奶液=13.05g 粉+90mL 温开水



- 冲调奶粉前应使用肥皂或清水将手彻底洗干净；
- 将所有干净的喂哺器具放入清水煮沸5分钟以上；
- 参照喂哺建议表取适量刚煮沸的水，使其冷却至45℃~50℃，然后注入奶瓶中；
- 参照喂哺建议表取适量奶粉加入到奶瓶中；
- 盖紧奶瓶盖（加上密封垫），然后轻轻摇至奶粉充分溶解；
- 冷却至适合宝宝饮用的温度即可喂哺，可以滴到手腕处测试温度。



温馨提示

- 对于0-6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。
- 本品如出现挂壁现象属于正常现象，请放心食用。
- 奶粉冲调好后，应马上给宝宝喂养，喂哺剩余的奶粉，弃掉，勿留于下次食用。
- 喂哺期间要照顾好宝宝，疏于照顾会引起宝宝便秘或其他不适。
- 宝宝两餐之间要适当补充水。

贮存说明

- 请将奶粉存放在阴凉干燥通风处，切勿放入冰箱内；
- 每次食用后，请将罐盖盖紧；
- 开罐后，建议一个月内食用完毕。

宜品®
爱尼可

国食注字
YP20230076



1
段

净含量：100克

婴儿配方奶粉(0-6月龄, 1段)

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2094
蛋白质	g	0.51	10.7
乳清蛋白	g	0.36	7.5
脂肪	g	1.23	25.7
亚油酸	g	0.20	4.18
D-亚麻酸	mg	19.1	400
碳水化合物	g	2.63	55.1
维生素			
维生素A	μg RE	17.6	368
维生素D	μg	0.60	12.5
维生素E	mg α-TE	0.27	5.56
维生素K ₁	μg	1.61	33.7
维生素素B ₁	μg	17.6	369
维生素B ₂	μg	29.1	610
维生素B ₆	μg	10.6	221
维生素B ₁₂	μg	0.055	1.16
烟酸	μg	149	3120
叶酸	μg	3.64	76.2
泛酸	μg	120	2520
维生素C	mg	3.03	63.5
生物素	μg	0.49	10.3
胆碱	mg	6.06	127
矿物质			
钠	mg	7.55	158
钾	mg	19.8	415
镁	mg	15.4	322
钙	mg	1.50	31.5
铁	mg	0.14	2.86
锌	mg	0.15	3.15
锰	mg	1.86	39.0
碘	mg	17.0	355
硒	mg	10.3	216
氯	mg	4.39	92.0
氟	mg	15.7	328
磷	mg	0.90	18.9
可选择成分			
肌醇	mg	2.04	42.8
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.06	85.0
二十碳四烯酸(AA)	mg	4.54	95.0
低聚半乳糖	g	0.014	0.30
低聚果糖	g	0.129	2.70
乳铁蛋白	mg	2.87	60.0



爱尼可1-100

喂哺建议表		
年龄	每次喂哺量	每日喂哺次数
0-2周	60	2
2-4周	90	3
1-2月	120	4
2-3月	150	5
3-4月	180	6
4-6月	210	7
7-12月	240	6

▲ 参照此表取适量温开水和奶粉，此表是根据平均需要量而定，仅供参考；
最适宜的溶解温度是45°C~50°C；每平勺奶粉约4.35克。
100mL 奶液=13.05g 粉+90mL 温开水



宜品®

爱尼可

1 段

净含量：800克

婴儿配方奶粉(0-6月龄, 1段)

国食注字
YP20230076



- 冲调奶粉前应使用肥皂或清水将手彻底洗干净；
- 将所有干净的喂哺器具放入沸水煮沸5分钟以上；
- 参照喂哺建议表取适量刚煮沸的水，使其冷却至45°C-50°C，然后注入奶瓶中；
- 参照喂哺建议表取适量奶粉加入到奶瓶中；
- 盖紧奶瓶盖（加上密封垫），然后轻轻摇至奶粉充分溶解；
- 冷却至适合宝宝饮用的温度即可喂哺，可以滴到手腕处测试温度。



温馨提示

- 对于0-6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。
- 本品如出现挂壁现象属于正常现象，请放心食用。
- 奶粉冲调好后，应马上给宝宝喂养，喂哺剩余的奶液，请弃掉，勿留于下次食用。
- 喂哺期间要照顾好宝宝，疏于照顾会引起宝宝哽咽或其他不适。
- 宝宝两餐之间要适当补充水。

贮存说明


- 请将奶粉存放在阴凉干燥通风处，切勿放入冰箱内；
- 每次食用后，请将罐盖盖紧；
- 开封后，建议一个月内食用完毕。

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2094
蛋白质	g	0.51	10.7
乳清蛋白	g	0.36	7.5
脂肪	g	1.23	25.7
亚油酸	g	0.20	4.18
α-亚麻酸	mg	19.1	400
碳水化合物	g	2.63	55.1
维生素			
维生素A	μg RE	17.6	368
维生素D	μg	0.60	12.5
维生素E	mg α-TE	0.27	5.56
维生素K ₁	μg	1.61	33.7
维生素B ₁	μg	17.6	369
维生素B ₂	μg	29.1	610
维生素B ₆	μg	10.6	221
维生素B ₁₂	μg	0.055	1.16
烟酸	μg	149	3120
叶酸	μg	3.64	76.2
泛酸	μg	120	2520
维生素C	mg	3.03	63.5
生物素	μg	0.49	10.3
胆碱	mg	6.06	127
矿物质			
钠	mg	7.55	158
钾	mg	19.8	415
铜	μg	15.4	322
镁	mg	1.50	31.5
铁	mg	0.14	2.86
锌	mg	0.15	3.15
锰	μg	1.86	39.0
钙	mg	17.0	355
磷	mg	10.3	216
碘	μg	4.39	92.0
氯	mg	15.7	328
硒	μg	0.90	18.9
可选择成分			
肌醇	mg	2.04	42.8
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.06	85.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.54	95.0
低聚半乳糖	g	0.014	0.30
低聚果糖	g	0.129	2.70
乳铁蛋白	mg	2.87	60.0

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(葵花籽油、大豆油、椰子油、低芥酸菜籽油、磷脂)、低聚果糖、低聚半乳糖、磷脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氯化胆胺、烟酰胺、D-泛酸钙、叶酸、D-生物素、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、肌醇、混合生育酚浓缩物、硫酸亚铁、硫酸锌、碘酸钾、硫酸铜、硫酸锰、亚硒酸钠、氯化镁、碳酸钙、磷酸氢钙、柠檬酸钠、柠檬酸钾、氯化钾、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12

产品信息

生产商：北安宜品努卡乳业有限公司
公司地址：黑龙江省黑河市北安市铁西区工业园区
产地：黑龙江·黑河
食品生产许可证编号：SC10523118150120
产品类别及属性：乳基粉状 婴儿配方食品
产品标准号：GB 10765-2021
咨询热线：400-6869-619
网址：www.ankmilk.com
生产日期、批次、保质期至：见罐底
保质期：24个月



爱尼可1-800

喂哺建议表			
年龄	每次喂哺量	温开水量(ml)	每日喂哺次数
0-2周	60	2	7-8
2-4周	80	3	6-7
1-2月	120	4	5-6
2-3月	150	5	5-6
3-4月	180	6	5-6
4-6月	210	7	4-5

▲ 参照此表取适量温开水和奶粉，此表是根据平均需要量而定，仅供参考；
最适宜的溶解温度是45°C-50°C；每平勺奶粉约4.35克。
100mL 奶液=13.05g 粉+90mL温开水



1. 冲调奶粉前应使用肥皂或清水将手彻底洗干净；
2. 将所有干净的喂哺器具放入清水煮沸5分钟以上；
3. 参照喂哺建议表取适量则煮沸的水，使其冷却至45°C-50°C，然后注入奶瓶中；
4. 参照喂哺建议表取适量奶粉加入到奶瓶中；
5. 盖紧奶瓶盖（加上密封垫），然后轻轻摇至奶粉充分溶解；
6. 冷却至适合宝宝饮用的温度即可喂哺，可以滴到手腕处测试温度。

- 请将奶粉存放在阴凉干燥通风处，切勿放入冰箱内；
■ 每次食用后，请将罐盖盖紧；
■ 开罐后，建议一个月内食用完毕。



温馨提示

1. 对于0-6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。
2. 本品如出现挂壁现象属于正常现象，请放心食用。
3. 奶粉冲调好后，应马上给宝宝喂养，喂哺剩余的奶粉，请弃掉，勿留于下次食用。
4. 喂哺期间要照顾好宝宝，疏于照顾会引起宝宝哽咽或其他不适。
5. 宝宝两次之间要适当补充水。

贮存说明

- 请将奶粉存放在阴凉干燥通风处，切勿放入冰箱内；
- 每次食用后，请将罐盖盖紧；
- 开罐后，建议一个月内食用完毕。

宜品
爱尼可

国食注字
YP20230076



净含量：380克

婴儿配方奶粉(0-6月龄, 1段)

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2094
蛋白质	g	0.51	10.7
乳清蛋白	g	0.36	7.5
脂肪	g	1.23	25.7
亚油酸	g	0.20	4.18
α-亚麻酸	mg	19.1	400
碳水化合物	g	2.63	55.1
维生素			
维生素A	μg RE	17.6	368
维生素D	μg	0.60	12.5
维生素E	mg α-TE	0.27	5.56
维生素K ₁	μg	1.61	33.7
维生素B ₁	μg	17.6	369
维生素B ₂	μg	29.1	610
维生素B ₆	μg	10.6	221
维生素B ₁₂	μg	0.055	1.16
烟酸	μg	149	3120
叶酸	μg	3.64	76.2
泛酸	μg	120	2520
维生素C	mg	3.03	63.5
生物素	μg	0.49	10.3
胆碱	mg	6.06	127
矿物质			
钠	mg	7.55	158
钾	mg	19.8	415
铜	μg	15.4	322
镁	mg	1.50	31.5
铁	mg	0.14	2.86
锌	mg	0.15	3.15
锰	mg	1.86	39.0
钙	mg	17.0	355
磷	mg	10.3	216
碘	μg	4.39	92.0
氯	mg	15.7	328
硒	μg	0.90	18.9
可选营养成分			
肌醇	mg	2.04	42.8
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.06	85.0
二十碳五烯酸(EPA)	mg	4.54	95.0
低聚半乳糖	g	0.014	0.30
低聚果糖	g	0.129	2.70
乳铁蛋白	mg	2.87	60.0

配料表			
生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物油和油(葵花籽油、大豆油、椰子油、低芥酸菜籽油、棕榈油、低聚果糖、低聚半乳糖、硬脂酸、醋酸软脂酸、熊果酸、DL-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氯钴胺、烟酰胺、D-泛酸钙、叶酸、D-生物素、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、肌醇、混合生育酚浓缩物、硫酸亚铁、硫酸锌、磷酸钾、硫酸铜、硫酸镁、亚硒酸钠、氯化镁、碳酸钙、磷酸氢钙、柠檬酸钠、柠檬酸钾、氯化钾、D-二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12			

产品信息			
生产商：北安宜品努卡乳业有限公司			
公司地址：黑龙江省黑河市北安市铁西区工业园区			
产地：黑龙江·黑河			
食品生产许可证编号：SC10523118150120			
产品类别及属性：乳基粉状 婴儿配方食品			
产品标准号：GB 10765-2021			
咨询热线：400-6869-619			
网址：www.ankmilk.com			
生产日期、批次、保质期至：见罐底			
保质期：24个月			



爱尼可1-380

喂哺建议表		
年龄	每次喂哺量 温开水量(ml)	每日喂哺次数 量勺数(平均)
0-2周	60	2
2-4周	90	3
1-2月	120	4
2-3月	150	5
3-4月	180	6
4-6月	210	7
7-9月	240	8

▲ 参照此表取适量温开水和奶粉，此表是根据平均需要量而定，仅供参考；
最适宜的溶解温度是45℃-50℃；每平勺奶粉约4.35克。
100mL 奶液=13.05g 粉+90mL 温开水



宜品®
爱尼可



净含量：80克

婴儿配方奶粉(0-6月龄, 1段)

国食注字
YP20230076

营养成分表	
项目	单位
能量	kJ
蛋白质	g
乳清蛋白	g
脂肪	g
亚油酸	g
α-亚麻酸	mg
碳水化合物	g
维生素A	μg RE
维生素D	μg
维生素E	mg α-TE
维生素K ₁	μg
维生素B ₁	μg
维生素B ₂	μg
维生素B ₆	μg
烟酸	μg
叶酸	μg
泛酸	μg
维生素C	mg
生物素	μg
胆碱	mg
矿物质	
钠	mg
镁	mg
钾	mg
钙	mg
磷	mg
碘	μg
氯化钾	mg
可选择成分	
肌醇	mg
二十二碳六烯酸	mg
二十四碳六烯酸	mg
低聚半乳糖	g
低聚果糖	g
乳铁蛋白	mg

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(葵花籽油、大豆油、椰子油、低芥酸菜籽油、磷脂)、低聚果糖、低聚半乳糖、磷脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、D-泛酸钙、叶酸、D-生物素、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、肌醇、混合生育酚浓缩物、硫酸亚铁、硝酸锌、硫酸钾、硫酸铜、硫酸锰、亚硒酸钠、氯化镁、碳酸钙、磷酸氢钙、柠檬酸钙、柠檬酸钾、氯化钾、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12

配料表

生产日期、批次、保质期至：见罐底
保质期：18个月

产品信息

生产商：北安宜品努卡乳业有限公司
公司地址：黑龙江省黑河市北安市铁西区工业园区
产地：黑龙江·黑河
食品生产许可证编号：SC10523118150120
产品类别及属性：乳基粉状 婴儿配方食品
产品标准号：GB 10765-2021
咨询热线：400-6869-619
网址：www.ankmilk.com
生产日期、批次、保质期至：见罐底
保质期：18个月



6 947050 507193

爱尼可1-80

喂哺建议表			
年龄	每次喂哺量	温开水量(ml)	每日喂哺次数
0-2周	60	2	7-8
2-4周	80	3	6-7
1-2月	120	4	5-6
2-3月	150	5	5-6
3-4月	180	6	5-6
4-6月	210	7	4-5

▲ 参照此表取适量温开水和奶粉，此表是根据平均需要量而定，仅供参考；
最适宜的溶解温度是45°C-50°C；每平勺奶粉约4.35克。
100mL奶液=13.05g粉+90mL温开水



1. 冲调奶粉前应使用肥皂或清水将手彻底洗干净；
2. 将所有干净的喂哺器具放入清水煮沸5分钟以上；
3. 参照喂哺建议表取适量刚煮沸的水，使其冷却至45°C-50°C，然后注入奶瓶中；
4. 参照喂哺建议表取适量奶粉加入到奶瓶中；
5. 盖紧奶瓶盖（加上密封垫），然后轻轻摇至奶粉充分溶解；
6. 冷却至适合宝宝饮用的温度即可喂哺，可以滴到手腕处测试温度。

■ 请将奶粉存放在阴凉干燥通风处，切勿放入冰箱内；
■ 每次食用后，请将罐盖盖紧；
■ 开罐后，建议一个月内食用完毕。



温馨提示

1. 对于0-6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。
2. 本品如出现挂壁现象属于正常现象，请放心食用。
3. 奶粉冲调好后，应马上给宝宝喂养，喂哺剩余的奶液，请弃掉，勿留于下次食用。
4. 哺喂期间要照顾好宝宝，过于照顾会引起宝宝哽咽或其他不适。
5. 宝宝两餐之间要适当补充水。

贮存说明

- 请将奶粉存放在阴凉干燥通风处，切勿放入冰箱内；
- 每次食用后，请将罐盖盖紧；
- 开罐后，建议一个月内食用完毕。

宜品® 爱尼可

国食注字
YP20230076



净含量: 350克

婴儿配方奶粉(0-6月龄, 1段)

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2094
蛋白质	g	0.51	10.7
乳清蛋白	g	0.36	7.5
脂肪	g	1.23	25.7
亚油酸	g	0.20	4.18
α-亚麻酸	mg	19.1	400
碳水化合物	g	2.63	55.1
维生素			
维生素A	μg RE	17.6	368
维生素D	μg	0.60	12.5
维生素E	mg α-TE	0.27	5.56
维生素K ₁	μg	1.61	33.7
维生素B ₁	μg	17.6	369
维生素B ₂	μg	29.1	610
维生素B ₆	μg	10.5	221
维生素B ₁₂	μg	0.055	1.16
烟酸	μg	149	3120
叶酸	μg	3.64	76.2
泛酸	μg	120	2520
维生素C	mg	3.03	63.5
生物素	μg	0.49	10.3
胆碱	mg	6.06	127
矿物质			
钠	mg	7.55	158
钾	mg	19.8	415
铜	μg	15.4	322
镁	mg	1.50	31.5
铁	mg	0.14	2.86
锌	mg	0.15	3.15
锰	mg	1.86	39.0
钙	mg	17.0	355
磷	mg	10.3	216
碘	μg	4.39	92.0
硒	μg	15.7	328
硒	μg	0.90	18.9
可选营养成分			
肌醇	mg	2.04	42.8
二十碳六烯酸(DHA)	mg	4.06	85.0
二十碳五烯酸(ARA)	mg	4.54	95.0
低聚半乳糖	g	0.014	0.30
低聚果糖	g	0.129	2.70
乳铁蛋白	mg	2.87	60.0

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物油(葵花籽油、大豆油、椰子油、低芥酸菜籽油、棕榈油)、低聚果糖、低聚半乳糖、磷脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫酸素、核黄素、盐酸哆罗嗦、氯钴胺、烟酰胺、D-泛酸钙、叶酸、混合生育酚浓缩物、硫酸亚铁、硫酸镁、磷酸钾、硫酸铜、硫酸锰、亚硒酸钠、氯化镁、碳酸钙、磷酸氢钙、柠檬酸钠、柠檬酸钾、氯化钾、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12

产品信息			
生产商:	北安宜品努卡乳业有限公司	公司地址:	黑龙江省黑河市北安市铁西区工业园区
产地:	黑龙江·黑河	食品生产许可证编号:	SC10523118150120
产品类别及属性:	乳基粉状 婴儿配方食品	产品标准号:	GB 10765-2021
咨询热线:	400-6869-619	网址:	www.arkmilk.com
生产日期、批次、保质期至:	见罐底	保质期:	24个月



爱尼可1-350

年龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水量(ml)	量勺数(平勺)	
0-2周	60	2	7-8
2-4周	90	3	6-7
1-2月	120	4	5-6
2-3月	150	5	5-6
3-4月	180	6	5-6
4-6月	210	7	4-5

▲ 参照此表取适量温开水和奶粉，此表是根据平均需要量而定，仅供参考；
最适宜的溶解温度是45℃~50℃；每平勺奶粉约4.35克。
100mL奶液=13.05g粉+90mL温开水



- 冲调奶粉前应使用肥皂或清水将手彻底洗干净；
 - 将所有干净的喂哺器具放入沸水煮沸5分钟以上；
 - 参照喂哺建议表取适量刚煮沸的水，使其冷却至45°C-50°C，然后注入奶瓶中；
 - 参照喂哺建议表取适量奶粉加入到奶瓶中；
 - 盖紧奶瓶盖（加上密封垫），然后轻轻摇至奶粉充分溶解；
 - 冷却至适合宝宝饮用的温度即可喂哺，可以滴到手腕处测试温度。
- 温馨提示**
- 对于0-6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。
 - 本品如出现挂壁现象属于正常现象，请放心食用。
 - 奶粉冲调好后，应马上给宝宝喂养，喂哺剩余的奶液，请弃掉，勿留于下次食用。
 - 喂哺期间要照顾好宝宝，疏于照顾会引起宝宝哽咽或其他不适。
 - 宝宝两餐之间要适当补充水。
- 贮存说明**
- 请将奶粉存放在阴凉干燥通风处，切勿放入冰箱内；
 - 每次食用后，请将罐盖盖紧；
 - 开罐后，建议一个月内食用完毕。



宜品®

爱尼可

国食注字
YP20230076



净含量: 700克

婴儿配方奶粉(0-6月龄, 1段)

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2094
蛋白质	g	0.51	10.7
乳清蛋白	g	0.36	7.5
脂肪	g	1.23	25.7
亚油酸	g	0.20	4.18
α-亚麻酸	mg	19.1	400
碳水化合物	g	2.63	55.1
维生素			
维生素A	μg RE	17.6	368
维生素D	μg	0.60	12.5
维生素E	mg α-TE	0.27	5.56
维生素K ₁	μg	1.61	33.7
维生素B ₁	μg	17.6	369
维生素B ₂	μg	29.1	610
维生素B ₆	μg	10.6	221
维生素B ₁₂	μg	0.055	1.16
烟酸	μg	149	3120
叶酸	μg	3.64	76.2
泛酸	μg	120	2520
维生素C	mg	3.03	63.5
生物素	μg	0.49	10.3
胆碱	mg	6.06	127
矿物质			
钠	mg	7.55	158
钾	mg	19.8	415
铜	μg	15.4	322
镁	mg	1.50	31.5
铁	mg	0.14	2.86
锌	mg	0.15	3.15
锰	μg	1.86	39.0
钙	mg	17.0	355
磷	mg	10.3	216
碘	μg	4.39	92.0
氯	mg	15.7	328
硒	μg	0.90	18.9
可选择成分			
肌醇	mg	2.04	42.8
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.06	85.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.54	95.0
低聚半乳糖	g	0.014	0.30
低聚果糖	g	0.129	2.70
乳铁蛋白	mg	2.87	60.0

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(葵花籽油、大豆油、椰子油、低芥酸菜籽油、磷脂)、低聚果糖、低聚半乳糖、磷脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氯钴胺、烟酰胺、D-泛酸钙、叶酸、D-生物素、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、肌醇、混合生育酚浓缩物、硫酸亚铁、硫酸锌、碘酸钾、硫酸铜、硫酸锰、亚硒酸钠、氯化镁、碳酸钙、磷酸氢钙、柠檬酸钠、柠檬酸钾、氯化钾、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12

产品信息

生产商：北京冬奥卡乳业有限公司
公司地址：黑龙江省黑河市北安市铁西区工业园区
产地：黑龙江·黑河
食品生产许可证编号：SC10523118150120
产品类别及属性：乳基粉状婴儿配方食品
产品标准号：GB 10765-2021
咨询热线：400-6869-619
网址：www.ankmilk.com
生产日期、批次、保质期至：见罐底
保质期：24个月



6 947050 507162

爱尼可1-700

喂哺建议表		
年龄	每次喂哺量 温开水量(ml)	每日喂哺次数 量勺数(平勺)
6-8月	210	7 3-4
8-12月	240	8 3

▲ 参照此表取适量温开水和奶粉，此表是根据平均需要量而定，仅供参考；
最适宜的溶解温度是45°C-50°C；每平勺奶粉约4.5克。
100mL 奶液 =13.5g 粉 +90mL 温开

冲调方法



1. 冲调奶粉前应使用肥皂或清水将手彻底洗干净；
2. 将所有干净的喂哺器具放入清水煮沸5分钟以上；
3. 参照喂哺建议表取适量刚煮沸的水，使其冷却至45°C-50°C，然后注入奶瓶中；
4. 参照喂哺建议表取适量奶粉加入到奶瓶中；
5. 盖紧奶瓶盖（加上密封垫），然后轻轻摇至奶粉充分溶解；
6. 冷却至适合宝宝饮用的温度即可喂哺，可以滴到手腕处测试温度。

贮存说明

- 请将奶粉存放在阴凉干燥通风处，切勿放入冰箱内；
- 每次食用后，请将罐盖盖紧；
- 开罐后，建议一个月内食用完毕。



宜品®
爱尼可

国食注字
YP20230077

2
段

净含量：800克

较大婴儿配方奶粉(6-12月龄, 2段)



温馨提示

1. 婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。6个月龄以上婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。
2. 本品如出现挂壁现象属于正常现象，请放心食用。
3. 奶粉冲调好后，应马上给宝宝喂养，喂哺剩余的奶液，请弃掉，勿留于下次食用。
4. 喂哺期间要照顾好宝宝，疏于照顾会引起宝宝哽咽或其他不适。
5. 宝宝两餐之间要适当补充水。

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2017
蛋白质	g	0.62	12.5
乳清蛋白	g	0.37	7.5
脂肪	g	1.11	22.3
亚油酸	g	0.13	2.66
α-亚麻酸	mg	14.8	298
碳水化合物	g	2.79	56.2
维生素			
维生素A	μg RE	22.6	455
维生素D	μg	0.60	12.1
维生素E	mg α-TE	0.26	5.20
维生素K ₁	μg	1.27	25.6
维生素B ₁	μg	17.6	354
维生素B ₂	μg	32.2	650
维生素B ₆	μg	13.8	278
维生素B ₁₂	μg	0.075	1.51
烟酸	μg	138	2780
叶酸	μg	3.01	60.7
泛酸	μg	120	2423
维生素C	mg	3.03	61.2
生物素	μg	0.52	10.5
胆碱	mg	6.20	125
矿物质			
钠	mg	6.99	141
钾	mg	21.3	430
铜	μg	10.6	213
镁	mg	1.51	30.5
铁	mg	0.30	5.98
锌	mg	0.15	2.93
锰	μg	3.18	64.2
钙	mg	21.5	433
磷	mg	12.4	251
碘	μg	4.52	91.1
氯	mg	13.9	280
硒	μg	0.60	12.1
可选择成分			
肌醇	mg	2.27	45.8
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.97	80.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.46	90.0
低聚半乳糖	g	0.015	0.30
低聚果糖	g	0.134	2.70
乳铁蛋白	mg	2.97	60.0



爱尼可2-800

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(葵花籽油、大豆油、椰子油、低芥酸菜籽油、磷脂)、低聚果糖、大豆油、低聚半乳糖、磷脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氯钴胺、烟酰胺、D-泛酸钙、叶酸、D-生物素、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、肌醇、混合生育酚浓缩物、硫酸亚铁、硫酸镁、碘酸钾、硫酸铜、硫酸锰、亚硒酸钠、氯化镁、碳酸钙、磷酸氢钙、柠檬酸钠、柠檬酸钾、氯化钾、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12

产品信息

生产商：北安宣品努卡乳业有限公司
公司地址：黑龙江省黑河市北安市铁西区工业园区
产地：黑龙江 · 黑河
食品生产许可证编号：SC10523118150120
产品类别及属性：乳基粉状较大婴儿配方食品
产品标准号：GB 10766-2021
咨询热线：400-6869-619
网址：www.ankmilk.com
生产日期、批次、保质期至：见罐底
保质期：24个月

喂哺建议表			
年龄	每次喂哺量	每日喂哺次数	
6-8月	210	7	3-4
8-12月	240	8	3

▲ 参照此表取适量温开水和奶粉，此表是根据平均需要量而定，仅供参考；
最适宜的溶解温度是45°C~50°C；每平勺奶粉约4.5克。
100mL 奶液 =13.5g 粉 +90mL 温开水



- 冲调奶粉前应使用肥皂或清水将手彻底洗干净；
- 将所有干净的喂哺器具放入清水煮沸5分钟以上；
- 参照喂哺建议表取适量刚煮沸的水，使其冷却至45°C~50°C，然后注入奶瓶中；
- 参照喂哺建议表取适量奶粉加入到奶瓶中；
- 盖紧奶瓶盖（加上密封垫），然后轻轻摇至奶粉充分溶解；
- 冷却至适合宝宝饮用的温度即可喂哺，可以滴到手腕处测试温度。

贮存说明

- 请将奶粉存放在阴凉干燥通风处，切勿放入冰箱内；
- 每次食用后，请将罐盖盖紧；
- 开罐后，建议一个月内食用完毕。



宜品®
爱尼可

国食注字
YP20230077



净含量：380克

较大婴儿配方奶粉(6-12月龄, 2段)

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	KJ	100	2017
蛋白质	g	0.62	12.5
乳清蛋白	g	0.37	7.5
脂肪	g	1.11	22.3
亚油酸	g	0.13	2.66
α-亚麻酸	mg	14.8	298
碳水化合物	g	2.79	56.2
维生素			
维生素A	μg RE	22.6	455
维生素D	μg	0.60	12.1
维生素E	mg α-TE	0.26	5.20
维生素K1	μg	1.27	25.6
维生素B1	μg	17.6	354
维生素B2	μg	32.2	650
维生素B6	μg	13.8	278
维生素B9	μg	0.075	1.51
烟酸	μg	138	2780
叶酸	μg	3.01	60.7
泛酸	μg	120	2423
维生素C	mg	3.03	61.2
生物素	μg	0.52	10.5
胆碱	mg	6.20	125
矿物质			
钠	mg	6.99	141
钾	mg	21.3	430
铜	mg	10.6	213
镁	mg	1.51	30.5
铁	mg	0.30	5.98
锌	mg	0.15	2.93
碘	mg	3.18	64.2
硒	mg	21.5	433
钙	mg	12.4	251
磷	mg	4.52	91.1
氯	mg	13.9	280
硝酸盐	mg	0.60	12.1
可选择成分			
肌醇	mg	2.27	45.8
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.97	80.0
二十四碳六烯酸(ARA)	mg	4.46	90.0
低聚半乳糖	g	0.015	0.30
低聚果糖	g	0.134	2.70
乳铁蛋白	mg	2.97	60.0

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物油和油(葵花籽油、大豆油、椰子油、低芥酸菜籽油、硬脂酸、低聚果糖、大豆油、低聚半乳糖、精脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸咖啡因、氟钴胺、烟酰胺、D-泛酸钙、叶酸、D-生物素、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、肌醇、混合生育酚浓缩物、硝酸亚铁、硫酸镁、磷酸钾、硫酸镁、硫酸锰、亚硒酸钠、氯化镁、硫酸钙、磷酸氢钙、柠檬酸钠、柠檬酸钾、氯化钾、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12

产品信息

生产商：北安宜品努卡乳业有限公司
公司地址：黑龙江省黑河市北安市铁西区工业园区

产地：黑龙江·黑河
食品生产许可证编号：SC10523118150120
产品类别及属性：乳基粉状 较大婴儿配方食品
产品标准号：GB 10766-2021
咨询热线：400-6869-619
网址：www.ankmilk.com
生产日期、批次、保质期至：见罐底
保质期：24个月



爱尼可2-380



宜品®
国食注字
YP20230077

爱尼可



净含量:350克

较大婴儿配方奶粉(6-12月龄, 2段)

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2017
蛋白质	g	0.62	12.5
乳清蛋白	g	0.37	7.5
脂肪	g	1.11	22.3
亚油酸	g	0.13	2.66
α-亚麻酸	mg	14.8	298
碳水化合物	g	2.79	56.2
维生素			
维生素A	μg RE	22.8	455
维生素D	μg	0.60	11.1
维生素E	mg α-TE	0.26	5.20
维生素K ₁	μg	1.27	25.6
维生素B ₁	μg	17.6	354
维生素B ₂	μg	32.2	650
维生素B ₆	μg	13.8	278
维生素B ₁₂	μg	0.075	1.51
烟酸	μg	138	2780
叶酸	μg	3.01	60.7
泛酸	μg	120	2423
维生素C	mg	3.03	61.2
生物素	μg	0.52	10.5
胆碱	mg	6.20	125
矿物质			
钠	mg	6.99	141
钾	mg	21.3	430
铜	μg	10.6	213
镁	mg	1.51	30.5
铁	mg	0.30	5.98
锌	mg	0.15	2.93
锰	mg	3.18	64.2
钙	mg	21.5	433
磷酸	mg	12.4	251
硫酸	mg	4.52	91.1
氯化物	mg	13.9	280
碘	μg	0.60	12.1
可选择成分			
肌醇	mg	2.27	45.8
二十碳六烯酸(DHA)	mg	3.97	80.0
二十碳四烯酸(AA)	mg	4.46	90.0
低聚半乳糖	g	0.015	0.30
低聚果糖	g	0.134	2.70
乳铁蛋白	mg	2.97	60.0

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物油(葵花籽油、大豆油、椰子油、低芥酸菜籽油、硬脂酸、低聚果糖、大豆油、低聚半乳糖、棕榈酸、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氯化胆胺、烟酰胺、D-泛酸钙、叶酸、D-生物素、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、肌醇、混合生育酚浓缩物、硫酸亚铁、磷酸镁、磷酸钙、磷酸锌、盐酸亚锡、氯化镁、碳酸钙、磷酸氢钙、柠檬酸钠、柠檬酸钾、氯化钾、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12

产品信息

生产商：北京宜品努卡乳业有限公司
公司地址：黑龙江省黑河市北安市铁西区工业园区
产地：黑龙江·黑河
食品生产许可证编号：SC10523118150120
产品类别及属性：乳基粉状较大婴儿配方食品
产品标准号：GB 10766-2021
咨询热线：400-6869-619
网址：www.ankmilk.com
生产日期、批次、保质期至：见罐底
保质期：24个月



爱尼可2-350

喂哺建议表		
年龄	每次喂哺量 温开水量(ml)	每日喂哺次数 量勺数(平勺)
6-8月	210	7 3-4
8-12月	240	8 3

▲ 参照此表取适量温开水和奶粉，此表是根据平均需要量而定，仅供参考；
最适宜的溶解温度是45°C-50°C；每平勺奶粉约4.5克。
100mL 奶液 = 13.5g 粉 + 90mL 温开水



- 冲调奶粉前应使用肥皂或清水将手彻底洗干净；
- 将所有干净的喂哺器具放入清水煮沸 5 分钟以上；
- 参照喂哺建议表取适量刚煮沸的水，使其冷却至 45°C-50°C，然后注入奶瓶中；
- 参照喂哺建议表取适量奶粉加入到奶瓶中；
- 盖紧奶瓶盖（加上密封垫），然后轻轻摇至奶粉充分溶解；
- 冷却至适合宝宝饮用的温度即可喂哺，可以滴到手腕处测试温度。

贮存说明	
■ 请将奶粉存放在阴凉干燥通风处，切勿放入冰箱内；	
■ 每次食用后，请将罐盖盖紧；	
■ 开罐后，建议一个月内食用完毕。	



温馨提示	
1. 婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。6个月龄以上婴儿食用本产品时，须配合添加辅食食品。	
2. 本品如出现挂壁现象属于正常现象，请放心食用。	
3. 奶粉冲调好后，应马上给宝宝喂养，喂哺剩余的奶液，请弃掉，勿留于下次食用。	
4. 喂哺期间要照顾好宝宝，疏于照顾会引起宝宝哽咽或其他不适。	
5. 宝宝两餐之间要适当补充水。	

宜品®
爱尼可

2 段

净含量：700克

较大婴儿配方奶粉(6-12月龄, 2段)

国食注字
YP20230077

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2017
蛋白质	g	0.62	12.5
乳清蛋白	g	0.37	7.5
脂肪	g	1.11	22.3
亚油酸	g	0.13	2.66
α-亚麻酸	mg	14.8	298
碳水化合物	g	2.79	56.2
维生素			
维生素A	μg RE	22.6	455
维生素D	μg	0.60	12.1
维生素E	mg α-TE	0.26	5.20
维生素K ₁	μg	1.27	25.6
维生素B ₁	μg	17.6	354
维生素B ₂	μg	32.2	650
维生素B ₆	μg	13.8	278
维生素B ₁₂	μg	0.075	1.51
烟酸	μg	138	2780
叶酸	μg	3.01	60.7
泛酸	μg	120	2423
维生素C	mg	3.03	61.2
生物素	μg	0.52	10.5
胆碱	mg	6.20	125
矿物质			
钠	mg	6.99	141
钾	mg	21.3	430
铜	μg	10.6	213
镁	mg	1.51	30.5
铁	mg	0.30	5.98
锌	mg	0.15	2.93
锰	μg	3.18	64.2
钙	mg	21.5	433
碘	mg	12.4	251
氯	μg	4.52	91.1
硒	mg	13.9	280
硒	μg	0.60	12.1
可选择成分			
肌醇	mg	2.27	45.8
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.97	80.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.46	90.0
低聚半乳糖	g	0.015	0.30
低聚果糖	g	0.134	2.70
乳铁蛋白	mg	2.97	60.0

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物油(葵花籽油、大豆油、椰子油、低芥酸菜籽油、磷脂)、低聚果糖、大豆油、低聚半乳糖、磷脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氯钴胺、烟酰胺、D-泛酸钙、叶酸、D-生物素、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、肌醇、混合生育酚浓缩物、硫酸亚铁、硫酸锌、碘酸钾、硫酸铜、硫酸锰、亚硝酸钠、氯化镁、碳酸钙、磷酸氢钙、柠檬酸钠、柠檬酸钾、氯化钾、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12

产品信息

生产商：北京宣品努卡乳业有限公司
公司地址：黑龙江省黑河市北安市铁西区工业园区
产地：黑龙江·黑河
食品生产许可证编号：SC10523118150120
产品类别及属性：乳基粉状较大婴儿配方食品
产品标准号：GB 10766-2021
咨询热线：400-6869-619
网址：www.ankmilk.com
生产日期、批次、保质期至：见罐底
保质期：24个月



爱尼可2-700

喂哺建议表			
年龄	每次喂哺量 温开水量(ml)	量勺数(平勺)	每日喂哺次数
12-36月	210	7	2-3
▲ 参照此表取适量温开水和奶粉，此表是根据平均需要量而定，仅供参考；最适宜的溶解温度是45℃-50℃；每平勺奶粉约4.5克。100mL 奶液≈13.5g 粉+90mL 温水			



贮存说明

- 请将奶粉存放在阴凉干燥通风处，切勿放入冰箱内；
- 每次食用后，请将罐盖盖紧；
- 开罐后，建议一个月内食用完毕。



营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1993
蛋白质	g	0.71	14.2
脂肪	g	1.06	21.1
亚油酸	g	0.13	2.54
α-亚麻酸	mg	13.4	268
碳水化合物	g	2.79	55.7
维生素			
维生素A	μg RE	22.6	451
维生素D	μg	0.60	11.9
维生素E	mg α-TE	0.26	5.20
维生素K ₁	μg	1.63	32.4
维生素B ₁	μg	17.6	350
维生素B ₂	μg	36.1	720
维生素B ₆	μg	13.8	275
维生素B ₁₂	μg	0.063	1.26
烟酸	μg	138	2750
叶酸	μg	3.01	60.0
泛酸	μg	123	2452
维生素C	mg	3.05	60.8
生物素	μg	0.59	11.7
矿物质			
钠	mg	11.5	230
钾	mg	22.6	450
铜	μg	8.8	175
镁	mg	1.76	35.0
铁	mg	0.30	5.90
锌	mg	0.13	2.50
钙	mg	22.8	455
磷	mg	12.8	256
碘	μg	2.56	51.0
氯	mg	14.1	282
可选择成分			
硒	μg	0.61	12.1
胆碱	mg	6.07	121
锰	μg	2.81	56.0
肌醇	mg	2.12	42.3
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.51	70.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.52	90.0
低聚半乳糖	g	0.015	0.30
低聚果糖	g	0.135	2.70
乳铁蛋白	mg	3.01	60.0

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物油(葵花籽油、大豆油、椰子油、低芥酸菜籽油、磷脂)、低聚果糖、大豆油、低聚半乳糖、磷脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氯钴胺、烟酰胺、D-泛酸钙、叶酸、D-生物素、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、肌醇、混合生育酚浓缩物、硫酸亚铁、硫酸锌、碘酸钾、硫酸铜、硫酸镁、亚硝酸钠、氯化镁、碳酸钙、磷酸氢钙、柠檬酸钠、柠檬酸钾、氯化钾、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12

*生牛乳加工

产品信息

生产商: 北宜品努卡乳业有限公司
公司地址: 黑龙江省黑河市北安市铁西区工业园区
产地: 黑龙江·黑河
食品生产许可证编号: SC10523118150120
产品类别及属性: 乳基粉状婴幼儿配方食品
产品标准号: GB 10767-2021
咨询热线: 400-6869-619
网址: www.ankmilk.com
生产日期、批次、保质期至: 见罐底
保质期: 24个月





宜品®
国食注字
YP20230078

爱尼可



幼儿配方奶粉 (12-36月龄, 3段)

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	1993	1993
蛋白质	g	0.71	14.2
脂肪	g	1.06	21.1
亚油酸	g	0.13	2.54
α-亚麻酸	mg	13.4	268
碳水化合物	g	2.79	55.7
维生素			
维生素A	μg RE	22.6	451
维生素D	μg	0.60	11.9
维生素E	mg α-TE	0.26	5.20
维生素K ₃	μg	1.63	32.4
维生素B ₁	μg	17.6	350
维生素B ₂	μg	36.1	720
维生素B ₆	μg	13.8	275
维生素B ₁₂	μg	0.063	1.26
烟酸	μg	138	2750
叶酸	μg	3.01	60.0
泛酸	μg	123	2452
维生素C	mg	3.05	60.8
生物素	μg	0.59	11.7
矿物质			
钠	mg	11.5	230
钾	mg	22.6	450
镁	mg	8.8	175
钙	mg	1.76	35.0
锌	mg	0.30	5.90
铁	mg	0.13	2.50
碘	mg	22.8	455
磷	mg	12.8	256
氯	μg	2.56	51.0
氟	μg	14.1	282
可选择成分			
硒	μg	0.61	12.1
胆碱	mg	6.07	121
核苷酸	μg	2.81	56.0
乳清蛋白	mg	2.12	42.3
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.51	70.0
二十六碳九烯(Omega-3)	mg	4.52	90.0
低聚半乳糖	g	0.015	0.30
低聚果糖	g	0.135	2.70
乳铁蛋白	mg	3.01	60.0

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物油和油(葵花籽油、大豆油、椰子油、低芥酸菜籽油、棕榈油)、低聚果糖、大豆油、低聚半乳糖、磷酸、醋酸乳黄酶、胆钙化醇、d₃-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫酸胺、核黄素、盐酸吡哆醇、氯化胺、烟酰胺、D-泛酸钙、叶酸、D-生物素、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、肌醇、混合生育酚浓缩物、硝酸亚铁、硝酸钴、硝酸钾、硫酸镁、硫酸锰、亚硬脂酸、氯化镁、碳酸钙、硝酸氢钙、柠檬酸钾、柠檬酸钾、氯化钾、二十碳六烯酸油脂/发酵法花生四烯酸、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

*牛乳加工

产品信息

生产商: 北安宜品努卡乳业有限公司
公司地址: 黑龙江省黑河市北安市铁西区工业园区
产地: 黑龙江·黑河
食品生产许可证编号: SC10523118150120
产品类别及属性: 乳基粉状 幼儿配方食品
产品标准号: GB 10767-2021
咨询热线: 400-6869-619
网址: www.anikmilk.com
生产日期、批次、保质期: 见罐底
保质期: 24个月



爱尼可3-380



宜品®
国食注字
YP20230078

爱尼可



净含量: 350克

幼儿配方奶粉(12-36月龄, 3段)

营养成分表		
项目	单位	每100kJ 每100g
能量	kJ	180 1993
蛋白质	g	0.71 14.2
脂肪	g	1.06 21.1
亚油酸	g	0.13 2.54
α-亚油酸	mg	13.4 268
碳水化合物	g	2.79 55.7
维生素		
维生素A	μg RE	22.6 451
维生素D	μg	0.60 11.9
维生素E	mg α-TE	0.26 5.20
维生素K ₁	μg	1.63 32.4
维生素B ₁	μg	17.6 350
维生素B ₂	μg	36.1 720
维生素B ₆	μg	13.8 275
维生素B ₁₂	μg	0.063 1.26
烟酸	μg	138 2750
叶酸	μg	3.01 60.0
泛酸	μg	123 2452
维生素C	mg	3.05 60.8
生物素	μg	0.59 11.7
矿物质		
钠	mg	11.5 230
钾	mg	22.6 450
镁	mg	8.8 175
钙	mg	1.76 35.0
铁	mg	0.30 5.90
锌	mg	0.13 2.50
铜	mg	22.8 455
碘	mg	12.8 256
磷	mg	2.56 51.0
氯	mg	14.1 282
可选添加成分		
硒	μg	0.61 12.1
胆碱	mg	6.07 121
锰	μg	2.81 56.0
肌醇	mg	2.12 42.3
二十碳六烯酸(DHA)	mg	3.51 70.0
二十二碳六烯酸(ARA)	mg	4.52 90.0
低聚半乳糖	g	0.015 0.30
低聚果糖	g	0.135 2.70
乳铁蛋白	mg	3.01 60.0

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物油(葵花籽油、大豆油、椰子油、低芥酸菜籽油、棕榈)、低聚果糖、大豆油、低聚半乳糖、磷酸、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲壳素、盐酸硫酸镁、核黄素、盐酸胱氨酸、氯化镁、硫酸锌、D-泛酸钙、叶酸、D-生物素、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、肌醇、混合生育酚浓缩物、硫酸亚铁、硫酸锌、碘酸钾、硫酸镁、亚硝酸钠、氯化镁、硝酸钙、磷酸氢钙、柠檬酸钠、柠檬酸钾、氯化钾、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12

产品信息

生产商：北京宜品努卡乳业有限公司
公司地址：黑龙江省黑河市北安市铁西区工业园区
产地：黑龙江·黑河
食品生产许可证编号：SC10523118150120
产品类别及属性：乳基粉状 幼儿配方食品
产品标准号：GB 10767-2021
咨询热线：400-6869-619
网址：www.ankmilk.com
生产日期、批次、保质期至：见罐底
保质期：24个月

6 947050 507155



喂哺建议表		
年龄	每次喂哺量	每日喂哺次数
12-36月	210	7
温开水量(ml) 量勺数(平勺)		
▲ 参照此表取适量温开水和奶粉，此表是根据平均需要量而定，仅供参考；最适宜的溶解温度是45°C-50°C；每平勺奶粉约4.5克。100mL 奶液=13.5g 粉+90mL 温开水		



- 冲调奶粉前应使用肥皂或清水将手彻底洗干净；
- 将所有干净的喂哺器具放入清水煮沸5分钟以上；
- 参照喂哺建议表取适量刚煮沸的水，使其冷却至45°C-50°C，然后注入奶杯中；
- 参照喂哺建议表取适量奶粉加入到奶杯中；
- 搅拌至奶粉充分溶解；
- 冷却至适合宝宝饮用的温度即可喂哺，可以滴入手腕处测试温度。

贮存说明		
■ 请将奶粉存放在阴凉干燥通风处，切勿放入冰箱内；		
■ 每次食用后，请将罐盖盖紧；		
■ 开罐后，建议一个月内食用完毕。		



- 温馨提示**
- 本品如出现挂壁现象属于正常现象，请放心食用。
 - 奶粉冲调好后，应马上给宝宝喂养，喂哺剩余的奶液，请弃掉，勿留于下次食用。
 - 喂哺期间要照顾好宝宝，疏于照顾会引起宝宝哽咽或其他不适。
 - 宝宝两餐之间要适当补充水。

宜品®
爱尼可

3 段

净含量：700克

幼儿配方奶粉(12-36月龄, 3段)

国食注字
YP20230078

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1993
蛋白质	g	0.71	14.2
脂肪	g	1.06	21.1
亚油酸	g	0.13	2.54
α-亚麻酸	mg	13.4	268
碳水化合物	g	2.79	55.7
维生素			
维生素A	μg RE	22.6	451
维生素D	μg	0.60	11.9
维生素E	mg α-TE	0.26	5.20
维生素K ₁	μg	1.63	32.4
维生素B ₁	μg	17.6	350
维生素B ₂	μg	36.1	720
维生素B ₆	μg	13.8	275
维生素B ₁₂	μg	0.063	1.26
烟酸	μg	138	2750
叶酸	μg	3.01	60.0
泛酸	μg	123	2452
维生素C	mg	3.05	60.8
生物素	μg	0.59	11.7
矿物质			
钠	mg	11.5	230
钾	mg	22.6	450
铜	μg	8.8	175
镁	mg	1.76	35.0
铁	mg	0.30	5.90
锌	mg	0.13	2.50
钙	mg	22.8	455
磷	mg	12.8	256
碘	μg	2.56	51.0
氯	mg	14.1	282
可选择成分			
硒	μg	0.61	12.1
胆碱	mg	6.07	121
锰	μg	2.81	56.0
肌醇	mg	2.12	42.3
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.51	70.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.52	90.0
低聚半乳糖	g	0.015	0.30
低聚果糖	g	0.135	2.70
乳铁蛋白	mg	3.01	60.0

配料表			
生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(葵花籽油、大豆油、椰子油、低芥酸菜籽油、磷脂)、低聚果糖、大豆油、低聚半乳糖、磷脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氯钴胺、烟酰胺、D-泛酸钙、叶酸、D-生物素、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、肌醇、混合生育酚浓缩物、硫酸亚铁、硫酸锌、碘酸钾、硫酸铜、硫酸锰、亚硒酸钠、氯化镁、碳酸钙、磷酸氢钙、柠檬酸钠、柠檬酸钾、氯化钾、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12			

产品信息			
生产商：北安宜品努卡乳业有限公司			
公司地址：黑龙江省黑河市北安市铁西区工业园区			
产地：黑龙江·黑河			
食品生产许可证编号：SC10523118150120			
产品类别及属性：乳基粉状婴幼儿配方食品			
产品标准号：GB 10767-2021			
咨询热线：400-6869-619			
网址：www.ankmilk.com			
生产日期、批次、保质期至：见罐底			
保质期：24个月			



爱尼可3-700

年龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水量(ml)	量勺数(平勺)	
0~2周	60	2	7~8
2~4周	90	3	6~7
1~2月	120	4	5~6
2~3月	150	5	5~6
3~4月	180	6	5~6
4~6月	210	7	4~5

▲ 参照此表取适量温开水和奶粉，此表是根据平均需要量而定，仅供参考；
最适宜的溶解温度是45°C~50°C；每平勺奶粉约4.35克。
100mL 奶液=13.05g 粉+90mL 温开水

冲调方法



- 冲调奶粉前应使用肥皂或清水将手彻底洗干净；
- 将所有干净的喂哺器具放入清水煮沸5分钟以上；
- 参照喂哺建议表取适量刚煮沸的水，使其冷却至45°C-50°C，然后注入奶瓶中；
- 参照喂哺建议表取适量奶粉加入到奶瓶中；
- 轻轻摇晃至奶粉充分溶解；
- 冷却至适合宝宝饮用的温度即可喂哺，可以滴到手腕处测试温度。

冲调及喂养提示

- 对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。
- 奶粉冲调好后，应马上给宝宝喂养，喂哺剩余的奶液，请弃掉，勿留于下次食用。
- 喂哺期间要照顾好宝宝，疏于照顾会引起宝宝哽咽或其他不适。
- 宝宝两餐之间要适当补充水。

贮存说明

- 请将奶粉存放在阴凉干燥通风处，切勿放入冰箱内；
- 每次食用后，请将罐盖盖紧；
- 开罐后，建议一个月内食用完毕。

宜品®

国食注字
YP20230079

宜品益臻



1 段

净含量：80克

婴儿配方奶粉(0-6月龄, 1段)

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2097
蛋白质	g	0.51	10.7
乳清蛋白	g	0.41	8.6
脂肪	g	1.25	26.3
亚油酸	g	0.19	4.08
α-亚麻酸	mg	20.3	425
碳水化合物	g	2.58	54.0
维生素			
维生素A	μg RE	18.4	385
维生素D	μg	0.59	12.3
维生素E	mg α-TDE	0.26	5.51
维生素K ₁	μg	1.56	32.7
维生素B ₁	μg	18.5	388
维生素B ₂	μg	31.2	654
维生素B ₆	μg	10.5	221
维生素B ₁₂	μg	0.058	1.21
烟酸	mg	133	2786
叶酸	μg	3.55	74.5
泛酸	mg	120	2520
维生素C	mg	2.98	62.4
生物素	μg	0.70	14.6
胆碱	mg	6.25	131
矿物质			
钠	mg	7.49	157
钾	mg	20.2	423
铜	mg	14.8	310
镁	mg	1.53	32.0
铁	mg	0.16	3.32
锌	mg	0.16	3.27
锰	mg	2.52	52.8
钙	mg	16.0	335
磷	mg	10.9	229
碘	mg	4.39	92.0
氯	mg	15.6	328
硒	μg	0.90	18.9
可选择性成分			
肌醇	mg	1.87	39.3
牛磺酸	mg	1.43	30.0
左旋肉碱	mg	0.42	8.82
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.81	80.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.67	98.0
低聚半乳糖	g	0.13	2.70
低聚果糖	g	0.014	0.30
叶黄素	μg	3.34	70.0
核苷酸	mg	1.05	22.1
乳铁蛋白	mg	2.38	50.0

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、低聚半乳糖、无水奶油、乳清蛋白粉、橄榄油、低聚果糖、磷脂、醋酸双黄酮、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氯钴胶、烟酰胺、D-泛酸钙、叶酸、D-生物素、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、牛磺酸、左旋肉碱、肌醇、混合生育酚浓缩物、硫酸亚铁、硫酸锌、磷酸钾、硫酸铜、硫酸镁、亚硒酸钠、硫酸镁、碳酸钙、磷酸氢钙、柠檬酸钠、氯化钾、磷酸三钙、叶黄素、核苷酸(5'-肌苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷)、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12

产品相关信息

生产商：北安宜品努卡乳业有限公司
地址：黑龙江省黑河市北安市铁西区工业园区
产地：黑龙江·黑河
食品生产许可证编号：SC10523118150120
产品类别及属性：乳基粉状婴儿配方食品
产品标准号：GB 10765-2021
咨询热线：400-6869-619
宜品网址：www.yepperdairy.com.cn
生产日期、批号及保质期至：见罐底
保质期：18个月




6 947050 506226 >

益臻1-80

喂哺建议表			
年龄	每次喂哺量 温开水量(ml)	量勺数(平勺)	每日喂哺次数
0-2月	60	2	7-8
2-4月	90	3	6-7
1-2月	120	4	5-6
2-3月	150	5	5-6
3-4月	180	6	5-6
4-6月	210	7	4-5

▲ 参照此表取适量温开水和奶粉，此表是根据平均需要量而定，仅供参考；
最适宜的溶解温度是45°C-50°C；每平勺奶粉约4.35克。
100mL 奶液 = 13.05g 粉 + 90mL 温开水



1. 冲调奶粉前应使用肥皂或清水将手彻底洗干净；
2. 将所有干净的喂哺器具放入清水煮沸5分钟以上；
3. 参照喂哺建议表取适量刚煮沸的水，使其冷却至45°C-50°C，然后注入奶瓶中；
4. 参照喂哺建议表取适量奶粉加入到奶瓶中；
5. 轻轻摇晃至奶粉充分溶解；
6. 冷却至适合宝宝饮用的温度即可喂哺，可以滴到手腕处测试温度。



宜品®

宜品益臻



1段

净含量: 700克

婴儿配方奶粉(0-6月龄, 1段)

贮存说明

- 请将奶粉存放在阴凉干燥通风处，切勿放入冰箱内；
- 每次食用后，请将罐盖盖紧；
- 开罐后，建议一个月内食用完毕。

国食注字
YP20230079

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2097
蛋白质	g	0.51	10.7
乳清蛋白	g	0.41	8.6
脂肪	g	1.25	26.3
亚油酸	g	0.19	4.08
α-亚麻酸	mg	20.3	425
碳水化合物	g	2.58	54.0
维生素			
维生素A	μg RE	18.4	385
维生素D	μg	0.59	12.3
维生素E	mg α-TE	0.26	5.51
维生素K ₁	μg	1.56	32.7
维生素B ₁	μg	18.5	388
维生素B ₂	μg	31.2	654
维生素B ₆	μg	10.5	221
维生素B ₁₂	μg	0.058	1.21
烟酸	mg	133	2786
叶酸	μg	3.55	74.5
泛酸	mg	120	2520
维生素C	mg	2.98	62.4
生物素	μg	0.70	14.6
胆碱	mg	6.25	131
矿物质			
钠	mg	7.49	157
钾	mg	20.2	423
铜	μg	14.8	310
镁	mg	1.53	32.0
铁	mg	0.16	3.32
锌	mg	0.16	3.27
锰	μg	2.52	52.8
钙	mg	16.0	335
磷	mg	10.9	229
碘	μg	4.39	92.0
氯	mg	15.6	328
硒	μg	0.90	18.9
可选择性成分			
肌醇	mg	1.87	39.3
牛磺酸	mg	1.43	30.0
左旋肉碱	mg	0.42	8.82
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.81	80.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.67	98.0
低聚半乳糖	g	0.13	2.70
低聚果糖	g	0.014	0.30
叶黄素	μg	3.34	70.0
核苷酸	mg	1.05	22.1
乳铁蛋白	mg	2.38	50.0

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、低聚半乳糖、无水奶油、乳清蛋白粉、橄榄油、低聚果糖、磷脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氟钴胺、烟酰胺、D-泛酸钙、叶酸、D-生物素、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、牛磺酸、左旋肉碱、肌醇、混合生育酚浓缩物、硫酸亚铁、硫酸锌、碘酸钾、硫酸铜、硫酸锰、亚硒酸钠、硫酸镁、碳酸钙、磷酸氢钙、柠檬酸钠、氯化钾、磷酸三钙、叶黄素、核苷酸(5'-肌苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷)、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb12

产品相关信息

生产商：北安宜品努卡乳业有限公司
地址：黑龙江省黑河市北安市铁西区工业园区
产地：黑龙江·黑河
食品生产许可证编号：SC10523118150120
产品类别及属性：乳基粉状 婴儿配方食品
产品标准号：GB 10765-2021
咨询热线：400-6869-619
宣传网址：www.yeeperdairy.com.cn
生产日期、批号及保质期至：见罐底
保质期：24个月




6 947050 506011

益臻1-700

喂哺建议表			
年龄	每次喂哺量 温开水量(ml)	量勺数(平勺)	每日喂哺次数
0-2周	60	2	7-8
2-4周	90	3	6-7
1-2月	120	4	5-6
2-3月	150	5	5-6
3-4月	180	6	5-6
4-6月	210	7	4-5

▲ 参照此表取适量温开水和奶粉，此表是根据平均需要量而定，仅供参考；
最适宜的溶解温度是45°C-50°C；每平勺奶粉约4.35克。
100mL 奶液 = 13.05g 奶粉 + 90mL 温开水



1. 冲调奶粉前应使用肥皂或清水将手彻底洗干净；
2. 将所有干净的喂哺器具放入清水煮沸5分钟以上；
3. 参照喂哺建议表取适量刚煮沸的水，使其冷却至45°C-50°C，然后注入奶瓶中；
4. 参照喂哺建议表取适量奶粉加入到奶瓶中；
5. 轻轻摇晃至奶粉充分溶解；
6. 冷却至适合宝宝饮用的温度即可喂哺，可以滴到手腕处测试温度。



宜品®

国食注字
YP20230079

宜品益臻



1段

净含量:350克

婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段)

冲调及喂养提示

- 对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。
- 奶粉冲调好后，应马上给宝宝喂养，喂哺剩余的奶液，请弃掉，勿留于下次食用。
- 喂哺期间要照顾好宝宝，疏于照顾会引起宝宝哽咽或其他不适。
- 宝宝两餐之间要适当补充水。

贮存说明

- 请将奶粉存放在阴凉干燥通风处，切勿放入冰箱内；
- 每次食用后，请将罐盖盖紧；
- 开罐后，建议一个月内食用完毕。

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2097
蛋白质	g	0.51	10.7
乳清蛋白	g	0.41	8.6
脂肪	g	1.25	26.3
亚油酸	g	0.19	4.08
α-亚麻酸	mg	20.3	425
碳水化合物	g	2.58	54.0
维生素			
维生素A	μg RE	18.4	385
维生素D	μg	0.59	12.3
维生素E	mg α-TDE	0.26	5.51
维生素K ₁	μg	1.56	32.7
维生素B ₁	μg	18.5	388
维生素B ₂	μg	31.2	654
维生素B ₆	μg	10.5	221
维生素B ₁₂	μg	0.058	1.21
烟酸	μg	133	2786
叶酸	μg	3.55	74.5
泛酸	μg	120	2520
维生素C	mg	2.98	62.4
生物素	μg	0.70	14.6
胆碱	mg	6.25	131
矿物质			
钠	mg	7.49	157
钾	mg	20.2	423
铜	μg	14.8	310
镁	mg	1.53	32.0
铁	mg	0.16	3.32
锌	mg	0.16	3.27
锰	μg	2.52	52.8
钙	mg	16.0	335
磷	mg	10.9	229
碘	μg	4.39	92.0
氯	mg	15.6	328
硒	μg	0.90	18.9
可选择性成分			
肌醇	mg	1.87	39.3
牛磺酸	mg	1.43	30.0
左旋肉碱	mg	0.42	8.82
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.81	80.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.67	98.0
低聚半乳糖	g	0.13	2.70
低聚果糖	g	0.014	0.30
叶黄素	μg	3.34	70.0
核苷酸	mg	1.05	22.1
乳铁蛋白	mg	2.38	50.0

配料表			
生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、低聚半乳糖、无水奶油、乳清蛋白粉、橄榄油、低聚果糖、磷脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醒、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氟钴胺、烟酰胺、D-泛酸钙、叶酸、D-生物素、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、牛磺酸、左旋肉碱、肌醇、混合生育酚浓缩物、硫酸亚铁、硫酸锌、碘酸钾、硫酸铜、硫酸镁、亚硒酸钠、硫酸镁、碳酸钙、磷酸氢钙、柠檬酸钠、氯化钾、磷酸三钙、叶黄素、核苷酸(5'-肌苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷)、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12			

产品相关信息			
生产商：北安宜品努卡乳业有限公司			
地址：黑龙江省黑河市北安市铁西区工业园区			
产地：黑龙江·黑河			
食品生产许可证编号：SC10523118150120			
产品类别及属性：乳基粉状 婴儿配方食品			
产品标准号：GB 10765-2021			
咨询热线：400-6869-619			
宜品网址：www.yeeperdairy.com.cn			
生产日期、批号及保质期：见罐底			
保质期：24个月			



益臻1-350

喂哺建议表			
年龄	每次喂哺量 温开水量(ml)	量勺数(平勺)	每日喂哺次数
0-2周	60	2	7-8
2-4周	90	3	6-7
1-2月	120	4	5-6
2-3月	150	5	5-6
3-4月	180	6	5-6
4-6月	210	7	4-5

▲ 参照此表取适量温开水和奶粉，此表是根据平均需要量而定，仅供参考；
最适宜的溶解温度是45°C~50°C；每平勺奶粉约4.35克。
100mL 奶液=13.05g 粉+90mL 温开水



1. 冲调奶粉前应使用肥皂或清水将手彻底洗干净；
2. 将所有干净的喂哺器具放入清水煮沸5分钟以上；
3. 参照喂哺建议表取适量刚煮沸的水，使其冷却至45°C-50°C，然后注入奶瓶中；
4. 参照喂哺建议表取适量奶粉加入到奶瓶中；
5. 轻轻摇晃至奶粉充分溶解；
6. 冷却至适合宝宝饮用的温度即可喂哺，可以滴到手腕处测试温度。

贮存说明

- 请将奶粉存放在阴凉干燥通风处，切勿放入冰箱内；
- 每次食用后，请将罐盖盖紧；
- 开罐后，建议一个月内食用完毕。

宜品®

国食注字
YP20230079

宜品益臻



1
段

净含量:100克

婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段)

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2097
蛋白质	g	0.51	10.7
乳清蛋白	g	0.41	8.6
脂肪	g	1.25	26.3
亚油酸	g	0.19	4.08
α-亚麻酸	mg	20.3	425
碳水化合物	g	2.58	54.0
维生素			
维生素A	μg RE	18.4	385
维生素D	μg	0.59	12.3
维生素E	mg α-T	0.26	5.51
维生素K ₁	μg	1.56	32.7
维生素B ₁	μg	18.5	388
维生素B ₂	μg	31.2	654
维生素B ₆	μg	10.5	221
维生素B ₁₂	μg	0.058	1.21
烟酸	mg	133	2786
叶酸	mg	3.55	74.5
泛酸	mg	120	2520
维生素C	mg	2.98	62.4
生物素	μg	0.70	14.6
胆碱	mg	6.25	131
矿物质			
钠	mg	7.49	157
钾	mg	20.2	423
铜	mg	14.8	310
镁	mg	1.53	32.0
铁	mg	0.16	3.32
锌	mg	0.16	3.27
锰	mg	2.52	52.8
钙	mg	16.0	335
磷	mg	10.9	229
碘	mg	4.39	92.0
氯	mg	15.6	328
硒	μg	0.90	18.9
可选择性成分			
肌醇	mg	1.87	39.3
牛磺酸	mg	1.43	30.0
左旋肉碱	mg	0.42	8.82
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.81	80.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.67	98.0
低聚半乳糖	g	0.13	2.70
低聚果糖	g	0.014	0.30
叶黄素	μg	3.34	70.0
核苷酸	mg	1.05	22.1
乳铁蛋白	mg	2.38	50.0

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、低聚半乳糖、无水奶油、乳清蛋白粉、橄榄油、低聚果糖、磷脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、d₃-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氯钴油、烟酰胺、D-泛酸钙、叶酸、D-生物素、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、牛磺酸、左旋肉碱、肌醇、混合生育酚浓缩物、硫酸亚铁、硫酸锌、碘酸钾、硫酸氢钙、柠檬酸钠、氯化钾、磷酸三钙、叶黄素、核苷酸(5'-肌苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷)、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12

产品相关信息

生产商：北安宜品努卡乳业有限公司
地址：黑龙江省黑河市北安市铁西区工业园区
产地：黑龙江·黑河
食品生产许可证编号：SC10523118150120
产品类别及属性：乳基粉状 婴儿配方食品
产品标准号：GB 10765-2021
咨询热线：400-6869-619
宜品网址：www.yeeperdairy.com.cn
生产日期、批号及保质期至：见罐底
保质期：18个月



6 947050 502549

益臻1-100

宜品®

国食注字
YP20230079

喂哺建议表			
年龄	每次喂哺量 温开水量(ml)	量勺数(平勺)	每日喂哺次数
0-2周	60	2	7-8
2-4周	90	3	6-7
1-2月	120	4	5-6
2-3月	150	5	5-6
3-4月	180	6	5-6
4-6月	210	7	4-5

▲ 参照此表取适量温开水和奶粉，此表是根据平均需要量而定，仅供参考；
最适宜的溶解温度是45°C-50°C；每平勺奶粉约4.35克。
100mL 奶液 = 13.05g 粉 + 90mL 温开水



1. 冲调奶粉前应使用肥皂或清水将手彻底洗干净；
2. 将所有干净的喂哺器具放入清水煮沸 5 分钟以上；
3. 参照喂哺建议表取适量刚煮沸的水，使其冷却至 45°C-50°C，然后注入奶瓶中；
4. 参照喂哺建议表取适量奶粉加入到奶瓶中；
5. 轻轻摇晃至奶粉充分溶解；
6. 冷却至适合宝宝饮用的温度即可喂哺，可以滴到手腕处测试温度。

冲调及喂养提示

- 对于 0~6 月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。
- 奶粉冲调好后，应马上给宝宝喂养，喂哺剩余的奶液，请弃掉，勿留于下次食用。
- 喂哺期间要照顾好宝宝，疏于照顾会引起宝宝哽咽或其他不适。
- 宝宝两餐之间要适当补充水。

贮存说明

- 请将奶粉存放在阴凉干燥通风处，切勿放入冰箱内；
- 每次食用后，请将罐盖盖紧；
- 开罐后，建议一个月内食用完毕。



营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2097
蛋白质	g	0.51	10.7
乳清蛋白	g	0.41	8.6
脂肪	g	1.25	26.3
亚油酸	g	0.19	4.08
α-亚麻酸	mg	20.3	425
碳水化合物	g	2.58	54.0
维生素			
维生素A	μg RE	18.4	385
维生素D	μg	0.59	12.3
维生素E	mg α-TE	0.26	5.51
维生素K ₁	μg	1.56	32.7
维生素B ₁	μg	18.5	388
维生素B ₂	μg	31.2	654
维生素B ₆	μg	10.5	221
维生素B ₁₂	μg	0.058	1.21
烟酸	μg	133	2786
叶酸	μg	3.55	74.5
泛酸	μg	120	2520
维生素C	mg	2.98	62.4
生物素	μg	0.70	14.6
胆碱	mg	6.25	131
矿物质			
钠	mg	7.49	157
钾	mg	20.2	423
铜	μg	14.8	310
镁	mg	1.53	32.0
铁	mg	0.16	3.32
锌	mg	0.16	3.27
锰	μg	2.52	52.8
钙	mg	16.0	335
磷	mg	10.9	229
碘	μg	4.39	92.0
氯	mg	15.6	328
硒	μg	0.90	18.9
可选择性成分			
肌醇	mg	1.87	39.3
牛磺酸	mg	1.43	30.0
左旋肉碱	mg	0.42	8.82
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.81	80.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.67	98.0
低聚半乳糖	g	0.13	2.70
低聚果糖	g	0.014	0.30
叶黄素	μg	3.34	70.0
核苷酸	mg	1.05	22.1
乳铁蛋白	mg	2.38	50.0

配料表			
生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、低聚半乳糖、无水奶油、乳清蛋白粉、橄榄油、低聚果糖、磷脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醒、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氯钴胺、烟酰胺-D-泛酸钙、叶酸-D-生物素-L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、牛磺酸、左旋肉碱、肌醇、混合生育酚浓缩物、硫酸亚铁、硫酸锌、碘酸钾、硫酸铜、硫酸镁、亚硒酸钠、硫酸镁、碳酸钙、碘酸氢钙、柠檬酸钠、氯化钾、磷酸三钙、叶黄素、核苷酸(5'-肌苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷)、二十二碳六烯酸油脂(发酵法、花生四烯酸、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12)			

产品相关信息			
生产商：北安宜品努卡乳业有限公司			
地址：黑龙江省黑河市北安市铁西区工业园区			
产地：黑龙江 黑河			
食品生产许可证编号：SC10523118150120			
产品类别及属性：乳基粉状 婴儿配方食品			
产品标准号：GB 10765-2021			
咨询热线：400-6869-619			
宜品网址：www.yeeperdairy.com.cn			
生产日期、批号及保质期至：见罐底			
保质期：24个月			



6 947050 502303

益臻1-380

年龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水量(mL)	量勺数(平勺)	
0-2周	60	2	7-8
2-4周	90	3	6-7
1-2月	120	4	5-6
2-3月	150	5	5-6
3-4月	180	6	5-6
4-6月	210	7	4-5

▲ 参照此表取适量温开水和奶粉，此表是根据平均需要量而定，仅供参考；最适宜的溶解温度是45°C-50°C；每平勺奶粉约4.35克。100mL 奶液=13.05g 粉 +90mL 温开水



- 冲调奶粉前应使用肥皂或清水将手彻底洗干净；
- 将所有干净的喂哺器具放入清水煮沸5分钟以上；
- 参照喂哺建议表取适量刚煮沸的水，使其冷却至45°C-50°C，然后注入奶瓶中；
- 参照喂哺建议表取适量奶粉加入到奶瓶中；
- 轻轻摇晃至奶粉充分溶解；
- 冷却至适合宝宝饮用的温度即可喂哺，可以滴到手腕处测试温度。



冲调及喂养提示

- 对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。
- 奶粉冲调好后，应马上给宝宝喂养，喂哺剩余的奶液，请弃掉，勿留于下次食用。
- 喂哺期间要照顾好宝宝，疏于照顾会引起宝宝哽咽或其他不适。
- 宝宝两餐之间要适当补充水。

贮存说明

- 请将奶粉存放在阴凉干燥通风处，切勿放入冰箱内；
- 每次食用后，请将罐盖盖紧；
- 开罐后，建议一个月内食用完毕。

宜品®

宜品益臻

国食注字
YP20230079



净含量:800克

婴儿配方奶粉(0-6月龄, 1段)

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2097
蛋白质	g	0.51	10.7
乳清蛋白	g	0.41	8.6
脂肪	g	1.25	26.3
亚油酸	g	0.19	4.08
α-亚麻酸	mg	20.3	425
碳水化合物	g	2.58	54.0
维生素			
维生素A	μg RE	18.4	385
维生素D	μg	0.59	12.3
维生素E	mg α-TE	0.26	5.51
维生素K ₁	μg	1.56	32.7
维生素B ₁	μg	18.5	388
维生素B ₂	μg	31.2	654
维生素B ₆	μg	10.5	221
维生素B ₁₂	μg	0.058	1.21
烟酸	μg	133	2786
叶酸	μg	3.55	74.5
泛酸	μg	120	2520
维生素C	mg	2.98	62.4
生物素	μg	0.70	14.6
胆碱	mg	6.25	131
矿物质			
钠	mg	7.49	157
钾	mg	20.2	423
铜	μg	14.8	310
镁	mg	1.53	32.0
铁	mg	0.16	3.32
锌	mg	0.16	3.27
钙	μg	2.52	52.8
磷	mg	16.0	335
碘	mg	10.9	229
氯	μg	4.39	92.0
硒	mg	15.6	328
可选择性成分			
肌醇	mg	1.87	39.3
牛磺酸	mg	1.43	30.0
左旋肉碱	mg	0.42	8.82
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.81	80.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.67	98.0
低聚半乳糖	g	0.13	2.70
低聚果糖	g	0.014	0.30
叶黄素	μg	3.34	70.0
核苷酸	mg	1.05	22.1
乳铁蛋白	mg	2.38	50.0

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、低聚半乳糖、无水奶油、乳清蛋白粉、橄榄油、低聚果糖、磷脂、醋酸胆黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氯钴胺、烟酰胺、D-泛酸钙、叶酸、D-生物素、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、牛磺酸、左旋肉碱、肌醇、混合生育酚浓缩物、硫酸亚铁、硫酸锌、碘酸钾、硫酸铜、硫酸锰、亚硒酸钠、硫酸镁、碳酸钙、磷酸氢钙、柠檬酸钠、氯化钾、磷酸三钙、叶黄素、核苷酸(5'-肌苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷)、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12

产品相关信息

生产商：北安宜品努卡乳业有限公司
地址：黑龙江省黑河市北安市铁西区工业园区
产地：黑龙江 黑河
食品生产许可证编号：SC10523118150120
产品类别及属性：乳基粉状 婴儿配方食品
产品标准号：GB 10765-2021
咨询热线：400-6869-619
宣品网址：www.yepperdairy.com.cn
生产日期、批号及保质期至：见罐底
保质期：24个月



益臻1-800

喂哺建议表			
年龄	每次喂哺量 温开水量(ml)	量勺数(平勺)	每日喂哺次数
0-2周	60	2	7-8
2-4周	90	3	6-7
1-2月	120	4	5-6
2-3月	150	5	5-6
3-4月	180	6	5-6
4-6月	210	7	4-5

▲ 参照此表取适量温开水和奶粉，此表是根据平均需要量而定，仅供参考；
最适宜的溶解温度是45°C-50°C；每平勺奶粉约4.35克。
100mL 奶液=13.05g 粉+90mL 温开水



- 冲调奶粉前应使用肥皂或清水将手彻底洗干净；
- 将所有干净的喂哺器具放入清水煮沸5分钟以上；
- 参照喂哺建议表取适量刚煮沸的水，使其冷却至45°C-50°C，然后注入奶瓶中；
- 参照喂哺建议表取适量奶粉加入到奶瓶中；
- 轻轻摇晃至奶粉充分溶解；
- 冷却至适合宝宝饮用的温度即可喂哺，可以滴到手腕处测试温度。



冲调及喂养提示

- 对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。
- 奶粉冲调好后，应马上给宝宝喂养，喂哺剩余的奶液，请弃掉，勿留于下次食用。
- 喂哺期间要照顾好宝宝，疏于照顾会引起宝宝哽咽或其他不适。
- 宝宝两餐之间要适当补充水。

贮存说明

- 请将奶粉存放在阴凉干燥通风处，切勿放入冰箱内；
- 每次食用后，请将罐盖盖紧；
- 开罐后，建议一个月内食用完毕。

宜品®

国食注字
YP20230079

宜品益臻



1段

净含量:400克

婴儿配方奶粉(0-6月龄, 1段)

营养成分表		
项目	单位	每100kJ 每100g
能量	kJ	100 2097
蛋白质	g	0.51 10.7
乳清蛋白	g	0.41 8.6
脂肪	g	1.25 26.3
亚油酸	g	0.19 4.08
α-亚麻酸	mg	20.3 425
碳水化合物	g	2.58 54.0
维生素		
维生素A	μg RE	18.4 385
维生素D	μg	0.59 12.3
维生素E	mg α-TE	0.26 5.51
维生素K ₁	μg	1.56 32.7
维生素B ₁	μg	18.5 388
维生素B ₂	μg	31.2 654
维生素B ₆	μg	10.5 221
维生素B ₁₂	μg	0.058 1.21
烟酸	μg	133 2786
叶酸	μg	3.55 74.5
泛酸	μg	120 2520
维生素C	mg	2.98 62.4
生物素	μg	0.70 14.6
胆碱	mg	6.25 131
矿物质		
钠	mg	7.49 157
钾	mg	20.2 423
铜	μg	14.8 310
镁	mg	1.53 32.0
铁	mg	0.16 3.32
锌	mg	0.16 3.27
锰	μg	2.52 52.8
钙	mg	16.0 335
磷	mg	10.9 229
碘	μg	4.39 92.0
氯	mg	15.6 328
硒	μg	0.90 18.9
可选择性成分		
肌醇	mg	1.87 39.3
牛磺酸	mg	1.43 30.0
左旋肉碱	mg	0.42 8.82
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.81 80.0
二十二碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.67 98.0
低聚半乳糖	g	0.13 2.70
低聚果糖	g	0.014 0.30
叶黄素	μg	3.34 70.0
核苷酸	mg	1.05 22.1
乳铁蛋白	mg	2.38 50.0

配料表		
生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、低聚半乳糖、无水奶油、乳清蛋白粉、橄榄油、低聚果糖、磷脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸叶酸、氯钴胺、烟酰胺、D-泛酸钙、叶酸、D-生物素、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、牛磺酸、左旋肉碱、肌醇、混合生育酚浓缩物、硫酸亚铁、硫酸锌、碘酸钾、硫酸铜、硫酸镁、亚硒酸钠、硫酸镁、碳酸钙、磷酸氢钙、柠檬酸钠、氯化钾、磷酸三钙、叶黄素、核苷酸(5'-肌苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷)、二十二碳六烯酸油脂(发酵法、花生四烯酸、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12)		

产品相关信息		
生产商:	北安宜品努卡乳业有限公司	
地址:	黑龙江省黑河市北安市铁西区工业园区	
产地:	黑龙江·黑河	
食品生产许可证编号:	SC10523118150120	
产品类别及属性:	乳基粉状 婴儿配方食品	
产品标准号:	GB 10765-2021	
咨询热线:	400-6869-619	
宜品网址:	www.yepperdairy.com.cn	
生产日期、批号及保质期至:	见罐底	
保质期:	24个月	



益臻1-400

喂哺建议表			
年龄	每次喂哺量 温开水量(ml)	量勺数(平勺)	每日喂哺次数
0-2周	80	2	7-8
2-4周	90	3	6-7
1-2月	120	4	5-6
2-3月	150	5	5-6
3-4月	180	6	5-6
4-6月	210	7	4-5

▲ 参照此表取适量温开水和奶粉，此表是根据平均需要量而定，仅供参考；最适宜的溶解温度是45°C-50°C；每平勺奶粉约4.35克。100mL奶液=13.05g粉+90mL温开水。



1. 冲调奶粉前应使用肥皂或清水将手彻底洗干净；
2. 将所有干净的喂哺器具放入清水煮沸 5 分钟以上；
3. 参照喂哺建议表取适量刚煮沸的水，使其冷却至 45°C-50°C，然后注入奶瓶中；
4. 参照喂哺建议表取适量奶粉加入到奶瓶中；
5. 轻轻摇晃至奶粉充分溶解；
6. 冷却至适合宝宝饮用的温度即可喂哺，可以滴到手腕处测试温度。



宜品®

宜品益臻

国食注字
YP20230079



1段

净含量: 820克

婴儿配方奶粉(0-6月龄, 1段)

贮存说明

- 请将奶粉存放在阴凉干燥通风处，切勿放入冰箱内；
- 每次食用后，请将罐盖盖紧；
- 开罐后，建议一个月内食用完毕。

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2097
蛋白质	g	0.51	10.7
乳清蛋白	g	0.41	8.6
脂肪	g	1.25	26.3
亚油酸	g	0.19	4.08
α-亚麻酸	mg	20.3	425
碳水化合物	g	2.58	54.0

项目	单位	每100kJ	每100g
维生素A	μg RE	18.4	385
维生素D	μg	0.59	12.3
维生素E	mg α-TE	0.26	5.51
维生素K ₁	μg	1.56	32.7
维生素B ₁	μg	18.5	388
维生素B ₂	μg	31.2	654
维生素B ₆	μg	10.5	221
维生素B ₁₂	μg	0.058	1.21
烟酸	μg	133	2786
叶酸	μg	3.55	74.5
泛酸	μg	120	2520
维生素C	mg	2.98	62.4
生物素	μg	0.70	14.6
胆碱	mg	6.25	131

矿物质	单位	每100kJ	每100g
钠	mg	7.49	157
钾	mg	20.2	423
镁	μg	14.8	310
钙	mg	1.53	32.0
铁	mg	0.16	3.32
锌	mg	0.16	3.27
锰	μg	2.52	52.8
钙	mg	16.0	335
磷	mg	10.9	229
碘	μg	4.39	92.0
氯	mg	15.6	328
硒	μg	0.90	18.9

可选择性成分	单位	每100kJ	每100g
肌醇	mg	1.87	39.3
牛磺酸	mg	1.43	30.0
左旋肉碱	mg	0.42	8.82
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.81	80.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.67	98.0
低聚半乳糖	g	0.13	2.70
低聚果糖	g	0.014	0.30
叶黄素	μg	3.34	70.0
核苷酸	mg	1.05	22.1
乳铁蛋白	mg	2.38	50.0

配料表			
生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物油和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、低聚半乳糖、无水奶油、乳清蛋白粉、橄榄油、低聚果糖、磷脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氯钴胺、烟酰胺、D-泛酸钙、叶酸、D-生物素、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、牛磺酸、左旋肉碱、肌醇、混合生育酚浓缩物、硫酸亚铁、硫酸锌、碘酸钾、硫酸铜、硫酸镁、亚硒酸钠、硫酸镁、碳酸钙、磷酸氢钙、柠檬酸钠、氯化钾、磷酸三钙、叶黄素、核苷酸(5'-肌苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷)、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12			

产品相关信息			
生产商:	北安宜品努卡乳业有限公司	地址:	黑龙江省黑河市北安市铁西区工业园区
产地:	黑龙江 黑河	食品生产许可证编号:	SC10523118150120
产品类别及属性:	乳基粉状 婴儿配方食品	产品标准号:	GB 10765-2021
咨询热线:	400-6869-619	宣传网址:	www.yeeperdairy.com.cn
生产日期、批号及保质期至:	见罐底	保质期:	24个月



益臻1-820

喂哺建议表			
年龄	每次喂哺量 温开水量(ml)	量勺数(平勺)	每日喂哺次数
0-2周	60	2	7-8
2-4周	90	3	6-7
1-2月	120	4	5-6
2-3月	150	5	5-6
3-4月	180	6	5-6
4-6月	210	7	4-5

▲ 参照此表取适量温开水和奶粉，此表是根据平均需要量而定，仅供参考；
最适宜的溶解温度是45°C~50°C；每平勺奶粉约4.35克。
100mL 奶液 = 13.05g 粉 + 90mL 温开水



- 冲调奶粉前应使用肥皂或清水将手彻底洗干净；
- 将所有干净的喂哺器具放入清水煮沸5分钟以上；
- 参照喂哺建议表取适量刚煮沸的水，使其冷却至45°C-50°C，然后注入奶瓶中；
- 参照喂哺建议表取适量奶粉加入到奶瓶中；
- 轻轻摇晃至奶粉充分溶解；
- 冷却至适合宝宝饮用的温度即可喂哺，可以滴到手腕处测试温度。

贮存说明

- 请将奶粉存放在阴凉干燥通风处，切勿放入冰箱内；
- 每次食用后，请将罐盖盖紧；
- 开罐后，建议一个月内食用完毕。

宜品®

国食注字
YP20230079

宜品益臻



1段

净含量:108克

婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段)

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2097
蛋白质	g	0.51	10.7
乳清蛋白	g	0.41	8.6
脂肪	g	1.25	26.3
亚油酸	g	0.19	4.08
α-亚麻酸	mg	20.3	425
碳水化合物	g	2.58	54.0
维生素			
维生素A	μg RE	18.4	385
维生素D	μg	0.59	12.3
维生素E	mg α-TE	0.26	5.51
维生素K ₁	μg	1.56	32.7
维生素B ₁	mg	18.5	388
维生素B ₂	mg	31.2	654
维生素B ₆	mg	10.5	221
维生素B ₁₂	mg	0.058	1.21
烟酸	mg	133	2786
叶酸	mg	3.55	74.5
泛酸	mg	120	2520
维生素C	mg	2.98	62.4
生物素	mg	0.70	14.6
胆碱	mg	6.25	131
矿物质			
钠	mg	7.49	157
钾	mg	20.2	423
镁	mg	14.8	310
铁	mg	1.53	32.0
锌	mg	0.16	3.32
碘	mg	0.16	3.27
钙	mg	2.52	52.8
磷	mg	16.0	335
氯	mg	10.9	229
硫酸	mg	4.39	92.0
氮	mg	15.6	328
硒	μg	0.90	18.9
可选择性成分			
肌醇	mg	1.87	39.3
牛磺酸	mg	1.43	30.0
左旋肉碱	mg	0.42	8.82
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.81	80.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.67	98.0
低聚半乳糖	g	0.13	2.70
低聚果糖	g	0.014	0.30
叶黄素	mg	3.34	70.0
核苷酸	mg	1.05	22.1
乳铁蛋白	mg	2.38	50.0

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、低聚半乳糖、无水奶油、乳清蛋白粉、橄榄油、低聚果糖、磷脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氯钴胺、烟酰胺、D-泛酸钙、叶酸、D-生物素、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、牛磺酸、左旋肉碱、肌醇、硫酸铜、硫酸锰、亚硒酸钠、硫酸镁、碳酸钙、磷酸氢钙、柠檬酸钠、氯化钾、磷酸三钙、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷)、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、乳铁蛋白、动物双岐杆菌乳亚种 Bb-12

产品相关信息

生产商：北安宜品努卡乳业有限公司
地址：黑龙江省黑河市北安市铁西区工业园区
产地：黑龙江 黑河
食品生产许可证编号：SC10523118150120
产品类别及属性：乳基粉状 婴儿配方食品
产品标准号：GB 10765-2021
咨询热线：400-6869-619
宜品网址：www.yeeperdairy.com.cn
生产日期、批号及保质期至：见罐底
保质期：18个月



6 947050 505465

益臻1-108

喂哺建议表			
年龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水量(ml)	量勺数(平勺)	
6-8月	210	7	3-4
8-12月	240	8	3

▲ 参照此表取适量温开水和奶粉，此表是根据平均需要量而定，仅供参考；
最适宜的溶解温度是45°C-50°C；每平勺奶粉约4.5克。
100mL 奶液=13.5g粉+90mL 温开水



- 冲调奶粉前应使用肥皂或清水将手彻底洗干净；
- 将所有干净的喂哺器具放入清水煮沸5分钟以上；
- 参照喂哺建议表取适量刚煮沸的水，使其冷却至45°C-50°C，然后注入奶瓶中；
- 参照喂哺建议表取适量奶粉加入到奶瓶中；
- 轻轻摇晃搅拌至奶粉充分溶解；
- 冷却至适合宝宝饮用的温度即可喂哺，可以滴到手腕处测试温度。



冲调及喂养提示

- 婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。6个月龄以上婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。
- 奶粉冲调好后，应马上给宝宝喂养，喂哺剩余的奶液，请弃掉，勿留于下次食用。
- 喂哺期间要照顾好宝宝，疏于照顾会引起宝宝便秘或其他不适。
- 宝宝两餐之间要适当补充水。

贮存说明

- 请将奶粉存放在阴凉干燥通风处，切勿放入冰箱内；
- 每次食用后，请将罐盖盖紧；
- 开罐后，建议一个月内食用完毕。

宜品®

宜品益臻

国食注字
YP20230080



2段

净含量:700克

较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段)

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2017
蛋白质	g	0.63	12.8
乳清蛋白	g	0.40	8.1
脂肪	g	1.11	22.3
亚油酸	g	0.17	3.52
α-亚麻酸	mg	18.0	364
碳水化合物	g	2.77	55.9
维生素			
维生素A	μg RE	22.4	451
维生素D	μg	0.59	11.8
维生素E	mg α-TE	0.25	5.01
维生素K ₁	μg	1.66	33.5
维生素B ₁	μg	19.3	389
维生素B ₂	μg	30.0	605
维生素B ₆	μg	13.6	275
维生素B ₁₂	μg	0.071	1.43
烟酸	μg	136	2750
叶酸	μg	3.85	77.6
泛酸	μg	123	2480
维生素C	mg	2.97	60.0
生物素	μg	0.67	13.5
胆碱	mg	6.20	125
矿物质			
钠	mg	9.32	188
钾	mg	23.1	466
钙	μg	10.4	210
镁	mg	1.83	37.0
铁	mg	0.30	6.05
锌	mg	0.15	3.06
锰	μg	3.21	64.7
碘	mg	21.3	430
磷	mg	14.7	296
氯	μg	4.51	91.0
硒	μg	15.4	310
可选择性成分			
肌醇	mg	2.31	46.5
牛磺酸	mg	1.51	30.5
左旋肉碱	mg	0.41	8.27
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.97	80.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.81	97.0
低聚半乳糖	g	0.13	2.70
低聚果糖	g	0.015	0.30
叶黄素	μg	8.68	175
核苷酸	mg	1.11	22.4
乳铁蛋白	mg	2.48	50.0

配料表			
生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、低聚半乳糖、脱脂乳粉、乳清蛋白粉、橄榄油、低聚果糖、磷脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氯钴胺、烟酰胺、D-泛酸钙、叶酸、D-生物素、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、牛磺酸、左旋肉碱、肌醇、混合生育酚浓缩物、硫酸亚铁、硫酸锌、碘酸钾、硫酸铜、硫酸锰、亚硒酸钠、硫酸镁、碳酸钙、磷酸氢钙、柠檬酸钠、氯化钾、磷酸三钙、叶黄素、核苷酸(S'-肌苷二钠、S'-尿苷二钠、S'-胞苷二钠、S'-鸟苷二钠、S'-单磷酸腺苷)、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳业种Bb-12			

产品相关信息			
生产商：北安宜品努卡乳业有限公司			
地址：黑龙江省黑河市北安市铁西区工业园区			
产地：黑龙江·黑河			
食品生产许可证编号：SC10523118150120			
产品类别及属性：乳基粉状 较大婴儿配方食品			
产品标准号：GB 10766-2021			
咨询热线：400-6869-619			
宜品网址：www.yeeperdairy.com.cn			
生产日期、批号及保质期：见罐底			
保质期：24个月			



益臻2-700

喂哺建议表			
年龄	每次喂哺量 温开水量(ml)	每日喂哺次数 量勺数(平勺)	
6-8月	210	7	3-4
8-12月	240	8	3

▲ 参照此表取适量温开水和奶粉，此表是根据平均需要量而定，仅供参考；
最适宜的溶解温度是45°C-50°C；每平勺奶粉约4.5克。
100mL 奶液=13.5g 粉+90mL 温开水



1. 调奶粉前应使用肥皂或清水将手彻底洗干净；
2. 将所有干净的喂哺器具放入清水煮沸5分钟以上；
3. 参照喂哺建议表取适量刚煮沸的水，使其冷却至45°C-50°C，然后注入奶瓶中；
4. 参照喂哺建议表取适量奶粉加入到奶瓶中；
5. 轻轻摇晃搅拌至奶粉充分溶解；
6. 冷却至适合宝宝饮用的温度即可喂哺，可以滴到手腕处测试温度。



冲调及喂养提示

- 婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。6个月龄以上婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。
- 奶粉冲调好后，应马上给宝宝喂养，喂哺剩余的奶液，请弃掉，勿留于下次食用。
- 喂哺期间要照顾好宝宝，疏于照顾会引起宝宝哽咽或其他不适。
- 宝宝两餐之间要适当补充水。

贮存说明

- 请将奶粉存放在阴凉干燥通风处，切勿放入冰箱内；
- 每次食用后，请将罐盖盖紧；
- 开罐后，建议一个月内食用完毕。

宜品®

宜品益臻



2段

净含量:350克

较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段)

国食注字
YP20230080

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2017
蛋白质	g	0.63	12.8
乳清蛋白	g	0.40	8.1
脂肪	g	1.11	22.3
亚油酸	g	0.17	3.52
α-亚麻酸	mg	18.0	364
碳水化合物	g	2.77	55.9
维生素			
维生素A	μg RE	22.4	451
维生素D	μg	0.59	11.8
维生素E	mg α-TE	0.25	5.01
维生素K ₁	μg	1.66	33.5
维生素B ₁	μg	19.3	389
维生素B ₂	μg	30.0	605
维生素B ₆	μg	13.6	275
维生素B ₁₂	μg	0.071	1.43
烟酸	μg	136	2750
叶酸	μg	3.85	77.6
泛酸	μg	123	2480
维生素C	mg	2.97	60.0
生物素	μg	0.67	13.5
胆碱	mg	6.20	125
矿物质			
钠	mg	9.32	188
钾	mg	23.1	466
铜	μg	10.4	210
镁	mg	1.83	37.0
铁	mg	0.30	6.05
锌	mg	0.15	3.06
锰	μg	3.21	64.7
钙	mg	21.3	430
磷	mg	14.7	296
碘	μg	4.51	91.0
氯	mg	15.4	310
硒	μg	0.60	12.1
可选择性成分			
肌醇	mg	2.31	46.5
牛磺酸	mg	1.51	30.5
左旋肉碱	mg	0.41	8.27
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.97	80.0
二十二碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.81	97.0
低聚半乳糖	g	0.13	2.70
低聚果糖	g	0.015	0.30
叶黄素	μg	8.68	175
核苷酸	mg	1.11	22.4
乳铁蛋白	mg	2.48	50.0

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、低聚半乳糖、脱脂乳粉、乳清蛋白粉、橄榄油、低聚果糖、磷脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氯钴胺、烟酰胺、D-泛酸钙、叶酸、D-生物素、L-抗坏血酸、氯化胆碱、牛磺酸、左旋肉碱、肌醇、混合生育酚浓缩物、硫酸亚铁、硫酸锌、碘酸钾、硫酸铜、硫酸镁、亚硒酸钠、硫酸镁、碳酸钙、磷酸氢钙、柠檬酸钠、氯化钾、磷酸三钙、叶黄素、核苷酸(5'-肌苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷)、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12

产品相关信息

生产商：北安宜品努卡乳业有限公司
地址：黑龙江省黑河市北安市铁西区工业园区
产地：黑龙江·黑河
食品生产许可证编号：SC10523118150120
产品类别及属性：乳基粉状较大婴儿配方食品
产品标准号：GB 10766-2021
咨询热线：400-6869-619
宜品网址：www.yeeperdairy.com.cn
生产日期、批号及保质期至：见罐底
保质期：24个月



6 947050 506202 >

益臻2-350



宜品®

国食注字
YP20230080

宜品益臻



2段

净含量:380克

较大婴儿配方奶粉(6-12月龄, 2段)

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2017
蛋白质	g	0.63	12.8
乳清蛋白	g	0.40	8.1
脂肪	g	1.11	22.3
亚油酸	g	0.17	3.52
α-亚麻酸	mg	18.0	364
碳水化合物	g	2.77	55.9
维生素			
维生素A	μg RE	22.4	451
维生素D	μg	0.59	11.8
维生素E	mg α-TE	0.25	5.01
维生素K ₁	μg	1.66	33.5
维生素B ₁	μg	19.3	389
维生素B ₂	μg	30.0	605
维生素B ₆	μg	13.6	275
维生素B ₁₂	μg	0.071	1.43
烟酸	μg	136	2750
叶酸	μg	3.85	77.6
泛酸	μg	123	2480
维生素C	mg	2.97	60.0
生物素	μg	0.67	13.5
胆碱	mg	6.20	125
矿物质			
钠	mg	9.32	188
钾	mg	23.1	466
镁	μg	10.4	210
钙	mg	1.83	37.0
铁	mg	0.30	6.05
锌	mg	0.15	3.06
锰	μg	3.21	64.7
碘	mg	21.3	430
磷	mg	14.7	296
氯	μg	4.51	91.0
硒	mg	15.4	310
硒	μg	0.60	12.1
可选择性成分			
肌醇	mg	2.31	46.5
牛磺酸	mg	1.51	30.5
左旋肉碱	mg	0.41	8.27
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.97	80.0
二十九碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.81	97.0
低聚半乳糖	g	0.13	2.70
低聚果糖	g	0.015	0.30
叶黄素	μg	8.68	175
核苷酸	mg	1.11	22.4
乳铁蛋白	mg	2.48	50.0



6 947050 502310

益臻2-380

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、低聚半乳糖、脱脂乳粉、乳清蛋白粉、橄榄油、低聚果糖、磷脂、醋酸胆碱、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氯钴胺、烟酰胺、D-泛酸钙、叶酸、D-生物素、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、牛磺酸、左旋肉碱、肌醇、混合生育酚浓缩物、硫酸亚铁、硫酸锌、碘酸钾、硫酸铜、硫酸镁、亚硒酸钠、硫酸镁、碳酸钙、磷酸氢钙、柠檬酸钠、氯化钾、磷酸三钙、叶黄素、核苷酸(5'-肌苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷)、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12

产品相关信息

生产商：北安宜品努卡乳业有限公司
地址：黑龙江省黑河市北安市铁西区工业园区
产地：黑龙江·黑河
食品生产许可证编号：SC10523118150120
产品类别及属性：乳基粉状 较大婴儿配方食品
产品标准号：GB 10766-2021
咨询热线：400-6869-619
宜品网址：www.yeeperdairy.com.cn
生产日期、批号及保质期至：见罐底
保质期：24个月

喂哺建议表		
年龄	每次喂哺量 温开水量(ml)	量勺数(平勺) 每日喂哺次数
6-8月	210	7 3-4
8-12月	240	8 3

▲ 参照此表取适量温开水和奶粉，此表是根据平均需要量而定，仅供参考；
最适宜的溶解温度是45°C-50°C；每平勺奶粉约4.5克。
100mL 奶液 = 13.5g 粉 + 90mL 温开水



宜品®

宜品益臻

国食注字
YP20230080

2段

净含量:800克

较大婴儿配方奶粉(6-12月龄, 2段)

贮存说明

- 请将奶粉存放在阴凉干燥通风处，切勿放入冰箱内；
- 每次食用后，请将罐盖盖紧；
- 开罐后，建议一个月内食用完毕。

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2017
蛋白质	g	0.63	12.8
乳清蛋白	g	0.40	8.1
脂肪	g	1.11	22.3
亚油酸	g	0.17	3.52
α-亚麻酸	mg	18.0	364
碳水化合物	g	2.77	55.9
维生素			
维生素A	μg RE	22.4	451
维生素D	μg	0.59	11.8
维生素E	mg α-TE	0.25	5.01
维生素K ₁	μg	1.66	33.5
维生素B ₁	μg	19.3	389
维生素B ₂	μg	30.0	605
维生素B ₆	μg	13.6	275
维生素B ₁₂	μg	0.071	1.43
烟酸	μg	136	2750
叶酸	μg	3.85	77.6
泛酸	μg	123	2480
维生素C	mg	2.97	60.0
生物素	μg	0.67	13.5
胆碱	mg	6.20	125
矿物质			
钠	mg	9.32	188
钾	mg	23.1	466
铜	μg	10.4	210
镁	mg	1.83	37.0
铁	mg	0.30	6.05
锌	mg	0.15	3.06
锰	μg	3.21	64.7
钙	mg	21.3	430
磷	mg	14.7	296
碘	μg	4.51	91.0
氯	mg	15.4	310
硒	μg	0.60	12.1
可选择性成分			
肌醇	mg	2.31	46.5
牛磺酸	mg	1.51	30.5
左旋肉碱	mg	0.41	8.27
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.97	80.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.81	97.0
低聚半乳糖	g	0.13	2.70
低聚果糖	g	0.015	0.30
叶黄素	μg	8.68	175
核苷酸	mg	1.11	22.4
乳铁蛋白	mg	2.48	50.0

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、低聚半乳糖、脱脂乳粉、乳清蛋白粉、橄榄油、低聚果糖、磷脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氯钴胺、烟酰胺、D-泛酸钙、叶酸、D-生物素、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、牛磺酸、左旋肉碱、肌醇、混合生育酚浓缩物、硫酸亚铁、硫酸锌、碘酸钾、硫酸铜、硫酸锰、亚硒酸钠、硫酸镁、碳酸钙、磷酸氢钙、柠檬酸钠、氯化钾、磷酸三钙、叶黄素、核苷酸(5'-肌苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷)、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、乳铁蛋白、动物双歧杆菌
乳业种 Bb-12

产品相关信息
生产商：北安宜品努卡乳业有限公司
地址：黑龙江省黑河市北安市铁西区工业园区
产地：黑龙江·黑河
食品生产许可证编号：SC10523118150120
产品类别及属性：乳基粉状 较大婴儿配方食品
产品标准号：GB 10766-2021
咨询热线：400-6869-619
宜品网址：www.yeeperdairy.com.cn
生产日期、批号及保质期至：见罐底
保质期：24个月



益臻2-800

喂哺建议表		
年龄	每次喂哺量 温开水量(ml)	每日喂哺次数 量勺数(平均)
6-8月	210	7 3-4
8-12月	240	8 3

▲ 参照此表取适量温开水和奶粉，此表是根据平均需要量而定，仅供参考；

最适宜的溶解温度是45°C-50°C；每平勺奶粉约4.5克。
100mL 奶液=13.5g粉+90mL 温开水

冲调方法



- 1、冲调奶粉前应使用肥皂或清水将手彻底洗干净；
- 2、将所有干净的喂哺器具放入清水煮沸5分钟以上；
- 3、参照喂哺建议表取适量刚煮沸的水，使其冷却至45°C-50°C，然后注入奶瓶中；
- 4、参照喂哺建议表取适量奶粉加入到奶瓶中；
- 5、轻轻摇晃搅拌至奶粉充分溶解；
- 6、冷却至适合宝宝饮用的温度即可喂哺，可以滴到手腕处测试温度。



冲调及喂养提示

- 婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。6个月龄以上婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。
- 奶粉冲调好后，应马上给宝宝喂养，喂哺剩余的奶液，请弃掉，勿留于下次食用。
- 喂哺期间要照顾好宝宝，疏于照顾会引起宝宝哽咽或其他不适。
- 宝宝两餐之间要适当补充水。

贮存说明

- 请将奶粉存放在阴凉干燥通风处，切勿放入冰箱内；
- 每次食用后，请将罐盖盖紧；
- 开罐后，建议一个月内食用完毕。

宜品®

宜品益臻

国食注字
YP20230080



2段

净含量: 820克

较大婴儿配方奶粉(6-12月龄, 2段)

营养成分表		
项目	单位	每100kJ 每100g
能量	kJ	100 2017
蛋白质	g	0.63 12.8
乳清蛋白	g	0.40 8.1
脂肪	g	1.11 22.3
亚油酸	g	0.17 3.52
α-亚麻酸	mg	18.0 364
碳水化合物	g	2.77 55.9
维生素A	μg RE	22.4 451
维生素D	μg	0.59 11.8
维生素E	mg α-TE	0.25 5.01
维生素K ₁	μg	1.66 33.5
维生素B ₁	μg	19.3 389
维生素B ₂	μg	30.0 605
维生素B ₆	μg	13.6 275
维生素B ₁₂	μg	0.071 1.43
烟酸	μg	136 2750
叶酸	μg	3.85 77.6
泛酸	μg	123 2480
维生素C	mg	2.97 60.0
生物素	μg	0.67 13.5
胆碱	mg	6.20 125
矿物质		
钠	mg	9.32 188
钾	mg	23.1 466
铜	μg	10.4 210
镁	mg	1.83 37.0
铁	mg	0.30 6.05
锌	mg	0.15 3.06
锰	μg	3.21 64.7
钙	mg	21.3 430
磷	mg	14.7 296
碘	μg	4.51 91.0
氯	mg	15.4 310
硒	μg	0.60 12.1
可选择性成分		
肌醇	mg	2.31 46.5
牛磺酸	mg	1.51 30.5
左旋肉碱	mg	0.41 8.27
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.97 80.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.81 97.0
低聚半乳糖	g	0.13 2.70
低聚果糖	g	0.015 0.30
叶黄素	μg	8.68 175
核苷酸	mg	1.11 22.4
乳铁蛋白	mg	2.48 50.0

配料表		
生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、低聚半乳糖、脱脂乳粉、乳清蛋白粉、橄榄油、低聚果糖、磷脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氯钴盐、烟酰胺、D-泛酸钙、叶酸、D-生物素、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、牛磺酸、左旋肉碱、肌醇、混合生育酚浓缩物、硫酸亚铁、硫酸锌、碘酸钾、硫酸铜、硫酸镁、亚硒酸钠、硫酸镁、碳酸钙、磷酸氢钙、柠檬酸钠、氯化钾、磷酸三钙、叶黄素、核苷酸(5'-肌苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷)、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12		

产品相关信息		
生产商：北安宜品努卡乳业有限公司		
地址：黑龙江省黑河市北安市铁西区工业园区		
产地：黑龙江·黑河		
食品生产许可证编号：SC10523118150120		
产品类别及属性：乳基粉状 较大婴儿配方食品		
产品标准号：GB 10766-2021		
咨询热线：400-6869-619		
宜品网址：www.yeeperdairy.com.cn		
生产日期、批号及保质期至：见罐底		
保质期：24个月		



6 947050 505366

益臻2-820

喂养建议表			
年龄	每次喂哺量 温开水量(ml)	量勺数(平勺)	每日喂哺次数
6-8月	210	7	3-4
8-12月	240	8	3

▲ 参照此表取适量温开水和奶粉，此表是根据平均需要量而定，仅供参考；
最适宜的溶解温度是45°C~50°C；每平勺奶粉约4.5克。
100mL奶液=13.5g粉+90mL温开水



- 冲调奶粉前应使用肥皂或清水将手彻底洗干净；
- 将所有干净的喂哺器具放入清水煮沸5分钟以上；
- 参照喂哺建议表取适量刚煮沸的水，使其冷却至45°C-50°C，然后注入奶瓶中；
- 参照喂哺建议表取适量奶粉加入到奶瓶中；
- 轻轻摇晃搅拌至奶粉充分溶解；
- 冷却至适合宝宝饮用的温度即可喂哺，可以滴到手腕处测试温度。



冲调及喂养提示

- 婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。6个月龄以上婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。
- 奶粉冲调好后，应马上给宝宝喂养，喂哺剩余的奶液，请弃掉，勿留于下次食用。
- 喂哺期间要照顾好宝宝，疏于照顾会引起宝宝哽咽或其他不适。
- 宝宝两餐之间要适当补充水。

贮存说明

- 请将奶粉存放在阴凉干燥通风处，切勿放入冰箱内；
- 每次食用后，请将罐盖盖紧；
- 开罐后，建议一个月内食用完毕。

宜品®

国食注字
YP20230080

宜品益臻



2段

净含量:400克

较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段)

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2017
蛋白质	g	0.63	12.8
乳清蛋白	g	0.40	8.1
脂肪	g	1.11	22.3
亚油酸	g	0.17	3.52
α-亚麻酸	mg	18.0	364
碳水化合物	g	2.77	55.9
维生素			
维生素A	μg RE	22.4	451
维生素D	μg	0.59	11.8
维生素E	mg α-TE	0.25	5.01
维生素K ₁	μg	1.66	33.5
维生素B ₁	μg	19.3	389
维生素B ₂	μg	30.0	605
维生素B ₆	μg	13.6	275
维生素B ₁₂	μg	0.071	1.43
烟酸	μg	136	2750
叶酸	μg	3.85	77.6
泛酸	μg	123	2480
维生素C	mg	2.97	60.0
生物素	μg	0.67	13.5
胆碱	mg	6.20	125
矿物质			
钠	mg	9.32	188
钾	mg	23.1	466
镁	mg	10.4	210
铁	mg	1.83	37.0
锌	mg	0.30	6.05
锰	mg	0.15	3.06
钙	μg	3.21	64.7
磷	mg	21.3	430
碘	μg	14.7	296
氯	μg	4.51	91.0
硒	μg	15.4	310
可选择性成分			
肌醇	mg	2.31	46.5
牛磺酸	mg	1.51	30.5
左旋肉碱	mg	0.41	8.27
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.97	80.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.81	97.0
低聚半乳糖	g	0.13	2.70
低聚果糖	g	0.015	0.30
叶黄素	μg	8.68	175
核苷酸	mg	1.11	22.4
乳铁蛋白	mg	2.48	50.0

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、低聚半乳糖、脱脂乳粉、乳清蛋白粉、橄榄油、低聚果糖、磷脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸哆罗嗦、氯钴胺、烟酰胺、D-泛酸钙、叶酸、D-生物素、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、牛磺酸、左旋肉碱、肌醇、混合生育酚浓缩物、硫酸亚铁、硫酸镁、碘酸钾、硫酸铜、硫酸锰、亚硒酸钠、硫酸镁、碳酸钙、磷酸氢钙、柠檬酸钠、氯化钾、磷酸三钙、叶黄素、核苷酸(5'-肌苷酸二钠,5'-尿苷酸二钠,5'-胞苷酸二钠,5'-鸟苷酸二钠,5'-单磷酸腺苷)、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、乳铁蛋白、动物双歧杆菌
乳业种 Bb-12

配料表

生产商：北安宜品努卡乳业有限公司
地址：黑龙江省黑河市北安市铁西区工业园区
产地：黑龙江·黑河
食品生产许可证编号：SC10523118150120
产品类别及属性：乳基粉状 较大婴儿配方食品
产品标准号：GB 10766-2021
咨询热线：400-6869-619
宜品网址：www.yeeperdairy.com.cn
生产日期、批号及保质期：见罐底
保质期：24个月



6 947050 506417

益臻2-400

年龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水量(ml)	量勺数(平勺)	
12-36个月	210	7	2-3

▲ 参照此表取适量温开水和奶粉，此表是根据平均需要量而定，仅供参考；最适宜的溶解温度是45°C~50°C；每平勺奶粉约4.5克。100mL奶液=13.5g粉+90mL温开水



- 1、冲调奶粉前应使用肥皂或清水将手彻底洗干净；
- 2、将所有干净的喂哺器具放入清水煮沸 5 分钟以上；
- 3、参照喂哺建议表取适量刚煮沸的水，使其冷却至 45℃-50℃，然后注入奶杯中；
- 4、参照喂哺建议表取适量奶粉加入到奶杯中；
- 5、搅拌至奶粉充分溶解；
- 6、冷却至适合宝宝饮用的温度即可喂哺，可以滴到手腕处测试温度。

贮存说明

- 请将奶粉存放在阴凉干燥通风处，勿放入冰箱内；
 - 每次食用后，请将罐盖盖紧；
 - 开罐后，建议一个月内食用完毕。



冲调及喂养提示

- 奶粉冲调好后，应马上给宝宝喂养，喂哺剩余的奶液，请弃掉，勿留于下次食用。
 - 喂哺期间要照顾好宝宝，疏忽照顾会引起宝宝哽咽或其不适。
 - 宝宝两餐之间要适当补充水。

宜品

目
录

含核苷酸



今明碩



含左旋肉碱



宜品益臻

国食注字
YP20230081

3段

净含量:700克

幼儿配方奶粉(12-36月龄, 3段)

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	201
蛋白质	g	0.70	14.7
脂肪	g	1.09	22.1
亚油酸	g	0.12	2.3
α-亚麻酸	mg	13.1	26.3
碳水化合物	g	2.73	54.5
维生素			
维生素A	μg RE	22.3	448
维生素D	μg	0.57	11.4
维生素E	mg α-T	0.24	4.9
维生素K ₁	μg	1.65	33.0
维生素B ₁	μg	21.7	43.4
维生素B ₂	μg	29.8	60.0
维生素B ₆	μg	13.6	27.3
维生素B ₁₂	μg	0.071	1.42
烟酸	μg	136	273
叶酸	μg	3.65	73.0
泛酸	μg	118	238
维生素C	mg	2.88	58.0
生物素	μg	0.72	14.0
矿物质			
钠	mg	8.45	170
钾	mg	29.5	472
铜	μg	9.9	200
镁	mg	1.85	37.3
铁	mg	0.29	5.89
锌	mg	0.16	3.21
钙	mg	22.3	448
磷	mg	15.4	309
碘	μg	2.95	59.0
氯	mg	16.1	323
可选择性成分			
硒	μg	0.61	12.3
胆碱	mg	6.17	124
锰	μg	3.22	64.7
肌醇	mg	2.30	46.0
牛磺酸	mg	1.53	30.1
左旋肉碱	mg	0.41	8.21
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.48	70.0
二十碳四烯酸(ARA)	mg	3.98	80.0
低聚半乳糖	g	0.13	2.71
低聚果糖	g	0.015	0.31
叶黄素	μg	8.75	178
核苷酸	mg	1.10	22.0
乳铁蛋白	mg	2.49	50.0

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、脱脂奶粉、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、橄榄油、低聚果糖、磷脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氯钴胺、烟酰胺、D-泛酸钾、叶酸、D-生物素、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、牛磺酸、左旋肉碱、肌醇、混合生育酚浓缩物、硫酸亚铁、硫酸锌、碘酸钾、硫酸铜、硫酸锰、亚硒酸钠、硫酸镁、碳酸钙、磷酸氢钙、柠檬酸钠、氯化钾、磷酸三钙、叶黄素、核苷酸(5'-肌苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'单磷酸腺苷)、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳业种Bb-12。

*生牛乳加工

产品相关信息

生产商: 北安宜品努卡乳业有限公司
地址: 黑龙江省黑河市北安市铁西区工业园区
产地: 黑龙江·黑河
食品生产许可证编号: SC10523118150120
产品类别及属性: 乳基粉状 婴儿配方食品
产品标准号: GB 10767-2021
咨询热线: 400-6869-619
宜品网址: www.yeeperdairy.com.cn
生产日期、批号及保质期至: 见罐底
保质期: 24个月



© 1998 [Wiley](http://www.wiley.com)

益臻3-700

喂哺建议表			
年龄	每次喂哺量 温开水量(ml)	量勺数(平勺)	每日喂哺次数
12-36个月	210	7	2-3

▲ 参照此表取适量温开水和奶粉，此表是根据平均需要量而定，仅供参考；最适宜的溶解温度是45°C-50°C；每平勺奶粉约4.5克。100mL 奶液=13.5g粉+90mL 温开水



- 1、冲调奶粉前应使用肥皂或清水将手彻底洗干净；
- 2、将所有干净的喂哺器具放入清水煮沸5分钟以上；
- 3、参照喂哺建议表取适量刚煮沸的水，使其冷却至45°C-50°C，然后注入奶杯中；
- 4、参照喂哺建议表取适量奶粉加入到奶杯中；
- 5、搅拌至奶粉充分溶解；
- 6、冷却至适合宝宝饮用的温度即可喂哺，可以滴到手腕处测试温度。



冲调及喂养提示

- 奶粉冲调好后，应马上给宝宝喂养，喂哺剩余的奶液，请弃掉，勿留于下次食用。
- 喂哺期间要照顾好宝宝，疏于照顾会引起宝宝哽咽或其他不适。
- 宝宝两餐之间要适当补充水。

贮存说明

- 请将奶粉存放在阴凉干燥通风处，切勿放入冰箱内；
- 每次食用后，请将罐盖盖紧；
- 开罐后，建议一个月内食用完毕。

宜品®

国食注字
YP20230081

宜品益臻



3段
净含量:350克

幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段)

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2011
蛋白质	g	0.70	14.1
脂肪	g	1.09	22.0
亚油酸	g	0.12	2.33
α-亚麻酸	mg	13.1	263
碳水化合物	g	2.73	54.9
维生素			
维生素A	μg RE	22.3	448
维生素D	μg	0.57	11.5
维生素E	mg α-TE	0.24	4.91
维生素K ₁	μg	1.65	33.1
维生素B ₁	μg	21.7	436
维生素B ₂	μg	29.8	600
维生素B ₆	μg	13.6	273
维生素B ₁₂	μg	0.071	1.42
烟酸	μg	136	2739
叶酸	μg	3.65	73.5
泛酸	μg	118	2380
维生素C	mg	2.88	58.0
生物素	μg	0.72	14.5
矿物质			
钠	mg	8.45	170
钾	mg	23.5	472
铜	μg	9.9	200
镁	mg	1.85	37.3
铁	mg	0.29	5.89
锌	mg	0.16	3.25
钙	mg	22.3	448
磷	mg	15.4	309
碘	μg	2.95	59.3
氯	mg	16.1	323
可选择性成分			
硒	μg	0.61	12.3
胆碱	mg	6.17	124
锰	μg	3.22	64.7
肌醇	mg	2.30	46.3
牛磺酸	mg	1.53	30.8
左旋肉碱	mg	0.41	8.23
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.48	70.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	3.98	80.0
低聚半乳糖	g	0.13	2.70
低聚果糖	g	0.015	0.30
叶黄素	μg	8.75	176
核苷酸	mg	1.10	22.1
乳铁蛋白	mg	2.49	50.0

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、脱脂乳粉、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、橄榄油、低聚果糖、磷脂、醋酸软脂酰、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氯钴胺、烟酰胺、D-泛酸钙、叶酸、D-生物素、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、牛磺酸、左旋肉碱、肌醇、混合生育酚浓缩物、硫酸亚铁、硫酸锌、碘酸钾、硫酸铜、硫酸锰、亚硒酸钠、硫酸镁、碳酸钙、磷酸氢钙、柠檬酸钠、氯化钾、磷酸三钙、叶黄素、核苷酸(5'-肌苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷)、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12

*生乳加工

产品相关信息

生产商：北安宜品努卡乳业有限公司
地址：黑龙江省黑河市北安市铁西区工业园区
产地：黑龙江·黑河
食品生产许可证编号：SC10523118150120
产品类别及属性：乳基粉状 幼儿配方食品
产品标准号：GB 10767-2021
咨询热线：400-6869-619
宜品网址：www.yeeperdairy.com.cn
生产日期、批号及保质期至：见罐底
保质期：24个月



益臻3-350

A1-2

喂哺建议表			
年龄	每次喂哺量 温开水量(ml)	量勺数(平勺)	每日喂哺次数
12-36个月	210	7	2-3

▲ 参照此表取适量温开水和奶粉，此表是根据平均需要量而定，仅供参考；最适宜的溶解温度是45°C~50°C；每平勺奶粉约4.5克。100mL 奶液=13.5g粉+90mL 温开水



1. 冲调奶粉前应使用肥皂或清水将手彻底洗干净；
2. 将所有干净的喂哺器具放入清水煮沸5分钟以上；
3. 参照喂哺建议表取适量刚煮沸的水，使其冷却至45°C-50°C，然后注入奶杯中；
4. 参照喂哺建议表取适量奶粉加入到奶杯中；
5. 搅拌至奶粉充分溶解；
6. 冷却至适合宝宝饮用的温度即可喂哺，可以滴到手腕处测试温度。



冲调及喂养提示

- 奶粉冲调好后，应马上给宝宝喂养，喂哺剩余的奶液，请弃掉，勿留于下次食用。
- 喂哺期间要照顾好宝宝，疏于照顾会引起宝宝哽咽或其他不适。
- 宝宝两餐之间要适当补充水。

贮存说明

- 请将奶粉存放在阴凉干燥通风处，切勿放入冰箱内；
- 每次食用后，请将罐盖盖紧；
- 开罐后，建议一个月内食用完毕。

宜品®

国食注字
YP20230081

宜品益臻



3段

净含量:380克

幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段)

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2011
蛋白质	g	0.70	14.1
脂肪	g	1.09	22.0
亚油酸	g	0.12	2.33
α-亚麻酸	mg	13.1	263
碳水化合物	g	2.73	54.9
维生素			
维生素A	μg RE	22.3	448
维生素D	μg	0.57	11.5
维生素E	mg α-TE	0.24	4.91
维生素K ₁	μg	1.65	33.1
维生素B ₁	μg	21.7	436
维生素B ₂	μg	29.8	600
维生素B ₆	μg	13.6	273
维生素B ₁₂	μg	0.071	1.42
烟酸	μg	136	2739
叶酸	μg	3.65	73.5
泛酸	μg	118	2380
维生素C	mg	2.88	58.0
生物素	μg	0.72	14.5
矿物质			
钠	mg	8.45	170
钾	mg	23.5	472
铜	μg	9.9	200
镁	mg	1.85	37.3
铁	mg	0.29	5.89
锌	mg	0.16	3.25
钙	mg	22.3	448
磷	mg	15.4	309
碘	μg	2.95	59.3
氯	mg	16.1	323
可选择性成分			
硒	μg	0.61	12.3
胆碱	mg	6.17	124
锰	μg	3.22	64.7
肌醇	mg	2.30	46.3
牛磺酸	mg	1.53	30.8
左旋肉碱	mg	0.41	8.23
DHA	mg	3.48	70.0
ARA	mg	3.98	80.0
低聚半乳糖	g	0.13	2.70
低聚果糖	g	0.015	0.30
叶黄素	μg	8.75	176
核苷酸	mg	1.10	22.1
乳铁蛋白	mg	2.49	50.0

配料表			
生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、脱脂奶粉、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、橄榄油、低聚果糖、磷脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸哆罗嗦、氯钴肽、烟酰胺、D-泛酸钙、叶酸、D-生物素、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、牛磺酸、左旋肉碱、肌醇、混合生育酚浓缩物、硫酸亚铁、硫酸镁、碘酸钾、硫酸铜、硫酸锰、亚硒酸钠、硫酸镁、碳酸钙、磷酸氢钙、柠檬酸钠、氯化钾、磷酸三钙、叶黄素、核苷酸(5'-肌苷二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷)、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12			

*生牛乳加工

产品相关信息

生产商: 北安宜品努卡乳业有限公司
地址: 黑龙江省黑河市北安市铁西区工业园区
产地: 黑龙江·黑河
食品生产许可证编号: SC10523118150120
产品类别及属性: 乳基粉状 幼儿配方食品
产品标准号: GB 10767-2021
咨询热线: 400-6869-619
宜品网址: www.yeeperdairy.com.cn
生产日期、批号及保质期: 见罐底
保质期: 24个月



益臻3-380

喂哺建议表		
年龄	每次喂哺量 温开水量(ml)	每日喂哺次数 量勺数(平勺)
12-36个月	210	7 2-3

▲ 参照此表取适量温开水和奶粉，此表是根据平均需要量而定，仅供参考；
最适宜的溶解温度是45℃~50℃；每平勺奶粉约4.5克。
100mL 奶液=13.5 g 粉+90mL 温开水



- 1、冲调奶粉前应使用肥皂或清水将手彻底洗干净；
- 2、将所有干净的喂哺器具放入清水煮沸5分钟以上；
- 3、参照喂哺建议表取适量刚煮沸的水，使其冷却至45℃~50℃，然后注入奶杯中；
- 4、参照喂哺建议表取适量奶粉加入到奶杯中；
- 5、搅拌至奶粉充分溶解；
- 6、冷却至适合宝宝饮用的温度即可喂哺，可以滴到手腕处测试温度。

贮存说明

- 请将奶粉存放在阴凉干燥通风处，切勿放入冰箱内；
- 每次食用后，请将罐盖盖紧；
- 开罐后，建议一个月内食用完毕。



宜品®

宜品

宜品益臻

国食注字
YP20230081

3段
净含量:800克
幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段)

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2011
蛋白质	g	0.70	14.1
脂肪	g	1.09	22.0
亚油酸	g	0.12	2.33
α-亚麻酸	mg	13.1	263
碳水化合物	g	2.73	54.9
维生素			
维生素A	μg RE	22.3	448
维生素D	μg	0.57	11.5
维生素E	mg α-TE	0.24	4.91
维生素K ₁	μg	1.65	33.1
维生素B ₁	μg	21.7	436
维生素B ₂	μg	29.8	600
维生素B ₆	μg	13.6	273
维生素B ₁₂	μg	0.071	1.42
烟酸	μg	136	2739
叶酸	μg	3.65	73.5
泛酸	μg	118	2380
维生素C	mg	2.88	58.0
生物素	μg	0.72	14.5
矿物质			
钠	mg	8.45	170
钾	mg	23.5	472
铜	μg	9.9	200
镁	mg	1.85	37.3
铁	mg	0.29	5.89
锌	mg	0.16	3.25
钙	mg	22.3	448
磷	mg	15.4	309
碘	μg	2.95	59.3
氯	mg	16.1	323
可选择性成分			
硒	μg	0.61	12.3
胆碱	mg	6.17	124
锰	μg	3.22	64.7
肌醇	mg	2.30	46.3
牛磺酸	mg	1.53	30.8
左旋肉碱	mg	0.41	8.23
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.48	70.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	3.98	80.0
低聚半乳糖	g	0.13	2.70
低聚果糖	g	0.015	0.30
叶黄素	μg	8.75	176
核苷酸	mg	1.10	22.1
乳铁蛋白	mg	2.49	50.0

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、脱脂奶粉、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、橄榄油、低聚果糖、磷脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氯钴胺、烟酰胺、D-泛酸钙、叶酸、D-生物素、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、牛磺酸、左旋肉碱、肌醇、混合生育酚浓缩物、硫酸亚铁、硫酸锌、碘酸钾、硫酸铜、硫酸锰、亚硒酸钠、硫酸镁、碳酸钙、磷酸氢钙、柠檬酸钠、氯化钾、磷酸三钙、叶黄素、核苷酸(5'-肌苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷)、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12

*生牛乳加工

产品相关信息

生产商：北安宜品努卡乳业有限公司
地址：黑龙江省黑河市北安市铁西区工业园区
产地：黑龙江·黑河
食品生产许可证编号：SC10523118150120
产品类别及属性：乳基粉状 幼儿配方食品
产品标准号：GB 10767-2021
咨询热线：400-6869-619
宜品网址：www.yeeperdairy.com.cn
生产日期、批号及保质期至：见罐底
保质期：24个月



益臻3-800

喂哺建议表

年龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水量(ml)	量勺数(平勺)	
12-36个月	210	7	2-3

▲ 参照此表取适量温开水和奶粉，此表是根据平均需要量而定，仅供参考；最适宜的溶解温度是45°C~50°C；每平勺奶粉约4.5克。100mL奶液=13.5g粉+90mL温开水

冲调方法

1. 冲调奶粉前应使用肥皂或清水将手彻底洗干净；
2. 将所有干净的喂哺器具放入清水煮沸5分钟以上；
3. 参照喂哺建议表取适量刚煮沸的水，使其冷却至45°C~50°C，然后注入奶杯中；
4. 参照喂哺建议表取适量奶粉加入到奶杯中；
5. 搅拌至奶粉充分溶解；
6. 冷却至适合宝宝饮用的温度即可喂哺，可以滴到手腕处测试温度。

贮存说明

- 请将奶粉存放在阴凉干燥通风处，切勿放入冰箱内；
- 每次食用后，请将罐盖盖紧；
- 开罐后，建议一个月内食用完毕。

含左旋肉碱

含核苷酸

含肌醇

含胆碱

宜品®

宜品益臻

国食注字
YP20230081

3段

净含量: 820克

幼儿配方奶粉(12-36月龄, 3段)

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2011
蛋白质	g	0.70	14.1
脂肪	g	1.09	22.0
亚油酸	g	0.12	2.33
α-亚麻酸	mg	13.1	263
碳水化合物	g	2.73	54.9
维生素			
维生素A	μg RE	22.3	448
维生素D	μg	0.57	11.5
维生素E	mg α-TE	0.24	4.91
维生素K ₁	μg	1.65	33.1
维生素B ₁	μg	21.7	436
维生素B ₂	μg	29.8	600
维生素B ₆	μg	13.6	273
维生素B ₁₂	μg	0.071	1.42
烟酸	μg	136	2739
叶酸	μg	3.65	73.5
泛酸	μg	118	2380
维生素C	mg	2.88	58.0
生物素	μg	0.72	14.5
矿物质			
钠	mg	8.45	170
钾	mg	23.5	472
铜	μg	9.9	200
镁	mg	1.85	37.3
铁	mg	0.29	5.89
锌	mg	0.16	3.25
钙	mg	22.3	448
磷	mg	15.4	309
碘	μg	2.95	59.3
氯	mg	16.1	323
可选择性成分			
硒	μg	0.61	12.3
胆碱	mg	6.17	124
锰	μg	3.22	64.7
肌醇	mg	2.30	46.3
牛磺酸	mg	1.53	30.8
左旋肉碱	mg	0.41	8.23
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.48	70.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	3.98	80.0
低聚半乳糖	g	0.13	2.70
低聚果糖	g	0.015	0.30
叶黄素	μg	8.75	176
核苷酸	mg	1.10	22.1
铁蛋白	mg	2.49	50.0

配料表			
生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、脱脂奶粉、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、橄榄油、低聚果糖、磷脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物油茶皂素、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氯钴胺、烟酰胺、D-泛酸钙、叶酸、D-生物素、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、牛磺酸、左旋肉碱、肌醇、混合生育酚浓缩物、硫酸亚铁、硫酸锌、碘酸钾、硫酸铜、硫酸锰、亚硒酸钠、硫酸镁、碳酸钙、磷酸氢钙、柠檬酸钠、氯化钾、磷酸三钙、叶黄素、核苷酸(S'-肌苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷)、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳业种Bb-12			

*生牛乳加工

产品相关信息			
生产商：北安宜品努卡乳业有限公司			
地址：黑龙江省黑河市北安市铁西区工业园区			
产地：黑龙江·黑河			
食品生产许可证编号：SC10523118150120			
产品类别及属性：乳基粉状 幼儿配方食品			
产品标准号：GB 10767-2021			
咨询热线：400-6869-619			
宜品网址：www.yeeperdairy.com.cn			
生产日期、批号及保质期至：见罐底			
保质期：24个月			



益臻3-820

喂养建议表		
年龄	每次喂哺量 温开水量(ml)	每日喂哺次数 量勺数(平勺)
12-36个月	210	7 2-3

▲ 参照此表取适量温开水和奶粉，此表是根据平均需要量而定，仅供参考；最适宜的溶解温度是45°C~50°C；每平勺奶粉约4.5克。100mL 奶液=13.5g 粉+90mL 温开水



1. 冲调奶粉前应使用肥皂或清水将手彻底洗干净；
2. 将所有干净的喂哺器具放入清水煮沸5分钟以上；
3. 参照喂养建议表取适量刚煮沸的水，使其冷却至45°C-50°C，然后注入奶杯中；
4. 参照喂养建议表取适量奶粉加入到奶杯中；
5. 搅拌至奶粉充分溶解；
6. 冷却至适合宝宝饮用的温度即可喂哺，可以滴到手腕处测试温度。



冲调及喂养提示

- 奶粉冲调好后，应马上给宝宝喂养，喂哺剩余的奶液，请弃掉，勿留于下次食用。
- 喂哺期间要照顾好宝宝，疏于照顾会引起宝宝哽咽或其他不适。
- 宝宝两餐之间要适当补充水。

贮存说明

- 请将奶粉存放在阴凉干燥通风处，切勿放入冰箱内；
- 每次食用后，请将罐盖盖紧；
- 开罐后，建议一个月内食用完毕。

宜品®

国食注字
YP20230081

宜品益臻



3段

净含量:400克

幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段)

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2011
蛋白质	g	0.70	14.1
脂肪	g	1.09	22.0
亚油酸	g	0.12	2.33
α-亚麻酸	mg	13.1	263
碳水化合物	g	2.73	54.9
维生素			
维生素A	μg RE	22.3	448
维生素D	μg	0.57	11.5
维生素E	mg α-TE	0.24	4.91
维生素K ₁	μg	1.65	33.1
维生素B ₁	μg	21.7	436
维生素B ₂	μg	29.8	600
维生素B ₆	μg	13.6	273
维生素B ₁₂	μg	0.071	1.42
烟酸	μg	136	2739
叶酸	μg	3.65	73.5
泛酸	μg	118	2380
维生素C	mg	2.88	58.0
生物素	μg	0.72	14.5
矿物质			
钠	mg	8.45	170
钾	mg	23.5	472
铜	μg	9.9	200
镁	mg	1.85	37.3
铁	mg	0.29	5.89
锌	mg	0.16	3.25
钙	mg	22.3	448
磷	mg	15.4	309
碘	μg	2.95	59.3
氯	mg	16.1	323
可选择性成分			
硒	μg	0.61	12.3
胆碱	mg	6.17	124
锰	μg	3.22	64.7
肌醇	mg	2.30	46.3
牛磺酸	mg	1.53	30.8
左旋肉碱	mg	0.41	8.23
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.48	70.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	3.98	80.0
低聚半乳糖	g	0.13	2.70
低聚果糖	g	0.015	0.30
叶黄素	μg	8.75	176
核苷酸	mg	1.10	22.1
乳铁蛋白	mg	2.49	50.0

配料表			
生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、脱脂奶粉、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、橄榄油、低聚果糖、磷脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氯钴盐、烟酰胺、D-泛酸钙、叶酸、D-生物素、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、牛磺酸、左旋肉碱、肌醇、混合生育酚浓缩物、硫酸亚铁、硫酸锌、碘酸钾、硫酸铜、硫酸锰、亚硒酸钠、硫酸镁、碳酸钙、磷酸氢钙、柠檬酸钠、氯化钾、磷酸三钙、叶黄素、核苷酸(5'-肌苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷)、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12			

*牛乳加工

产品相关信息

生产商：北安宜品努卡乳业有限公司
地址：黑龙江省黑河市北安市铁西区工业园区
产地：黑龙江·黑河
食品生产许可证编号：SC10523118150120
产品类别及属性：乳基粉状 幼儿配方食品
产品标准号：GB 10767-2021

咨询热线：400-6869-619
宜品网址：www.yepperdairy.com.cn
生产日期、批号及保质期：见罐底
保质期：24个月



益臻3-400

喂哺建议表			
年龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水量(ml)	量勺数(平勺)	
0-2周	60	2	7-8
2-4周	90	3	6-7
1-2月	120	4	5-6
2-3月	150	5	5-6
3-4月	180	6	5-6
4-6月	210	7	4-5

△ 参照此表取适量温开水和奶粉，此表是根据平均需要量而定，仅供参考；
最适宜的溶解温度是45℃~50℃；每一平勺约4.35克；
100mL奶液=13.05g粉+90mL温开水。



温馨提示

- 对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品；
- 请勿擅自改变奶的浓度，浓度不恰当宝宝会得不到适当的营养；
- 冲调奶粉时，如有奶粉泡沫或挂壁均属正常现象，请放心食用；
- 奶粉冲调好后，待温度适宜时给宝宝食用，喂哺剩余的奶液请弃掉，勿留于下次食用；
- 宝宝在两餐之间要适当补充水。

贮存说明

- 本品应存放在阴凉干燥通风处。
- 奶粉开罐后请务必盖严，切记！请勿放入冰箱内保存。
- 开罐后请在一个月内食用完。

宜品®

宜品

婴儿配方羊奶粉 (0-6月龄, 1段)

1 段

净含量: 100克
国食注字YP20230334



营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2110
蛋白质	g	0.51	10.8
乳清蛋白	g	0.41	8.6
脂肪	g	1.26	26.5
亚油酸	g	0.20	4.22
α-亚麻酸	mg	18.2	385
碳水化合物	g	2.57	54.2
维生素			
维生素A	μg RE	17.4	367
维生素D	μg	0.60	12.6
维生素E	mg α-TE	0.23	4.82
维生素K ₁	μg	1.45	30.6
维生素B ₁	μg	17.6	372
维生素B ₂	μg	23.8	503
维生素B ₆	μg	10.5	221
维生素B ₁₂	μg	0.058	1.22
烟酸	μg	138	2910
叶酸	μg	3.61	76.1
泛酸	μg	134	2836
维生素C	mg	2.99	63.0
生物素	μg	0.53	11.2
胆碱	mg	6.26	132
矿物质			
钠	mg	8.77	185
钾	mg	22.1	467
铜	μg	17.8	375
镁	mg	1.49	31.5
铁	mg	0.15	3.26
锌	mg	0.15	3.25
锰	μg	2.05	43.2
钙	mg	17.8	375
磷	mg	10.5	221
碘	μg	4.48	94.5
氯	mg	17.4	368
硒	μg	0.96	20.3
可选择成分			
左旋肉碱	mg	0.46	9.78
二十二碳六烯酸	mg	4.29	90.6
二十碳四烯酸	mg	4.98	105
低聚半乳糖	g	0.13	2.70
低聚果糖	g	0.014	0.30
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.19	4.00

脱盐乳清粉(来源绵羊乳)、全脂绵羊乳粉、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、低聚半乳糖、橄榄油、奶油、低聚果糖、磷脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、混合生育酚浓缩物、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氯钴胺、烟酰胺、D-泛酸钙、叶酸、D-生物素、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、左旋肉碱、硫酸亚铁、硫酸锌、碘酸钾、硫酸铜、硫酸镁、亚硒酸钠、硫酸镁、碳酸钙、磷酸氢钙、柠檬酸钠、柠檬酸钾、氯化钾、磷酸三钙、二十二碳六烯酸、花生四烯酸、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12

产品信息

生产商:黑龙江欧贝嘉营养食品有限公司(C)
地址:黑龙江省伊春市铁力市西河生态工业园区
产地:黑龙江·伊春
食品生产许可证编号:SC10523078101249
生产商:北安宜品努卡乳业有限公司(A)
地址:黑龙江省黑河市北安市铁西区工业园区
产地:黑龙江·黑河
食品生产许可证编号:SC10523118150120
生产商:宜品(青岛)羊乳制品有限公司(F)
地址:山东省青岛市莱西市沽河街道办事处龙口西路300号
产地:山东·青岛
食品生产许可证编号:SC10537028502446
产品类别及属性:乳基粉状 婴儿配方食品
产品标准号: GB 10765-2021
保质期:18个月
生产日期、批号及保质期至:见罐底
(具体生产商/产地见生产日期末端代码)
咨询热线:400-6966-128



宜品1-1

喂哺建议表			
年龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水量(ml)	量勺数(平勺)	
0-2周	60	2	7-8
2-4周	90	3	6-7
1-2月	120	4	5-6
2-3月	150	5	5-6
3-4月	180	6	5-6
4-6月	210	7	4-5

△ 参照此表取适量温开水和奶粉，此表是根据平均需要量而定，仅供参考；
最适宜的溶解温度是45°C~50°C；每一平勺约4.35克；
100mL奶液=13.05g粉+90mL温开水。



宜品®

宜品

婴儿配方羊奶粉 (0-6月龄, 1段)

1 段

净含量: 300克
国食注字YP20230334

- 1. 消毒：将奶瓶和奶嘴放入沸水中煮5分钟进行消毒；
- 2. 将水注入奶瓶：饮用水煮沸后，冷却至45°C~50°C，参照喂哺建议表，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中；
- 3. 将奶粉加入奶瓶：参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中；
- 4. 摆晃奶瓶：盖紧奶瓶，并摇动奶瓶直至奶粉充分溶解；
- 5. 测温：喂哺前，请将奶液滴在手腕内侧检测温度是否适合宝宝食用；
- 6. 清洗：喂哺后剩余奶液请丢弃，清洗奶瓶和奶嘴。

贮存说明

- 本品应存放在阴凉干燥通风处。
- 奶粉开罐后请务必盖严，切记！请勿放入冰箱内保存。
- 开罐后请在一个月内食用完。



营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2110
蛋白质	g	0.51	10.8
乳清蛋白	g	0.41	8.6
脂肪	g	1.26	26.5
亚油酸	g	0.20	4.22
α-亚麻酸	mg	18.2	385
碳水化合物	g	2.57	54.2
维生素			
维生素A	μg RE	17.4	367
维生素D	μg	0.60	12.6
维生素E	mg α-TE	0.23	4.82
维生素K ₁	μg	1.45	30.6
维生素B ₁	μg	17.6	372
维生素B ₂	μg	23.8	503
维生素B ₆	μg	10.5	221
维生素B ₁₂	μg	0.058	1.22
烟酸	μg	138	2910
叶酸	μg	3.61	76.1
泛酸	μg	134	2836
维生素C	mg	2.99	63.0
生物素	μg	0.53	11.2
胆碱	mg	6.26	132
矿物质			
钠	mg	8.77	185
钾	mg	22.1	467
铜	μg	17.8	375
镁	mg	1.49	31.5
铁	mg	0.15	3.26
锌	mg	0.15	3.25
锰	μg	2.05	43.2
钙	mg	17.8	375
磷	mg	10.5	221
碘	μg	4.48	94.5
氯	mg	17.4	368
硒	μg	0.96	20.3
可选择成分			
左旋肉碱	mg	0.46	9.78
二十二碳六烯酸	mg	4.29	90.6
二十碳四烯酸	mg	4.98	105
低聚半乳糖	g	0.13	2.70
低聚果糖	g	0.014	0.30
1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯	g	0.19	4.00

配料表

脱盐乳清粉(来源绵羊乳)、全脂绵羊乳粉、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、低聚半乳糖、橄榄油、奶油、低聚果糖、磷脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、混合生育酚浓缩物、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、D-泛酸钙、叶酸、D-生物素、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、左旋肉碱、硫酸亚铁、硫酸锌、碘酸钾、硫酸铜、硫酸镁、亚硒酸钠、硫酸镁、磷酸钙、磷酸氢钙、柠檬酸钠、柠檬酸钾、氯化钾、磷酸三钙、二十二碳六烯酸、花生四烯酸、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12

产品信息

生产商:黑龙江欧贝嘉营养食品有限公司(C)
地址:黑龙江省伊春市铁力市西河生态工业园区
产地:黑龙江·伊春
食品生产许可证编号:SC10523078101249
生产商:北安宜品努卡乳业有限公司(A)
地址:黑龙江省黑河市北安市铁西区工业园区
产地:黑龙江·黑河
食品生产许可证编号:SC10523118150120
生产商:宜品(青岛)羊乳制品有限公司(F)
地址:山东省青岛市莱西市沽河街道办事处龙口西路300号
产地:山东·青岛
食品生产许可证编号:SC10537028502446
产品类别及属性:乳基粉状 婴儿配方食品
产品标准号:GB 10765-2021
保质期:24个月
生产日期、批号及保质期至:见罐底
(具体生产商/产地见生产日期末端代码)
咨询热线:400-6966-128



6 947213 582265 >

宜品1-3

喂哺建议表		
年龄	每次喂哺量	每日喂哺次数
	温开水量(ml)	量勺数(平勺)
0-2周	60	2
2-4周	90	3
1-2月	120	4
2-3月	150	5
3-4月	180	6
4-6月	210	7

△ 参照此表取适量温开水和奶粉，此表是根据平均需要量而定，仅供参考；
最适宜的溶解温度是45°C~50°C；每一平勺约4.35克；
100mL奶液=13.05g粉+90mL温开水。



- 消毒：将奶瓶和奶嘴放入沸水中煮 5 分钟进行消毒；
- 将水注入奶瓶：饮用水煮沸后，冷却至 45°C~50°C，参照喂哺建议表，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中；
- 将奶粉加入奶瓶：参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中；
- 摇晃奶瓶：盖紧奶瓶，并摇动奶瓶直至奶粉充分溶解；
- 测温：喂哺前，请将奶液滴在手腕内侧检测温度是否适合宝宝食用；
- 清洗：喂哺后剩余奶液请丢弃，清洗奶瓶和奶嘴。

贮存说明

- 本品应存放在阴凉干燥通风处。
- 奶粉开罐后请务必盖严，切记！请勿放入冰箱内保存。
- 开罐后请在一个月内食用完。



宜品®

宜品 婴儿配方羊奶粉 (0-6月龄, 1段)

1 段

净含量: 800克
国食注字YP20230334



营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2110
蛋白质	g	0.51	10.8
乳清蛋白	g	0.41	8.6
脂肪	g	1.26	26.5
亚油酸	g	0.20	4.22
α-亚麻酸	mg	18.2	385
碳水化合物	g	2.57	54.2
维生素			
维生素A	μg RE	17.4	367
维生素D	μg	0.60	12.6
维生素E	mg α-TE	0.23	4.82
维生素K ₁	μg	1.45	30.6
维生素B ₁	μg	17.6	372
维生素B ₂	μg	23.8	503
维生素B ₆	μg	10.5	221
维生素B ₁₂	μg	0.058	1.22
烟酸	μg	138	2910
叶酸	μg	3.61	76.1
泛酸	μg	134	2836
维生素C	mg	2.99	63.0
生物素	μg	0.53	11.2
胆碱	mg	6.26	132
矿物质			
钠	mg	8.77	185
钾	mg	22.1	467
铜	μg	17.8	375
镁	mg	1.49	31.5
铁	mg	0.15	3.26
锌	mg	0.15	3.25
锰	μg	2.05	43.2
钙	mg	17.8	375
磷	mg	10.5	221
碘	μg	4.48	94.5
氯	mg	17.4	368
硒	μg	0.96	20.3
可选择成分			
左旋肉碱	mg	0.46	9.78
二十二碳六烯酸	mg	4.29	90.6
二十碳四烯酸	mg	4.98	105
低聚半乳糖	g	0.13	2.70
低聚果糖	g	0.014	0.30
1,3-二油酰-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.19	4.00


配料表			
脱盐乳清粉（来源绵羊乳）、全脂绵羊乳粉、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、低聚半乳糖、橄榄油、奶油、低聚果糖、磷脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、混合生育酚浓缩物、植物甲萘醌、盐酸硫酸素、核黄素、盐酸吡哆醇、氯钴胺、烟酰胺、D-泛酸钙、叶酸、D-生物素、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、左旋肉碱、硫酸亚铁、硫酸锌、磷酸钾、硫酸铜、硫酸锰、亚硒酸钠、硫酸镁、碳酸钙、磷酸氢钙、柠檬酸钠、柠檬酸钾、氯化钾、磷酸三钙、二十二碳六烯酸、花生四烯酸、动物双歧杆菌乳亚种 Bb 12			

产品信息			
生产商:黑龙江欧贝嘉营养食品有限公司(C)	地址:黑龙江省伊春市铁力市西河生态工业园区	产地:黑龙江·伊春	食品生产许可证编号:SC10523078101249
生产商:北京宜品努卡乳业有限公司(A)	地址:黑龙江省黑河市北安市铁西区工业园区	产地:黑龙江·黑河	食品生产许可证编号:SC10523118150120
生产商:宜品(青岛)羊乳制品有限公司(F)	地址:山东省青岛市莱西市沽河街道办事处龙口西路300号	产地:山东·青岛	食品生产许可证编号:SC10537028502446
产品类别及属性:乳基粉状 婴儿配方食品	产品标准号:GB 10765-2021	保质期:24个月	生产日期、批号及保质期至:见罐底 (具体生产商/产地见生产日期末端代码)
			咨询热线:400-6966-128



宜品1-8

A1-4



1. 消毒：将奶瓶和奶嘴放入沸水中煮 5 分钟进行消毒；
2. 将水注入奶瓶：饮用水煮沸后，冷却至 45°C~50°C；最适宜的溶解温度是 45°C~50°C；每—平勺约 4.5 克；100mL 奶液 = 13.5g 粉 + 90mL 温开水。
3. 将奶粉加入奶瓶：参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中；
4. 摆晃奶瓶：盖紧奶瓶，并摇动奶瓶直至奶粉充分溶解；
5. 测温：喂哺前，请将奶液滴在手腕内侧检测温度是否适合宝宝食用；
6. 清洗：喂哺后剩余奶液请丢弃，清洗奶瓶和奶嘴。

贮存说明
· 本品应存放在阴凉干燥通风处。
· 奶粉开罐后请务必盖严，切记！请勿放入冰箱内保存。
· 开罐后请在一个月内食用完。



年龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水量(ml)	量勺数(平勺)	
6-8月	210	7	3-4
8-12月	240	8	3

△ 参照此表取适量温开水和奶粉，此表是根据平均需要量而定，仅供参考；最适宜的溶解温度是 45°C~50°C；每—平勺约 4.5 克；100mL 奶液 = 13.5g 粉 + 90mL 温开水。

温馨提示

- 母乳喂养是较好的喂养方式，在母乳不足或无母乳时可食用本产品，较大婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品；
- 请勿擅自改变奶的浓度，浓度不恰当宝宝会得不到适当的营养；
- 冲调奶粉时，如有奶粉泡沫或挂壁均属正常现象，请放心食用；
- 奶粉冲调好后，待温度适宜时给宝宝食用，喂哺剩余的奶粉请弃掉，勿留于下次食用；
- 宝宝在两餐之间要适当补充水。

宜品®

宜品 较大婴儿配方羊奶粉 (6-12月龄, 2段)



营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2001
蛋白质	g	0.62	12.5
脂肪	g	1.07	21.5
亚油酸	g	0.17	3.32
α-亚麻酸	mg	16.0	320
碳水化合物	g	2.85	57.0
维生素			
维生素A	μg RE	22.6	453
维生素D	μg	0.59	11.9
维生素E	mg α-TE	0.22	4.35
维生素K ₁	μg	1.43	28.6
维生素B ₁	μg	18.3	366
维生素B ₂	μg	31.5	630
维生素B ₆	μg	13.7	275
维生素B ₁₂	μg	0.061	1.23
烟酸	μg	137	2750
叶酸	μg	3.01	60.2
泛酸	μg	120	2402
维生素C	mg	3.77	75.5
生物素	μg	0.51	10.3
胆碱	mg	6.05	121
矿物质			
钠	mg	6.90	138
钾	mg	23.2	465
铜	μg	11.1	223
镁	mg	1.51	30.2
铁	mg	0.30	6.02
锌	mg	0.16	3.11
锰	μg	1.99	39.8
钙	mg	21.4	429
磷	mg	12.8	256
碘	μg	4.51	90.2
氯	mg	18.0	360
硒	μg	0.67	13.5
可选择成分			
左旋肉碱	mg	0.57	11.5
二十二碳六烯酸	mg	4.42	88.5
二十碳四烯酸	mg	5.30	106
低聚半乳糖	g	0.13	2.70
低聚果糖	g	0.015	0.30
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3.00

脱盐乳清粉（来源绵羊乳）、全脂绵羊乳粉、脱脂绵羊乳粉、低聚半乳糖、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、奶油、橄榄油、低聚果糖、磷脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、混合生育酚浓缩物、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、D-泛酸钙、叶酸、D-生物素、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、左旋肉碱、硫酸亚铁、硫酸锌、碘酸钾、硫酸铜、硫酸镁、亚硒酸钠、硫酸镁、碳酸钙、磷酸氢钙、柠檬酸钠、柠檬酸钾、氯化钾、磷酸三钙、二十二碳六烯酸、花生四烯酸、动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12


产品信息
生产商: 黑龙江欧贝嘉营养食品有限公司(C)
地址: 黑龙江省伊春市铁力市西河生态工业园区
产地: 黑龙江·伊春
食品生产许可证编号: SC10523078101249
生产商: 北安宜品努卡乳业有限公司(A)
地址: 黑龙江省黑河市北安市铁西区工业园区
产地: 黑龙江·黑河
食品生产许可证编号: SC10523118150120
生产商: 宜品(青岛)羊乳制品有限公司(F)
地址: 山东省青岛市莱西市沽河街道办事处龙口西路 300 号
产地: 山东·青岛
食品生产许可证编号: SC10537028502446
产品类别及属性: 乳基粉状 较大婴儿配方食品
产品标准号: GB 10766-2021
保质期: 24 个月
生产日期、批号及保质期至: 见罐底
(具体生产商/产地见生产日期末端代码)
咨询热线: 400-6966-128



宜品2-3



- 消毒：将奶瓶和奶嘴放入沸水中煮 5 分钟进行消毒；
- 将水注入奶瓶：饮用水煮沸后，冷却至 45°C~50°C，参照喂哺建议表，将适量的水倒入消过毒的奶瓶中；
- 将奶粉加入奶瓶：参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中；
- 摇晃奶瓶：盖紧奶瓶，并摇动奶瓶直至奶粉充分溶解；
- 测温：喂哺前，请将奶液滴在手腕内侧检测温度是否适合宝宝食用；
- 清洗：喂哺后剩余奶液请丢弃，清洗奶瓶和奶嘴。



年龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水量(ml)	量勺数(平勺)	
6-8月	210	7	3-4
8-12月	240	8	3

△ 参照此表取适量温开水和奶粉，此表是根据平均需要量而定，仅供参考；最适宜的溶解温度是 45°C~50°C；每一平勺约 4.5 克；100mL 奶液 = 13.5g 粉 + 90mL 温开水。

温馨提示

- 母乳喂养是较好的喂养方式，在母乳不足或无母乳时可食用本产品，较大婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品；
- 请勿擅自改变奶的浓度，浓度不恰当宝宝会得不到适当的营养；
- 冲调奶粉时，如有奶粉泡沫或挂壁均属正常现象，请放心食用；
- 奶粉冲调好后，待温度适宜时给宝宝食用，喂哺剩余的奶液请丢弃，勿留于下次食用；
- 宝宝在两餐之间要适当补充水。

宜品®

宜品 较大婴儿配方羊奶粉 (6-12月龄, 2段)



2 段

净含量: 800克
国食注字YP20230335

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2001
蛋白质	g	0.62	12.5
脂肪	g	1.07	21.5
亚油酸	g	0.17	3.32
α-亚麻酸	mg	16.0	320
碳水化合物	g	2.85	57.0
维生素			
维生素A	μg RE	22.6	453
维生素D	μg	0.59	11.9
维生素E	mg α-TE	0.22	4.35
维生素K ₁	μg	1.43	28.6
维生素B ₁	μg	18.3	366
维生素B ₂	μg	31.5	630
维生素B ₆	μg	13.7	275
维生素B ₁₂	μg	0.061	1.23
烟酸	μg	137	2750
叶酸	μg	3.01	60.2
泛酸	μg	120	2402
维生素C	mg	3.77	75.5
生物素	μg	0.51	10.3
胆碱	mg	6.05	121
矿物质			
钠	mg	6.90	138
钾	mg	23.2	465
铜	μg	11.1	223
镁	mg	1.51	30.2
铁	mg	0.30	6.02
锌	mg	0.16	3.11
锰	μg	1.99	39.8
钙	mg	21.4	429
磷	mg	12.8	256
碘	μg	4.51	90.2
氯	mg	18.0	360
硒	μg	0.67	13.5
可选择成分			
左旋肉碱	mg	0.57	11.5
二十二碳六烯酸	mg	4.42	88.5
二十碳五烯酸	mg	5.30	106
低聚半乳糖	g	0.13	2.70
低聚果糖	g	0.015	0.30
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3.00

配料表

脱盐乳清粉（来源绵羊乳）、全脂绵羊乳粉、脱脂绵羊乳粉、低聚半乳糖、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、奶油、橄榄油、低聚果糖、磷脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、混合生育酚浓缩物、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、D-泛酸钙、叶酸、D-生物素、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、左旋肉碱、硫酸亚铁、硫酸锌、碘酸钾、硫酸铜、硫酸锰、亚硒酸钠、硫酸镁、碳酸钙、磷酸氢钙、柠檬酸钠、柠檬酸钾、氯化钾、磷酸三钙、二十二碳六烯酸、花生四烯酸、动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12


产品信息

生产商:黑龙江欧贝嘉营养食品有限公司(C)
地址:黑龙江省伊春市铁力市西河生态工业园区
产地:黑龙江·伊春
食品生产许可证编号:SC10523078101249
生产商:北安宜品努卡乳业有限公司(A)
地址:黑龙江省黑河市北安市铁西区工业园区
产地:黑龙江·黑河
食品生产许可证编号:SC10523118150120
生产商:宜品(青岛)羊乳制品有限公司(F)
地址:山东省青岛市莱西市沽河街道办事处龙口西路300号
产地:山东·青岛
食品生产许可证编号:SC10537028502446
产品类别及属性:乳基粉状 较大婴儿配方食品
产品标准号:GB 10766-2021
保质期:24个月
生产日期、批号及保质期至:见罐底
(具体生产商/产地见生产日期末端代码)
咨询热线:400-6966-128




6 947213 582883 >

宜品2-8



1. 消毒：将喂哺器具放入沸水中煮 5 分钟进行消毒；
2. 冷却沸水：饮用水煮沸后，冷却至 45°C~50°C，参照
喂哺建议表，在奶杯中加入适量的水；
3. 加入奶粉：参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶
粉量加入奶杯中；
4. 搅拌：将奶粉搅拌至充分溶解；
5. 测温：当奶液温度适宜时即可进行喂哺；
6. 清洗：喂哺后剩余奶液请丢弃，清洗喂哺器具。




· 本品应存放在阴凉干燥通风处。
· 奶粉开罐后请务必盖严，切记！请勿放入冰箱内保存。
· 开罐后请在一个月内食用完。



年龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水量(ml)	量勺数(平勺)	
12-36月	210	7	2-3

△ 参照此表取适量温开水和奶粉，此表是根据平均需要量而定，仅供参考；
最适宜的溶解温度是 45°C~50°C；每一平勺约 4.5 克；
100mL 奶液 =13.5g 粉+90mL 温开水。



- 母乳喂养是最好的喂养方式，在母乳不足或无母乳时可食用本产品；
- 请勿擅自改变奶的浓度，浓度不恰当宝宝会得不到适当的营养；
- 冲调奶粉时，如有奶粉泡沫或挂壁均属正常现象，请放心食用；
- 奶粉冲调好后，待温度适宜时给宝宝食用，喂哺剩余的奶液请丢弃，勿留于下次食用；
- 宝宝在两餐之间要适当补充水。

宜品®

宜品 幼儿配方羊奶粉 (12-36月龄, 3段)



净含量: 300克
国食注字YP20230336

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2001
蛋白质	g	0.71	14.2
脂肪	g	1.07	21.5
亚油酸	g	0.16	3.20
α-亚麻酸	mg	15.4	308
碳水化合物	g	2.76	55.3
维生素			
维生素A	μg RE	22.5	451
维生素D	μg	0.60	12.1
维生素E	mg α-TE	0.23	4.56
维生素K ₁	μg	1.29	25.8
维生素B ₁	μg	17.6	353
维生素B ₂	μg	30.2	605
维生素B ₆	μg	13.7	275
维生素B ₁₂	μg	0.067	1.35
烟酸	μg	138	2770
叶酸	μg	3.13	62.6
泛酸	μg	123	2468
维生素C	mg	3.40	68.0
生物素	μg	0.52	10.5
矿物质			
钠	mg	7.65	153
钾	mg	23.2	465
铜	μg	9.4	189
镁	mg	1.81	36.2
铁	mg	0.30	6.03
锌	mg	0.15	3.02
钙	mg	21.9	439
磷	mg	14.2	285
碘	μg	3.41	68.2
氯	mg	17.9	358
可选择成分			
硒	μg	0.60	12.1
胆碱	mg	6.10	122
锰	μg	1.81	36.2
左旋肉碱	mg	0.52	10.5
二十二碳六烯酸	mg	3.90	78.0
二十碳四烯酸	mg	4.25	85.0
低聚半乳糖	g	0.13	2.70
低聚果糖	g	0.015	0.30
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3.00

配料表			
脱盐乳清粉（来源绵羊乳）、脱脂绵羊乳粉、全脂绵羊乳粉、低聚半乳糖、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、奶油、橄榄油、低聚果糖、磷脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、混合生育酚浓缩物、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氟钴胺、烟酰胺、D-泛酸钙、叶酸、D-生物素、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、左旋肉碱、硫酸亚铁、硫酸锌、碘酸钾、硫酸铜、硫酸镁、亚硒酸钠、碳酸钙、磷酸氢钙、柠檬酸钾、柠檬酸钠、氯化钾、磷酸三钙、二十二碳六烯酸、花生四烯酸、动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12			

产品信息			
生产商:黑龙江欧贝嘉营养食品有限公司(C)	地址:黑龙江省伊春市铁力市西河生态工业园区	产地:黑龙江·伊春	食品生产许可证编号:SC10523078101249
生产商:北安宜品努卡乳业有限公司(A)	地址:黑龙江省黑河市北安市铁西区工业园区	产地:黑龙江·黑河	食品生产许可证编号:SC10523118150120
生产商:宜品(青岛)羊乳制品有限公司(F)	地址:山东省青岛市莱西市沽河街道办事处龙口西路300号	产地:山东·青岛	食品生产许可证编号:SC10537028502446
产品类别及属性:乳基粉状 幼儿配方食品	产品标准号: GB 10767-2021	保质期:24个月	生产日期、批号及保质期至:见罐底 (具体生产商/产地见生产日期末端代码) 咨询热线:400-6966-128



6 947213 582241 >

宜品3-3



1. 消毒：将喂哺器具放入沸水中煮 5 分钟进行消毒；
2. 冷却沸水：饮用水煮沸后，冷却至 45°C~50°C，参照
喂哺建议表，在奶杯中加入适量的水；
3. 加入奶粉：参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶
粉量加入奶杯中；
4. 搅拌：将奶粉搅拌至充分溶解；
5. 测温：当奶液温度适宜时即可进行喂哺；
6. 清洗：喂哺后剩余奶液请丢弃，清洗喂哺器具。

贮存说明

- 本品应放在阴凉干燥通风处。
- 奶粉开罐后请务必盖严，切记！请勿放入冰箱内保存。
- 开罐后请在一个月内食用完。



喂哺建议表			
年龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水量(ml)	量勺数(平勺)	
12-36月	210	7	2-3

△ 参照此表取适量温开水和奶粉，此表是根据平均需要量而定，仅供参考；
最适宜的溶解温度是 45°C~50°C；每一平勺约 4.5 克；
100mL 奶液 =13.5g 粉+90mL 温开水。

温馨提示

- 母乳喂养是较好的喂养方式，在母乳不足或无母乳时可食用本产品；
- 请勿擅自改变奶的浓度，浓度不恰当宝宝会得不到适当的营养；
- 冲调奶粉时，如有奶粉泡沫或挂壁均属正常现象，请放心食用；
- 奶粉冲调好后，待温度适宜时给宝宝食用，喂哺剩余的奶液请弃掉，勿留于下次食用；
- 宝宝在两餐之间要适当补充水。

宜品®

宜品

幼儿配方羊奶粉 (12-36月龄, 3段)

3 段

净含量: 800克
国食注字YP20230336



营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2001
蛋白质	g	0.71	14.2
脂肪	g	1.07	21.5
亚油酸	g	0.16	3.20
α-亚麻酸	mg	15.4	308
碳水化合物	g	2.76	55.3
维生素			
维生素A	μg RE	22.5	451
维生素D	μg	0.60	12.1
维生素E	mg α-TE	0.23	4.56
维生素K ₁	μg	1.29	25.8
维生素B ₁	μg	17.6	353
维生素B ₂	μg	30.2	605
维生素B ₆	μg	13.7	275
维生素B ₁₂	μg	0.067	1.35
烟酸	μg	138	2770
叶酸	μg	3.13	62.6
泛酸	μg	123	2468
维生素C	mg	3.40	68.0
生物素	μg	0.52	10.5
矿物质			
钠	mg	7.65	153
钾	mg	23.2	465
铜	μg	9.4	189
镁	mg	1.81	36.2
铁	mg	0.30	6.03
锌	mg	0.15	3.02
钙	mg	21.9	439
磷	mg	14.2	285
碘	μg	3.41	68.2
氯	mg	17.9	358
可选择成分			
硒	μg	0.60	12.1
胆碱	mg	6.10	122
锰	μg	1.81	36.2
左旋肉碱	mg	0.52	10.5
二十二碳六烯酸	mg	3.90	78.0
二十碳四烯酸	mg	4.25	85.0
低聚半乳糖	g	0.13	2.70
低聚果糖	g	0.015	0.30
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3.00

脱盐乳清粉（来源绵羊乳）、脱脂绵羊乳粉、全脂绵羊乳粉、低聚半乳糖、1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、奶油、橄榄油、低聚果糖、磷脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、混合生育酚浓缩物、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氯钴胺、烟酰胺、D-泛酸钙、叶酸、D-生物素、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、左旋肉碱、硫酸亚铁、硫酸锌、碘酸钾、硫酸铜、硫酸镁、亚硒酸钠、碳酸钙、磷酸氢钙、柠檬酸钾、柠檬酸钠、氯化钾、磷酸三钙、二十二碳六烯酸、花生四烯酸、动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12

产品信息

生产商:黑龙江欧贝嘉营养食品有限公司(C)
地址:黑龙江省伊春市铁力市西河生态工业园区
产地:黑龙江·伊春
食品生产许可证编号:SC10523078101249
生产商:北安宜品努卡乳业有限公司(A)
地址:黑龙江省黑河市北安市铁西区工业园区
产地:黑龙江·黑河
食品生产许可证编号:SC10523118150120
生产商:宜品(青岛)羊乳制品有限公司(F)
地址:山东省青岛市莱西市沽河街道办事处龙口西路300号
产地:山东·青岛
食品生产许可证编号:SC10537028502446
产品类别及属性:乳基粉状婴幼儿配方食品
产品标准号:GB 10767-2021
保质期:24个月
生产日期、批号及保质期至:见罐底
(具体生产商/产地见生产日期末端代码)
咨询热线:400-6966-128



宜品3-8

A1-4

喂哺建议表			
年龄	每次喂哺量 温开水量(ml)	量勺数(平勺)	每日喂哺次数
0-2周	60	2	7-8
2-4周	90	3	6-7
1-2月	120	4	5-6
2-3月	150	5	5-6
3-4月	180	6	5-6
4-6月	210	7	4-5

△ 参照此表取适量温开水和奶粉，此表是根据平均需要量而定，仅供参考；
最适宜的溶解温度是45°C~50°C；每一平勺约4.35克；
100mL奶液=13.05g+90mL温开水。



1. 消毒：将奶瓶和奶嘴放入沸水中煮5分钟进行消毒；
2. 将水注入奶瓶：饮用水煮沸后，冷却至45°C~50°C，参照喂哺建议表，将适量的水倒入消过毒的奶瓶中；
3. 将奶粉加入奶瓶：参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中；
4. 摆晃奶瓶：盖紧奶瓶，并摇动奶瓶直至奶粉充分溶解；
5. 测温：喂哺前，请将奶液滴在手腕内侧检测温度是否适合宝宝食用；
6. 清洗：喂哺后剩余奶液请丢弃，清洗奶瓶和奶嘴。

贮存说明

- 本品应存放在阴凉干燥通风处。
- 奶粉开罐后请务必盖严，切记！请勿放入冰箱内保存。
- 开罐后请在一个月内食用完。

宜品®

国食注字
YP20230373

欧士达

婴儿配方羊奶粉 (0-6月龄, 1段)



1段

净含量: 800克

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2104
蛋白质	g	0.51	10.8
乳清蛋白	g	0.41	8.6
脂肪	g	1.25	26.2
亚油酸	g	0.20	4.16
α-亚麻酸	mg	20.2	425
碳水化合物	g	2.59	54.5

维生素A	μg RE	17.5	368
维生素D	μg	0.60	12.6
维生素E	mg α-TE	0.23	4.86
维生素K	μg	1.22	25.7
维生素B ₁	μg	17.4	367
维生素B ₂	μg	23.7	498
维生素B ₆	μg	10.7	225
维生素B ₁₂	μg	0.050	1.06
烟酸	μg	138	2910
叶酸	μg	3.62	76.1
泛酸	μg	121	2536
维生素C	mg	3.08	64.7
生物素	μg	0.51	10.7
胆碱	mg	5.99	126


矿物质	mg	8.70	183
钠	mg	21.8	459
钾	μg	18.0	378
镁	mg	1.45	30.6
铁	mg	0.14	2.98
锌	mg	0.15	3.15
锰	μg	1.85	38.9
钙	mg	17.1	360
磷	mg	10.5	220
碘	μg	4.49	94.5
氯	mg	15.2	320
硒	μg	0.90	19.0

可选择成分	mg	1.80	37.8
肌醇	mg	0.38	7.90
左旋肉碱	mg	4.49	94.5
二十二碳六烯酸	mg	4.99	105
二十碳四烯酸	mg	0.13	2.70
低聚半乳糖	g	0.014	0.30
低聚果糖	g	3.38	71.2
叶黄素	μg	1.05	22.1
核苷酸	mg	2.38	50.0
乳铁蛋白	mg		

脱盐乳清粉（来源绵羊乳）、食用植物调和油（玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油）、全脂绵羊乳粉、低聚半乳糖、橄榄油、奶油、低聚果糖、磷脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、混合生育酚浓缩物、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、D-泛酸钙、叶酸、D-生物素、氯化胆碱、左旋肉碱、肌醇、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸钾、硫酸镁、亚硒酸钠、硫酸镁、碳酸钙、磷酸氢钙、柠檬酸钠、柠檬酸钾、氯化钾、L-抗坏血酸钠、磷酸三钙、叶黄素、核苷酸（5'-肌苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷）、乳铁蛋白、二十二碳六烯酸、花生四烯酸、动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12

产品信息

生产商: 黑龙江欧贝嘉营养食品有限公司(C)
地址: 黑龙江省伊春市铁力市西河生态工业园区
产地: 黑龙江·伊春
食品生产许可证编号: SC10523078101249
生产商: 北安宜品努卡乳业有限公司(A)
地址: 黑龙江省黑河市北安市铁西区工业园区
产地: 黑龙江·黑河
食品生产许可证编号: SC10523118150120
生产商: 宜品(青岛)羊乳制品有限公司(F)
地址: 山东省青岛市莱西市沽河街道办事处龙口西路300号
产地: 山东·青岛
食品生产许可证编号: SC10537028502446
产品类别及属性: 乳基粉状 婴儿配方食品
产品标准号: GB 10765-2021
保质期: 24个月
生产日期、批号及保质期至: 见罐底
(具体生产商/产地见生产日期末端代码)
咨询热线: 400-6966-128



欧士达1-8

喂哺建议表			
年龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水量(mL)	量勺数(平勺)	
0-2周	60	2	7-8
2-4周	90	3	6-7
1-2月	120	4	5-6
2-3月	150	5	5-6
3-4月	180	6	5-6
4-6月	210	7	4-5

△ 参照此表取适量温开水和奶粉，此表是根据平均需要量而定，仅供参考；
最适宜的溶解温度是45°C~50°C；每一平勺约4.35克；
100mL奶液=13.05g粉+90mL温开水。



- 消毒：将奶瓶和奶嘴放入沸水中煮5分钟进行消毒；
- 将水注入奶瓶：饮用水煮沸后，冷却至45°C~50°C，参照喂哺建议表，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中；
- 将奶粉加入奶瓶：参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中；
- 摇晃奶瓶：盖紧奶瓶，并摇动奶瓶直至奶粉充分溶解；
- 测温：喂哺前，请将奶液滴在手腕内侧检测温度是否适合宝宝食用；
- 清洗：喂哺后剩余奶液请丢弃，清洗奶瓶和奶嘴。

贮存说明

- 本品应存放在阴凉干燥通风处。
- 奶粉开罐后请务必盖严，切记！请勿放入冰箱内保存。
- 开罐后请在一个月内食用完。



宜品®

国食注字
YP20230373

欧士达 婴儿配方羊奶粉 (0-6月龄, 1段)



1 段

净含量: 700克

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2104
蛋白质	g	0.51	10.8
乳清蛋白	g	0.41	8.6
脂肪	g	1.25	26.2
亚油酸	g	0.20	4.16
α-亚麻酸	mg	20.2	425
碳水化合物	g	2.59	54.5
维生素			
维生素A	μg RE	17.5	368
维生素D	μg	0.60	12.6
维生素E	mg α-TE	0.23	4.86
维生素K ₁	μg	1.22	25.7
维生素B ₁	μg	17.4	367
维生素B ₂	μg	23.7	498
维生素B ₆	μg	10.7	225
维生素B ₁₂	μg	0.050	1.06
烟酸	μg	138	2910
叶酸	μg	3.62	76.1
泛酸	μg	121	2536
维生素C	mg	3.08	64.7
生物素	μg	0.51	10.7
胆碱	mg	5.99	126
矿物质			
钠	mg	8.70	183
钾	mg	21.8	459
铜	μg	18.0	378
镁	mg	1.45	30.6
铁	mg	0.14	2.98
锌	mg	0.15	3.15
锰	μg	1.85	38.9
钙	mg	17.1	360
磷	mg	10.5	220
碘	μg	4.49	94.5
氯	mg	15.2	320
硒	μg	0.90	19.0
可选择成分			
肌醇	mg	1.80	37.8
左旋肉碱	mg	0.38	7.90
二十二碳六烯酸	mg	4.49	94.5
二十碳四烯酸	mg	4.99	105
低聚半乳糖	g	0.13	2.70
低聚果糖	g	0.014	0.30
叶黄素	μg	3.38	71.2
核苷酸	mg	1.05	22.1
乳铁蛋白	mg	2.38	50.0

配料表			
脱盐乳清粉 (来源绵羊乳)、食用植物调和油 (玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、全脂绵羊乳粉、低聚半乳糖、橄榄油、奶油、低聚果糖、磷脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚混合生育酚浓缩物、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、D-泛酸钙、叶酸、D-生物素、氯化胆碱、左旋肉碱、肌醇、硫酸亚铁、硫酸锌、碘酸钾、硫酸铜、硫酸镁、亚硒酸钠、硫酸镁、碳酸钙、磷酸氢钙、柠檬酸钠、柠檬酸钾、氯化钾、L-抗坏血酸钠、磷酸三钙、叶黄素、核苷酸 (5'-肌苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷)、乳铁蛋白、二十二碳六烯酸、花生四烯酸、动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12			

产品信息			
生产商:黑龙江欧贝嘉营养食品有限公司(C)			
地址:黑龙江省伊春市铁力市西河生态工业园区			
产地:黑龙江·伊春			
食品生产许可证编号:SC10523078101249			
生产商:北安宜品卡乳业有限公司(A)			
地址:黑龙江省黑河市北安市铁西区工业园区			
产地:黑龙江·黑河			
食品生产许可证编号:SC10523118150120			
生产商:宜品(青岛)乳制品有限公司(F)			
地址:山东省青岛市莱西市沽河街道办事处龙口西路300号			
产地:山东·青岛			
食品生产许可证编号:SC10537028502446			
产品类别及属性:乳基粉状 婴儿配方食品			
产品标准号:GB 10765-2021			
保质期:24个月			
生产日期、批号及保质期至:见罐底 (具体生产商/产地见生产日期末代码)			
咨询热线:400-6966-128			



欧士达1-7

年龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水量(ml)	量勺数(平勺)	
0-2周	60	2	7-8
2-4周	90	3	6-7
1-2月	120	4	5-6
2-3月	150	5	5-6
3-4月	180	6	5-6
4-6月	210	7	4-5

△ 参照此表取适量温开水和奶粉，此表是根据平均需要量而定，仅供参考；
最适宜的溶解温度是45℃~50℃；每一平勺约4.35克；
100mL奶液=13.05g粉+90mL温开水。

冲调方法



温馨提示

- 对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品；
- 请勿擅自改变奶的浓度，浓度不恰当宝宝会得不到适当的营养；
- 冲调奶粉时，如有奶粉泡沫或挂壁均属正常现象，请放心食用；
- 奶粉冲调好后，待温度适宜时给宝宝食用，喂哺剩余的奶液请弃掉，勿留于下次食用；
- 宝宝在两餐之间要适当补充水；
- 摇晃奶粉瓶：盖紧奶瓶，并摇动奶瓶直至奶粉充分溶解；
- 测温：喂哺前，请将奶液滴在手腕内侧检测温度是否适合宝宝食用；
- 清洗：喂哺后剩余奶液请丢弃，清洗奶瓶和奶嘴。

贮存说明

- 本品应存放在阴凉干燥通风处。
- 奶粉开罐后请务必盖严，切记！请勿放入冰箱内保存。
- 开罐后请在一个月内食用完。

宜品®



欧士达 婴儿配方羊奶粉 (0-6月龄, 1段)



1 段

净含量: 100克

国食注字
YP20230373

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2104
蛋白质	g	0.51	10.8
乳清蛋白	g	0.41	8.6
脂肪	g	1.25	26.2
亚油酸	g	0.20	4.16
α-亚麻酸	mg	20.2	425
碳水化合物	g	2.59	54.5

维生素	μg RE	17.5	368
维生素D	μg	0.60	12.6
维生素E	mg α-TE	0.23	4.86
维生素K ₁	μg	1.22	25.7
维生素B ₁	μg	17.4	367
维生素B ₂	μg	23.7	498
维生素B ₆	μg	10.7	225
维生素B ₁₂	μg	0.050	1.06
烟酸	μg	138	2910
叶酸	μg	3.62	76.1
泛酸	μg	121	2536
维生素C	mg	3.08	64.7
生物素	μg	0.51	10.7
胆碱	mg	5.99	126

矿物质	mg	8.70	183
钠	mg	21.8	459
钾	μg	18.0	378
铜	mg	1.45	30.6
镁	mg	0.14	2.98
铁	mg	0.15	3.15
锌	μg	1.85	38.9
锰	mg	17.1	360
钙	mg	10.5	220
磷	mg	4.49	94.5
碘	μg	15.2	320
氯	mg	0.90	19.0
硒	μg		

可选择成分	mg	1.80	37.8
肌醇	mg	0.38	7.90
左旋肉碱	mg	4.49	94.5
二十二碳六烯酸	mg	4.99	105
二十碳四烯酸	mg	0.13	2.70
低聚半乳糖	g	0.014	0.30
低聚果糖	g	3.38	71.2
叶黄素	μg	1.05	22.1
核苷酸	mg	2.38	50.0
乳铁蛋白	mg		

脱盐乳清粉（来源绵羊乳）、食用植物油（玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油）、全脂绵羊乳粉、低聚半乳糖、橄榄油、奶油、低聚果糖、磷脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-a-醋酸生育酚、混合生育酚浓缩物、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氟钴胺、烟酰胺、D-泛酸钙、叶酸、D-生物素、氯化胆碱、左旋肉碱、肌醇、硫酸亚铁、硫酸锌、碘酸钾、硫酸铜、硫酸镁、亚硒酸钠、硫酸镁、碳酸钙、磷酸氢钙、柠檬酸钠、柠檬酸钾、氯化钾、L-抗坏血酸钠、磷酸三钙、叶黄素、核苷酸（5'-肌苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷）、乳铁蛋白、二十二碳六烯酸、花生四烯酸、动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12

产品信息

生产商: 黑龙江欧贝嘉营养食品有限公司(C)
地址: 黑龙江省伊春市铁力市西河生态工业园区
产地: 黑龙江·伊春
食品生产许可证编号: SC10523078101249
生产商: 北安宜品努卡乳业有限公司(A)
地址: 黑龙江省黑河市北安市铁西区工业园区
产地: 黑龙江·黑河
食品生产许可证编号: SC10523118150120
生产商: 宜品(青岛)羊乳制品有限公司(F)
地址: 山东省青岛市莱西市沽河街道办事处龙口西路300号
产地: 山东·青岛
食品生产许可证编号: SC10537028502446
产品类别及属性: 乳基粉状婴儿配方食品
产品标准号: GB 10765-2021
保质期: 18个月
生产日期、批号及保质期至: 见罐底
(具体生产商/产地见生产日期末端代码)
咨询热线: 400-6966-128



欧士达1-1

喂哺建议表			
年龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水量(mL)	量勺数(平勺)	
0-2周	60	2	7-8
2-4周	90	3	6-7
1-2月	120	4	5-6
2-3月	150	5	5-6
3-4月	180	6	5-6
4-6月	210	7	4-5

△ 参照此表取适量温开水和奶粉，此表是根据平均需要量而定，仅供参考；
最适宜的溶解温度是45°C~50°C；每一平勺约4.35克；
100mL奶液=13.05g粉+90mL温开水。



1. 消毒：将奶瓶和奶嘴放入沸水中煮5分钟进行消毒；
2. 将水注入奶瓶：饮用水煮沸后，冷却至45°C~50°C，参照喂哺建议表，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中；
3. 将奶粉加入奶瓶：参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中；
4. 摆晃奶瓶：盖紧奶瓶，并摇动奶瓶直至奶粉充分溶解；
5. 测温：喂哺前，请将奶液滴在手腕内侧检测温度是否适合宝宝食用；
6. 清洗：喂哺后剩余奶液请丢弃，清洗奶瓶和奶嘴。

贮存说明

- 本品应存放在阴凉干燥通风处。
- 奶粉开罐后请务必盖严，切记！请勿放入冰箱内保存。
- 开罐后请在一个月内食用完。

宜品®

国食注字
YP20230373

欧士达 婴儿配方羊奶粉 (0-6月龄, 1段)



1段

净含量: 308克

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2104
蛋白质	g	0.51	10.8
乳清蛋白	g	0.41	8.6
脂肪	g	1.25	26.2
亚油酸	g	0.20	4.16
α-亚麻酸	mg	20.2	425
碳水化合物	g	2.59	54.5

维生素

维生素A	μg RE	17.5	368
维生素D	μg	0.60	12.6
维生素E	mg α-TE	0.23	4.86
维生素K ₁	μg	1.22	25.7
维生素B ₁	μg	17.4	367
维生素B ₂	μg	23.7	498
维生素B ₆	μg	10.7	225
维生素B ₁₂	μg	0.050	1.06
烟酸	μg	138	2910
叶酸	μg	3.62	76.1
泛酸	μg	121	2536
维生素C	mg	3.08	64.7
生物素	μg	0.51	10.7
胆碱	mg	5.99	126

矿物质

钠	mg	8.70	183
钾	mg	21.8	459
铜	μg	18.0	378
镁	mg	1.45	30.6
铁	mg	0.14	2.98
锌	mg	0.15	3.15
锰	μg	1.85	38.9
钙	mg	17.1	360
磷	mg	10.5	220
碘	μg	4.49	94.5
氯	mg	15.2	320
硒	μg	0.90	19.0

可选择成分

肌醇	mg	1.80	37.8
左旋肉碱	mg	0.38	7.90
二十二碳六烯酸	mg	4.49	94.5
二十碳四烯酸	mg	4.99	105
低聚半乳糖	g	0.13	2.70
低聚果糖	g	0.014	0.30
叶黄素	μg	3.38	71.2
核苷酸	mg	1.05	22.1
乳铁蛋白	mg	2.38	50.0

配料表

脱盐乳清粉（来源绵羊乳）、食用植物调和油（玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油）、全脂绵羊乳粉、低聚半乳糖、橄榄油、奶油、低聚果糖、磷脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、混合生育酚浓缩物、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸哆罗嗦、氯钴胺、烟酰胺、D-泛酸钙、叶酸、D-生物素、氯化胆碱、左旋肉碱、肌醇、硫酸亚铁、硫酸锌、碘酸钾、硫酸铜、硫酸镁、亚硒酸钠、硫酸镁、碳酸钙、磷酸氢钙、柠檬酸钠、柠檬酸钾、氯化钾、L-抗坏血酸钠、磷酸三钙、叶黄素、核苷酸（5'-肌苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷）、乳铁蛋白、二十二碳六烯酸、花生四烯酸、动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12

产品信息

生产商:黑龙江欧贝嘉营养食品有限公司(C)
地址:黑龙江省伊春市铁力市西河生态工业园区
产地:黑龙江·伊春
食品生产许可证编号:SC10523078101249
生产商:北安宜品努卡乳业有限公司(A)
地址:黑龙江省黑河市北安市铁西区工业园区
产地:黑龙江·黑河
食品生产许可证编号:SC10523118150120
生产商:宜品(青岛)乳制品有限公司(F)
地址:山东省青岛市莱西市沽河街道办事处龙口西路300号
产地:山东·青岛
食品生产许可证编号:SC10537028502446
产品类别及属性:乳基粉状婴儿配方食品
产品标准号:GB 10765-2021
保质期:24个月
生产日期、批号及保质期至:见罐底
(具体生产商/产地见生产日期末端代码)
咨询热线:400-6966-128



6 947213 582630

欧士达1-308



1. 消毒：将奶瓶和奶嘴放入沸水中煮 5 分钟进行消毒；
 2. 将水注入奶瓶：饮用水煮沸后，冷却至 45°C~50°C；
 参照喂哺建议表，将适量的水倒入消过毒的奶瓶中；
 3. 将奶粉加入奶瓶：参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中；
 4. 摆晃奶瓶：盖紧奶瓶，并摇动奶瓶直至奶粉充分溶解；
 5. 测温：喂哺前，请将奶液滴在手腕内侧检测温度是否适合宝宝食用；
 6. 清洗：喂哺后剩余奶液请丢弃，清洗奶瓶和奶嘴。

贮存说明

- 本品应存放在阴凉干燥通风处。
- 奶粉开罐后请务必盖严，切记！请勿放入冰箱内保存。
- 开罐后请在一个月内食用完。



年龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水量(ml)	量勺数(平勺)	
6-8月	210	7	3-4
8-12月	240	8	3

△ 参照此表取适量温开水和奶粉，此表是根据平均需要量而定，仅供参考；
 最适宜的溶解温度是 45°C~50°C；每一平勺约 4.5 克；
 100mL 奶液 = 13.5g 粉 + 90mL 温开水。

温馨提示

- 母乳喂养是较好的喂养方式，在母乳不足或无母乳时可食用本产品，较大婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品；
- 请勿擅自改变奶的浓度，浓度不恰当宝宝会得不到适当的营养；
- 冲调奶粉时，如有奶粉泡沫或挂壁均属正常现象，请放心食用；
- 奶粉冲调好后，待温度适宜时给宝宝食用，喂哺剩余的奶液请弃掉，勿留于下次食用；
- 宝宝在两餐之间要适当补充水。

宜品®

国食注字 YP20230374

欧士达

较大婴儿配方羊奶粉

(6-12月龄, 2段)




2段
净含量: 800克

国食注字
YP20230374

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2010
蛋白质	g	0.63	12.7
乳清蛋白	g	0.44	8.8
脂肪	g	1.07	21.5
亚油酸	g	0.15	3.06
α-亚麻酸	mg	15.4	309
碳水化合物	g	2.85	57.3
维生素			
维生素A	μg RE	22.5	453
维生素D	μg	0.60	12.0
维生素E	mg α-TE	0.21	4.23
维生素K ₁	μg	1.27	25.6
维生素B ₁	μg	17.7	355
维生素B ₂	μg	26.8	538
维生素B ₆	μg	13.5	271
维生素B ₁₂	μg	0.060	1.20
烟酸	μg	139	2787
叶酸	μg	3.02	60.8
泛酸	μg	121	2435
维生素C	mg	3.46	69.5
生物素	μg	0.52	10.5
胆碱	mg	6.02	121
矿物质			
钠	mg	6.82	137
钾	mg	22.8	458
铜	μg	10.4	210
镁	mg	1.52	30.5
铁	mg	0.30	6.00
锌	mg	0.15	3.02
锰	μg	1.98	39.8
钙	mg	21.8	439
磷	mg	12.9	259
碘	μg	4.51	90.6
氯	mg	17.0	342
硒	μg	0.60	12.1
可选择成分			
肌醇	mg	1.26	25.3
左旋肉碱	mg	0.54	10.8
二十二碳六烯酸	mg	4.46	89.6
二十碳四烯酸	mg	5.12	103
低聚半乳糖	g	0.13	2.70
低聚果糖	g	0.015	0.30
叶黄素	μg	8.51	171
核苷酸	mg	1.12	22.5
乳铁蛋白	mg	2.49	50.0

配料表			
脱盐乳清粉（来源绵羊乳）、食用植物油和油（玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油）、全脂绵羊乳粉、脱脂绵羊乳粉、低聚半乳糖、奶油、橄榄油、低聚果糖、磷脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、混合生育酚浓缩物、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、D-泛酸钙、叶酸、D-生物素、氯化胆碱、左旋肉碱、肌醇、硫酸亚铁、硫酸锌、磷酸钙、硫酸铜、硫酸镁、亚硒酸钠、硫酸镁、碳酸钙、磷酸氢钙、柠檬酸钠、柠檬酸钾、氯化钾、L-抗坏血酸钠、磷酸三钙、叶黄素、核苷酸（5-肌苷酸二钠、5-尿苷酸二钠、5-胞苷酸二钠、5-鸟苷酸二钠、5-单磷酸腺苷）、乳铁蛋白、二十二碳六烯酸、花生四烯酸、动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12			

产品信息			
生产商:黑龙江欧贝嘉营养食品有限公司(C)			
地址:黑龙江省伊春市铁力市西河生态工业园区			
产地:黑龙江·伊春			
食品生产许可证编号:SC10523078101249			
生产商:北安宜品努卡乳业有限公司(A)			
地址:黑龙江省黑河市北安市铁西区工业园区			
产地:黑龙江·黑河			
食品生产许可证编号:SC10523118150120			
生产商:宜品(青岛)羊乳制品有限公司(F)			
地址:山东省青岛市莱西市沽河街道办事处龙口西路300号			
产地:山东·青岛			
食品生产许可证编号:SC10537028502446			
产品类别及属性:乳基粉状较大婴儿配方食品			
产品标准号:GB 10766-2021			
保质期:24个月			
生产日期、批号及保质期至:见罐底 (具体生产商/产地见生产日期末端代码)			
咨询热线:400-6966-128			





年龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水量(ml)	量勺数(平勺)	
6-8月	210	7	3-4
8-12月	240	8	3

△ 参照此表取适量温开水和奶粉，此表是根据平均需要量而定，仅供参考；
最适宜的溶解温度是 45°C~50°C；每一平勺约 4.5 克；100mL 奶液 = 13.5g 粉 + 90mL 温开水。

- 消毒：将奶瓶和奶嘴放入沸水中煮 5 分钟进行消毒；
- 将水注入奶瓶：饮用水煮沸后，冷却至 45°C~50°C，参照喂哺建议表，将适量的水倒入消过毒的奶瓶中；
- 将奶粉加入奶瓶：参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中；
- 摇晃奶瓶：盖紧奶瓶，并摇动奶瓶直至奶粉充分溶解；
- 测温：喂哺前，请将奶液滴在手腕内侧检测温度是否适合宝宝食用；
- 清洗：喂哺后剩余奶液请丢弃，清洗奶瓶和奶嘴。

贮存说明

- 本品应存放在阴凉干燥通风处。
- 奶粉开罐后请务必盖严，切记！请勿放入冰箱内保存。
- 开罐后请在一个月内食用完。



宜品®

欧士达 较大婴儿配方羊奶粉 (6-12月龄, 2段)



国食注字
YP20230374

2段
净含量: 700克

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2010
蛋白质	g	0.63	12.7
乳清蛋白	g	0.44	8.8
脂肪	g	1.07	21.5
亚油酸	g	0.15	3.06
α-亚麻酸	mg	15.4	309
碳水化合物	g	2.85	57.3
维生素			
维生素A	μg RE	22.5	453
维生素D	μg	0.60	12.0
维生素E	mg α-TE	0.21	4.23
维生素K ₁	μg	1.27	25.6
维生素B ₁	μg	17.7	355
维生素B ₂	μg	26.8	538
维生素B ₆	μg	13.5	271
维生素B ₁₂	μg	0.060	1.20
烟酸	μg	139	2787
叶酸	μg	3.02	60.8
泛酸	μg	121	2435
维生素C	mg	3.46	69.5
生物素	μg	0.52	10.5
胆碱	mg	6.02	121
矿物质			
钠	mg	6.82	137
钾	mg	22.8	458
铜	μg	10.4	210
镁	mg	1.52	30.5
铁	mg	0.30	6.00
锌	mg	0.15	3.02
锰	μg	1.98	39.8
钙	mg	21.8	439
磷	mg	12.9	259
碘	μg	4.51	90.6
氯	mg	17.0	342
硒	μg	0.60	12.1
可选择成分			
肌醇	mg	1.26	25.3
左旋肉碱	mg	0.54	10.8
二十二碳六烯酸	mg	4.46	89.6
二十碳四烯酸	mg	5.12	103
低聚半乳糖	g	0.13	2.70
低聚果糖	g	0.015	0.30
叶黄素	μg	8.51	171
核苷酸	mg	1.12	22.5
乳铁蛋白	mg	2.49	50.0

配料表

脱盐乳清粉（来源绵羊乳）、食用植物调和油（玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油）、全脂绵羊乳粉、脱脂绵羊乳粉、低聚半乳糖、奶油、橄榄油、低聚果糖、磷脂、醋酸初黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、混合生育酚浓缩物、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氯钴胺、烟酰胺、D-泛酸钙、叶酸、D-生物素、氯化胆碱、左旋肉碱、肌醇、硫酸亚铁、硫酸锌、碘酸钾、硫酸铜、硫酸镁、亚硒酸钠、硫酸镁、碳酸钙、磷酸氢钙、柠檬酸钠、柠檬酸钾、氯化钾、L-抗坏血酸钠、磷酸三钙、叶黄素、核苷酸（5'-肌苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷）、乳铁蛋白、二十二碳六烯酸、花生四烯酸、动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12


产品信息

生产商:黑龙江欧贝嘉营养食品有限公司(C)
地址:黑龙江省伊春市铁力市西河生态工业园区
产地:黑龙江·伊春
食品生产许可证编号:SC10523078101249
生产商:北安宜品努卡乳业有限公司(A)
地址:黑龙江省黑河市北安市铁西区工业园区
产地:黑龙江·黑河
食品生产许可证编号:SC10523118150120
生产商:宜品(青岛)羊乳制品有限公司(F)
地址:山东省青岛市莱西市沽河街道办事处龙口西路300号
产地:山东·青岛
食品生产许可证编号:SC10537028502446
产品类别及属性:乳基粉状 较大婴儿配方食品
产品标准号:GB 10766-2021
保质期:24个月
生产日期、批号及保质期至:见罐底
(具体生产商/产地见生产日期末端代码)
咨询热线:400-6966-128





- 消毒：将奶瓶和奶嘴放入沸水中煮 5 分钟进行消毒；
- 将水注入奶瓶：饮用水煮沸后，冷却至 45°C~50°C，参照喂哺建议表，将适量的水倒入消过毒的奶瓶中；
- 将奶粉加入奶瓶：参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中；
- 摇晃奶瓶：盖紧奶瓶，并摇动奶瓶直至奶粉充分溶解；
- 测温：喂哺前，请将奶液滴在手腕内侧检测温度是否适合宝宝食用；
- 清洗：喂哺后剩余奶液请丢弃，清洗奶瓶和奶嘴。



宜品®

欧士达 较大婴儿配方羊奶粉 (6-12月龄, 2段)



2 段
净含量: 100克

国食注字
YP20230374

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2010
蛋白质	g	0.63	12.7
乳清蛋白	g	0.44	8.8
脂肪	g	1.07	21.5
亚油酸	g	0.15	3.06
α-亚麻酸	mg	15.4	309
碳水化合物	g	2.85	57.3
维生素			
维生素A	μg RE	22.5	453
维生素D	μg	0.60	12.0
维生素E	mg α-TE	0.21	4.23
维生素K ₁	μg	1.27	25.6
维生素B ₁	μg	17.7	355
维生素B ₂	μg	26.8	538
维生素B ₆	μg	13.5	271
维生素B ₁₂	μg	0.060	1.20
烟酸	μg	139	2787
叶酸	μg	3.02	60.8
泛酸	μg	121	2435
维生素C	mg	3.46	69.5
生物素	μg	0.52	10.5
胆碱	mg	6.02	121
矿物质			
钠	mg	6.82	13.7
钾	mg	22.8	458
铜	μg	10.4	210
镁	mg	1.52	30.5
铁	mg	0.30	6.00
锌	mg	0.15	3.02
钙	mg	1.98	39.8
磷	mg	21.8	439
碘	mg	12.9	259
氯	μg	4.51	90.6
硒	μg	17.0	342
可选择成分	mg	0.60	12.1
肌醇	mg	1.26	25.3
左旋肉碱	mg	0.54	10.8
二十二碳六烯酸	mg	4.46	89.6
二十碳四烯酸	mg	5.12	103
低聚半乳糖	g	0.13	2.70
低聚果糖	g	0.015	0.30
叶黄素	μg	8.51	171
核苷酸	mg	1.12	22.5
乳铁蛋白	mg	2.49	50.0

脱盐乳清粉（来源绵羊乳）、食用植物调和油（玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油）、全脂绵羊乳粉、脱脂绵羊乳粉、低聚半乳糖、奶油、橄榄油、低聚果糖、磷脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、混合生育酚浓缩物、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氟钴胺、烟酰胺、D-泛酸钙、叶酸、D-生物素、氯化胆碱、左旋肉碱、肌醇、硫酸亚铁、硫酸锌、碘酸钾、硫酸铜、硫酸锰、亚硒酸钠、硫酸镁、碳酸钙、磷酸氢钙、柠檬酸钠、柠檬酸钾、氯化钾、L-抗坏血酸钠、磷酸三钙、叶黄素、核苷酸（5'-肌苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷）、乳铁蛋白、二十二碳六烯酸、花生四烯酸、动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12

产品信息

生产商: 黑龙江欧贝嘉营养食品有限公司(C)
地址: 黑龙江省伊春市铁力市西河生态工业园区
产地: 黑龙江·伊春
食品生产许可证编号: SC10523078101249
生产商: 北安宜品努卡乳业有限公司(A)
地址: 黑龙江省黑河市北安市铁西区工业园区
产地: 黑龙江·黑河
食品生产许可证编号: SC10523118150120
生产商: 宜品(青岛)羊乳制品有限公司(F)
地址: 山东省青岛市莱西市沽河街道办事处龙口西路300号
产地: 山东·青岛
食品生产许可证编号: SC10537028502446
产品类别及属性: 乳基粉状 较大婴儿配方食品
产品标准号: GB 10766-2021
保质期: 18个月
生产日期、批号及保质期至: 见罐底
(具体生产商/产地见生产日期末端代码)
咨询热线: 400-6966-128




6 947213 582203

欧士达2-1



- 消毒：将奶瓶和奶嘴放入沸水中煮 5 分钟进行消毒；
- 将水注入奶瓶：饮用水煮沸后，冷却至 45°C~50°C，参照喂哺建议表，将适量的水倒入消过毒的奶瓶中；
- 将奶粉加入奶瓶：参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中；
- 摇晃奶瓶：盖紧奶瓶，并摇动奶瓶直至奶粉充分溶解；
- 测温：喂哺前，请将奶液滴在手腕内侧检测温度是否适合宝宝食用；
- 清洗：喂哺后剩余奶液请丢弃，清洗奶瓶和奶嘴。



宜品®

国食注字 YP20230374

欧士达 较大婴儿配方羊奶粉 (6-12月龄, 2段)



2段

净含量: 308克

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2010
蛋白质	g	0.63	12.7
乳清蛋白	g	0.44	8.8
脂肪	g	1.07	21.5
亚油酸	g	0.15	3.06
α-亚麻酸	mg	15.4	309
碳水化合物	g	2.85	57.3
维生素			
维生素A	μg RE	22.5	453
维生素D	μg	0.60	12.0
维生素E	mg α-TE	0.21	4.23
维生素K ₁	μg	1.27	25.6
维生素B ₁	μg	17.7	355
维生素B ₂	μg	26.8	538
维生素B ₆	μg	13.5	271
维生素B ₁₂	μg	0.060	1.20
烟酸	μg	139	2787
叶酸	μg	3.02	60.8
泛酸	μg	121	2435
维生素C	mg	3.46	69.5
生物素	μg	0.52	10.5
胆碱	mg	6.02	121
矿物质			
钠	mg	6.82	137
钾	mg	22.8	458
铜	μg	10.4	210
镁	mg	1.52	30.5
铁	mg	0.30	6.00
锌	mg	0.15	3.02
钙	mg	1.98	39.8
磷	mg	21.8	439
碘	μg	12.9	259
氯	mg	4.51	90.6
硒	μg	17.0	342
可选择成分			
肌醇	mg	1.26	25.3
左旋肉碱	mg	0.54	10.8
二十二碳六烯酸	mg	4.46	89.6
二十碳四烯酸	mg	5.12	103
低聚半乳糖	g	0.13	2.70
低聚果糖	g	0.015	0.30
叶黄素	μg	8.51	171
核苷酸	mg	1.12	22.5
乳铁蛋白	mg	2.49	50.0

脱盐乳清粉（来源绵羊乳）、食用植物调和油（玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油）、全脂绵羊乳粉、脱脂绵羊乳粉、低聚半乳糖、奶油、橄榄油、低聚果糖、磷脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、混合生育酚浓缩物、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氯钴胺、烟酰胺、D-泛酸钙、叶酸、D-生物素、氯化胆碱、左旋肉碱、肌醇、硫酸亚铁、硫酸锌、碘酸钾、硫酸铜、硫酸锰、亚硒酸钠、硫酸镁、碳酸钙、磷酸氢钙、柠檬酸钠、柠檬酸钾、氯化钾、L-抗坏血酸钠、磷酸三钙、叶黄素、核苷酸（5'-肌苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷）、乳铁蛋白、二十二碳六烯酸、花生四烯酸、动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12

产品信息

生产商:黑龙江欧贝嘉营养食品有限公司(C)
地址:黑龙江省伊春市铁力市西河生态工业园区
产地:黑龙江·伊春
食品生产许可证编号:SC10523078101249
生产商:北京宜品努卡乳业有限公司(A)
地址:黑龙江省黑河市北安市铁西区工业园区
产地:黑龙江·黑河
食品生产许可证编号:SC10523118150120
生产商:宜品(青岛)羊乳制品有限公司(F)
地址:山东省青岛市莱西市沽河街道办事处龙口西路300号
产地:山东·青岛
食品生产许可证编号:SC10537028502446
产品类别及属性:乳基粉状 较大婴儿配方食品
产品标准号:GB 10766-2021
保质期:24个月
生产日期、批号及保质期至:见罐底
(具体生产商/产地见生产日期末端代码)
咨询热线:400-6966-128




6 947213 582685

欧士达2-308



- 消毒：将喂哺器具放入沸水中煮 5 分钟进行消毒；
- 冷却沸水：饮用水煮沸后，冷却至 45°C~50°C，参照喂哺建议表，在奶杯中加入适量的水；
- 加入奶粉：参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶杯中；
- 搅拌：将奶粉搅拌至充分溶解；
- 测温：当奶液温度适宜时即可进行喂哺；
- 清洗：喂哺后剩余奶液请丢弃，清洗喂哺器具。



年龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水量(mL)	量勺数(平勺)	
12-36月	210	7	2-3

△ 参照此表取适量温开水和奶粉，此表是根据平均需要量而定，仅供参考；最适宜的溶解温度是 45°C~50°C；每一平勺约 4.5 克；100mL 奶液 = 13.5g 粉 + 90mL 温开水。

温馨提示

- 母乳喂养是较好的喂养方式；在母乳不足或无母乳时可食用本产品；
- 请勿擅自改变奶的浓度，浓度不恰当宝宝会得不到适当的营养；
- 冲调奶粉时，如有奶粉泡沫或挂壁均属正常现象，请放心食用；
- 奶粉冲调好后，待温度适宜时给宝宝食用，喂哺剩余的奶液请丢掉，勿留于下次食用；
- 宝宝在两餐之间要适当补充水。

宜品®

国食注字 YP20230375 欧士达 幼儿配方羊奶粉 (12-36月龄, 3段)



3段

净含量: 800克

营养成分表
国食注字
YP20230375

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2004
蛋白质	g	0.69	13.9
脂肪	g	1.06	21.2
亚油酸	g	0.16	3.18
α-亚麻酸	mg	15.3	307
碳水化合物	g	2.81	56.4

维生素	μg RE	22.6	452
维生素A	μg	0.60	12.1
维生素D	μg α-TE	0.23	4.51
维生素E	μg	1.28	25.7
维生素K ₁	μg	17.6	352
维生素B ₁	μg	27.5	552
维生素B ₂	μg	13.8	276
维生素B ₁₂	μg	0.057	1.15
烟酸	μg	139	2788
叶酸	μg	3.10	62.1
泛酸	μg	121	2422
维生素C	mg	3.16	63.4
生物素	μg	0.53	10.7

矿物质	mg	7.39	148
钠	mg	22.5	450
钾	μg	9.03	181
铜	mg	1.79	35.9
镁	mg	0.30	6.09
铁	mg	0.13	2.54
锌	mg	21.9	438
钙	mg	14.4	289
磷	μg	2.93	58.7
碘	mg	17.5	350


可选择成分	μg	0.61	12.2
硒	mg	6.09	122
胆碱	μg	1.58	31.7
锰	mg	1.28	25.6
肌醇	mg	0.38	7.60
左旋肉碱	mg	4.05	81.2
二十二碳六烯酸	mg	4.51	90.3
二十碳四烯酸	g	0.13	2.70
低聚半乳糖	g	0.015	0.30
低聚果糖	μg	8.63	173
叶黄素	mg	1.10	22.1
核苷酸	mg	2.50	50.0
乳铁蛋白	mg		

配料表

脱盐乳清粉（来源绵羊乳）、食用植物调和油（玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油）、脱脂绵羊乳粉、全脂绵羊乳粉、低聚半乳糖、奶油、橄榄油、低聚果糖、磷脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、混合生育酚浓缩物、植物茶氨酸、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氟钴胺、烟酰胺、D-泛酸钙、叶酸、D-生物素、氯化胆碱、左旋肉碱、肌醇、硫酸亚铁、硫酸镁、碘酸钾、硫酸铜、硫酸镁、亚硒酸钠、硫酸镁、碳酸钙、柠檬酸钾、柠檬酸钠、氯化钾、L-抗坏血酸钠、磷酸三钙、叶黄素、核苷酸（5'-肌苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷）、乳铁蛋白、二十二碳六烯酸、花生四烯酸、动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12


产品信息

生产商：黑龙江欧贝嘉营养食品有限公司(C)
地址：黑龙江省伊春市铁力市西河生态工业园区
产地：黑龙江·伊春
食品生产许可证编号：SC10523078101249
生产商：北安宜品努乳业有限公司(A)
地址：黑龙江省黑河市北安市铁西区工业园区
产地：黑龙江·黑河
食品生产许可证编号：SC10523118150120
生产商：宜品(青岛)羊乳制品有限公司(F)
地址：山东省青岛市莱西市沽河街道办事处龙口西路300号
产地：山东·青岛
食品生产许可证编号：SC10537028502446
产品类别及属性：乳基粉状 幼儿配方食品
产品标准号：GB 10767-2021
保质期：24个月
生产日期、批号及保质期至：见罐底
(具体生产商/产地见生产日期末端代码)
咨询热线：400-6966-128






1. 消毒：将喂哺器具放入沸水中煮 5 分钟进行消毒；
2. 冷却沸水：饮用水煮沸后，冷却至 45°C~50°C，参考喂哺建议表，在奶杯中加入适量的水；
3. 加入奶粉：参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶杯中；
4. 搅拌：将奶粉搅拌至充分溶解；
5. 测温：当奶液温度适宜时即可进行喂哺；
6. 清洗：喂哺后剩余奶液请丢弃，清洗喂哺器具。



年龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水量(ml)	量勺数(平勺)	
12-36月	210	7	2-3

△ 参照此表取适量温开水和奶粉，此表是根据平均需要量而定，仅供参考；最适宜的溶解温度是 45°C~50°C；每一平勺约 4.5 克；100mL 奶液 = 13.5g 粉 + 90mL 温开水。



宜品®

国食注字
YP20230375

欧士达 幼儿配方羊奶粉 (12-36月龄, 3段)



3段
净含量: 700克

营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2004
蛋白质	g	0.69	13.9
脂肪	g	1.06	21.2
亚油酸	g	0.16	3.18
α-亚麻酸	mg	15.3	307
碳水化合物	g	2.81	56.4

维生素	μg RE	22.6	452
维生素D	μg	0.60	12.1
维生素E	mg α-TE	0.23	4.51
维生素K ₁	μg	1.28	25.7
维生素B ₁	μg	17.6	352
维生素B ₂	μg	27.5	552
维生素B ₆	μg	13.8	276
维生素B ₁₂	μg	0.057	1.15
烟酸	μg	139	2788
叶酸	μg	3.10	62.1
泛酸	μg	121	2422
维生素C	mg	3.16	63.4
生物素	μg	0.53	10.7

矿物质	mg	7.39	148
钠	mg	22.5	450
钾	μg	9.03	181
铜	mg	1.79	35.9
镁	mg	0.30	6.09
铁	mg	0.13	2.54
锌	mg	21.9	438
钙	mg	14.4	289
磷	μg	2.93	58.7
碘	mg	17.5	350

可选择成分	μg	0.61	12.2
硒	mg	6.09	122
胆碱	μg	1.58	31.7
锰	mg	1.28	25.6
肌醇	mg	0.38	7.60
左旋肉碱	mg	4.05	81.2
二十碳六烯酸	mg	4.51	90.3
低聚半乳糖	g	0.13	2.70
低聚果糖	g	0.015	0.30
叶黄素	μg	8.63	173
核苷酸	mg	1.10	22.1
乳铁蛋白	mg	2.50	50.0

配料表			
脱盐乳清粉 (来源绵羊乳)、食用植物调和油 (玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、脱脂绵羊乳粉、全脂绵羊乳粉、低聚半乳糖、奶油、橄榄油、低聚果糖、磷脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、混合生育酚浓缩物、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、D-泛酸钙、叶酸、D-生物素、氯化胆碱、左旋肉碱、肌醇、硫酸亚铁、硫酸锌、碘酸钾、硫酸镁、亚硒酸钠、硫酸镁、碳酸钙、柠檬酸钾、柠檬酸钠、氯化钾、L-抗坏血酸钠、磷酸三钙、叶黄素、核苷酸 (5'-肌苷二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷)、乳铁蛋白、二十二碳六烯酸、花生四烯酸、动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12			

产品信息			
生产商:黑龙江欧贝嘉营养食品有限公司(C)			
地址:黑龙江省伊春市铁力市西河生态工业园区			
产地:黑龙江·伊春			
食品生产许可证编号:SC10523078101249			
生产商:北安富品努卡乳业有限公司(A)			
地址:黑龙江省黑河市北安市铁西区工业园区			
产地:黑龙江·黑河			
食品生产许可证编号:SC10523118150120			
生产商:宜品(青岛)羊乳制品有限公司(F)			
地址:山东省青岛市莱西市沽河街道办事处龙口西路300号			
产地:山东·青岛			
食品生产许可证编号:SC10537028502446			
产品类别及属性:乳基粉状 幼儿配方食品			
产品标准号: GB 10767-2021			
保质期:24个月			
生产日期、批号及保质期至:见罐底			
(具体生产商/产地见生产日期末端代码)			
咨询热线:400-6966-128			



欧士达3-7



1. 消毒：将喂哺器具放入沸水中煮 5 分钟进行消毒；
2. 冷却沸水：饮用水煮沸后，冷却至 45℃~50℃，参照喂哺建议表，在奶杯中加入适量的水；
3. 加入奶粉：参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶杯中；
4. 搅拌：将奶粉搅拌至充分溶解；
5. 测温：当奶液温度适宜时即可进行喂哺；
6. 清洗：喂哺后剩余奶液请丢弃，清洗喂哺器具。

贮存说明

- 本品应放在阴凉干燥通风处。
- 奶粉开罐后请务必盖严，切记！请勿放入冰箱内保存。
- 开罐后请在一个月内食用完。



年龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水量(ml)	量勺数(平勺)	
12-36月	210	7	2-3

⚠ 参照此表取适量温开水和奶粉，此表是根据平均需要量而定，仅供参考；最适宜的溶解温度是 45℃~50℃；每一平勺约 4.5 克；100mL 奶液 = 13.5g 粉 + 90mL 温开水。

温馨提示

- 母乳喂养是较好的喂养方式，在母乳不足或无母乳时可食用本产品；
- 请勿擅自改变奶的浓度，浓度不恰当宝宝会得不到适当的营养；
- 冲调奶粉时，如有奶粉泡沫或挂壁均属正常现象，请放心食用；
- 奶粉冲调好后，待温度适宜时给宝宝食用，喂哺剩余的奶液请丢弃，勿留于下次食用；
- 宝宝在两餐之间要适当补充水。

宜品®

欧士达 幼儿配方羊奶粉 (12-36月龄, 3段)



3段
净含量: 100克

国食注字
YP20230375

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2004
蛋白质	g	0.69	13.9
脂肪	g	1.06	21.2
亚油酸	g	0.16	3.18
α-亚麻酸	mg	15.3	307
碳水化合物	g	2.81	56.4
维生素			
维生素A	μg RE	22.6	452
维生素D	μg	0.60	12.1
维生素E	mg α-TE	0.23	4.51
维生素K ₁	μg	1.28	25.7
维生素B ₁	μg	17.6	352
维生素B ₂	μg	27.5	552
维生素B ₆	μg	13.8	276
维生素B ₁₂	μg	0.057	1.15
烟酸	μg	139	2788
叶酸	μg	3.10	62.1
泛酸	μg	121	2422
维生素C	mg	3.16	63.4
生物素	μg	0.53	10.7
矿物质			
钠	mg	7.39	148
钾	mg	22.5	450
铜	μg	9.03	181
镁	mg	1.79	35.9
铁	mg	0.30	6.09
锌	mg	0.13	2.54
钙	mg	21.9	438
磷	mg	14.4	289
碘	μg	2.93	58.7
氯	mg	17.5	350
可选择成分			
硒	μg	0.61	12.2
胆碱	mg	6.09	122
钻	μg	1.58	31.7
肌醇	mg	1.28	25.6
左旋肉碱	mg	0.38	7.60
二十二碳六烯酸	mg	4.05	81.2
二十碳四烯酸	mg	4.51	90.3
低聚半乳糖	g	0.13	2.70
低聚果糖	g	0.015	0.30
叶黄素	μg	8.63	173
核苷酸	mg	1.10	22.1
乳铁蛋白	mg	2.50	50.0

配料表

脱盐乳清粉（来源绵羊乳）、食用植物调和油（玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油）、脱脂绵羊乳粉、全脂绵羊乳粉、低聚半乳糖、奶油、橄榄油、低聚果糖、磷脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、混合生育酚浓缩物、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、D-泛酸钙、叶酸、D-生物素、氯化胆碱、左旋肉碱、肌醇、硫酸亚铁、硫酸锌、碘酸钾、硫酸铜、硫酸锰、亚硒酸钠、硫酸镁、碳酸钙、柠檬酸钾、柠檬酸钠、氯化钾、L-抗坏血酸钠、磷酸三钙、叶黄素、核苷酸（5'-肌苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷）、乳铁蛋白、二十二碳六烯酸、花生四烯酸、动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12

产品信息

生产商：黑龙江欧贝嘉营养食品有限公司(C)
地址：黑龙江省伊春市铁力市西河生态工业园区
产地：黑龙江·伊春
食品生产许可证编号：SC10523078101249
生产商：北安宜品努卡乳业有限公司(A)
地址：黑龙江省黑河市北安市铁西区工业园区
产地：黑龙江·黑河
食品生产许可证编号：SC10523118150120
生产商：宜品(青岛)羊乳制品有限公司(F)
地址：山东省青岛市莱西市沽河街道办事处龙口西路300号
产地：山东·青岛
食品生产许可证编号：SC10537028502446
产品类别及属性：乳基粉状 幼儿配方食品
产品标准号：GB 10767-2021
保质期：18个月
生产日期、批号及保质期至：见罐底
(具体生产商/产地见生产日期末端代码)
咨询热线：400-6966-128




6 947213 582197

欧士达3-1

B1-5




- 1. 消毒：将喂哺器具放入沸水中煮 5 分钟进行消毒；
- 2. 冷却沸水：饮用水煮沸后，冷却至 45°C~50°C，参考喂哺建议表，在奶杯中加入适量的水；
- 3. 加入奶粉：参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶杯中；
- 4. 搅拌：将奶粉搅拌至充分溶解；
- 5. 测温：当奶液温度适宜时即可进行喂哺；
- 6. 清洗：喂哺后剩余奶液请丢弃，清洗喂哺器具。



年龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水量(ml)	量勺数(平勺)	
12-36月	210	7	2-3

△ 参照此表取适量温开水和奶粉，此表是根据平均需要量而定，仅供参考；
最适宜的溶解温度是 45°C~50°C；每一平勺约 4.5 克；100mL 奶液 = 13.5g 粉 + 90mL 温开水。



宜品®

**国食注字
YP20230375**

欧士达

幼儿配方羊奶粉 (12-36月龄, 3段)



3段

净含量: 308克

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2004
蛋白质	g	0.69	13.9
脂肪	g	1.06	21.2
亚油酸	g	0.16	3.18
α-亚麻酸	mg	15.3	307
碳水化合物	g	2.81	56.4

维生素	μg RE	22.6	452
维生素D	μg	0.60	12.1
维生素E	mg α-TE	0.23	4.51
维生素K ₁	μg	1.28	25.7
维生素B ₁	μg	17.6	352
维生素B ₂	μg	27.5	552
维生素B ₆	μg	13.8	276
维生素B ₁₂	μg	0.057	1.15
烟酸	μg	139	2788
叶酸	μg	3.10	62.1
泛酸	μg	121	2422
维生素C	mg	3.16	63.4
生物素	μg	0.53	10.7

矿物质	mg	7.39	148
钠	mg	22.5	450
钾	μg	9.03	181
铜	mg	1.79	35.9
镁	mg	0.30	6.09
铁	mg	0.13	2.54
锌	mg	21.9	438
钙	mg	14.4	289
磷	μg	2.93	58.7
碘	mg	17.5	350

可选择成分	μg	0.61	12.2
硒	mg	6.09	122
胆碱	mg	1.58	31.7
肌醇	mg	1.28	25.6
左旋肉碱	mg	0.38	7.60
二十二碳六烯酸	mg	4.05	81.2
二十碳四烯酸	mg	4.51	90.3
低聚半乳糖	g	0.13	2.70
低聚果糖	g	0.015	0.30
叶黄素	μg	8.63	173
核苷酸	mg	1.10	22.1
乳铁蛋白	mg	2.50	50.0

配料表

脱盐乳清粉（来源绵羊乳）、食用植物油（玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油）、脱脂绵羊奶粉、全脂绵羊奶粉、低聚半乳糖、奶油、橄榄油、低聚果糖、磷脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、混合生育酚浓缩物、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氯化胆碱、肌醇、D-泛酸钙、叶酸、D-生物素、氯化胆碱、左旋肉碱、肌醇、硫酸亚铁、硫酸锌、碘酸钾、硫酸铜、硫酸锰、亚硒酸钠、硫酸镁、碳酸钙、柠檬酸钾、柠檬酸钠、氯化钾、L-抗坏血酸钠、磷酸三钙、叶黄素、核苷酸（5'-肌苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷）、乳铁蛋白、二十二碳六烯酸、花生四烯酸、动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12

产品信息

生产商:黑龙江欧贝嘉营养食品有限公司(C)
地址:黑龙江省伊春市铁力市西河生态工业园区
产地:黑龙江·伊春
食品生产许可证编号:SC10523078101249
生产商:北安宜品努卡乳业有限公司(A)
地址:黑龙江省黑河市北安市铁西区工业园区
产地:黑龙江·黑河
食品生产许可证编号:SC10523118150120
生产商:宜品(青岛)羊乳制品有限公司(F)
地址:山东省青岛市莱西市沽河街道办事处龙口西路300号
产地:山东·青岛
食品生产许可证编号:SC10537028502446
产品类别及属性:乳基粉状 幼儿配方食品
产品标准号:GB 10767-2021
保质期:24个月
生产日期、批号及保质期至:见罐底
(具体生产商/产地见生产日期末端代码)
咨询热线:400-6966-128



喂哺建议表/Feeding Recommendations		
年龄	每次喂哺量	
	温开水量(ml)	量勺数(平勺)
0~2周	60	2
2~4周	90	3
1~2月	120	4
2~3月	150	5
3~4月	180	6
4~6月	210	7

▲ 每平勺奶粉约4.35克，每100mL奶液=90mL温开水+13.05g粉。



- 消毒：将奶瓶和奶嘴放入沸水中煮5分钟进行消毒；
- 将水注入奶瓶：饮用水煮沸后，冷却至45°C~50°C，参照喂哺建议表，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中；
- 将奶粉加入奶瓶：参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中；
- 摇晃奶瓶：盖紧奶瓶，并摇动奶瓶直至奶粉充分溶解；
- 测温：喂哺前，请将奶液滴在手腕内侧检测温度是否适合宝宝食用；
- 清洗：喂哺后剩余奶液请丢弃，清洗奶瓶和奶嘴。



- 对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品；
- 请勿擅自改变奶的浓度，浓度不恰当宝宝会得不到适当的营养；
- 冲调奶粉时，如有奶粉泡沫或挂壁均属正常现象，请放心食用；
- 奶粉冲调好后，待温度适宜时给宝宝食用，喂哺剩余的奶液请丢弃，勿留于下次食用；
- 宝宝在两餐之间要适当补充水。



- 本品应存放在阴凉干燥通风处。
奶粉开罐后请务必盖严，切记！请勿放入冰箱内保存。
开罐后请在一个月内食用完。

宜品®

小羊姐姐 婴儿配方羊奶粉 (0-6月龄, 1段)



1 段

净含量: 100克
国食注字YP20240062

营养成分表/Nutrition Information		
项目	单位	每100kJ 每100g
能量	kJ	100 2106
蛋白质	g	0.47 9.8
乳清蛋白	g	0.42 8.9
脂肪	g	1.25 26.3
亚油酸	g	0.20 4.17
α-亚麻酸	mg	19.4 409
碳水化合物	g	2.63 55.4
维生素		
维生素A	μg RE	17.4 367
维生素D	μg	0.59 12.5
维生素E	mg α-TE	0.22 4.61
维生素K ₁	μg	1.19 25.1
维生素B ₁	μg	17.4 367
维生素B ₂	μg	24.1 508
维生素B ₆	μg	10.4 220
维生素B ₁₂	μg	0.048 1.02
烟酸	mg	120 2520
叶酸	μg	3.61 76.1
泛酸	μg	126 2650
维生素C	mg	3.00 63.2
生物素	μg	0.51 10.8
胆碱	mg	5.98 126
矿物质		
钠	mg	7.41 156
钾	mg	21.2 446
镁	μg	15.7 331
钙	mg	1.50 31.5
铁	mg	0.15 3.07
锌	mg	0.15 3.15
锰	μg	1.51 31.9
碘	mg	16.9 356
磷	mg	9.9 208
氯	μg	4.28 90.2
氮	mg	16.0 338
硒	μg	0.90 18.9
可选择成分		
二十二碳六烯酸	mg	4.27 90.0
二十二碳四烯酸	mg	5.13 108
低聚半乳糖	g	0.13 2.70
低聚果糖	g	0.014 0.30
叶黄素	μg	3.37 71.0
核苷酸	mg	0.95 20.0

脱盐乳清粉（来源羊乳）、食用植物调和油（玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油）、低聚半乳糖、奶油、全脂羊乳粉、橄榄油、低聚果糖、磷脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、混合生育酚浓缩物、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氯钴胺、烟酰胺、D-泛酸钙、叶酸、D-生物素、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、硫酸亚铁、硫酸锌、碘酸钾、硫酸铜、硫酸锰、亚硒酸钠、硫酸镁、碳酸钙、磷酸氢钙、柠檬酸钠、柠檬酸钾、氯化钾、磷酸三钙、二十二碳六烯酸、花生四烯酸、叶黄素、核苷酸（5'-肌苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷）、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12

过敏原信息：本产品含有乳制品、大豆制品。

产品信息/Product information

产品类别及属性：乳基粉状 婴儿配方食品
产品标准号：GB 10765-2021
生产日期、批号及保质期至：见罐底 保质期：18个月
生产商：北宜品努卡乳业有限公司(A)
地址：黑龙江省黑河市北安市铁西区工业园区
产地：黑龙江 黑河
食品生产许可证编号：SC10523118150120
生产商：黑龙江欧贝嘉营养食品有限公司(C)
地址：黑龙江省伊春市铁力市西河生态工业园区
产地：黑龙江 伊春
食品生产许可证编号：SC10523078101249
(具体生产商/产地见生产日期末端代码)
销售及咨询热线：400-6869-619



扫码领取更多福利 6 947213 581954 >

小羊1-1

喂哺建议表/Feeding Recommendations			
年龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水量(ml)	量勺数(平勺)	
0-2周	60	2	7~8
2-4周	90	3	6~7
1-2月	120	4	5~6
2-3月	150	5	5~6
3-4月	180	6	5~6
4-6月	210	7	4~5

△ 每平勺奶粉约4.35克，每100mL奶液=90mL温开水+13.05g粉。



- 消毒：将奶瓶和奶嘴放入沸水中煮 5 分钟进行消毒；
- 将水注入奶瓶：饮用水煮沸后，冷却至 45°C~50°C；
- 参照喂哺建议表，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中；
- 将奶粉加入奶瓶：参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中；
- 摇晃奶瓶：盖紧奶瓶，并摇动奶瓶直至奶粉充分溶解；
- 测温：喂哺前，请将奶液滴在手腕内侧检测温度是否适合宝宝食用；
- 清洗：喂哺后剩余奶液请丢弃，清洗奶瓶和奶嘴。

- 温馨提示/Courtesy Reminder**
- 对于 0~6 月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品；
 - 请勿擅自改变奶的浓度，浓度不恰当宝宝会得不到适当的营养；
 - 冲调奶粉时，如有奶粉泡沫或挂壁均属正常现象，请放心食用；
 - 奶粉冲调好后，待温度适宜时给宝宝食用，喂哺剩余的奶液请丢掉，勿留于下次食用；
 - 宝宝在两餐之间要适当补充水；

- 贮存说明/Storage**
- 本品应存放在阴凉干燥通风处。
 - 奶粉开罐后请务必盖严，切记！请勿放入冰箱内保存。
 - 开罐后请在一个月内食用完。

宜品®

小羊姐姐 婴儿配方羊奶粉 (0-6月龄, 1段)



营养成分表/Nutrition Information

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2106
蛋白质	g	0.47	9.8
乳清蛋白	g	0.42	8.9
脂肪	g	1.25	26.3
亚油酸	g	0.20	4.17
α-亚麻酸	mg	19.4	409
碳水化合物	g	2.63	55.4
维生素			
维生素A	μg RE	17.4	367
维生素D	μg	0.59	12.5
维生素E	mg α-TE	0.22	4.61
维生素K ₁	μg	1.19	25.1
维生素B ₁	μg	17.4	367
维生素B ₂	μg	24.1	508
维生素B ₆	μg	10.4	220
维生素B ₁₂	μg	0.048	1.02
烟酸	μg	120	2520
叶酸	μg	3.61	76.1
泛酸	μg	126	2650
维生素C	mg	3.00	63.2
生物素	μg	0.51	10.8
胆碱	mg	5.98	126
矿物质			
钠	mg	7.41	156
钾	mg	21.2	446
铜	μg	15.7	331
镁	mg	1.50	31.5
铁	mg	0.15	3.07
锌	mg	0.15	3.15
锰	μg	1.51	31.9
钙	mg	16.9	356
磷	mg	9.9	208
碘	μg	4.28	90.2
氯	mg	16.0	338
硒	μg	0.90	18.9
可选择成分			
二十二碳六烯酸	mg	4.27	90.0
二十碳四烯酸	mg	5.13	108
低聚半乳糖	g	0.13	2.70
低聚果糖	g	0.014	0.30
叶黄素	μg	3.37	71.0
核苷酸	mg	0.95	20.0

脱盐乳清粉（来源羊乳）、食用植物油和油（玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油）、低聚半乳糖、奶油、全脂羊乳粉、橄榄油、低聚果糖、磷脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、混合生育酚浓缩物、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氯钴胺、烟酰胺、D-泛酸钙、叶酸、D-生物素、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、硫酸亚铁、硫酸锌、碘酸钾、硫酸铜、硫酸锰、亚硒酸钠、硫酸镁、碳酸钙、磷酸氢钙、柠檬酸钠、柠檬酸钾、氯化钾、磷酸三钙、二十二碳六烯酸、花生四烯酸、叶黄素、核苷酸（5'-肌苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷）、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12

过敏原信息：本产品含有乳制品、大豆制品。

产品信息/Product information

产品类别及属性：乳基粉状 婴儿配方食品

产品标准号：GB 10765-2021

生产日期、批号及保质期：见罐底 保质期：24个月

生产商：北安宜品努卡乳业有限公司(A)

地址：黑龙江省黑河市北安市铁西区工业园区

产地：黑龙江·黑河

食品生产许可证编号：SC10523118150120

生产商：黑龙江欧贝嘉营养食品有限公司(C)


地址：黑龙江省伊春市铁力市西河生态工业园区

产地：黑龙江·伊春

食品生产许可证编号：SC10523078101249

(具体生产商/产地见生产日期末端代码)

销售及咨询热线：400-6869-619



扫码领取更多福利 6 947213 582159 >

小羊1-4

喂哺建议表/Feeding Recommendations		
年龄	每次喂哺量	每日喂哺次数
0~2周	60	2
2~4周	90	3
1~2月	120	4
2~3月	150	5
3~4月	180	6
4~6月	210	7

△ 每平勺奶粉约4.35克,每100mL奶液=90mL温开水+13.05g粉。



- 消毒：将奶瓶和奶嘴放入沸水中煮5分钟进行消毒；
- 将水注入奶瓶：饮用水煮沸后，冷却至45°C~50°C，参照喂哺建议表，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中；
- 将奶粉加入奶瓶：参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中；
- 摇晃奶瓶：盖紧奶瓶，并摇动奶瓶直至奶粉充分溶解；
- 测温：喂哺前，请将奶液滴在手腕内侧检测温度是否适合宝宝食用；
- 清洗：喂哺后剩余奶液请丢弃，清洗奶瓶和奶嘴。



温馨提示/Courtesy Reminder

- 对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品；
- 请勿擅自改变奶粉的浓度，浓度不恰当宝宝会得不到适当的营养；
- 冲调奶粉时，如有奶粉结块或挂壁均属正常现象，请放心食用；
- 奶粉冲调好后，待温度适宜时给宝宝食用，喂哺剩余的奶液请弃掉，勿留于下次食用；
- 宝宝在两餐之间要适当补充水；

贮存说明/Storage

- 本品应放在阴凉干燥通风处。
- 奶粉开罐后请务必盖严，切记！请勿放入冰箱内保存。
- 开罐后请在一个月内食用完。

宜品®

小羊姐姐 婴儿配方羊奶粉 (0-6月龄, 1段)



营养成分表/Nutrition Information

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2106
蛋白质	g	0.47	9.8
乳清蛋白	g	0.42	8.9
脂肪	g	1.25	26.3
亚油酸	g	0.20	4.17
α-亚麻酸	mg	19.4	409
碳水化合物	g	2.63	55.4
维生素			
维生素A	μg RE	17.4	367
维生素D	μg	0.59	12.5
维生素E	mg α-TE	0.22	4.61
维生素K ₁	μg	1.19	25.1
维生素B ₁	μg	17.4	367
维生素B ₂	μg	24.1	508
维生素B ₆	μg	10.4	220
维生素B ₁₂	μg	0.048	1.02
烟酸	μg	120	2520
叶酸	μg	3.61	76.1
泛酸	μg	126	2650
维生素C	mg	3.00	63.2
生物素	μg	0.51	10.8
胆碱	mg	5.98	126
矿物质			
钠	mg	7.41	156
钾	mg	21.2	446
铜	μg	15.7	331
镁	mg	1.50	31.5
铁	mg	0.15	3.07
锌	mg	0.15	3.15
锰	μg	1.51	31.9
钙	mg	16.9	356
磷	mg	9.9	208
碘	μg	4.28	90.2
氯	mg	16.0	338
硒	μg	0.90	18.9
可选择成分			
二十二碳六烯酸	mg	4.27	90.0
二十碳四烯酸	mg	5.13	108
低聚半乳糖	g	0.13	2.70
低聚果糖	g	0.014	0.30
叶黄素	μg	3.37	71.0
核苷酸	mg	0.95	20.0

配料表/Ingredients

脱盐乳清粉（来源羊乳）、食用植物油（玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油）、低聚半乳糖、奶油、全脂羊乳粉、橄榄油、低聚果糖、磷脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、混合生育酚浓缩物、植物甲萘醒、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、D-泛酸钙、叶酸、D-生物素、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、硫酸亚铁、硫酸锌、碘酸钾、硫酸铜、硫酸镁、亚硒酸钠、硫酸镁、碳酸钙、磷酸氢钙、柠檬酸钠、柠檬酸钾、氯化钾、磷酸三钙、二十二碳六烯酸、花生四烯酸、叶黄素、核苷酸（5'-肌苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷）、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12

过敏原信息：本产品含有乳制品、大豆制品。

产品信息/Product information

产品类别及属性：乳基粉状婴儿配方食品
产品标准号：GB 10765-2021
生产日期、批号及保质期：见罐底 保质期：24个月
生产商：北安宜品努卡乳业有限公司(A)
地址：黑龙江省黑河市北安市铁西区工业园区
产地：黑龙江·黑河
食品生产许可证编号：SC10523118150120
生产商：黑龙江欧贝嘉营养食品有限公司(C)
地址：黑龙江省伊春市铁力市西河生态工业园区
产地：黑龙江·伊春
食品生产许可证编号：SC10523078101249
(具体生产商/产地见生产日期末端代码)
销售及咨询热线：400-6869-619



扫码领取更多福利

喂哺建议表/Feeding Recommendations			
年龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水量(ml)	量勺数(平勺)	
6-8月	210	7	3~4
8-12月	240	8	3

△每平勺奶粉约4.5克，每100mL奶液=90mL温开水+13.5g粉。



温馨提示/Courtesy Reminder

- 1. 消毒：将奶瓶和奶嘴放入沸水中煮5分钟进行消毒；
- 2. 将水注入奶瓶：饮用水煮沸后，冷却至45°C~50°C，参照喂哺建议表，将适量的水倒入消毒过的奶瓶中；
- 3. 将奶粉加入奶瓶：参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶瓶中；
- 4. 摆晃奶瓶：盖紧奶瓶，并摇动奶瓶直至奶粉充分溶解；
- 5. 测温：喂哺前，请将奶液滴在手腕内侧检测温度是否适合宝宝食用；
- 6. 清洗：喂哺后剩余奶液请丢弃，清洗奶瓶和奶嘴。

贮存说明/Storage

- 本品应存放在阴凉干燥通风处。
- 奶粉开罐后请务必盖严，切记：请勿放入冰箱内保存。
- 开罐后请在一个月内食用完。



宜品®

小羊姐姐 较大婴儿配方羊奶粉 (6-12月龄, 2段)



营养成分表/Nutrition Information			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2011
蛋白质	g	0.56	11.2
乳清蛋白	g	0.46	9.2
脂肪	g	1.09	22.0
亚油酸	g	0.16	3.22
α-亚麻酸	mg	16.7	335
碳水化合物	g	2.87	57.8
维生素			
维生素A	μg RE	22.4	450
维生素D	μg	0.60	12.0
维生素E	mg α-TE	0.22	4.45
维生素K ₁	μg	1.25	25.2
维生素B ₁	μg	17.4	350
维生素B ₂	μg	25.8	518
维生素B ₆	μg	13.7	275
维生素B ₁₂	μg	0.051	1.03
烟酸	μg	137	2750
叶酸	μg	3.01	60.5
泛酸	μg	119	2400
维生素C	mg	3.14	63.2
生物素	μg	0.51	10.2
胆碱	mg	5.97	120
矿物质			
钠	mg	7.76	156
钾	mg	22.4	450
铜	μg	10.4	210
镁	mg	1.49	30.0
铁	mg	0.30	6.00
锌	mg	0.15	3.02
锰	μg	1.98	39.8
钙	mg	21.7	437
磷	mg	12.7	255
碘	μg	4.29	86.3
氯	mg	15.5	312
硒	μg	0.60	12.1
可选择成分			
二十二碳六烯酸	mg	4.48	90.1
二十碳四烯酸	mg	5.37	108
低聚半乳糖	g	0.13	2.70
低聚果糖	g	0.015	0.30
叶黄素	μg	8.55	172
核苷酸	mg	1.02	20.5

配料表/Ingredients

脱盐乳清粉（来源羊乳）、食用植物调和油（玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油）、全脂羊乳粉、低聚半乳糖、奶油、橄榄油、低聚果糖、磷脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、混合生育酚浓缩物、植物甲萘醒、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氯钴胺、烟酰胺、D-泛酸钙、叶酸、D-生物素、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、硫酸亚铁、硫酸锌、碘酸钾、硫酸铜、硫酸锰、亚硒酸钠、硫酸镁、碳酸钙、磷酸氢二钙、柠檬酸钠、柠檬酸钾、氯化钾、磷酸三钙、二十二碳六烯酸、花生四烯酸、叶黄素、核苷酸（5'-肌苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷）、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12

过敏原信息：本产品含有乳制品、大豆制品。

产品信息/Product information

产品类别及属性：乳基粉状较大婴儿配方食品

产品标准号：GB 10766-2021
生产日期、批号及保质期至：见罐底 保质期：24个月
生产商：北安宜品努卡乳业有限公司(A)
地址：黑龙江省黑河市北安市铁西区工业园区
产地：黑龙江·黑河
食品生产许可证编号：SC10523118150120
生产商：黑龙江欧贝嘉营养食品有限公司(C)
地址：黑龙江省伊春市铁力市西河生态工业园区
产地：黑龙江·伊春
食品生产许可证编号：SC10523078101249
(具体生产商/产地见生产日期末端代码)
销售及咨询热线：400-6869-619



扫码领取更多福利 6 947213 581978 >

小羊2-4

宜品®

小羊姐姐 幼儿配方羊奶粉 (12-36月龄, 3段)

喂哺建议表/Feeding Recommendations		
年龄	每次喂哺量	每日喂哺次数
温开水量(ml)	量勺数(平勺)	
12-36月	210	7
		2-3

⚠ 每平勺奶粉约4.5克, 每100mL奶液=90mL温开水+13.5g粉。



- 消毒: 将喂哺器具放入沸水中煮5分钟进行消毒;
- 冷却沸水: 饮用水煮沸后, 冷却至45°C-50°C,
- 参照喂哺建议表, 在奶杯中加入适量的水;
- 加入奶粉: 参照喂哺建议表, 使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶杯中;
- 搅拌: 将奶粉搅拌至充分溶解;
- 测温: 当奶液温度适宜时即可进行喂哺;
- 清洗: 喂哺后剩余奶液请丢弃, 清洗喂哺器具。

贮存说明/Storage		
· 本品应存放在阴凉干燥通风处。		
· 奶粉冲调后请务必盖严, 切记! 请勿放入冰箱内保存。		
· 开罐后请在一个月内食用完。		



- 温馨提示/Courtesy Reminder**
- 母乳喂养永远是最好的喂养方式, 在母乳不足或无母乳时可食用本产品;
 - 请勿擅自改变奶的浓度, 浓度不恰当宝宝会得不到适当的营养;
 - 冲调奶粉时, 如有奶粉泡沫或挂壁均属正常现象, 请放心食用;
 - 奶粉冲调好后, 待温度适宜时给宝宝食用, 喂哺剩余的奶液请丢弃, 勿留于下次食用;
 - 宝宝在两餐之间要适当补充水。



营养成分表/Nutrition Information

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1995
蛋白质	g	0.66	13.1
脂肪	g	1.06	21.2
亚油酸	g	0.16	3.12
α-亚麻酸	mg	15.1	302
碳水化合物	g	2.84	56.7
维生素			
维生素A	μg RE	22.6	451
维生素D	μg	0.60	12.0
维生素E	mg α-TE	0.23	4.52
维生素K ₁	μg	1.29	25.8
维生素B ₁	μg	17.6	351
维生素B ₂	μg	26.1	520
维生素B ₆	μg	13.8	276
维生素B ₁₂	μg	0.053	1.06
烟酸	mg	140	2800
叶酸	μg	3.10	61.8
泛酸	μg	120	2403
维生素C	mg	3.01	60.0
生物素	μg	0.52	10.3
矿物质			
钠	mg	6.12	122
镁	mg	21.3	425
钙	mg	8.62	172
铁	mg	1.75	35.0
锌	mg	0.30	6.03
钙	mg	0.13	2.51
磷	mg	21.3	425
碘	mg	13.0	260
氯	μg	1.81	36.1
可选择成分			
硒	μg	0.61	12.2
胆碱	mg	6.02	120
锰	μg	1.76	35.2
二十二碳六烯酸	mg	4.04	80.6
二十碳四烯酸	mg	4.52	90.1
低聚半乳糖	g	0.14	2.70
低聚果糖	g	0.015	0.30
叶黄素	μg	8.77	175
核苷酸	mg	1.02	20.3

脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、全脂羊乳粉、脱脂羊乳粉、低聚半乳糖、奶油、橄榄油、低聚果糖、磷脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、混合生育酚浓缩物、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、D-泛酸钙、叶酸、D-生物素、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、硫酸亚铁、硫酸锌、磷酸钾、硫酸铜、硫酸镁、亚硒酸钠、硫酸镁、碳酸钙、磷酸氢钙、柠檬酸钾、柠檬酸钠、氯化钾、磷酸三钙、二十二碳六烯酸、花生四烯酸、叶黄素、核苷酸(5'-肌苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12

过敏原信息: 本产品含有乳制品、大豆制品。

产品信息/Product information

产品类别及属性: 乳基粉状 幼儿配方食品
产品标准号: GB 10767-2021
生产日期、批号及保质期: 见罐底 保质期: 18个月
生产商: 北安宜品努卡乳业有限公司(A)
地址: 黑龙江省黑河市北安市铁西区工业园区
产地: 黑龙江·黑河
食品生产许可证编号: SC10523118150120
生产商: 黑龙江欧贝嘉营养食品有限公司(C)
地址: 黑龙江省伊春市铁力市西河生态工业园区
产地: 黑龙江·伊春
食品生产许可证编号: SC10523078101249
(具体生产商/产地见生产日期末端代码)
销售及咨询热线: 400-6869-619



扫码领取更多福利 6 947213 581916 >

喂哺建议表/Feeding Recommendations			
年龄	每次喂哺量 温开水量(ml)	量勺数(平勺)	每日喂哺次数
12-36月	210	7	2~3
△ 每平勺奶粉约4.5克,每100mL奶液=90mL温开水+13.5g粉。			



1. 消毒: 将喂哺器具放入沸水中煮5分钟进行消毒;
2. 冷却沸水: 饮用水煮沸后, 冷却至45°C~50°C, 参照
喂哺建议表, 在奶杯中加入适量的水;
3. 加入奶粉: 参照喂哺建议表, 使用专用量勺将正确的
奶粉量加入奶杯中;
4. 搅拌: 将奶粉搅拌至充分溶解;
5. 测温: 当奶液温度适宜时即可进行喂哺;
6. 清洗: 喂哺后剩余奶液请丢弃, 清洗喂哺器具。

贮存说明/Storage			
· 本品应存放在阴凉干燥通风处。			
· 奶粉冲调后请务必盖严, 切记! 请勿放入冰箱内保存。			
· 开罐后请在一个月内食用完。			



温馨提示/Courtesy Reminder

- 母乳喂养永远是最好的喂养方式, 在母乳不足或无母乳时可食用本产品;
- 请勿擅自改变奶的浓度, 浓度不恰当宝宝会得不到适当的营养;
- 冲调奶粉时, 如有奶粉泡沫或挂壁均属正常现象, 请放心食用;
- 奶粉冲调好后, 待温度适宜时给宝宝食用, 喂哺剩余的奶液请丢弃, 勿留于下次食用;
- 宝宝在两餐之间要适当补充水。

宜品®

小羊姐姐 幼儿配方羊奶粉 (12-36月龄, 3段)



营养成分表/Nutrition Information

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1995
蛋白质	g	0.66	13.1
脂肪	g	1.06	21.2
亚油酸	g	0.16	3.12
α-亚麻酸	mg	15.1	302
碳水化合物	g	2.84	56.7
维生素			
维生素A	μg RE	22.6	451
维生素D	μg	0.60	12.0
维生素E	mg α-TE	0.23	4.52
维生素K ₁	μg	1.29	25.8
维生素B ₁	μg	17.6	351
维生素B ₂	μg	26.1	520
维生素B ₆	μg	13.8	276
维生素B ₁₂	μg	0.053	1.06
烟酸	μg	140	2800
叶酸	μg	3.10	61.8
泛酸	μg	120	2403
维生素C	mg	3.01	60.0
生物素	μg	0.52	10.3
矿物质			
钠	mg	6.12	122
钾	mg	21.3	425
铜	μg	8.62	172
镁	mg	1.75	35.0
铁	mg	0.30	6.03
锌	mg	0.13	2.51
钙	mg	21.3	425
磷	mg	13.0	260
碘	μg	1.81	36.1
氯	mg	14.0	279
可选择成分			
硒	μg	0.61	12.2
胆碱	mg	6.02	120
锰	μg	1.76	35.2
二十二碳六烯酸	mg	4.04	80.6
二十碳四烯酸	mg	4.52	90.1
低聚半乳糖	g	0.14	2.70
低聚果糖	g	0.015	0.30
叶黄素	μg	8.77	175
核苷酸	mg	1.02	20.3

配料表/Ingredients
脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、全脂羊乳粉、脱脂羊乳粉、低聚半乳糖、奶油、橄榄油、低聚果糖、磷脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚浓缩物、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氯钴胺、烟酰胺、D-泛酸钙、叶酸、D-生物素、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、硫酸亚铁、硫酸锌、碘酸钾、硫酸铜、硫酸锰、亚硒酸钠、硫酸镁、碳酸钙、磷酸氢钙、柠檬酸钾、柠檬酸钠、氯化钾、磷酸三钙、二十二碳六烯酸、花生四烯酸、叶黄素、核苷酸(5'-肌苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12

过敏原信息: 本产品含有乳制品、大豆制品。

产品信息/Product Information

产品类别及属性: 乳基粉状幼儿配方食品
产品标准号: GB 10767-2021
生产日期、批号及保质期至: 见罐底 保质期: 24个月
生产商: 北安宜品努卡乳业有限公司(A)
地址: 黑龙江省黑河市北安市铁西区工业园区
产地: 黑龙江·黑河
食品生产许可证编号: SC10523118150120
生产商: 黑龙江欧嘉营养食品有限公司(C)
地址: 黑龙江省伊春市铁力市西河生态工业园区
产地: 黑龙江·伊春
食品生产许可证编号: SC10523078101249
(具体生产商/产地见生产日期末端代码)
销售及咨询热线: 400-6869-619



扫码领取更多福利 6 947213 581961 >

小羊3-4

喂哺建议表/Feeding Recommendations			
年龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水量(ml)	量勺数(平勺)	
12~36月	210	7	2-3
△ 每勺奶粉约4.5克,每100mL奶液=90mL温开水+13.5g粉。			



1. 消毒：将喂哺器具放入沸水中5分钟进行消毒；
2. 冷却沸水：饮用水煮沸后，冷却至45°C~50°C，参照喂哺建议表，在奶杯中加入适量的水；
3. 加入奶粉：参照喂哺建议表，使用专用量勺将正确的奶粉量加入奶杯中；
4. 搅拌：将奶粉搅拌至充分溶解；
5. 测温：当奶液温度适宜时即可进行喂哺；
6. 清洗：喂哺后剩余奶液请丢弃，清洗喂哺器具。

贮存说明/Storage

- 本品应存放在阴凉干燥通风处。
- 奶粉开罐后请务必盖严，切记！请勿放入冰箱内保存。
- 开罐后请在一个月内食用完。



温馨提示/Courtesy Reminder

- 母乳喂养永远是最好的喂养方式，在母乳不足或无母乳时可食用本产品；
- 请勿擅自改变奶的浓度，浓度不恰当时宝宝会得不到适当的营养；
- 冲调奶粉时，如有奶粉泡沫或挂壁均属正常现象，请放心食用；
- 奶粉冲调好后，待温度适宜时给宝宝食用，喂哺剩余的奶液请丢弃，勿留于下次食用；
- 宝宝在两餐之间要适当补充水。

宜品®

小羊姐姐 幼儿配方羊奶粉 (12-36月龄, 3段)



净含量: 800克
国食注字YP20240064

营养成分表/Nutrition Information			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1995
蛋白质	g	0.66	13.1
脂肪	g	1.06	21.2
亚油酸	g	0.16	3.12
DHA	mg	15.1	302
碳水化合物	g	2.84	56.7
维生素			
维生素A	μg RE	22.6	451
维生素D	μg	0.60	12.0
维生素E	mg α-TE	0.23	4.52
维生素K ₁	μg	1.29	25.8
维生素B ₁	μg	17.6	351
维生素B ₂	μg	26.1	520
维生素B ₆	μg	13.8	276
维生素B ₁₂	μg	0.053	1.06
烟酸	μg	140	2800
叶酸	μg	3.10	61.8
泛酸	μg	120	2403
维生素C	mg	3.01	60.0
生物素	μg	0.52	10.3
矿物质			
钠	mg	6.12	122
钾	mg	21.3	425
铜	μg	8.62	172
镁	mg	1.75	35.0
铁	mg	0.30	6.03
锌	mg	0.13	2.51
钙	mg	21.3	425
磷	mg	13.0	260
碘	μg	1.81	36.1
氯	mg	14.0	279
可选择成分			
硒	μg	0.61	12.2
胆碱	mg	6.02	120
锰	μg	1.76	35.2
二十二碳六烯酸	mg	4.04	80.6
二十碳四烯酸	mg	4.52	90.1
低聚半乳糖	g	0.14	2.70
低聚果糖	g	0.015	0.30
叶黄素	μg	8.77	175
核苷酸	mg	1.02	20.3

配料表/Ingredients			
脱盐乳清粉（来源羊乳）、食用植物调和油（玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油）、全脂羊乳粉、脱脂羊乳粉、低聚半乳糖、奶油、橄榄油、低聚果糖、磷脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、混合生育酚浓缩物、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氯化胆碱、烟酰胺、D-泛酸钙、叶酸、D-生物素、L-抗坏血酸钠、氯化胆碱、硫酸亚铁、硫酸锌、碘酸钾、硫酸铜、硫酸镁、亚硒酸钠、硫酸镁、碳酸钙、磷酸氢钙、柠檬酸钾、柠檬酸钠、氯化钾、磷酸三钙、二十二碳六烯酸、花生四烯酸、叶黄素、核苷酸（5'-肌苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷）、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12			

过敏原信息：本产品含有乳制品、大豆制品。

产品信息/Product information

产品类别及属性：乳基粉状 幼儿配方食品
产品标准号：GB 10767-2021
生产日期、批号及保质期至：见罐底 保质期：24个月
生产商：北安宜品努卡乳业有限公司(A)
地址：黑龙江省黑河市北安市铁西区工业园区
产地：黑龙江·黑河
食品生产许可证编号：SC10523118150120
生产商：黑龙江欧贝嘉营养食品有限公司(C)
地址：黑龙江省伊春市铁力市西河生态工业园区
产地：黑龙江·伊春
食品生产许可证编号：SC10523078101249
(具体生产商/产地见生产日期末端代码)
销售及咨询热线：400-6869-619



扫码领取更多福利 6 947213 581923 >

小羊3-8