

变版后- 爱美乐臻护婴儿配方奶粉（0-6月龄，1段）



1

营养成分表			
项目	单位	每100g	每100kJ
能量	kJ	2033	100
蛋白质	g	11.0	0.54
脂肪	g	24.2	1.19
碳水化合物	g	1.94	0.10
α-亚麻酸	mg	327	16
维生素A	μg RE	382	19
维生素D	μg	12.8	0.63
维生素E	mg α-TE	3.2	0.16
维生素K ₁	μg	27.4	1.35
维生素B ₁	μg	374	18
维生素B ₂	μg	515	25
维生素B ₆	μg	231.4	11.4
维生素B ₁₂	μg	0.698	0.034
叶酸	μg	2580	127
胆碱	mg	76.4	3.8
泛酸	μg	2650	130
维生素C	mg	66.5	3.3
生物素	μg	10.7	0.53
胆碱	mg	125	6.1
矿物质			
钠	mg	183	9
钾	mg	447	22
铜	μg	369	18.2
镁	mg	32.5	1.6
铁	mg	2.85	0.14
锌	mg	3.2	0.16
锰	μg	32.6	1.60
钙	mg	325	16
磷	mg	175	9
碘	μg	96.6	4.8
硒	μg	324	16
维生素	μg	19.7	0.97
可选择成分			
肌醇	mg	28.4	1.4
牛磺酸	mg	28	1.4
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	80	3.9
二十二碳四烯酸(ARA)	mg	100	4.9
低聚果糖	mg	477	23
低聚半乳糖	mg	2999	148
核苷酸	mg	15.2	0.75
乳铁蛋白	mg	42	2.1

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油、玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、乳糖、低聚果糖(FOS)、低聚半乳糖(GOS)、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、浓缩乳清蛋白粉、乳铁蛋白、核苷酸(5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠)、5'-腺苷酸二钠、维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B(盐酸硫胺素)、维生素B₁₂(维生素B₁₂)、维生素B₆(维生素B₆)、维生素B₂(维生素B₂)、维生素B₃(烟酰胺)、维生素B₅(泛酸)、维生素B₇(生物素)、维生素C(抗坏血酸)、D-生物素、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、碳酸钾、磷酸三钙、硫酸亚铁、硫酸锌、碘酸钾、硫酸铜、硫酸锰、亚硒酸钠、柠檬酸钠、氯化钾。

冲调方法

1. 冲调前请洗净双手；将奶瓶、奶嘴及奶嘴盖彻底清洗干净。

2. 将奶具放在沸水中煮至5分钟，备用。

3. 将沸水冷却至50℃-60℃，将正确水量加入奶瓶中。

4. 按《喂哺表》说明，用专用量匙将准确量奶粉加入奶瓶中(取奶粉时，请勿刻意压实)。

5. 将奶瓶盖紧后摇晃至完全溶解。喂哺前将奶液滴二、三滴于内手腕测试温度，以不烫手为宜。

爱美乐



婴儿配方奶粉
(0-6月龄, 1段)

净含量: 800克 · 国食注字YP20230439

喂哺表

婴儿月龄	每次用量	每24小时喂哺次数
2-14天	60	2
3-8周	120	4
2-3个月	120	4
3-6个月	180	6

* 盖内附赠专用量匙

注意事项

标准稀释法：一平匙奶粉(约4.5克)兑30毫升水。

请按《喂哺表》喂哺。请不要擅自改变冲调比例，不恰当的冲调不利于婴儿的健康。

请勿使用沾有水的量匙取奶粉。

冲调后请马上给婴儿喂哺，或盖紧奶瓶并储存在温度为2-4℃的冰箱中，冷藏时间不得超过24小时，如果冲调后的配方奶粉超过2小时未予冷藏，则不能再食用。

请勿将冲调好的配方奶粉冻结。

开始喂哺后，奶瓶内的配方奶粉必须在1小时内用完。未用完的配方奶粉必须倒掉，不能再进行冷藏。

贮藏方法

本品应存放在阴凉、干燥处，开启后请将开口封严，并在一个月内用完。开封后请勿放入冰箱储存，请在保质期内食用此产品。

重要说明

对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

本品为乳基粉状婴儿配方食品，牛奶蛋白过敏者勿用。

制造商：大庆乳品厂有限责任公司
公司地址：黑龙江省大庆市高新区安萨路18公里处
产地：黑龙江省大庆市
邮编：163311
生产许可证号：SC10523060250637
销售热线：0459-6030306
售后服务：0459-6030666
产品执行标准：GB 10765-2021
产品类别：乳基婴儿配方奶粉
保质期：24个月
生产日期(批号)：见罐底

400-707-5116
产品咨询热线
<http://www.daqingdairy.com>

1001-1

变版前- 爱美乐臻护婴儿配方奶粉（0-6月龄，1段）

营养成分表

项目	单位	每100g	每100kJ
能量	kJ	2033	100
蛋白质	g	11.0	0.54
脂肪	g	24.2	1.19
亚油酸	g	1.94	0.10
α-亚麻酸	mg	327	16
碳水化合物	g	54.3	2.7
维生素A	μg RE	382	19
维生素D	μg	12.8	0.63
维生素E	mg α-TE	3.2	0.16
维生素K ₁	μg	27.4	1.35
维生素B ₁	μg	374	18
维生素B ₂	μg	515	25
维生素B ₆	μg	231.4	11.4
维生素B ₁₂	μg	0.698	0.034
烟酸(烟酰胺)	μg	2580	127
叶酸	μg	76.4	3.8
泛酸	μg	2650	130
维生素C	mg	66.5	3.3
生物素	μg	10.7	0.53
胆碱	mg	125	6.1
矿物质			
钠	mg	183	9
钾	mg	447	22
钙	μg	369	18.2
镁	mg	32.5	1.6
铁	mg	2.85	0.14
锌	mg	3.2	0.16
铜	μg	32.6	1.60
锰	mg	325	16
碘	mg	175	9
硒	μg	96.6	4.8
铬	μg	324	16
钼	μg	19.7	0.97
可选择成分			
肌醇	mg	28.4	1.4
牛磺酸	mg	28	1.4
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	80	3.9
二十碳四烯酸(ARA)	mg	100	4.9
低聚半乳糖	mg	477	23
低聚果糖	mg	2999	148
核苷酸	mg	15.2	0.75
乳铁蛋白	mg	42	2.1

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油)、乳糖、低聚果糖(FOS)、低聚半乳糖(GOS)、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、浓缩乳清蛋白粉、乳铁蛋白、核苷酸(5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-腺苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠)、维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(抗坏血酸)、D-生物素、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、微晶纤维素、磷酸三钙、硫酸锌、硫酸亚铁、硫酸铜、碘酸钾、硫酸钾、硫酸锰、亚硫酸钠、柠檬酸钠、氯化钾。

冲调方法

1

冲调前请洗净双手；将奶瓶、奶嘴及奶瓶盖彻底清洗干净。

2

将奶具放在沸水中煮至5分钟，备用。

3

将沸水冷却至50℃~60℃，将正确水量加入奶瓶中。

4

按《喂哺表》说明，用专用量匙将准确量奶粉加入奶瓶中(取奶粉时，请勿压实)。

5

将奶瓶摇晃后摇匀至完全溶解。喂哺前将奶液滴二、三滴于内手腕测试温度，以不烫手为宜。

爱美乐®

爱

美

乐

臻

护

1

婴儿配方奶粉

(0-6月龄, 1段)

净含量: 800克 · 国食注字YP20230439

喂哺表

婴儿月龄	每次用量		每24小时喂哺次数
	温开水量(毫升)	量匙匙数	
2-14天	60	2	8
3-8周	120	4	6
2-3个月	120	4	6
3-6个月	180	6	5

* 盖内附赠专用量匙

贮藏方法

本品应存放在阴凉、干燥处，开启后请将开口封严，并在一个月内用完。开封后请勿放入冰箱储存，请在保质期内食用此产品。

重要说明

对于0-6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

本品为乳基粉状婴儿配方食品，牛奶蛋白过敏者勿用。

制造商：大庆乳品厂有限责任公司
公司地址：黑龙江省大庆市高新区安萨路18公里处
产地：黑龙江省大庆市
邮编：163311
生产许可证号：SC10523060250637
销售热线：0459-6030306
售后服务：0459-6030666
产品执行标准：GB 10765-2021
产品类别：乳基婴儿配方奶粉
保质期：24个月
生产日期(批号)：见罐底

注意事项

标准稀释法：一平匙奶粉(约4.6克)兑30毫升水。

请按《喂哺表》喂哺。请不要擅自改变冲调比例，不恰当的冲调不利于婴儿的健康。

请勿使用沾有水的量匙取奶粉。

冲调后请马上给婴儿喂哺，或盖紧奶瓶并储存在温度为2-4℃的冰箱中，冷藏时间不得超过24小时，如果冲调后的配方奶粉超过2小时未予冷藏，则不能再食用。

请勿将冲调好的配方奶粉冻结。

开始喂哺后，奶瓶内的配方奶粉必须在1小时内用完。未用完的配方奶粉必须倒掉，不能再进行冷藏。

400-707-5116

产品咨询热线

http://www.daqingdairy.com

6 907121 213125

变版后- 爱美乐臻护较大婴儿配方奶粉（6-12月龄，2段）



2

营养成分表			
项目	单位	每100g	每100kJ
能量	kJ	2007	100
蛋白质	g	12.0	0.60
脂肪	g	22.8	1.14
亚油酸	g	2.7	0.13
α-亚麻酸	mg	439	22
碳水化合物	g	54.8	2.7
维生素			
维生素A	μg RE	472	24
维生素D	μg	13.4	0.67
维生素E	mg α-TE	3.92	0.20
维生素K ₁	μg	27	1.35
维生素B ₁	μg	375	19
维生素B ₂	μg	500	25
维生素B ₆	μg	315	15.7
维生素B ₁₂	μg	1.06	0.053
烟酸(烟酰胺)	μg	3125	156
叶酸	μg	67	3.3
泛酸	μg	2450	122
维生素C	mg	62.6	3.1
生物素	μg	10.6	0.53
胆碱	mg	126	6.3
矿物质			
钠	mg	70	3
钾	mg	440	22
钙	μg	225	11.2
镁	mg	32.1	1.6
铁	mg	6.65	0.33
锌	mg	3.14	0.16
铜	μg	38.6	1.92
锰	mg	378	19
磷	mg	225	11
碘	μg	91	4.5
硒	μg	167	8
氯	μg	12.6	0.63
可选择成分			
肌醇	mg	29.2	1.5
牛磺酸	mg	27	1.3
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	80	4.0
二十碳四烯酸(ARA)	mg	100	5.0
低聚果糖	mg	450	22
低聚半乳糖	mg	3000	149
核苷酸	mg	27	1.3
乳铁蛋白	mg	43	2.1

配料表	
生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油、玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、乳糖、低聚果糖(FOS)、低聚半乳糖(GOS)、花生四烯酸(ARA)、浓缩乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸(DHA)、乳铁蛋白、核苷酸(5-核苷酸腺苷、5'-核苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠)、维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B ₁ (盐酸硫胺素)、维生素B ₂ (核黄素)、维生素B ₆ (盐酸吡哆醇)、维生素B ₁₂ (氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸)、D-生物素、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、磷酸钙、磷酸三钙、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸铜、硫酸钾、硫酸钠、硫酸锰、亚硫酸钠、柠檬酸钾。	

冲调方法	
1	冲调前请洗净双手；将奶瓶、奶嘴及奶瓶盖彻底清洗干净。
2	将奶具放在沸水中煮至5分钟，备用。
3	将沸水冷却至50℃~60℃，将正确水量加入奶瓶中。
4	按《喂哺表》说明，用专用量匙将准确量奶粉加入奶瓶中(取奶粉时，请勿刻意压平)。
5	将奶瓶盖紧后摇晃至完全溶解。喂哺前将奶液滴二、三滴于内手腕测试温度，以不烫手为宜。

爱美乐



较大婴儿配方奶粉
(6-12月龄, 2段)

净含量: 800克 · 国食注字YP20230440

喂哺表		
较大婴儿月龄	每次用量	每24小时喂哺次数
6-12个月	240	8

* 盖内附赠专用量匙

贮藏方法	
本品应存放在阴凉、干燥处，开启后请将开口封严，并在一个月内用完。开封后请勿放入冰箱储存，请在保质期内食用此产品。	

重要说明	
较大婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。	
本品为乳基粉状较大婴儿配方食品，牛奶蛋白过敏者勿用。	

注意事项	
标准稀释法：一平匙奶粉(约4.5克)兑30毫升水。	
请按《喂哺表》喂哺。请不要擅自改变冲调比例，不恰当的冲调不利于较大婴儿的健康。	
请勿使用沾有水的量匙取奶粉。	
冲调后请马上给较大婴儿喂哺，或盖紧奶瓶并储存在温度为2-4℃的冰箱中，冷藏时间不得超过24小时。如果冲调后的配方奶粉超过2小时未予冷藏，则不能再食用。	
请勿将冲调好的配方奶粉冻结。	
开始喂哺后，奶瓶内的配方奶粉必须在1小时内用完。未用完的配方奶粉必须倒掉，不能再进行冷藏。	

400-707-5116
产品咨询热线
http://www.daqingdairy.com

6 907121 213132

1002-1

变版前- 爱美乐臻护较大婴儿配方奶粉（6-12月龄，2段）

营养成分表

项目	单位	每100g	每100kJ
能量	kJ	2007	100
蛋白质	g	12.0	0.60
脂肪	g	22.8	1.14
碳水化合物	g	2.7	0.13
α-亚麻酸	mg	439	22
碳水化合物	g	54.8	2.7
维生素A	μg RE	472	24
维生素D	μg	13.4	0.67
维生素E	mg α-TE	3.92	0.20
维生素K ₁	μg	27	1.35
维生素B ₁	μg	375	19
维生素B ₂	μg	500	25
维生素B ₆	μg	315	15.7
维生素B ₁₂	μg	1.06	0.053
叶酸(烟酰胺)	μg	3125	156
叶酸	μg	67	3.3
泛酸	μg	2450	122
维生素C	mg	62.6	3.1
生物素	μg	10.6	0.53
胆碱	mg	126	6.3
矿物质			
钠	mg	70	3
钾	mg	440	22
钙	mg	225	11.2
镁	mg	32.1	1.6
铁	mg	6.65	0.33
锌	mg	3.14	0.16
铜	μg	38.6	1.92
锰	μg	378	19
磷	mg	225	11
碘	μg	91	4.5
硒	μg	167	8
可溶性成分			
肌醇	mg	29.2	1.5
牛磺酸	mg	27	1.3
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	80	4.0
二十碳四烯酸(ARA)	mg	100	5.0
低聚半乳糖	mg	450	22
低聚果糖	mg	3000	149
核苷酸	mg	27	1.3
乳铁蛋白	mg	43	2.1

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油)、乳糖、低聚果糖(FOS)、低聚半乳糖(GOS)、花生四烯酸(ARA)、浓缩乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸(DHA)、乳铁蛋白、核苷酸(5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷二核苷酸、5'-鸟苷二核苷酸、5'-尿苷二核苷酸)、维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酰胺(烟酸)、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(抗坏血酸)、D-生物素、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、磷酸钙、磷酸三钙、磷酸亚铁、磷酸钾、磷酸钠、磷酸钾、磷酸钠、磷酸钾、亚磷酸钠、柠檬酸钾。

冲调方法

- 冲调前请洗净双手；将奶瓶、奶嘴及奶嘴盖彻底清洗干净。
- 将奶具放在沸水中煮至5分钟，备用。
- 将沸水冷却至50℃-60℃，将正确水量加入奶瓶中。
- 按《喂哺表》说明，用专用量匙将准确量奶粉加入奶瓶中(取奶粉时，请勿刻意压实)。
- 将奶瓶盖紧后摇晃至完全溶解。喂哺前将奶液滴二、三滴于内手腕测试温度，以不烫手为宜。

爱美乐®

爱美乐臻护

2 较大婴儿配方奶粉 (6-12月龄, 2段)

净含量: 800克 · 国食注字 YP20230440

喂哺表

较大婴儿月龄	每次用量		每24小时喂哺次数
	每次水量 (毫升)	奶粉量 (克)	
6-12个月	240	8	4

* 罐内附赠专用量匙

贮藏方法

本品应存放在阴凉、干燥处，开启后将开口封严，并在一个月内用完。开封后请勿放入冰箱储存，请在保质期内食用此产品。

重要说明

较大婴儿食用本产品时，须配合添加辅食食品。

本品为乳基粉状较大婴儿配方食品，牛奶蛋白过敏者勿用。

制造商：大庆乳品厂有限责任公司
公司地址：黑龙江省大庆市高新区安萨路18公里处
产地：黑龙江省大庆市
邮编：163311
生产许可证号：SC10523060250637
销售热线：0459-6030306
售后服务：0459-6030666
产品执行标准：GB 10766-2021
产品类别：乳基较大婴儿配方奶粉
保质期：24个月
生产日期(批号)：见罐底

注意事项

标准稀释法：一平匙奶粉(约4.5克)兑30毫升水。

请按《喂哺表》喂哺。请不要擅自改变冲调比例，不恰当的冲调不利于较大婴儿的健康。

请勿使用沾有水的量匙取奶粉。

冲调后请马上给较大婴儿喂哺，或盖紧奶瓶并储存在温度为2-4℃的冰箱中，冷藏时间不得超过24小时。如果冲调后的配方奶粉超过2小时未予冷藏，则不能再食用。

请勿将冲调好的配方奶粉冻结。

开始喂哺后，奶瓶内的配方奶粉必须在1小时内用完。未用完的配方奶粉必须倒掉，不能再进行冷藏。

400-707-5116

产品咨询热线

http://www.daqingdairy.com

6 907121 213132



变版后- 爱美乐臻护幼儿配方奶粉（12-36月龄，3段）



3

营养成分表			
项目	单位	每100g	每100kJ
能量	kJ	1997	100
蛋白质	g	13.2	0.66
脂肪	g	22.4	1.12
亚油酸	g	2.7	0.14
α-亚麻酸	mg	433	22
碳水化合物	g	53.9	2.7
维生素			
维生素A	μg RE	486	24
维生素D	μg	12.9	0.65
维生素E	mg α-TE	4.01	0.20
维生素K ₁	μg	28	1.40
维生素B ₁	μg	375	19
维生素B ₂	μg	495	25
维生素B ₆	μg	316	15.8
维生素B ₁₂	μg	1.08	0.054
烟酸(烟酰胺)	μg	3135	157
叶酸	μg	69	3.5
泛酸	μg	2488	125
维生素C	mg	68.8	3.4
生物素	μg	10.7	0.54
矿物质			
钙	mg	124	6
镁	mg	495	25
钠	μg	235	11.8
钾	mg	37.5	1.9
磷	mg	6.75	0.34
氯	mg	2.8	0.14
硫	mg	426	21
锌	mg	244	12
铜	μg	43.5	2.2
锰	mg	200	10
可选择成分			
胆碱	μg	12.4	0.62
肌醇	mg	129	6.5
牛磺酸	μg	68	3.40
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	33.3	1.7
二十碳四烯酸(EPA)	mg	28	1.4
低聚果糖	mg	40	2.0
低聚半乳糖	mg	41	2.1
低聚果糖	mg	497	25
低聚半乳糖	mg	3000	150
低聚果糖	mg	28	1.4
低聚半乳糖	mg	44	2.2

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物油和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油)、乳糖、低聚果糖(FOS)、浓缩乳清蛋白粉、低聚半乳糖(GOS)、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、乳铁蛋白、核苷酸(5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二核苷酸、5'-鸟苷酸二核苷酸、5'-尿苷酸二核苷酸)、维生素A(视黄醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素E(d-α-生育酚)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、D-泛酸钙、维生素C(L-抗坏血酸)、D-生物素、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、碳酸钾、硫酸亚铁、硫酸锌、磷酸钾、磷酸铜、硫酸锰、亚硒酸钠、柠檬酸钾。

生牛乳加工

冲调方法

1 冲调前请洗净双手；将奶瓶、奶嘴及奶盖彻底清洗干净。

2 将奶具放在沸水中煮至5分钟，备用。

3 将沸水冷却至50℃-60℃，将正确水量加入奶瓶中。

4 按《喂哺表》说明，用专用量匙将准确量奶粉加入奶瓶中(取奶粉时，请勿刻意压平)。

5 将奶瓶盖紧后摇匀至完全溶解。喂哺前将奶液滴二、三滴于内手腕测试温度，以不烫手为宜。

爱美乐®

爱美乐臻护

3

幼儿配方奶粉
(12-36月龄,3段)

净含量:800克·国食注字YP20230441

喂哺表

幼儿月龄	每次用量		每24小时喂哺次数
	温开水(毫升)	量匙数	
12-36个月	240	8	2-3

* 瓶内附赠专用量匙

注意事项

标准稀释法:一平匙奶粉(约4.5克)兑30毫升水。

请按《喂哺表》喂哺。请不要擅自改变冲调比例，不当的冲调不利于幼儿的健康。

请勿使用沾有水的量匙取奶粉。

冲调后请马上给幼儿喂哺，或盖紧奶瓶并储存在温度为2-4℃的冰箱中，冷藏时间不得超过24小时，如果冲调后的配方奶粉超过2小时未予冷藏，则不能再食用。

请勿将冲调好的配方奶粉冻结。

开始喂哺后，奶瓶内的配方奶粉必须在1小时内用完。未用完的配方奶粉必须倒掉，不能再进行冷藏。

400-707-5116
产品咨询热线
http://www.doqingdairy.com

贮藏方法

本品应存放在阴凉、干燥处，开启后请将开口封严，并在一个月内用完。开封后请勿放入冰箱储存，请在保质期内食用此产品。

重要说明

本品为乳基粉状幼儿配方食品，牛奶蛋白过敏者勿用。

制造商: 大庆乳品厂有限责任公司
公司地址: 黑龙江省大庆市高新区安萨路18公里处
产地: 黑龙江省大庆市
邮编: 163311
生产许可证号: SC10523060250637
销售热线: 0459-6030306
售后服务: 0459-6030666
产品执行标准: GB 10767-2021
产品类别: 乳基幼儿配方奶粉
保质期: 24个月
生产日期(批号): 见罐底

6 907121 213149

1003-1



爱美乐臻护

3 幼儿配方奶粉
(12-36月龄, 3段)

净含量:800克·国食注字YP20230441

贮藏方法

5 将奶瓶盖紧后摇匀至完全溶解。
喂哺前将奶液滴二、三滴于内
手腕测试温度，以不烫手为宜。

400-707-5116
产品咨询热线
<http://www.daqingdairy.com>

制造商: 大庆乳品厂有限责任公司
 公司地址: 黑龙江省大庆市高新区
 安萨路18公里处
 产地: 黑龙江省大庆市
 邮编: 163311
 生产许可证号: SC10523060250637
 销售热线: 0459-6030306
 售后服务: 0459-6030666
 产品执行标准: GB 10767-2021
 产品类型: 乳基幼儿配方奶粉
 保质期: 24个月
 生产日期(批号): 见罐底

