

序号01

喂哺用量建议表

月龄	每次喂哺份量		每天喂哺次数
	温开水(毫升)	奶粉(平勺)	
1-2周	60	2	7-8
2周-1月龄	90	3	6
1-2月龄	120	4	5
2-4月龄	180	6	5
4-6月龄	210	7	4-5

冲调方法



1. 调奶之前,请洗净双手,将干净的奶瓶、奶嘴、奶瓶盖放入沸水中煮5分钟消毒。
2. 调奶时,用煮沸后冷却至45°C-50°C温开水,依照喂哺用量建议表,在消毒后的奶瓶中加入需要温开水量。
3. 依照喂哺用量建议表,用产品所配粉勺量取准确份量(平勺)的婴儿配方奶粉,加入奶瓶中。
4. 盖严奶瓶盖,轻摇至奶粉充分溶解,待温度适宜时,即可喂哺婴儿。

贮存条件

本品应贮藏于阴凉干燥处。每次取出奶粉后请务必封闭严密,以防止吸潮或进入异物,勿置于冰箱内,并于开启后四周内食用完。

制造商:青冈亚华乳多宝乳业有限公司
地址:青冈县中和镇(原乳粉厂院内)
产地:黑龙江省绥化市
产品类别及属性:乳基粉状婴儿配方食品
产品标准代号:GB 10765-2021
食品生产许可证编号:SC10523122302904
保质期:24个月
生产日期、保质期至、生产批号:见罐底

更多产品及服务请咨询(市话费)

400-109-8968

www.sijinanshan.com
service@avadairy.com



四季南山®

注册号:
国食注字:YP20170493



哆赋

婴儿配方奶粉 (0-6月龄,1段)

1段

净含量:800克

营养成分表

项目	单位	每100千焦	每100克
能量	kJ	100	2063
蛋白质	g	0.55	11.4
脂肪	g	1.22	25.1
亚油酸	g	0.20	4.1
α-亚麻酸	mg	20	407
碳水化合物	g	2.6	53.7
维生素			
维生素A	μg RE	20	404
维生素D	μg	0.63	13
维生素E	mg α-TE	0.19	4.0
维生素K ₁	μg	2.08	43
维生素B ₁	μg	20	412
维生素B ₂	μg	50	1022
维生素B ₆	μg	21.0	433
维生素B ₁₂	μg	0.092	1.9
烟酸(烟酰胺)	μg	163	3369
叶酸	μg	5.4	112
泛酸	μg	165	3408
维生素C	mg	3.3	69
生物素	μg	0.78	16
胆碱	mg	6.1	126
矿物质			
钠	mg	9	178
钾	mg	22	447
铜	μg	17.9	370
镁	mg	1.6	34
铁	mg	0.18	3.7
锌	mg	0.19	3.9
锰	μg	1.45	30
钙	mg	18	372
磷	mg	9	186
碘	μg	5.4	111
氯	mg	15	310
硒	μg	0.97	20
可选择成分			
肌醇	mg	1.7	36
牛磺酸	mg	1.2	24
左旋肉碱	mg	0.6	13
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.9	80
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.5	92
低聚半乳糖	mg	9	193
低聚果糖	mg	160	3296
核苷酸	mg	1.45	30

注:100毫升奶液≈13.5克奶粉+90毫升水(1平勺奶粉≈4.5克)。

配料

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、低聚果糖、脱脂奶粉、乳糖、花生四烯酸、无水奶油、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、磷脂、核苷酸(5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠)、左旋肉碱、牛磺酸、肌醇。

维生素:维生素C(L-抗坏血酸)、维生素E(DL-α-醋酸生育酚)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素A(醋酸视黄酯)、烟酸(烟酰胺)、泛酸(D-泛酸钙)、叶酸、维生素K₁(植物甲萘醌)、生物素(D-生物素)、维生素B₁(核黄素)、维生素B₂(盐酸硫胺素)、维生素B₁₂(氰钴胺)、氯化胆碱。

矿物质:氯化钾、柠檬酸钠、碳酸钾、磷酸三钙、硫酸镁、硫酸钾、硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰。

本产品含有乳糖和乳蛋白质,乳糖不耐受和乳蛋白过敏者慎用或遵医嘱。

爱心提示

对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

1. 喂奶时应抱着婴儿,如有疏忽可能会引起婴儿窒息或不适。
2. 水和奶瓶未经消毒或奶液浓度不当,可能会引起婴儿的不适。
3. 按照“喂哺用量建议表”的指示与冲调方法进行配制,每次调制一次用量并立即饮用,不要留存未喝完奶液。



清洁卫生
绿化环境




6 930713 600164

序号02

喂哺用量建议表

月龄	每次喂哺份量		每天喂哺次数
	温开水(毫升)	奶粉(平均)	次
1-2周	60	2	7-8
2周-1月龄	90	3	6
1-2月龄	120	4	5
2-4月龄	180	6	5
4-6月龄	210	7	4-5

冲调方法



1. 调奶之前,请洗净双手,将干净的奶瓶、奶嘴、奶瓶盖放入沸水中煮5分钟消毒。
2. 调奶时,用煮沸后冷却至45°C-50°C温开水,依照喂哺用量建议表,在消毒后的奶瓶中加入需要温开水量。
3. 依照喂哺用量建议表,用产品所配奶勺量取准确份量(平均)的婴儿配方奶粉,加入奶瓶中。
4. 盖严奶瓶盖,轻摇至奶粉充分溶解,待温度适宜时,即可喂哺婴儿。

贮存条件

本品应贮藏于阴凉干燥处。每次取出奶粉后请务必密封严密,以防止吸潮或进入异物,勿置于冰箱内,并于开启后四周内食用完。

制造商:青冈亚华乳多宝乳业有限责任公司
地址:青冈县中和镇(原乳粉厂院内)
产地:黑龙江省绥化市
产品类别及属性:乳基粉状婴儿配方食品
产品标准代号:GB 10765-2021
食品生产许可证编号:SC10523122302904
保质期:24个月
生产日期(MFG)、保质期至(EXP)、
生产批号:见罐底

更多产品及服务请咨询(市话免费)

400-109-8968

www.sijinanshan.com
service@avadairy.com



注册号:
国食注字:YP20170493



哆赋

婴儿配方奶粉 (0-6月龄,1段)

净含量:850克

营养成分表

项目	单位	每100千焦	每100克
能量	kJ	100	2063
蛋白质	g	0.55	11.4
脂肪	g	1.22	25.1
亚油酸	g	0.20	4.1
α-亚麻酸	mg	20	407
碳水化合物	g	2.6	53.7
维生素			
维生素A	μg RE	20	404
维生素D	μg	0.63	13
维生素E	mg α-TE	0.19	4.0
维生素K ₁	μg	2.08	43
维生素B ₁	μg	20	412
维生素B ₂	μg	50	1022
维生素B ₆	μg	21.0	433
维生素B ₁₂	μg	0.092	1.9
烟酸(烟酰胺)	μg	163	3369
叶酸	μg	5.4	112
泛酸	μg	165	3408
维生素C	mg	3.3	69
生物素	μg	0.78	16
胆碱	mg	6.1	126
矿物质			
钠	mg	9	178
钾	mg	22	447
铜	μg	17.9	370
镁	mg	1.6	34
铁	mg	0.18	3.7
锌	mg	0.19	3.9
锰	μg	1.45	30
钙	mg	18	372
磷	mg	9	186
碘	μg	5.4	111
氯	mg	15	310
硒	μg	0.97	20
可选择成分			
肌醇	mg	1.7	36
牛磺酸	mg	1.2	24
左旋肉碱	mg	0.6	13
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.9	80
二十碳四烯酸(ARA)	mg	4.5	92
低聚半乳糖	mg	9	193
低聚果糖	mg	160	3296
核苷酸	mg	1.45	30

注:100毫升奶液≈13.5克奶粉+90毫升水(1平勺奶粉≈4.5克)。

配料

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物油和乳(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、低聚果糖、脱脂奶粉、乳糖、花生四烯酸(ARA)、无水奶油、二十二碳六烯酸(DHA)、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、磷脂、核苷酸(5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠)、左旋肉碱、牛磺酸、肌醇、维生素:维生素C(L-抗坏血酸)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素A(醋酸视黄酯)、烟酸(烟酰胺)、泛酸(D-泛酸钙)、叶酸、维生素K₁(植物甲萘醌)、生物素(D-生物素)、维生素B₁₂(核黄素)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(氧钴胺)、氯化胆碱、矿物质:氯化钾、柠檬酸钠、磷酸钙、磷酸三钙、硫酸镁、硫酸钾、硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰。

本产品含有乳糖和乳蛋白质,乳糖不耐受和乳蛋白过敏者慎用或遵医嘱。

爱心提示

对于0-6月龄的婴儿最理想食品是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

1. 喂奶时应抱着婴儿,如有疏忽可能会引起婴儿窒息或不适。
2. 水和奶瓶未经消毒或奶液浓度不当,可能会引起婴儿的不适。
3. 按照“喂哺用量建议表”的指示与冲调方法进行配制,每次调制一次用量并立即饮用,不要留存未喝完奶液。



清洁卫生
绿化环境




6 930713 600249

序号03

喂哺用量建议表

月龄	每次喂哺份量		每天喂哺次数
	温开水(毫升)	奶粉(平勺)	
1-2周	60	2	7-8
2周-1月龄	90	3	6
1-2月龄	120	4	5
2-4月龄	180	6	5
4-6月龄	210	7	4-5

冲调方法



1. 调奶之前,请洗净双手,将干净的奶瓶、奶嘴、奶瓶盖放入沸水中煮5分钟消毒。
2. 调奶时,用煮沸后冷却至45°C-50°C温开水,依照喂哺用量建议表,在消毒后的奶瓶中加入需要温开水量。
3. 依照喂哺用量建议表,用产品所配粉勺量取准确份量(平勺)的婴儿配方奶粉,加入奶瓶中。
4. 盖严奶瓶盖,轻摇至奶粉充分溶解,待温度适宜时,即可喂哺婴儿。

贮存条件

本品应贮藏于阴凉干燥处。每次取出奶粉后请务必封闭严密,以防止吸潮或进入异物,勿置于冰箱内,并于开启后四周内食用完。

制造商:青冈亚华乳多宝乳业有限公司

地址:青冈县中和镇(原乳粉厂院内)

产地:黑龙江省绥化市

产品类别及属性:乳基粉状婴儿配方食品

产品标准代号:GB 10765-2021

食品生产许可证编号:SC10523122302904

保质期:12个月

生产日期(MFG)、保质期至(EXP)、

生产批号:见罐底

更多产品及服务请咨询(市话资费)

400-109-8968

www.sijinanshan.com

service@avadairy.com



注册号:
国食注字:YP20170493



哆赋

婴儿配方奶粉
(0-6月龄,1段)

1

净含量:100克

营养成分表

项目	单位	每100千焦	每100克
能量	kJ	100	2063
蛋白质	g	0.55	11.4
脂肪	g	1.22	25.1
亚油酸	g	0.20	4.1
(L-亚油酸)	mg	20	407
碳水化合物	g	2.6	53.7
维生素			
维生素A	μg RE	20	404
维生素D	μg	0.63	13
维生素E	mg α-TE	0.19	4.0
维生素K ₁	μg	2.08	43
维生素B ₁	μg	20	412
维生素B ₂	μg	50	1022
维生素B ₆	μg	21.0	433
维生素B ₁₂	μg	0.092	1.9
烟酸(烟酰胺)	mg	163	3369
叶酸	μg	5.4	112
泛酸	mg	1.65	3408
维生素C	mg	3.3	69
生物素	μg	0.78	16
胆碱	mg	6.1	126
矿物质			
钠	mg	9	178
钾	mg	22	447
钙	mg	17.9	370
镁	mg	1.6	34
铁	mg	0.18	3.7
锌	mg	0.19	3.9
铜	mg	1.45	30
锰	mg	18	372
磷	mg	9	186
氯	mg	5.4	111
碘	μg	15	310
硒	μg	0.97	20
可选择成分			
肌醇	mg	1.7	36
牛磺酸	mg	1.2	24
左旋肉碱	mg	0.6	13
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.9	80
二十碳四烯酸(ARA)	mg	4.5	92
低聚半乳糖	mg	9	193
低聚果糖	mg	1.60	3296
核苷酸	mg	1.45	30

注:100毫升奶液≈13.5克奶粉+90毫升水(1平勺奶粉≈4.5克)。

配料

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物油和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、低聚果糖、脱脂奶粉、乳糖、花生四烯酸(ARA)、无水奶油、二十二碳六烯酸(DHA)、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、磷脂、核苷酸(5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠)、左旋肉碱、牛磺酸、肌醇、维生素:维生素C(L-抗坏血酸)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素A(醋酸视黄酯)、烟酸(烟酰胺)、泛酸(D-泛酸钙)、叶酸、维生素K₁(植物甲萘醌)、生物素(D-生物素)、维生素B₁(核黄素)、维生素B₂(盐酸硫胺素)、维生素B₁₂(氰钴胺)、氯化胆碱、矿物质:氯化钾、柠檬酸钠、碳酸钾、磷酸三钙、硫酸镁、磷酸钾、硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰。


本产品含有乳糖和乳蛋白质,乳糖不耐受和乳蛋白过敏者慎用或遵医嘱。

爱心提示

对于0-6月龄的婴儿最理想食品是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。
1. 喂奶时应抱着婴儿,如有疏忽可能会引起婴儿窒息或不适。
2. 水和奶瓶未经消毒或奶液浓度不当,可能会引起婴儿的不适。
3. 按照“喂哺用量建议表”的指示与冲调方法进行配制,每次调制一次用量并立即饮用,不要留存未喝完奶液。



清洁卫生
绿化环境




6 930713 600317

序号04

喂哺用量建议表

月龄	每次喂哺份量		每天喂哺次数
	温开水(毫升)	奶粉(平均)	
1-2周	60	2	7-8
2周-1月龄	90	3	6
1-2月龄	120	4	5
2-4月龄	180	6	5
4-6月龄	210	7	4-5

冲调方法



1. 调奶之前,请洗净双手,将干净的奶瓶、奶嘴、奶瓶盖放入沸水中煮5分钟消毒。
2. 调奶时,用煮沸后冷却至45°C-50°C温开水,依照喂哺用量建议表,在消毒后的奶瓶中加入需要温开水量。
3. 依照喂哺用量建议表,用产品所配粉勺量取准确份量(平均)的婴儿配方奶粉,加入奶瓶中。
4. 盖严奶瓶盖,轻摇至奶粉充分溶解,待温度适宜时,即可喂哺婴儿。

贮存条件

本品应贮藏于阴凉干燥处。每次取出奶粉后请务必封闭严密,以防止吸潮或进入异物,勿置于冰箱内,并于开启后四周内食用完。

制造商:青冈亚华乳多宝乳业有限责任公司
地址:青冈县中和镇(原乳粉厂院内)
产地:黑龙江省绥化市
产品类别及属性:乳基粉状婴儿配方食品
产品标准代号:GB 10765-2021
食品生产许可证编号:SC10523122302904
保质期:24个月
生产日期(MFG)、保质期至(EXP)、
生产批号:见罐底

更多产品及服务请咨询(市话费)

400-109-8968

www.sijinanshan.com
service@avadairy.com



注册号:
国食注字:YP20170493



哆赋

婴儿配方奶粉 (0-6月龄,1段)

1

净含量:520克

营养成分表

项目	单位	每100千焦	每100克
能量	kJ	100	2063
蛋白质	g	0.55	11.4
脂肪	g	1.22	25.1
亚油酸	g	0.20	4.1
α-亚麻酸	mg	20	407
碳水化合物	g	2.6	53.7
维生素			
维生素A	μg RE	20	404
维生素D	μg	0.63	13
维生素E	mg α-TE	0.19	4.0
维生素K ₁	μg	2.08	43
维生素B ₁	μg	20	412
维生素B ₂	μg	50	1022
维生素B ₆	μg	21.0	433
维生素B ₁₂	μg	0.092	1.9
烟酸(烟酰胺)	μg	163	3369
叶酸	μg	5.4	112
泛酸	μg	165	3408
维生素C	mg	3.3	69
生物素	μg	0.78	16
胆碱	mg	6.1	126
矿物质			
钠	mg	9	178
钾	mg	22	447
铜	μg	17.9	370
镁	mg	1.6	34
铁	mg	0.18	3.7
锌	mg	0.19	3.9
锰	μg	1.45	30
钙	mg	18	372
磷	mg	9	186
氯	μg	5.4	111
碘	mg	15	310
硒	μg	0.97	20
可选择成分			
肌醇	mg	1.7	36
牛磺酸	mg	1.2	24
左旋肉碱	mg	0.6	13
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.9	80
二十碳四烯酸(ARA)	mg	4.5	92
低聚半乳糖	mg	9	193
低聚果糖	mg	160	3296
核苷酸	mg	1.45	30

注:100毫升奶液≈13.5克奶粉+90毫升水(1平勺奶粉≈4.5克)。

配料

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物油调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、低聚果糖、脱脂奶粉、乳糖、花生四烯酸(ARA)、无水奶油、二十二碳六烯酸(DHA)、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、磷脂、核苷酸(5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠)、左旋肉碱、牛磺酸、肌醇、维生素:维生素C(L-抗坏血酸)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素A(醋酸视黄醇)、烟酸(烟酰胺)、泛酸(D-泛酸钙)、叶酸、维生素K₁(植物甲萘醌)、生物素(D-生物素)、维生素B₁₂(核黄素)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、氯化胆碱。

本产品含有乳糖和乳蛋白质,乳糖不耐受和乳蛋白过敏者慎用或遵医嘱。

爱心提示

- 对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。
- 1.喂奶时应抱着婴儿,如有疏忽可能会引起婴儿窒息或不适。
 - 2.水和奶瓶未经消毒或奶液浓度不当,可能会引起婴儿的不适。
 - 3.按照“喂哺用量建议表”的指示与冲调方法进行配制,每次调制一次用量并立即饮用,不要留存未喝完奶液。



清洁卫生
绿化环境



69307131600119

序号05

含有核苷酸.含有肌醇.含有左旋肉碱.含有牛磺酸.




注册号:
国食注字:YP20170494

喂哺用量建议表

月龄	每次喂哺份量		每天喂哺次数
	温开水(毫升)	奶粉(平均)	
6-9月龄	210	7	4
9-12月龄	240	8	3

冲调方法



1. 调奶之前,请洗净双手,将干净的奶瓶、奶嘴、奶瓶盖放入沸水中煮5分钟消毒。
2. 调奶时,用煮沸后冷却至45°C-50°C温开水,依照喂哺用量建议表,在消毒后的奶瓶中加入需要温开水量。
3. 依照喂哺用量建议表,用产品所配勺量取准确份量(平均)的较大婴儿配方奶粉,加入奶瓶中。
4. 盖严奶瓶盖,轻摇至奶粉充分溶解,待温度适宜时,即可喂哺较大婴儿。

贮存条件

本品应贮藏于阴凉干燥处。每次取出奶粉后请务必密封严密,以防止吸潮或进入异物,勿置于冰箱内,并于开启后四周内食用完。

制造商:青冈亚华乳多宝乳业有限公司
地 址:青冈县中和镇(原乳粉厂院内)
产 地:黑龙江省绥化市
产品类别及属性:乳基粉状较大婴儿配方食品
产品标准代号:GB 10766-2021
食品生产许可证编号:SC10523122302904
保质期:24个月
生产日期、保质期至、生产批号:见罐底

更多产品及服务请咨询(市话资费)
400-109-8968
www.sijinanshan.com
service@avadairy.com



哆赋

较大婴儿配方奶粉
(6-12月龄,2段)

2段

净含量:800克

营养成分表

项目	单位	每100千焦	每100克
能量	kJ	100	2025
蛋白质	g	0.66	13.4
脂肪	g	1.14	23.1
亚油酸	g	0.16	3.3
α-亚麻酸	mg	16	327
碳水化合物	g	2.7	53.9
维生素			
维生素A	μg RE	23	467
维生素D	μg	0.64	13
维生素E	mg α-TE	0.29	5.8
维生素K ₁	μg	2.42	49
维生素B ₁	μg	22	445
维生素B ₂	μg	49	1000
维生素B ₆	μg	20.2	409
维生素B ₁₂	μg	0.094	1.9
烟酸(烟酰胺)	μg	188	3817
叶酸	μg	5.2	105
泛酸	μg	172	3478
维生素C	mg	3.1	62
生物素	μg	0.94	19
胆碱	mg	6.2	126
矿物质			
钠	mg	6	121
钾	mg	25	501
铜	μg	12.4	251
镁	mg	1.9	39
铁	mg	0.30	6.1
锌	mg	0.19	3.9
锰	μg	1.83	37
钙	mg	24	476
磷	mg	12	243
碘	μg	5.5	111
氯	mg	17	347
硒	μg	0.74	15
可选择成分			
肌醇	mg	1.8	36
牛磺酸	mg	1.2	25
左旋肉碱	mg	0.7	14
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.9	79
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.5	92
低聚半乳糖	mg	14	277
低聚果糖	mg	150	3036
核苷酸	mg	1.48	30

注:100毫升奶液≈13.5克奶粉+90毫升水(1平均奶粉≈4.5克)

配料

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、乳糖、脱脂奶粉、低聚果糖、花生四烯酸、低聚半乳糖、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、无水奶油、磷脂、核苷酸(5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠)、左旋肉碱、牛磺酸、肌醇。
维生素、维生素C(L-抗坏血酸)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素A(醋酸视黄醇)、烟酸(烟酰胺)、泛酸(D-泛酸钙)、生物素(D-生物素)、维生素K₁(植物甲萘醌)、叶酸、维生素B₂(核黄素)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₁₂(氰钴胺)、氯化胆碱。
矿物质:氯化钾、碳酸钙、磷酸三钙、硫酸镁、碘酸钾、硫酸亚铁、硫酸铜、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰。

本产品含有乳糖和乳蛋白质,乳糖不耐受和乳蛋白过敏者慎用或遵医嘱。

爱心提示

- 6-12月的较大婴儿食用本产品时,须配合添加辅助食品。食用和冲调较大婴儿配方奶粉以及其他与喂哺有关的事宜,请遵循专业人员的指导。
1. 喂奶时应抱着较大婴儿,如有疏忽可能会引起较大婴儿窒息或不适。
 2. 水和奶瓶未经消毒或奶液浓度不当,可能会引起较大婴儿的不适。
 3. 按照“喂哺用量建议表”的指示与冲调方法进行配制,每次调制一次用量并立即饮用,不要留存未喝完奶液。



清洁卫生
绿化环境



6 930713 600171

序号06

含有核苷酸,含有肌醇,含有左旋肉碱,含有牛磺酸。




注册号:
国食注字:YP20170494

喂哺用量建议表

月龄	每次喂哺份量		每天喂哺次数
	温开水(毫升)	奶粉(平勺)	
6-9月龄	210	7	4
9-12月龄	240	8	3

冲调方法



1. 调奶之前,请洗净双手,将干净的奶瓶、奶嘴、奶瓶盖放入沸水中煮5分钟消毒。
2. 调奶时,用煮沸后冷却至45°C-50°C温开水,依照喂哺用量建议表,在消毒后的奶瓶中加入需要温开水量。
3. 依照喂哺用量建议表,用产品所配粉勺量取准确份量(平勺)的较大婴儿配方奶粉,加入奶瓶中。
4. 盖严奶瓶盖,轻摇至奶粉充分溶解,待温度适宜时,即可喂哺较大婴儿。

贮存条件

本品应贮藏于阴凉干燥处,每次取出奶粉后请务必密封严密,以防止吸潮或进入异物,勿置于冰箱内,并于开启后四周内食用完。

制造商:青冈亚华乳多宝乳业有限公司
地址:青冈县中和镇(原乳粉厂院内)
产地:黑龙江省绥化市
产品类别及属性:乳基粉状较大婴儿配方食品
产品标准代号:GB 10766-2021
食品生产许可证编号:SC10523122302904
保质期:24个月
生产日期(MFG)、保质期至(EXP)、
生产批号:见罐底

更多产品及服务请咨询(市话费)

400-109-8968

www.sijiananshan.com
service@avadairy.com



哆赋

较大婴儿配方奶粉
(6-12月龄,2段)

2

净含量:850克

营养成分表

项目	单位	每100千焦	每100克
能量	kJ	100	2025
蛋白质	g	0.66	13.4
脂肪	g	1.14	23.1
亚油酸	g	0.16	3.3
α-亚麻酸	mg	16	327
碳水化合物	g	2.7	53.9
维生素			
维生素A	μg RE	23	467
维生素D	μg	0.64	13
维生素E	mg α-TE	0.29	5.8
维生素K ₁	μg	2.42	49
维生素B ₁	μg	22	445
维生素B ₂	μg	49	1000
维生素B ₆	μg	20.2	409
维生素B ₁₂	μg	0.094	1.9
烟酸(烟酰胺)	μg	188	3817
叶酸	μg	5.2	105
泛酸	μg	172	3478
维生素C	mg	3.1	62
生物素	μg	0.94	19
胆碱	mg	6.2	126
矿物质			
钠	mg	6	121
钾	mg	25	501
铜	μg	12.4	251
镁	mg	1.9	39
铁	mg	0.30	6.1
锌	mg	0.19	3.9
锰	μg	1.83	37
钙	mg	24	476
磷	mg	12	243
碘	μg	5.5	111
氯	mg	17	347
硒	μg	0.74	15
可选择成分			
肌醇	mg	1.8	36
牛磺酸	mg	1.2	25
左旋肉碱	mg	0.7	14
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.9	79
二十碳四烯酸(ARA)	mg	4.5	92
低聚半乳糖	mg	14	277
低聚果糖	mg	150	3036
核苷酸	mg	1.48	30

注:100毫升奶液≈13.5克奶粉+90毫升水(1平勺奶粉≈4.5克)。

配料

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、乳糖、脱脂奶粉、低聚果糖、花生四烯酸(ARA)、低聚半乳糖、二十二碳六烯酸(DHA)、无水奶油、磷脂、核苷酸(5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠)、左旋肉碱、牛磺酸、肌醇。

维生素:维生素C(L-抗坏血酸)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素A(醋酸视黄酯)、烟酸(烟酰胺)、泛酸(D-泛酸钙)、生物素(D-生物素)、维生素K₁(植物甲萘醌)、叶酸、维生素B₂(核黄素)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₁₂(氰钴胺)、氯化胆碱。

矿物质:氯化钾、碳酸钾、磷酸二钙、硫酸镁、磷酸钾、硫酸亚铁、硫酸铜、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰。

本产品含有乳糖和乳蛋白质,乳糖不耐受和乳蛋白过敏者慎用或遵医嘱。

爱心提示

- 6-12月的较大婴儿食用本产品时,须配合添加辅食。食用和冲调较大婴儿配方奶粉以及其它与喂哺有关的事宜,请遵循专业人员的指导。
1. 喂哺时应抱着较大婴儿,如有疏忽可能会引起较大婴儿窒息或不适。
 2. 水和奶瓶未经消毒或奶液浓度不当,可能会引起较大婴儿的不适。
 3. 按照“喂哺用量建议表”的指示与冲调方法进行配制,每次调制一次用量并立即饮用,不要留存未喝完奶液。



清洁卫生
绿化环境



6 930713 600294

含有核苷酸.含有肌醇.含有左旋肉碱.含有牛磺酸.

喂哺用量建议表

月龄	每次喂哺份量		每天喂哺次数
	温开水(毫升)	奶粉(平勺)	
6-9月龄	210	7	4
9-12月龄	240	8	3

冲调方法



1. 调奶之前,请洗净双手,将干净的奶瓶、奶嘴、奶瓶盖放入沸水中煮5分钟消毒。
2. 调奶时,用煮沸后冷却至45°C-50°C温开水,依照喂哺用量建议表,在消毒后的奶瓶中加入需要温水量。
3. 依照喂哺用量建议表,用产品所配粉勺量取准确份量(平勺)的较大婴儿配方奶粉,加入奶瓶中。
4. 盖严奶瓶盖,轻摇至奶粉充分溶解,待温度适宜时,即可喂哺较大婴儿。

贮存条件

本品应贮藏于阴凉干燥处。每次取出奶粉后请务必封闭严密,以防止吸潮或进入异物,勿置于冰箱内,并于开启后四周内食用完。



注册号:
国食注字:YP20170494



哆赋

较大婴儿配方奶粉
(6-12月龄,2段)

2

净含量:100克

营养成分表

项目	单位	每100千焦	每100克
能量	kJ	100	2025
蛋白质	g	0.66	13.4
脂肪	g	1.14	23.1
碳水化合物	g	0.16	3.3
维生素A	μg RE	23	467
维生素D	μg	0.64	13
维生素E	mg α-TE	0.29	5.8
维生素K ₁	μg	2.42	49
维生素B ₁	μg	22	445
维生素B ₂	μg	49	1000
维生素B ₆	μg	20.2	409
维生素B ₁₂	μg	0.094	1.9
烟酸(烟酰胺)	mg	188	3817
叶酸	μg	5.2	105
泛酸	mg	172	3478
维生素C	mg	3.1	62
胆碱	mg	0.94	19
矿物质	mg	6.2	126
钙	mg	6	121
磷	mg	25	501
钾	mg	12.4	251
钠	mg	1.9	39
镁	mg	0.30	6.1
锌	mg	0.19	3.9
铜	mg	1.83	37
铁	mg	24	476
锰	mg	12	243
硒	μg	5.5	111
碘	μg	17	347
可选择成分	mg	0.74	15
肌醇	mg	1.8	36
牛磺酸	mg	1.2	25
左旋肉碱	mg	0.7	14
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.9	79
二十二碳四烯酸(ARA)	mg	4.5	92
低聚半乳糖	mg	14	277
低聚果糖	mg	150	3036
核苷酸	mg	1.48	30

注:100毫升奶液≈13.5克奶粉+90毫升水(1平勺奶粉≈4.5克)。

配料

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物油和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、乳糖、脱脂奶粉、低聚果糖、花生四烯酸(ARA)、低聚半乳糖、二十二碳六烯酸(DHA)、无水奶油、磷脂、核苷酸(5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠)、左旋肉碱、牛磺酸、肌醇。

维生素:维生素C(L-抗坏血酸)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素A(醋酸视黄酯)、烟酸(烟酰胺)、泛酸(D-泛酸钙)、生物素(D-生物素)、维生素K₁(植物甲萘醌)、叶酸、维生素B₁₂(核黄素)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、氯化胆碱。矿物质:氯化钾、碳酸钾、磷酸三钙、硫酸镁、硫酸钾、硫酸亚铁、硫酸铜、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰。

本产品含有乳糖和乳蛋白质,乳糖不耐受和乳蛋白过敏者慎用或遵医嘱。

爱心提示

- 6-12月的较大婴儿食用本产品时,须配合添加辅食。食用和冲调较大婴儿配方奶粉以及其他与喂哺有关的事宜,请遵循专业人员的指导。
1. 喂奶时应抱着较大婴儿,如有疏忽可能会引起较大婴儿窒息或不适。
 2. 水和奶瓶未经消毒或奶液浓度不当,可能会引起较大婴儿的不适。
 3. 按照“喂哺用量建议表”的指示与冲调方法进行配制,每次调制一次用量并立即饮用,不要留存未喝完奶液。

制造商:青风亚华乳多宝乳业有限公司

地址:青风县中和镇(原乳粉厂院内)

产地:黑龙江省绥化市

产品类别及属性:乳基粉状较大婴儿配方食品

产品标准代号:GB 10766-2021

食品生产许可证编号:SC10523122302904

保质期:12个月

生产日期(MFG)、保质期至(EXP)、

生产批号:见罐底

更多产品及服务请咨询(市话费)

400-109-8968

www.sijiananshan.com

service@avadairy.com



清洁卫生
绿化环境



6 930713 600225

序号08

含有核苷酸.含有肌醇.含有左旋肉碱.含有牛磺酸.




注册号:
国食注字:YP20170494

喂哺用量建议表

月龄	每次喂哺份量		每天喂哺次数
	温开水(毫升)	奶粉(平勺)	
6-9月龄	210	7	4
9-12月龄	240	8	3

冲调方法



1. 调奶之前,请洗净双手,将干净的奶瓶、奶嘴、奶瓶盖放入沸水中煮5分钟消毒。
2. 调奶时,用煮沸后冷却至45°C-50°C温开水,依照喂哺用量建议表,在消毒后的奶瓶中加入需要温水量。
3. 依照喂哺用量建议表,用产品所配粉勺量取准确份量(平勺)的较大婴儿配方奶粉,加入奶瓶中。
4. 盖严奶瓶盖,轻摇至奶粉充分溶解,待温度适宜时,即可喂哺较大婴儿。

贮存条件

本品应贮藏于阴凉干燥处。每次取出奶粉后请务必封闭严密,以防止吸潮或进入异物,勿置于冰箱内,并于开启后四周内食用完。

制造商:青冈亚华乳多宝乳业有限责任公司

地 址:青冈县中和镇(原乳粉厂院内)

产 地:黑龙江省绥化市

产品类别及属性:乳基粉状较大婴儿配方食品

产品标准代号:GB 10766-2021

食品生产许可证编号:SC10523122302904

保质期:24个月

生产日期(MFG)、保质期至(EXP)、

生产批号:见罐底

更多产品及服务请咨询(市话资费)

400-109-8968

www.sijinanshan.com

service@avadaairy.com



较大婴儿配方奶粉
(6-12月龄,2段)

咭赋

2

净含量:520克

营养成分表

项目	单位	每100千焦	每100克
能量	kJ	100	2025
蛋白质	g	0.66	13.4
脂肪	g	1.14	23.1
亚油酸	g	0.16	3.3
α-亚麻酸	mg	16	327
碳水化合物	g	2.7	53.9
维生素			
维生素A	μg RE	23	467
维生素D	μg	0.64	13
维生素E	mg α-TE	0.29	5.8
维生素K ₁	μg	2.42	49
维生素B ₁	μg	22	445
维生素B ₂	μg	49	1000
维生素B ₆	μg	20.2	409
维生素B ₁₂	μg	0.094	1.9
烟酸(烟酰胺)	μg	188	3817
叶酸	μg	5.2	105
泛酸	μg	172	3478
维生素C	mg	3.1	62
生物素	μg	0.94	19
胆碱	mg	6.2	126
矿物质			
钠	mg	6	121
钾	mg	25	501
铜	μg	12.4	251
镁	mg	1.9	39
铁	mg	0.30	6.1
锌	mg	0.19	3.9
锰	μg	1.83	37
钙	mg	24	476
磷	mg	12	243
碘	μg	5.5	111
氯	mg	17	347
硒	μg	0.74	15
可选择成分			
肌醇	mg	1.8	36
牛磺酸	mg	1.2	25
左旋肉碱	mg	0.7	14
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.9	79
二十碳四烯酸(ARA)	mg	4.5	92
低聚半乳糖	mg	14	277
低聚果糖	mg	150	3036
核苷酸	mg	1.48	30

注:100毫升奶液≈13.5克奶粉+90毫升水(1平勺奶粉≈4.5克)。

配料

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、乳糖、脱脂奶粉、低聚果糖、花生四烯酸(ARA)、低聚半乳糖、二十二碳六烯酸(DHA)、无水奶油、磷脂、核苷酸(5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠)、左旋肉碱、牛磺酸、肌醇。

维生素:维生素C(L-抗坏血酸)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素A(醋酸视黄醇)、烟酸(烟酰胺)、泛酸(D-泛酸钙)、生物素(D-生物素)、维生素K₁(植物甲萘醌)、叶酸、维生素B₂(核黄素)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₁₂(氰钴胺)、氯化胆碱。矿物质:氯化钾、碳酸钾、磷酸三钙、硫酸镁、硫酸钾、硫酸亚铁、硫酸铜、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰。

本产品含有乳糖和乳蛋白质,乳糖不耐受和乳蛋白过敏者慎用或遵医嘱。

爱心提示

6-12月的较大婴儿食用本产品时,须配合添加辅食。食用和冲调较大婴儿配方奶粉以及其它与喂哺有关的事宜,请遵循专业人员的指导。

1.喂奶时应抱着较大婴儿,如有疏忽可能会引起较大婴儿窒息或不适。

2.水和奶瓶未经消毒或奶液浓度不当,可能会引起较大婴儿的不适。

3.按照“喂哺用量建议表”的指示与冲调方法进行配制,每次调制一次用量并立即饮用,不要留存未喝完奶液。



清洁卫生
绿化环境



6 930713 600386

序号09

含有核苷酸.含有肌醇.含有左旋肉碱.含有牛磺酸。




注册号:
国食注字:YP20170495

喂哺用量建议表

每次喂哺份量 每天喂哺次数

月龄	温开水(毫升)	奶粉(平勺)	次
12-36月龄	240	8	2-3

冲调方法



1. 调奶之前，请洗净双手，将干净的奶瓶、奶嘴、奶瓶盖放入沸水中煮5分钟消毒。
2. 调奶时，用煮沸后冷却至45°C-50°C温开水，依照喂哺用量建议表，在消毒后的奶瓶中加入需要温开水量。
3. 依照喂哺用量建议表，用产品所配粉勺量取准确份量(平勺)的幼儿配方奶粉，加入奶瓶中。
4. 盖严奶瓶盖，轻摇至奶粉充分溶解，待温度适宜时，即可喂哺幼儿。

贮存条件

本品应贮藏于阴凉干燥处。每次取出奶粉后请务必封闭严密，以防止吸潮或进入异物，勿置于冰箱内，并于开启后四周内食用完。

制造商:青冈亚华乳多宝乳业有限责任公司
地址:青冈县中和镇(原奶粉厂院内)
产地:黑龙江省绥化市
产品类别及属性:乳基粉状幼儿配方食品
产品标准代号:GB 10767-2021
食品生产许可证编号:SC10523122302904
保质期:24个月
生产日期、保质期至、生产批号:见罐底

更多产品及服务请咨询(市话费)
400-109-8968
www.sijinanshan.com
service@avadairy.com



哆赋

幼儿配方奶粉
(12-36月龄,3段)

3段

净含量:800克

营养成分表

项目	单位	每100千焦	每100克
能量	kJ	100	2002
蛋白质	g	0.66	13.3
脂肪	g	1.10	22.0
亚油酸	g	0.15	3.1
α-亚麻酸	mg	15	303
碳水化合物	g	2.7	55.0
维生素			
维生素A	μg RE	23	467
维生素D	μg	0.65	13
维生素E	mg α-TE	0.29	5.8
维生素K ₁	μg	2.45	49
维生素B ₁	μg	22	447
维生素B ₂	μg	53	1061
维生素B ₆	μg	20.5	410
维生素B ₁₂	μg	0.100	2.0
烟酸(烟酰胺)	μg	191	3823
叶酸	μg	5.3	106
泛酸	μg	175	3503
维生素C	mg	3.1	62
生物素	μg	0.95	19
矿物质			
钠	mg	6	125
钾	mg	26	518
铜	μg	12.5	251
镁	mg	2.0	41
铁	mg	0.30	6.1
锌	mg	0.17	3.5
钙	mg	24	490
磷	mg	13	254
碘	μg	5.6	112
氯	mg	18	357
可选择成分			
锰	μg	2.05	41
肌醇	mg	1.8	36
牛磺酸	mg	1.2	25
左旋肉碱	mg	0.7	14
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	1.6	33
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	2.2	44
低聚半乳糖	mg	18	360
低聚果糖	mg	152	3036
核苷酸	mg	1.50	30

注:100毫升奶液≈13.5克奶粉+90毫升水(1平勺奶粉≈4.5克)。


配料

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、乳糖、脱脂奶粉、低聚果糖、低聚半乳糖、花生四烯酸、无水奶油、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、磷脂、核苷酸(5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠)、左旋肉碱、牛磺酸、肌醇。
维生素:维生素C(L-抗坏血酸)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素A(醋酸视黄酯)、烟酸(烟酰胺)、泛酸(D-泛酸钙)、生物素(D-生物素)、维生素B₂(核黄素)、维生素K₁(植物甲萘醌)、叶酸、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₁₂(氰钴胺)。
矿物质:氯化钾、碳酸钙、磷酸三钙、硫酸镁、磷酸钾、硫酸亚铁、硫酸铜、硫酸锌、硫酸锰。

- 生牛乳加工
- 本产品含有乳糖和乳蛋白质，乳糖不耐受和乳蛋白过敏者慎用或遵医嘱。

爱心提示

12-36月的幼儿食用本产品时，请在两餐之间补喂适量温开水。食用和冲调幼儿配方奶粉以及其它与喂哺有关的事宜，请遵循专业人员的指导。
1. 喂奶时应抱着幼儿，如有疏忽可能会引起幼儿窒息或不适。
2. 水和奶瓶未经消毒或奶液浓度不当，可能会引起幼儿的不适。
3. 按照“喂哺用量建议表”的指示与冲调方法进行配制，每次调制一次用量并立即饮用，不要留存未喝完奶液。



含有核苷酸.含有肌醇.含有左旋肉碱.含有牛磺酸。




注册号:
国食注字:YP20170495

喂哺用量建议表

每次喂哺份量		每天喂哺次数
月龄	温开水(毫升)	奶粉(平勺)
12-36月龄	240	8
		次

冲调方法



1. 调奶之前,请洗净双手,将干净的奶瓶、奶嘴、奶瓶盖放入沸水中煮5分钟消毒。
2. 调奶时,用煮沸后冷却至45°C-50°C温开水,依照喂哺用量建议表,在消毒后的奶瓶中加入需要温开水量。
3. 依照喂哺用量建议表,用产品所配粉勺量取准确份量(平勺)的幼儿配方奶粉,加入奶瓶中。
4. 盖严奶瓶盖,轻摇至奶粉充分溶解,待温度适宜时,即可喂哺幼儿。

贮存条件

本品应贮藏于阴凉干燥处。每次取出奶粉后请务必密封严密,以防止吸潮或进入异物,勿置于冰箱内,并于开启后四周内食用完。

制造商:青冈亚华乳多宝乳业有限公司

地址:青冈县中和镇(原奶粉厂院内)

产地:黑龙江省绥化市

产品类别及属性:乳基粉状幼儿配方食品

产品标准代号:GB 10767-2021

食品生产许可证编号:SC10523122302904

保质期:24个月

生产日期(MFG)、保质期至(EXP)、

生产批号:见罐底

更多产品及服务请咨询(市话资费)

400-109-8968

www.sijinnanshan.com
service@avadairy.com



哆赋

幼儿配方奶粉
(12-36月龄,3段)

3

净含量:850克

营养成分表

项目	单位	每100千焦	每100克
能量	kJ	100	2002
蛋白质	g	0.66	13.3
脂肪	g	1.10	22.0
亚油酸	g	0.15	3.1
α-亚麻酸	mg	15	303
碳水化合物	g	2.7	55.0
维生素			
维生素A	μg RE	23	467
维生素D	μg	0.65	13
维生素E	mg α-TE	0.29	5.8
维生素K ₁	μg	2.45	49
维生素B ₁	μg	22	447
维生素B ₂	μg	53	1061
维生素B ₆	μg	20.5	410
维生素B ₁₂	μg	0.100	2.0
烟酸(烟酰胺)	μg	191	3823
叶酸	μg	5.3	106
泛酸	μg	175	3503
维生素C	mg	3.1	62
生物素	μg	0.95	19
矿物质			
钠	mg	6	125
钾	mg	26	518
铜	μg	12.5	251
镁	mg	2.0	41
铁	mg	0.30	6.1
锌	mg	0.17	3.5
钙	mg	24	490
磷	mg	13	254
碘	μg	5.6	112
氯	mg	18	357
可选择成分			
锰	μg	2.05	41
肌醇	mg	1.8	36
牛磺酸	mg	1.2	25
左旋肉碱	mg	0.7	14
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	1.6	33
二十碳四烯酸(ARA)	mg	2.2	44
低聚半乳糖	mg	18	360
低聚果糖	mg	152	3036
核苷酸	mg	1.50	30

注:100毫升奶液≈13.5克奶粉+90毫升水(1平勺奶粉≈4.5克)。

配料

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、乳糖、脱脂奶粉、低聚果糖、低聚半乳糖、花生四烯酸(ARA)、无水奶油、二十二碳六烯酸(DHA)、磷脂、核苷酸(5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠)、左旋肉碱、牛磺酸、肌醇。

维生素:维生素C(L-抗坏血酸)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素A(醋酸视黄酯)、烟酸(烟酰胺)、泛酸(D-泛酸钙)、生物素(D-生物素)、维生素B₂(核黄素)、维生素K₁(植物甲萘醌)、叶酸、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₁₂(氰钴胺)。

矿物质:氯化钾、碳酸钙、磷酸三钙、硫酸镁、碘酸钾、硫酸亚铁、硫酸铜、硫酸锌、硫酸锰。

本产品含有乳糖和乳蛋白质,乳糖不耐受和乳蛋白过敏者慎用或遵医嘱。

爱心提示

- 12-36月的幼儿食用本产品时,请在两餐之间补喂适量温开水。食用和冲调幼儿配方奶粉以及其它与喂哺有关的事宜,请遵循专业人员的指导。
1. 喂奶时应抱着幼儿,如有疏忽可能会引起幼儿窒息或不适。
 2. 水和奶瓶未经消毒或奶液浓度不当,可能会引起幼儿的不适。
 3. 按照“喂哺用量建议表”的指示与冲调方法进行配制,每次调制一次用量并立即饮用,不要留存未喝完奶液。



清洁卫生
绿化环境




6 930713 600300

含有核苷酸.含有肌醇.含有左旋肉碱.含有牛磺酸。

喂哺用量建议表

月龄	每次喂哺份量		每天喂哺次数
	温开水(毫升)	奶粉(平均)	
12-36月龄	240	8	2-3

冲调方法



1. 调奶之前,请洗净双手,将干净的奶瓶、奶嘴、奶瓶盖放入沸水中煮5分钟消毒。
2. 调奶时,用煮沸后冷却至45°C-50°C温开水,依照喂哺用量建议表,在消毒后的奶瓶中加入需要温开水量。
3. 依照喂哺用量建议表,用产品所配份量勺取准确份量(平均)的幼儿配方奶粉,加入奶瓶中。
4. 盖严奶瓶盖,轻摇至奶粉充分溶解,待温度适宜时,即可喂哺幼儿。

贮存条件

本品应贮藏于阴凉干燥处。每次取出奶粉后请务必封闭严密,以防止吸潮或进入异物,勿置于冰箱内,并于开启后四周内食用完。

制造商:青风亚华乳多宝乳业有限公司

地址:青风县中和镇(原乳粉厂院内)

产地:黑龙江省绥化市

产品类别及属性:乳基粉状幼儿配方食品

产品标准代号:GB 10767-2021

食品生产许可证编号:SC10523122302904

保质期:12个月

生产日期(MFG)、保质期至(EXP)、

生产批号:见罐底

更多产品及服务请咨询(市话费)

400-109-8968

www.sijinanshan.com

service@avadairy.com



注册号:
国食注字:YP20170495



哆赋

幼儿配方奶粉
(12-36月龄,3段)

3

净含量:100克

营养成分表

项目	单位	每100千焦	每100克
能量	kJ	100	2002
蛋白质	g	0.66	13.3
脂肪	g	1.10	22.0
亚油酸	g	0.15	3.1
(1-亚麻酸	g	15	303
碳水化合物	g	2.7	55.0
维生素			
维生素A	μg RE	23	467
维生素D	μg	0.65	13
维生素E	mg α-TE	0.29	5.8
维生素K	μg	2.45	49
维生素B ₁	mg	22	447
维生素B ₂	mg	53	1061
维生素B ₆	mg	20.5	410
维生素B ₁₂	μg	0.100	2.0
烟酸(烟酰胺)	mg	191	3823
叶酸	μg	5.3	106
泛酸	mg	175	3503
维生素C	mg	3.1	62
生物素	μg	0.95	19
矿物质			
钠	mg	6	125
钾	mg	26	518
钙	mg	12.5	251
镁	mg	2.0	41
铁	mg	0.30	6.1
锌	mg	0.17	3.5
铜	mg	24	480
锰	mg	13	254
碘	μg	5.6	112
可选择成分			
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	2.05	41
肌醇	mg	1.8	36
牛磺酸	mg	1.2	25
左旋肉碱	mg	0.7	14
二十二碳六烯酸(ARA)	mg	1.6	33
低聚半乳糖	mg	2.2	44
低聚果糖	mg	18	360
核苷酸	mg	152	3036
	mg	1.50	30

注:100毫升奶液≈13.5克奶粉+90毫升水(1平均奶粉≈4.5克)

配料

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物油和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、乳糖、脱脂奶粉、低聚果糖、低聚半乳糖、花生四烯酸(ARA)、无水奶油、二十二碳六烯酸(DHA)、磷脂、核苷酸(5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠)、左旋肉碱、牛磺酸、肌醇。

维生素:维生素C(L-抗坏血酸)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素A(醋酸视黄酯)、烟酸(烟酰胺)、泛酸(D-泛酸钙)、生物素(D-生物素)、维生素B₁₂(核黄素)、维生素K₁(植物甲萘醌)、叶酸、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)。

矿物质:氯化钾、碳酸钾、磷酸三钙、硫酸镁、磷酸钾、硫酸亚铁、硫酸铜、硫酸锌、硫酸锰。

本产品含有乳糖和乳蛋白质,乳糖不耐受和乳蛋白过敏者慎用或遵医嘱。

爱心提示

- 12-36月的幼儿食用本产品时,请在两餐之间补喂适量温开水。食用和冲调幼儿配方奶粉以及其它与喂哺有关的事宜,请遵循专业人员的指导。
1. 喂奶时应抱着幼儿,如有疏忽可能会引起幼儿窒息或不适。
 2. 水和奶瓶未经消毒或奶液浓度不当,可能会引起幼儿的不适。
 3. 按照“喂哺用量建议表”的指示与冲调方法进行配制,每次调制一次用量并立即饮用,不要留存未喝完奶液。



清洁卫生
绿化环境



6 930713 600232

序号12

含有核苷酸.含有肌醇.含有左旋肉碱.含有牛磺酸。




注册号:
国食注字:YP20170495

喂哺用量建议表

每次喂哺份量		每天喂哺次数
月龄	温开水(毫升)	奶粉(平均) 次
12-36月龄	240	8 2-3

冲调方法



1. 调奶之前,请洗净双手,将干净的奶瓶、奶嘴、奶瓶盖放入沸水中煮5分钟消毒。
2. 调奶时,用煮沸后冷却至45°C-50°C温开水,依照喂哺用量建议表,在消毒后的奶瓶中加入需要温开水量。
3. 依照喂哺用量建议表,用产品所配粉勺量取准确份量(平均)的幼儿配方奶粉,加入奶瓶中。
4. 盖严奶瓶盖,轻摇至奶粉充分溶解,待温度适宜时,即可喂哺幼儿。

贮存条件

本品应贮藏于阴凉干燥处。每次取出奶粉后请务必密封严密,以防止吸潮或进入异物,勿置于冰箱内,并于开启后四周内食用完。

制造商:青冈亚华乳多宝乳业有限公司
地址:青冈县中和镇(原奶粉厂院内)
产地:黑龙江省绥化市
产品类别及属性:乳基粉状幼儿配方食品
产品标准代号:GB 10767-2021
食品生产许可证编号:SC10523122302904
保质期:24个月
生产日期(MFG)、保质期至(EXP)、
生产批号:见罐底

更多产品及服务请咨询(市话费)
400-109-8968
www.sijinanshan.com
service@avadairy.com



幼儿配方奶粉 (12-36月龄,3段)

哆赋

3

净含量:520克

营养成分表

项目	单位	每100千焦	每100克
能量	kJ	100	2002
蛋白质	g	0.66	13.3
脂肪	g	1.10	22.0
亚油酸	g	0.15	3.1
α-亚油酸	mg	15	303
碳水化合物	g	2.7	55.0
维生素			
维生素A	μg RE	23	467
维生素D	μg	0.65	13
维生素E	mg α-TE	0.29	5.8
维生素K ₁	μg	2.45	49
维生素B ₁	μg	22	447
维生素B ₂	μg	53	1061
维生素B ₆	μg	20.5	410
维生素B ₁₂	μg	0.100	2.0
烟酸(烟酰胺)	μg	191	3823
叶酸	μg	5.3	106
泛酸	μg	175	3503
维生素C	mg	3.1	62
生物素	μg	0.95	19
矿物质			
钠	mg	6	125
钾	mg	26	518
铜	μg	12.5	251
镁	mg	2.0	41
铁	mg	0.30	6.1
锌	mg	0.17	3.5
钙	mg	24	490
磷	mg	13	254
碘	μg	5.6	112
氯	mg	18	357
可选择成分			
锰	μg	2.05	41
肌醇	mg	1.8	36
牛磺酸	mg	1.2	25
左旋肉碱	mg	0.7	14
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	1.6	33
二十碳四烯酸(ARA)	mg	2.2	44
低聚半乳糖	mg	18	360
低聚果糖	mg	152	3036
核苷酸	mg	1.50	30

注:100毫升奶液≈13.5克奶粉+90毫升水(1平勺奶粉≈4.5克)。

配料

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、乳糖、脱脂奶粉、低聚果糖、低聚半乳糖、花生四烯酸(ARA)、无水奶油、二十二碳六烯酸(DHA)、磷脂、核苷酸(5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠、5'-胞苷酸二钠)、左旋肉碱、牛磺酸、肌醇。

维生素:维生素C(L-抗坏血酸)、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素A(视黄醇)、烟酸(烟酰胺)、泛酸(D-泛酸钙)、生物素(D-生物素)、维生素B₁(核黄素)、维生素K₁(植物甲萘醌)、叶酸、维生素B₁₂(盐酸硫胺素)、维生素B₁₂(氰钴胺)。

矿物质:氯化钾、碳酸钾、磷酸三钙、硫酸镁、硫酸钾、硫酸亚铁、硫酸铜、硫酸锌、硫酸锰。

本产品含有乳糖和乳蛋白质,乳糖不耐受和乳蛋白过敏者慎用或遵医嘱。

爱心提示

12-36月的幼儿食用本产品时,请在两餐之间补充适量温开水。食用和冲调幼儿配方奶粉以及其它与喂哺有关的事宜,请遵循专业人员的指导。

1. 喂奶时应抱着幼儿,如有疏忽可能会引起幼儿窒息或不适。

2. 水和奶瓶未经消毒或奶液浓度不当,可能会引起幼儿的不适。

3. 按照“喂哺用量建议表”的指示与冲调方法进行配制,每次调制一次用量并立即饮用,不要留存未喝完奶液。



清洁卫生
绿化环境




6 930713 600393

序号13

喂哺用量建议表

月龄	每次喂哺份量		每天喂哺次数
	温开水 (毫升)	奶粉 (平勺)	
1-2周	60	2	7-8
2周-1月龄	90	3	6
1-2月龄	120	4	5
2-4月龄	180	6	5
4-6月龄	210	7	4-5

冲调方法



1. 调奶之前,请洗净双手,将干净的奶瓶、奶嘴、奶瓶盖放入沸水中煮5分钟消毒。
2. 调奶时,用煮沸后冷却至45°C-50°C温开水,依照喂哺用量建议表,在消毒后的奶瓶中加入需要温开水量。
3. 依照喂哺用量建议表,用产品所配粉勺量取准确份量(平勺)的婴儿配方奶粉,加入奶瓶中。
4. 盖严奶瓶盖,轻摇至奶粉充分溶解,待温度适宜时,即可喂哺婴儿。

贮存条件

本品应贮藏于阴凉干燥处。每次取出奶粉后请务必封闭严密,以防止吸潮或进入异物,勿置于冰箱内,并于开启后四周内食用完。

制造商:青冈亚华乳多宝乳业有限责任公司
地 址:青冈县中和镇(原乳粉厂院内)
产 地:黑龙江省绥化市
曾用商品名称:领冠羊®
产品类别及属性:乳基粉状婴儿配方食品
产品标准代号:GB 10765-2021
食品生产许可证编号:SC10523122302904
保质期:24个月
生产日期、保质期至、生产批号:见罐底

联系我们

咨询热线
400-681-9901

官方网址
www.sijinanshan.com

菁雅

婴儿配方羊奶粉 (0-6月龄,1段)

1段

净含量:800克
国食注字YP20230356



营养成分表

项目	单位	每100千焦	每100克
能量	kJ	100	2045
蛋白质	g	0.55	11.3
脂肪	g	1.18	24.2
亚油酸	g	0.16	3.2
α-亚麻酸	mg	20	410
碳水化合物	g	2.7	54.6
维生素			
维生素A	μg RE	20	406
维生素D	μg	0.64	13
维生素E	mg α-TE	0.20	4.0
维生素K ₁	μg	2.10	43
维生素B ₁	μg	20	406
维生素B ₂	μg	39	797
维生素B ₆	μg	18.7	382
维生素B ₁₂	μg	0.088	1.8
烟酸(烟酰胺)	μg	169	3449
叶酸	μg	5.3	109
泛酸	μg	171	3505
维生素C	mg	3.4	69
生物素	μg	1.03	21
胆碱	mg	7.1	145
矿物质			
钠	mg	9	180
钾	mg	23	461
铜	μg	18.1	370
镁	mg	1.6	33
铁	mg	0.18	3.7
锌	mg	0.19	3.8
锰	μg	1.17	24
钙	mg	16	327
磷	mg	11	215
碘	μg	4.6	95
氯	mg	15	305
硒	μg	0.93	19
可选择成分			
肌醇	mg	4.2	85
牛磺酸	mg	1.0	20
左旋肉碱	mg	1.2	24
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.6	73
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.2	85
低聚半乳糖	mg	14	277
低聚果糖	mg	64	1313
聚葡萄糖	mg	79	1608
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.24	4.9
叶黄素	μg	3.81	78

注:100毫升奶液≈13.5克奶粉+90毫升水(1平勺奶粉≈4.5克)。

配料

脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、全脂羊奶粉、乳糖、聚葡萄糖、低聚果糖、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、低聚半乳糖、花生四烯酸、左旋肉碱、肌醇、牛磺酸、叶黄素。
维生素:维生素C(L-抗坏血酸)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素A(醋酸视黄酯)、烟酸(烟酰胺)、泛酸(D-泛酸钙)、叶酸、维生素K₁(植物甲萘醌)、生物素(D-生物素)、维生素B₁₂(氰钴胺)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(氰钴胺)、氯化胆碱。
矿物质:柠檬酸钠、碳酸钾、氯化钾、磷酸三钙、硫酸镁、磷酸钾、硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰。

过敏提示

本品含有乳及乳制品(包括乳糖)。

爱心提示

- 对于0-6月龄的婴儿最理想的食品是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。
1. 喂奶时应抱着婴儿,如有疏忽可能会引起婴儿窒息或不适。
 2. 水和奶瓶未经消毒或奶液浓度不当,可能会引起婴儿的不适。
 3. 按照“喂哺用量建议表”的指示与冲调方法进行配制,每次调制一次用量并立即饮用,不要留存未喝完奶液。

清洁卫生
绿化环境



冲调方法



1. 调奶之前,请洗净双手,将干净的奶瓶、奶嘴、奶瓶盖放入沸水中煮5分钟消毒。
2. 调奶时,用煮沸后冷却至45°C-50°C温开水,依照喂哺用量建议表,在消毒后的奶瓶中加入需要温开水量。
3. 依照喂哺用量建议表,用产品所配粉勺量取准确份量(平勺)的婴儿配方奶粉,加入奶瓶中。
4. 盖严奶瓶盖,轻摇至奶粉充分溶解,待温度适宜时,即可喂哺婴儿。

贮存条件

本品应贮藏于阴凉干燥处。每次取出奶粉后请务必密封严密,以防止吸潮或进入异物,勿置于冰箱内,并于开启后四周内食用完。

喂哺用量建议表

月龄	温开水(毫升)	奶粉(平勺)	每天喂哺次数
1-2周	60	2	7-8
2周-1月龄	90	3	6
1-2月龄	120	4	5
2-4月龄	180	6	5
4-6月龄	210	7	4-5

爱心提示

对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

1. 喂奶时应抱着婴儿,如有疏忽可能会引起婴儿窒息或不洁。
2. 水和奶瓶未经消毒或奶液浓度不当,可能会引起婴儿的不适。
3. 按照“喂哺用量建议表”的指示与冲调方法进行配制,每次调制一次用量并立即饮用,不要留存未喝完奶液。

过敏提示

本品含有乳及乳制品(包括乳糖)。

联系我们

咨询热线
400-681-9901
官方网址
www.sijinanshan.com

制造商:青网亚华乳多宝乳业有限公司
地址:青网县中和镇(原乳粉厂院内)
产地:黑龙江省绥化市
曾用商品名称:领冠羊
产品类别及属性:乳基粉状婴儿配方食品
产品标准代号:GB 10765-2021
食品生产许可证编号:SC10523122302904
保质期:12个月
生产日期、保质期至、生产批号:见罐底

菁雅

婴儿配方羊奶粉

(0-6月龄,1段)

1段

净含量:85克
国食注字YP20230356



配料

脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、全脂羊奶粉、乳糖、聚葡萄糖、低聚果糖、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、低聚半乳糖、花生四烯酸、左旋肉碱、肌醇、牛磺酸、叶黄素。

维生素:维生素C(抗坏血酸)、维生素E(d-α-醋酸生育酚)、维生素B₁(盐酸吡哆醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素A(醋酸视黄醇)、烟酸(烟酰胺)、泛酸(D-泛酸钙)、叶酸、维生素K₁(植物甲萘醌)、生物素(D-生物素)、维生素B₆(核黄素)、维生素B₁₂(盐酸硫胺素)、维生素B₉(氰钴胺)、氯化胆碱。

矿物质:柠檬酸钠、碳酸钙、氯化钾、磷酸三钙、硫酸镁、碘酸钾、硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰。

营养成分表

项目	单位	每100千焦	每100克	项目	单位	每100千焦	每100克
能量	kJ	100	2045	铁	mg	0.18	3.7
蛋白质	g	0.55	11.3	锌	mg	0.19	3.8
脂肪	g	1.18	24.2	锰	μg	1.17	24
亚油酸	g	0.16	3.2	钙	mg	16	327
α-亚麻酸	mg	20	410	磷	mg	11	215
碳水化合物	g	2.7	54.6	碘	μg	4.6	95
维生素				氯	mg	15	305
维生素A	μg RE	20	406	硒	μg	0.93	19
维生素D	μg	0.64	13	可选择成分			
维生素E	mg α-TE	0.20	4.0	肌醇	mg	4.2	85
维生素K ₁	μg	2.10	43	牛磺酸	mg	1.0	20
维生素B ₁	μg	20	406	左旋肉碱	mg	1.2	24
维生素B ₂	μg	39	797	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.6	73
维生素B ₆	μg	18.7	382	二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.2	85
维生素B ₁₂	μg	0.088	1.8	低聚半乳糖	mg	14	277
烟酸(烟酰胺)	μg	169	3449	低聚果糖	mg	64	1313
叶酸	μg	5.3	109	聚葡萄糖	mg	79	1608
泛酸	μg	171	3505	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.24	4.9
维生素C	mg	3.4	69	叶黄素	μg	3.81	78
生物素	μg	1.03	21	注:100毫升奶液≈13.5克奶粉+90毫升水(平勺奶粉≈4.5克)。			
胆碱	mg	7.1	145				
矿物质							
钠	mg	9	180				
钾	mg	23	461				
铜	μg	18.1	370				
镁	mg	1.6	33				



序号15

喂哺用量建议表

每次喂哺份量		每天喂哺次数	
月龄	温开水 (毫升)	奶粉 (平勺)	次
1-2周	60	2	7-8
2周-1月龄	90	3	6
1-2月龄	120	4	5
2-4月龄	180	6	5
4-6月龄	210	7	4-5

冲调方法



1. 调奶之前,请洗净双手,将干净的奶瓶、奶嘴、奶瓶盖放入沸水中煮 5 分钟消毒。
2. 调奶时,用煮沸后冷却至 45°C-50°C 温开水,依照喂哺用量建议表,在消毒后的奶瓶中加入需要温开水量。
3. 依照喂哺用量建议表,用产品所配粉勺量取准确份量 (平勺) 的婴儿配方奶粉,加入奶瓶中。
4. 盖严奶瓶盖,轻摇至奶粉充分溶解,待温度适宜时,即可喂哺婴儿。

贮存条件

本品应贮藏于阴凉干燥处。每次取出奶粉后请务必封闭严密,以防止吸潮或进入异物,勿置于冰箱内,并于开启后四周内食用完。

制造商: 青冈亚华乳多宝乳业有限责任公司
 地址: 青冈县中和镇 (原奶粉厂院内)
 产地: 黑龙江省绥化市
 曾用商品名称: 领赋羊®
 产品类别及属性: 乳基粉状婴儿配方食品
 产品标准代号: GB 10765-2021
 食品生产许可证编号: SC10523122302904
 保质期: 24 个月
 生产日期、保质期至、生产批号: 见罐底

联系我们

咨询热线
400-681-9901

官方网址
www.sijinanshan.com

菁雅

婴儿配方羊奶粉 (0-6月龄,1段)

1段

净含量: 400克
 国食注字YP20230356



营养成分表

项目	单位	每100千焦	每100克
能量	kJ	100	2045
蛋白质	g	0.55	11.3
脂肪	g	1.18	24.2
亚油酸	g	0.16	3.2
α-亚麻酸	mg	20	410
碳水化合物	g	2.7	54.6
维生素			
维生素A	μg RE	20	406
维生素D	μg	0.64	13
维生素E	mg α-TE	0.20	4.0
维生素K ₁	μg	2.10	43
维生素B ₁	μg	20	406
维生素B ₂	μg	39	797
维生素B ₆	μg	18.7	382
维生素B ₁₂	μg	0.088	1.8
烟酸(烟酰胺)	μg	169	3449
叶酸	μg	5.3	109
泛酸	μg	171	3505
维生素C	mg	3.4	69
生物素	μg	1.03	21
胆碱	mg	7.1	145
矿物质			
钠	mg	9	180
钾	mg	23	461
铜	μg	18.1	370
镁	mg	1.6	33
铁	mg	0.18	3.7
锌	mg	0.19	3.8
锰	μg	1.17	24
钙	mg	16	327
磷	mg	11	215
碘	μg	4.6	95
氯	mg	15	305
硒	μg	0.93	19
可选择成分			
肌醇	mg	4.2	85
牛磺酸	mg	1.0	20
左旋肉碱	mg	1.2	24
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.6	73
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.2	85
低聚半乳糖	mg	14	277
低聚果糖	mg	64	1313
聚葡萄糖	mg	79	1608
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.24	4.9
叶黄素	μg	3.81	78

注: 100毫升奶液≈13.5克奶粉+90毫升水(1平勺奶粉≈4.5克)。

配料

脱盐乳清粉(来源羊乳)、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、全脂羊奶粉、乳糖、聚葡萄糖、低聚果糖、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、低聚半乳糖、花生四烯酸、左旋肉碱、肌醇、牛磺酸、叶黄素。
 维生素: 维生素 C(L- 抗坏血酸)、维生素 E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素 B₆(盐酸吡哆醇)、维生素 D(胆钙化醇)、维生素 A(醋酸视黄酯)、烟酸(烟酰胺)、泛酸(D- 泛酸钙)、叶酸、维生素 K₁(植物甲萘醌)、生物素(D- 生物素)、维生素 B₂(核黄素)、维生素 B₁₂(盐酸硫酸素)、维生素 B₁₂(氰钴胺)、氯化胆碱。
 矿物质: 柠檬酸钠、碳酸钙、氯化钾、磷酸三钙、硫酸镁、碘酸钾、硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰。

过敏提示

本品含有乳及乳制品(包括乳糖)。

爱心提示

对于 0-6 月龄的婴儿最理想的食物是母乳, 在母乳不足或无母乳时可食用本产品。
 1. 喂奶时应抱着婴儿, 如有疏忽可能会引起婴儿窒息或不适。
 2. 水和奶瓶未经消毒或奶液浓度不当, 可能会引起婴儿的不适。
 3. 按照“喂哺用量建议表”的指示与冲调方法进行配制, 每次调制一次用量并立即饮用, 不要留存未喝完奶液。




序号16

●含有聚葡萄糖 ●含有肌醇 ●含有左旋肉碱 ●含有牛磺酸

喂哺用量建议表			
每次喂哺份量		每天喂哺次数	
月龄	温开水 (毫升)	奶粉 (平勺)	次
6-9月龄	210	7	4
9-12月龄	240	8	3

冲调方法



1. 调奶之前,请洗净双手,将干净的奶瓶、奶嘴、奶瓶盖放入沸水中煮5分钟消毒。
2. 调奶时,用煮沸后冷却至45°C-50°C温开水,依照喂哺用量建议表,在消毒后的奶瓶中加入需要温开水量。
3. 依照喂哺用量建议表,用产品所配粉勺量取准确份量(平勺)的较大婴儿配方奶粉,加入奶瓶中。
4. 盖严奶瓶盖,轻摇至奶粉充分溶解,待温度适宜时,即可喂哺较大婴儿。

贮存条件

本品应贮藏于阴凉干燥处。每次取出奶粉后请务必封闭严密,以防止吸潮或进入异物,勿置于冰箱内,并于开启后四周内食用完。

制造商:青冈亚华乳多宝乳业有限公司
 地址:青冈县中和镇(原奶粉厂院内)
 产地:黑龙江省绥化市
 曾用商品名称:领冠羊
 产品类别及属性:乳基粉状较大婴儿配方食品
 产品标准代号:GB 10766-2021
 食品生产许可证编号:SC10523122302904
 保质期:24个月
 生产日期、保质期至、生产批号:见罐底

联系我们

咨询热线
400-681-9901

官方网站
www.sijinanshan.com

菁雅 较大婴儿配方羊奶粉 (6-12月龄,2段)

2段

净含量:800克
 国食注字YP20230357



营养成分表			
项目	单位	每100千焦	每100克
能量	kJ	100	1995
蛋白质	g	0.58	11.6
脂肪	g	1.10	21.9
亚油酸	g	0.11	2.2
α-亚麻酸	mg	15	292
碳水化合物	g	2.8	56.2
维生素			
维生素A	μg RE	23	458
维生素D	μg	0.65	13
维生素E	mg α-TE	0.26	5.1
维生素K ₁	μg	2.51	50
维生素B ₁	μg	22	431
维生素B ₂	μg	31	612
维生素B ₆	μg	20.4	406
维生素B ₁₂	μg	0.075	1.5
烟酸(烟酰胺)	μg	194	3878
叶酸	μg	5.0	100
泛酸	μg	163	3247
维生素C	mg	3.1	62
生物素	μg	1.05	21
胆碱	mg	6.1	121
矿物质			
钠	mg	6	115
钾	mg	26	511
铜	μg	12.8	256
镁	mg	1.9	38
铁	mg	0.31	6.1
锌	mg	0.19	3.8
锰	μg	1.50	30
钙	mg	21	426
磷	mg	13	259
碘	μg	4.9	97
氯	mg	19	371
硒	μg	0.65	13
可选择成分			
肌醇	mg	3.5	69
牛磺酸	mg	1.0	20
左旋肉碱	mg	1.0	20
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.7	73
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.3	85
低聚半乳糖	mg	14	277
低聚果糖	mg	66	1313
聚葡萄糖	mg	101	2010
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.17	3.4
叶黄素	μg	7.77	155

注:100毫升奶液≈13.5克奶粉+90毫升水(1平勺奶粉≈4.5克)。

配料	
脱盐乳清粉(来源羊乳)、全脂羊奶粉、乳糖、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、聚葡萄糖、低聚果糖、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、低聚半乳糖、花生四烯酸、左旋肉碱、肌醇、牛磺酸、叶黄素。	
维生素:维生素C(L-抗坏血酸)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素B ₆ (盐酸吡哆醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素A(醋酸视黄醇)、烟酸(烟酰胺)、泛酸(D-泛酸钙)、生物素(D-生物素)、维生素K ₁ (植物甲萘醌)、叶酸、维生素B ₁₂ (核黄素)、维生素B ₁ (盐酸硫胺素)、维生素B ₂ (氰钴胺)、氯化胆碱。	
矿物质:碳酸钙、磷酸三钙、氯化钾、硫酸镁、硫酸钾、硫酸亚铁、硫酸铜、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰。	

过敏提示

本品含有乳及乳制品(包括乳糖)。

爱心提示

6-12月的较大婴儿食用本产品时,须配合添加辅助食品。食用和冲调较大婴儿配方奶粉以及其他与喂哺有关的事宜,请遵循专业人员的指导。

1. 喂奶时应抱着较大婴儿,如有疏忽可能会引起较大婴儿窒息或不适。
2. 水和奶瓶未经消毒或奶液浓度不当,可能会引起较大婴儿的不适。
3. 按照“喂哺用量建议表”的指示与冲调方法进行配制,每次调制一次用量并立即饮用,不要留存未喝完奶液。

清洁卫生 绿化环境



6 975737 550057


序号17

●含有聚葡萄糖 ●含有肌醇 ●含有左旋肉碱 ●含有牛磺酸

喂哺用量建议表

每次喂哺份量		每天喂哺次数	
月龄	温开水 (毫升)	奶粉 (平勺)	次
6-9月龄	210	7	4
9-12月龄	240	8	3

冲调方法



1. 调奶之前,请洗净双手,将干净的奶瓶、奶嘴、奶瓶盖放入沸水中煮5分钟消毒。
2. 调奶时,用煮沸后冷却至45°C-50°C温开水,依照喂哺用量建议表,在消毒后的奶瓶中加入需要温开水量。
3. 依照喂哺用量建议表,用产品所配粉勺量取准确份量(平勺)的较大婴儿配方奶粉,加入奶瓶中。
4. 盖严奶瓶盖,轻摇至奶粉充分溶解,待温度适宜时,即可喂哺较大婴儿。

贮存条件

本品应贮藏于阴凉干燥处。每次取出奶粉后请务必封闭严密,以防止吸潮或进入异物,勿置于冰箱内,并于开启后四周内食用完。

制造商:青冈亚华乳多宝乳业有限公司

地址:青冈县中和镇(原奶粉厂院内)

产地:黑龙江省绥化市

曾用名:领赋羊

产品类别及属性:乳基粉状较大婴儿配方食品

产品标准代号:GB 10766-2021

食品生产许可证编号:SC10523122302904

保质期:24个月

生产日期、保质期至、生产批号:见罐底

联系我们

咨询热线

400-681-9901



官方网址

www.sijinanshan.com


菁雅

较大婴儿配方羊奶粉 (6-12月龄,2段)

2段

净含量:400克

国食注字YP20230357



营养成分表

项目	单位	每100千焦	每100克
能量	kJ	100	1995
蛋白质	g	0.58	11.6
脂肪	g	1.10	21.9
亚油酸	g	0.11	2.2
α-亚麻酸	mg	15	292
碳水化合物	g	2.8	56.2
维生素			
维生素A	μg RE	23	458
维生素D	μg	0.65	13
维生素E	mg α-TE	0.26	5.1
维生素K ₁	μg	2.51	50
维生素B ₁	μg	22	431
维生素B ₂	μg	31	612
维生素B ₆	μg	20.4	406
维生素B ₁₂	μg	0.075	1.5
烟酸(烟酰胺)	μg	194	3878
叶酸	μg	5.0	100
泛酸	μg	163	3247
维生素C	mg	3.1	62
生物素	μg	1.05	21
胆碱	mg	6.1	121
矿物质			
钠	mg	6	115
钾	mg	26	511
铜	μg	12.8	256
镁	mg	1.9	38
铁	mg	0.31	6.1
锌	mg	0.19	3.8
锰	μg	1.50	30
钙	mg	21	426
磷	mg	13	259
碘	μg	4.9	97
氯	mg	19	371
硒	μg	0.65	13
可选择成分			
肌醇	mg	3.5	69
牛磺酸	mg	1.0	20
左旋肉碱	mg	1.0	20
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.7	73
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.3	85
低聚半乳糖	mg	14	277
低聚果糖	mg	66	1313
聚葡萄糖	mg	101	2010
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.17	3.4
叶黄素	μg	7.77	155

注:100毫升奶液≈13.5克奶粉+90毫升水(1平勺奶粉≈4.5克)。

配料

脱盐乳清粉(来源羊乳)、全脂羊奶粉、乳糖、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、聚葡萄糖、低聚果糖、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、低聚半乳糖、花生四烯酸、左旋肉碱、肌醇、牛磺酸、叶黄素。
维生素:维生素C(L-抗坏血酸)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素A(醋酸视黄酯)、烟酸(烟酰胺)、泛酸(D-泛酸钙)、生物素(D-生物素)、维生素K₁(植物甲萘醌)、叶酸、维生素B₂(核黄素)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₁₂(氰钴胺)、氯化胆碱。
矿物质:碳酸钙、磷酸三钙、氯化钾、硫酸镁、碘酸钾、硫酸亚铁、硫酸铜、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰。

过敏提示

本品含有乳及乳制品(包括乳糖)。

爱心提示

6-12月的较大婴儿食用本产品时,须配合添加辅助食品。食用和冲调较大婴儿配方奶粉以及其它与喂哺有关的事宜,请遵循专业人员的指导。

1. 喂奶时应抱着较大婴儿,如有疏忽可能会引起较大婴儿窒息或不适。
2. 水和奶瓶未经消毒或奶液浓度不当,可能会引起较大婴儿的不适。
3. 按照“喂哺用量建议表”的指示与冲调方法进行配制,每次调制一次用量并立即饮用,不要留存未喝完奶液。



清洁卫生
绿化环境




序号18

● 含有聚葡萄糖 ● 含有肌醇 ● 含有左旋肉碱 ● 含有牛磺酸

喂哺用量建议表

每次喂哺份量		每天喂哺次数	
月龄	温开水 (毫升)	奶粉 (平勺)	次
12-36月龄	240	8	2-3

冲调方法



1. 调奶之前, 请洗净双手, 将干净的奶瓶、奶嘴、奶瓶盖放入沸水中煮 5 分钟消毒。
2. 调奶时, 用煮沸后冷却至 45°C-50°C 温开水, 依照喂哺用量建议表, 在消毒后的奶瓶中加入需要温开水量。
3. 依照喂哺用量建议表, 用产品所配粉勺量取准确份量 (平勺) 的幼儿配方奶粉, 加入奶瓶中。
4. 盖严奶瓶盖, 轻摇至奶粉充分溶解, 待温度适宜时, 即可喂哺幼儿。

贮存条件

本品应贮藏于阴凉干燥处。每次取出奶粉后请务必封闭严密, 以防止吸潮或进入异物, 勿置于冰箱内, 并于开启后四周内食用完。

制造商: 青冈亚华乳多宝乳业有限公司
地址: 青冈县中和镇 (原乳粉厂院内)
产地: 黑龙江省绥化市
曾用商品名称: 领冠羊®
产品类别及属性: 乳基粉状幼儿配方食品
产品标准代号: GB 10767-2021
食品生产许可证编号: SC10523122302904
保质期: 24 个月
生产日期、保质期至、生产批号: 见罐底

联系我们

咨询热线
400-681-9901

官方网址
www.sijinanshan.com

3 段

净含量: 800克
国食注字YP20230358

菁雅

幼儿配方羊奶粉
(12-36月龄, 3段)



营养成分表

项目	单位	每100千焦	每100克
能量	kJ	100	1984
蛋白质	g	0.60	11.9
脂肪	g	1.08	21.4
亚油酸	g	0.11	2.2
α-亚麻酸	mg	15	293
碳水化合物	g	2.8	56.3
维生素			
维生素A	μg RE	23	459
维生素D	μg	0.66	13
维生素E	mg α-TE	0.26	5.1
维生素K ₁	μg	2.52	50
维生素B ₁	μg	22	433
维生素B ₂	μg	34	674
维生素B ₆	μg	20.5	406
维生素B ₁₂	μg	0.076	1.5
烟酸(烟酰胺)	μg	196	3886
叶酸	μg	5.1	101
泛酸	μg	165	3279
维生素C	mg	3.1	62
生物素	μg	1.11	22
矿物质			
钠	mg	6	119
钾	mg	24	481
铜	μg	13.0	257
镁	mg	2.0	39
铁	mg	0.31	6.1
锌	mg	0.17	3.4
钙	mg	22	435
磷	mg	14	268
碘	μg	5.0	99
氯	mg	19	383
可选择成分			
硒	μg	0.66	13
胆碱	mg	6.2	123
肌醇	mg	3.6	71
牛磺酸	mg	1.1	21
左旋肉碱	mg	1.0	20
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	1.9	38
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	2.2	43
低聚半乳糖	mg	14	277
低聚果糖	mg	66	1313
聚葡萄糖	mg	101	2010
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.17	3.4
叶黄素	μg	7.81	155

注: 100毫升奶液≈13.5克奶粉+90毫升水(1平勺奶粉≈4.5克)。

配料

脱盐乳清粉(来源羊乳)、全脂羊奶粉、乳糖、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、聚葡萄糖、低聚果糖、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、低聚半乳糖、花生四烯酸、氯化胆碱、左旋肉碱、肌醇、牛磺酸、叶黄素。

维生素: 维生素 C(L-抗坏血酸)、维生素 E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素 B₆(盐酸吡哆醇)、维生素 D(胆钙化醇)、维生素 A(醋酸视黄酯)、烟酸(烟酰胺)、泛酸(D-泛酸钙)、生物素(D-生物素)、维生素 B₁₂(核黄素)、维生素 K₁(植物甲萘醌)、叶酸、维生素 B₁(盐酸硫胺素)、维生素 B₂(核黄素)。
矿物质: 碳酸钙、磷酸三钙、氯化钾、硫酸镁、碘酸钾、硫酸亚铁、硫酸铜、硫酸锌、亚硒酸钠。

过敏提示

本品含有乳及乳制品(包括乳糖)。

爱心提示

12-36 月的幼儿食用本品时, 请在两餐之间补喂适量温开水。食用和冲调幼儿配方奶粉以及其他与喂哺有关的事宜, 请遵循专业人员的指导。

1. 喂奶时应抱着幼儿, 如有疏忽可能会引起幼儿窒息或不适。
2. 水和奶瓶未经消毒或奶液浓度不当, 可能会引起幼儿的不适。
3. 按照“喂哺用量建议表”的指示与冲调方法进行配制, 每次调制一次用量并立即饮用, 不要留存未喝完奶液。

清洁卫生
绿化环境



序号19

●含有聚葡萄糖 ●含有肌醇 ●含有左旋肉碱 ●含有牛磺酸

喂哺用量建议表			
每次喂哺份量		每天喂哺次数	
月龄	温开水 (毫升)	奶粉 (平均)	次
12-36月龄	240	8	2-3

冲调方法



1. 调奶之前, 请洗净双手, 将干净的奶瓶、奶嘴、奶瓶盖放入沸水中煮 5 分钟消毒。
2. 调奶时, 用煮沸后冷却至 45°C-50°C 温开水, 依照喂哺用量建议表, 在消毒后的奶瓶中加入需要温开水量。
3. 依照喂哺用量建议表, 用产品所配粉勺量取准确份量 (平均) 的幼儿配方奶粉, 加入奶瓶中。
4. 盖严奶瓶盖, 轻摇至奶粉充分溶解, 待温度适宜时, 即可喂哺幼儿。

贮存条件

本品应贮藏于阴凉干燥处。每次取出奶粉后请务必封闭严密, 以防止吸潮或进入异物, 勿置于冰箱内, 并于开启后四周内食用完。

制造商: 青冈亚华乳多宝乳业有限责任公司
 地址: 青冈县中和镇(原乳粉厂院内)
 产地: 黑龙江省绥化市
 曾用商品名称: 领赋羊®
 产品类别及属性: 乳基粉状幼儿配方食品
 产品标准代号: GB 10767-2021
 食品生产许可证编号: SC10523122302904
 保质期: 24 个月
 生产日期、保质期至、生产批号: 见罐底

联系我们

咨询热线
400-681-9901

官方网址
www.sijinanshan.com

3 段

净含量: 400克
 国食注字YP20230358

菁雅 幼儿配方羊奶粉 (12-36月龄, 3段)



营养成分表			配料	
项目	单位	每100千焦	每100克	
能量	kJ	100	1984	脱盐乳清粉(来源羊乳)、全脂羊奶粉、乳糖、食用
蛋白质	g	0.60	11.9	植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵
脂肪	g	1.08	21.4	花籽油、椰子油、亚麻籽油)、聚葡萄糖、低聚果糖、
亚油酸	g	0.11	2.2	二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、低聚半乳糖、花
α-亚麻酸	mg	15	293	生四烯酸、氯化胆碱、左旋肉碱、肌醇、牛磺酸、叶
碳水化合物	g	2.8	56.3	黄素。
维生素				维生素: 维生素 C(L-抗坏血酸)、维生素 E(dl-α-
维生素A	μg RE	23	459	脂酸生育酚)、维生素 B ₆ (盐酸吡哆醇)、维生素 D
维生素D	μg	0.66	13	(胆钙化醇)、维生素 A(酯化视黄酯)、烟酸(烟酰
维生素E	mg α-TE	0.26	5.1	胺)、泛酸(D-泛酸钙)、生物素(D-生物素)、维生
维生素K ₁	μg	2.52	50	素 B ₂ (核黄素)、维生素 K ₁ (植物甲萘醌)、叶酸、维
维生素B ₁	μg	22	433	生素 B ₃ (盐酸硫胺素)、维生素 B ₁₂ (氰钴胺)。
维生素B ₂	μg	34	674	矿物质: 碳酸钙、磷酸三钙、氯化钾、硫酸镁、碘酸
维生素B ₆	μg	20.5	406	钾、硫酸亚铁、硫酸铜、硫酸锌、亚硒酸钠。
维生素B ₁₂	μg	0.076	1.5	
烟酸(烟酰胺)	μg	196	3886	
叶酸	μg	5.1	101	
泛酸	μg	165	3279	
维生素C	mg	3.1	62	
生物素	μg	1.11	22	
矿物质				
钠	mg	6	119	
钾	mg	24	481	
铜	μg	13.0	257	
镁	mg	2.0	39	
铁	mg	0.31	6.1	
锌	mg	0.17	3.4	
钙	mg	22	435	
磷	mg	14	268	
碘	μg	5.0	99	
氯	mg	19	383	
可选择成分				
硒	μg	0.66	13	
胆碱	mg	6.2	123	
肌醇	mg	3.6	71	
牛磺酸	mg	1.1	21	
左旋肉碱	mg	1.0	20	
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	1.9	38	
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	2.2	43	
低聚半乳糖	mg	14	277	
低聚果糖	mg	66	1313	
聚葡萄糖	mg	101	2010	
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.17	3.4	
叶黄素	μg	7.81	155	

注: 100毫升奶液≈13.5克奶粉+90毫升水(1平均奶粉≈4.5克)。

过敏提示

本品含有乳及乳制品(包括乳糖)。

爱心提示

12-36 月的幼儿食用本品时, 请在两餐之间补喂适量温开水。食用和冲调幼儿配方奶粉以及其它与喂哺有关的事宜, 请遵循专业人员的指导。

1. 喂奶时应抱着幼儿, 如有疏忽可能会引起幼儿窒息或不适。

2. 水和奶瓶未经消毒或奶液浓度不当, 可能会引起幼儿的不适。

3. 按照“喂哺用量建议表”的指示与冲调方法进行配制, 每次调制一次用量并立即饮用, 不要留存未喝完奶液。





国食注字:YP20230353


序号20

喂哺用量建议表

每次喂哺份量

月龄	温开水(毫升)	奶粉(平勺)	每天喂哺次数(次)
1-2周	60	2	7-8
2周-1月龄	90	3	6
1-2月龄	120	4	5
2-4月龄	180	6	5
4-6月龄	210	7	4-5

冲调方法



1. 调奶之前,请洗净双手,将干净的奶瓶、奶嘴、奶瓶盖放入沸水中煮5分钟消毒。
2. 调奶时,用煮沸后冷却至45°C-50°C温开水,依照喂哺用量建议表,在消毒后的奶瓶中加入需要温开水量。
3. 依照喂哺用量建议表,用产品所配粉勺量取准确份量(平勺)的婴儿配方奶粉,加入奶瓶中。
4. 盖严奶瓶盖,轻摇至奶粉充分溶解,待温度适宜时,即可喂哺婴儿。

贮存条件

本品应贮藏于阴凉干燥处,每次取出奶粉后请务必密封严密,以防止吸潮或进入异物,
勿置于冰箱内,并于开启后四周内食用完。

制造商:青冈亚华乳多宝乳业有限责任公司

地址:青冈县中和镇(原乳粉厂院内)

产地:黑龙江省绥化市

产品类别及属性:乳基粉状婴儿配方食品

产品标准代号:GB 10765-2021

食品生产许可证编号:SC10523122302904

保质期:24个月

生产日期、保质期至、生产批号:见罐底

更多产品及服务请咨询(市话资费)

400-109-8968

www.sijinnanshan.com

service@avadairy.com



领昱

婴儿配方奶粉

(0-6月龄,1段)

1段

净含量:800克

营养成分表

项目	单位	每100千焦	每100克
能量	kJ	100	2068
蛋白质	g	0.56	11.5
脂肪	g	1.22	25.3
亚油酸	g	0.16	3.3
α -亚麻酸	mg	20	418
碳水化合物	g	2.6	53.5
维生素A	μ g RE	20	404
维生素D	μ g	0.63	13
维生素E	mg α -TE	0.19	4.0
维生素K ₁	μ g	2.08	43
维生素B ₁	μ g	20	409
维生素B ₂	μ g	47	976
维生素B ₆	μ g	17.7	367
维生素B ₁₂	μ g	0.092	1.9
烟酸(烟酰胺)	μ g	163	3365
叶酸	μ g	5.4	112
泛酸	μ g	163	3367
维生素C	mg	3.3	69
生物素	μ g	0.73	15
胆碱	mg	6.0	125
矿物质			
钠	mg	8	174
钾	mg	23	466
铜	μ g	17.9	370
镁	mg	1.5	32
铁	mg	0.18	3.7
锌	mg	0.19	3.9
锰	μ g	1.45	30
钙	mg	17	354
磷	mg	9	176
氯	μ g	5.1	105
硒	mg	16	337
维生素	μ g	0.97	20
可选择成分			
肌醇	mg	1.7	35
牛磺酸	mg	1.0	21
左旋肉碱	mg	0.6	13
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.9	80
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.4	92
低聚半乳糖	mg	27	553
低聚果糖	mg	138	2862
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.25	5.1
酪蛋白磷酸肽	mg	3.14	65

注:100毫升奶液 $\approx$ 13.5克奶粉+90毫升水(1平勺奶粉 $\approx$ 4.5克)。

配料

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、乳糖、低聚果糖、低聚半乳糖、花生四烯酸、乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、酪蛋白磷酸肽、左旋肉碱、牛磺酸、肌醇。

维生素:维生素C(L-抗坏血酸)、维生素E(DL- α -醋酸生育酚)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素A(醋酸视黄酯)、烟酸(烟酰胺)、泛酸(D-泛酸钙)、叶酸、维生素K₁(植物甲萘醌)、生物素(D-生物素)、维生素B₁(核黄素)、维生素B₂(盐酸硫胺素)、维生素B₁₂(氰钴胺)、氯化胆碱。

矿物质:氯化钾、柠檬酸钠、碳酸钙、磷酸三钙、硫酸镁、碘酸钾、硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰。

本产品含有乳糖和乳蛋白质,乳糖不耐受和乳蛋白过敏者慎用或遵医嘱。

爱心提示

对于0-6月龄的婴儿最理想的食品是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

1.喂奶时应抱着婴儿,如有疏忽可能会引起婴儿窒息或不适。

2.水和奶瓶未经消毒或奶液浓度不当,可能会引起婴儿的不适。

3.按照“喂哺用量建议表”的指示与冲调方法进行配制,每次调制一次用量并立即取用,不要留存未喝完奶液。

请仔细阅读使用说明

清洁卫生
绿化环境

6 930713 600539


序号21

哺育用量建议表

每次哺育份量

月龄	温开水(毫升)	奶粉(平勺)	每天哺育次数(次)
1-2周	60	2	7-8
2周-1月龄	90	3	6
1-2月龄	120	4	5
2-4月龄	180	6	5
4-6月龄	210	7	4-5

冲调方法



1. 调奶之前,请洗净双手,将干净的奶瓶、奶嘴、奶瓶盖放入沸水中煮5分钟消毒。
2. 调奶时,用煮沸后冷却至45°C-50°C温开水,依照哺育用量建议表,在消毒后的奶瓶中加入需要温开水量。
3. 依照哺育用量建议表,用产品所配粉勺量取准确份量(平勺)的婴儿配方奶粉,加入奶瓶中。
4. 盖严奶瓶盖,轻轻至奶粉充分溶解,待温度适宜时,即可哺育婴儿。

贮存条件

本品应贮藏于阴凉干燥处,每次取出奶粉后请务必密封严密,以防止吸潮或进入异物,
勿置于冰箱内,并于开启后四周内食用完。

制造商:青冈亚华乳多宝乳业有限公司
地址:青冈县中和镇(原乳粉厂院内)
产地:黑龙江省绥化市
产品类别及属性:乳基粉状婴儿配方食品
产品标准代号:GB 10765-2021
食品生产许可证编号:SC10523122302904
保质期:12个月
生产日期、保质期至、生产批号:见罐底

更多产品及服务请咨询(市话免费)

400-109-8968

www.sijinanshan.com
service@avadairy.com



四季南山®

国食注字:YP20230353

领昱

婴儿配方奶粉

(0-6月龄,1段)

1段

净含量:100克



营养成分表

项目	单位	每100千焦	每100克
能量	KJ	100	2068
蛋白质	g	0.56	11.5
脂肪	g	1.22	25.3
亚油酸	g	0.16	3.3
α-亚麻酸	mg	20	418
碳水化合物	g	2.6	53.5
维生素			
维生素A	μg RE	20	404
维生素D	μg	0.63	13
维生素E	mg α-TE	0.19	4.0
维生素B ₁	μg	2.08	43
维生素B ₂	μg	20	409
维生素B ₆	μg	47	976
维生素B ₁₂	μg	17.7	367
烟酸(烟酰胺)	μg	0.092	1.9
叶酸	μg	163	3365
泛酸	μg	5.4	112
维生素C	μg	163	3367
生物素	μg	3.3	69
胆碱	μg	0.73	15
矿物质			
钠	mg	6.0	125
钾	mg	8	174
铜	mg	23	466
铁	μg	17.9	370
锌	mg	1.5	32
锰	mg	0.18	3.7
钴	mg	0.19	3.9
钙	μg	1.45	30
磷	mg	17	354
镁	mg	9	176
碘	μg	5.1	105
氯	μg	16	337
可选择成分			
肌醇	mg	1.7	35
牛磺酸	mg	1.0	21
左旋肉碱	mg	0.6	13
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.9	80
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.4	92
低聚半乳糖	mg	27	553
低聚果糖	mg	138	2862
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.25	5.1
酪蛋白磷酸肽	mg	3.14	65

注:100毫升奶液≈13.5克奶粉+90毫升水(1平勺奶粉≈4.5克)。

配料


生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物油和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、乳糖、低聚果糖、低聚半乳糖、花生四烯酸、乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸油酯(发酵法)、酪蛋白磷酸肽、左旋肉碱、牛磺酸、肌醇、维生素、维生素C(L-抗坏血酸)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素A(醋酸视黄醇)、烟酸(烟酰胺)、泛酸(D-泛酸钙)、叶酸、维生素K₁(植物甲萘醌)、生物素(D-生物素)、维生素B₁₂(核黄素)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(富钴胺)、氯化胆碱、矿物质:氯化钾、柠檬酸钠、碳酸钙、磷酸三钙、硫酸镁、磷酸钾、硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰。

本产品含有乳糖和乳蛋白质,乳糖不耐受和乳蛋白过敏者慎用或遵医嘱。

爱心提示

对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。
1. 喂奶时应抱着婴儿,如有疏忽可能会引起婴儿窒息或不洁。
2. 水和奶瓶未经消毒或奶液浓度不当,可能会引起婴儿的不洁。
3. 按照“哺育用量建议表”的指示与冲调方法进行配制,每次调制一次用量并立即饮用,不要留存未喝完奶液。

常用商品名称:倍尔富

清洁卫生
绿色环境

6 930713 600560


序号22

喂哺用量建议表

每次喂哺份量

月龄	温开水(毫升)	奶粉(平勺)	每天喂哺次数(次)
1-2周	60	2	7-8
2周-1月龄	90	3	6
1-2月龄	120	4	5
2-4月龄	180	6	5
4-6月龄	210	7	4-5

冲调方法



1. 调奶之前,请洗净双手,将干净的奶瓶、奶嘴、奶瓶盖放入沸水中煮5分钟消毒。
2. 调奶时,用煮沸后冷却至45°C-50°C温开水,依照喂哺用量建议表,在消毒后的奶瓶中加入需要温开水。
3. 依照喂哺用量建议表,用产品所配粉勺量取准确份量(平勺)的婴儿配方奶粉,加入奶瓶中。
4. 盖严奶瓶盖,轻摇至奶粉充分溶解,待温度适宜时,即可喂哺婴儿。

贮存条件

本品应贮藏于阴凉干燥处,每次取出奶粉后请务必封闭严密,以防止吸潮或进入异物,勿置于冰箱内,并于开启后四周内食用完。

制造商:青网亚华乳多宝乳业有限责任公司

地址:青网县中和镇(原奶粉厂院内)

产地:黑龙江省绥化市

产品类别及属性:乳基粉状婴儿配方食品

产品标准代号:GB 10765-2021

食品生产许可证编号:SC10523122302904

保质期:24个月

生产日期、保质期至、生产批号:见罐底

更多产品及服务咨询(市话免费)

400-109-8968

www.sijinanshan.com
service@avadairy.com

国食注字:YP20230353

领昱

婴儿配方奶粉

(0-6月龄,1段)

1段

净含量:418克

营养成分表

项目	单位	每100千焦	每100克
能量	kJ	100	2068
蛋白质	g	0.56	11.5
脂肪	g	1.22	25.3
亚油酸	g	0.16	3.3
α -亚麻酸	mg	20	418
碳水化合物	g	2.6	53.5
维生素			
维生素A	μ g RE	20	404
维生素D	μ g	0.63	13
维生素E	mg α -TE	0.19	4.0
维生素K ₁	μ g	2.08	43
维生素B ₁	μ g	20	409
维生素B ₂	μ g	47	976
维生素B ₆	μ g	17.7	367
维生素B ₁₂	μ g	0.092	1.9
烟酸(烟酰胺)	μ g	163	3365
叶酸	μ g	5.4	112
泛酸	μ g	163	3367
维生素C	mg	3.3	69
生物素	μ g	0.73	15
胆碱	mg	6.0	125
矿物质			
钠	mg	8	174
钾	mg	23	466
铜	μ g	17.9	370
镁	mg	1.5	32
铁	mg	0.18	3.7
锌	mg	0.19	3.9
锰	μ g	1.45	30
钙	mg	17	354
磷	mg	9	176
碘	μ g	5.1	105
氯	mg	16	337
硒	μ g	0.97	20
可选择成分			
肌醇	mg	1.7	35
牛磺酸	mg	1.0	21
左旋肉碱	mg	0.6	13
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	3.9	80
二十碳四烯酸(AA)(ARA)	mg	4.4	92
低聚半乳糖	mg	27	553
低聚果糖	mg	138	2862
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.25	5.1
酪蛋白磷酸肽	mg	3.14	65

注:100毫升奶液 $\approx$ 13.5克奶粉+90毫升水(1平勺奶粉 $\approx$ 4.5克)。

配料

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物油和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、乳糖、低聚果糖、低聚半乳糖、花生四烯酸、乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸油酯(发酵法)、酪蛋白磷酸肽、左旋肉碱、牛磺酸、肌醇。

维生素:维生素C(抗坏血酸)、维生素E(dl- α -生育酚)、维生素B₁(盐酸吡哆醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素A(视黄醇)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(吡哆醇)、维生素K₁(植物甲萘醌)、生物素(D-生物素)、维生素B₁₂(钴胺素)、维生素B₃(烟酰胺)、维生素B₅(泛酸)、维生素B₇(生物素)、维生素B₉(叶酸)、维生素B₁₂(钴胺素)、维生素B₁₂(钴胺素)、维生素B₁₂(钴胺素)。

矿物质:氯化钾、柠檬酸钠、磷酸钙、磷酸二钙、磷酸镁、磷酸钾、磷酸铜、磷酸亚铁、硫酸锌、亚硫酸钠、硫酸锰。

本产品含有乳糖和乳蛋白,乳糖不耐受和乳蛋白过敏者慎用或遵医嘱。

爱心提示

对于0-6月龄的婴儿,最理想的食品是母乳。在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

1. 喂奶时应抱着婴儿,如有疏忽可能会引起婴儿窒息或不适。
2. 水和奶粉未经消毒或奶液浓度不当,可能会引起婴儿的不适。
3. 按照“喂哺用量建议表”的指示与冲调方法进行配制,每次调制一次用量并立即饮用,不要留存未喝完奶液。

食品名称和规格

清洁卫生
绿化环境

6 930713 600478



国食注字:YP20230354

序号23


含有肌醇,含有左旋肉碱,含有牛磺酸,含有1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯。

喂哺用量建议表

每次喂哺份量

月龄	温开水(毫升)	奶粉(平勺)	每天喂哺次数(次)
6-9月龄	210	7	4
9-12月龄	240	8	3

冲调方法



1. 喂奶前,请洗净双手,将干净的奶瓶、奶嘴、奶瓶盖放入沸水中煮5分钟消毒。
2. 喂奶时,用煮沸后冷却至45°C-50°C温开水,依照喂哺用量建议表,在消毒后的奶瓶中加入需要温开水。
3. 依照喂哺用量建议表,用产品所配粉勺量取准确份量(平勺)的较大婴儿配方奶粉,加入奶瓶中。
4. 盖严奶瓶盖,轻摇至奶粉充分溶解,待温度适宜时,即可喂哺较大婴儿。

贮存条件

本品应贮藏于阴凉干燥处,每次取出奶粉后请务必封闭严密,以防止吸潮或进入异物,勿置于冰箱内,并于开启后四周内食用完。

制造商:青冈亚华乳多宝乳业有限责任公司
地址:青冈县中和镇(原乳粉厂院内)
产地:黑龙江省绥化市
产品类别及属性:乳基粉状较大婴儿配方食品
产品标准代号:GB 10766-2021
食品生产许可证编号:SC10523122302904
保质期:24个月
生产日期、保质期至、生产批号:见罐底

更多产品及服务请咨询(市话资费)

400-109-8968

www.sijinanshan.com
service@avadairy.com

领昱

较大婴儿配方奶粉
(6-12月龄,2段)

2段

净含量:800克

营养成分表

项目	单位	每100千焦	每100克
能量	kJ	100	2000
蛋白质	g	0.67	13.3
脂肪	g	1.10	21.9
亚油酸	g	0.13	2.6
α-亚麻酸	mg	16	325
碳水化合物	g	2.8	55.1
维生素			
维生素A	μg RE	23	464
维生素D	μg	0.65	13
维生素E	mg α-TE	0.29	5.8
维生素K ₁	μg	2.45	49
维生素B ₁	μg	22	441
维生素B ₂	μg	46	918
维生素B ₆	μg	18.6	372
维生素B ₁₂	μg	0.095	1.9
烟酸(烟酰胺)	μg	191	3811
叶酸	μg	53	106
泛酸	μg	170	3396
维生素C	mg	3.1	62
生物素	μg	0.90	18
胆碱	mg	6.0	119
矿物质			
钠	mg	7	133
钾	mg	24	482
铜	μg	12.5	250
镁	mg	1.9	38
铁	mg	0.31	6.1
锌	mg	0.20	3.9
钙	μg	1.55	31
磷	mg	22	433
碘	mg	11	227
氯	μg	5.4	107
硒	mg	17	336
可溶性成分			
肌醇	mg	1.7	34
牛磺酸	mg	1.1	21
左旋肉碱	mg	0.7	13
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.0	80
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.6	92
低聚果糖	mg	28	553
低聚乳糖	mg	143	2862
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.20	3.9
酪蛋白磷酸肽	mg	3.25	65

注:100毫升奶液≈13.5克奶粉+90毫升水(1平勺奶粉≈4.5克)。

配料

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、乳糖、脱脂奶粉、低聚果糖、低聚半乳糖、花生四烯酸、乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、酪蛋白磷酸肽、左旋肉碱、牛磺酸、肌醇。

维生素:维生素C(L-抗坏血酸)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素A(醋酸视黄酯)、烟酸(烟酰胺)、泛酸(D-泛酸钙)、叶酸、维生素K₁(植物甲萘醌)、生物素(D-生物素)、维生素B₁₂(钴胺素)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、氯化胆碱。

矿物质:氯化钾、柠檬酸钠、碳酸钾、磷酸三钙、硫酸镁、硫酸钾、硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰。

本产品含有乳糖和乳蛋白,乳糖不耐受和乳蛋白过敏者慎用或遵医嘱。

爱心提示

6-12月的较大婴儿食用本产品时,须配合添加辅助食品。食用和冲调较大婴儿配方奶粉以及其它与喂哺有关的事宜,请遵循专业人员的指导。

1. 喂奶时应抱着较大婴儿,如有疏忽可能会引起较大婴儿窒息或不适。
2. 水和奶瓶未经消毒或奶液浓度不当,可能会引起较大婴儿的不适。
3. 按照“喂哺用量建议表”的指示与冲调方法进行配制,每次调制一次用量并立即饮用,不要留存未喝完奶液。

请仔细阅读说明

清洁卫生
绿化环境

6 9 3 0 7 1 3 6 0 0 5 4 6

序号24

含有肌醇,含有左旋肉碱,含有牛磺酸,含有1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯。

四季南山®

国食注字:YP20230354

领昱


较大婴儿配方奶粉
(6-12月龄,2段)

喂哺用量建议表

每次喂哺份量

月龄	温开水(毫升)	奶粉(平勺)	每天喂哺次数(次)
6-9月龄	210	7	4
9-12月龄	240	8	3

冲调方法



1. 调奶之前,请洗净双手,将干净的奶瓶、奶嘴、奶瓶盖放入沸水中煮5分钟消毒。
2. 调奶时,用煮沸后冷却至45°C-50°C温开水,依照喂哺用量建议表,在消毒后的奶瓶中加入需要温开水量。
3. 依照喂哺用量建议表,用产品所配粉勺量取准确份量(平勺)的较大婴儿配方奶粉,加入奶瓶中。
4. 盖严奶瓶盖,轻摇至奶粉充分溶解,待温度适宜时,即可喂哺较大婴儿。

贮存条件

本品应贮藏于阴凉干燥处,每次取出奶粉后请务必密封严密,防止吸潮或进入异物,
勿置于冰箱内,并于开启后四周内食用完。

制造商:青网亚华乳多宝乳业有限公司
地址:青网县中和镇(原奶粉厂院内)
产地:黑龙江省绥化市
产品类别及属性:乳基粉状较大婴儿配方食品
产品标准代号:GB 10766-2021
食品生产许可证编号:SC10523122302904
保质期:24个月
生产日期、保质期至、生产批号:见罐底

更多产品及服务咨询(市话资费)

400-109-8968

www.sijinanshan.com
service@avadairy.com

2段

净含量:418克

营养成分表

项目	单位	每100千焦	每100克
能量	kJ	100	2000
蛋白质	g	0.67	13.3
脂肪	g	1.10	21.9
亚油酸	g	0.13	2.6
α -亚麻酸	mg	16	325
碳水化合物	g	2.8	55.1
维生素			
维生素A	$\mu\text{g RE}$	23	464
维生素D	μg	0.65	13
维生素E	$\text{mg } \alpha\text{-TE}$	0.29	5.8
维生素K ₁	μg	2.45	49
维生素B ₁	μg	22	441
维生素B ₂	μg	46	918
维生素B ₆	μg	18.6	372
维生素B ₁₂	μg	0.095	1.9
烟酸(烟酰胺)	μg	191	3811
叶酸	μg	5.3	106
泛酸	μg	170	3396
维生素C	mg	3.1	62
生物素	μg	0.90	18
胆碱	mg	6.0	119
矿物质			
钠	mg	7	133
钾	mg	24	482
铜	μg	12.5	250
镁	mg	1.9	38
铁	mg	0.31	6.1
锌	mg	0.20	3.9
锰	μg	1.55	31
钙	mg	22	433
磷	mg	11	227
碘	μg	5.4	107
氯	mg	17	336
硒	μg	0.75	15
可溶性成分			
肌醇	mg	1.7	34
牛磺酸	mg	1.1	21
左旋肉碱	mg	0.7	13
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.0	80
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.6	92
低聚半乳糖	mg	28	553
低聚果糖	mg	143	2862
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.20	3.9
酪蛋白磷酸肽	mg	3.25	65

注:100毫升奶液≈13.5克奶粉+90毫升水(1平勺奶粉≈4.5克)。

配料

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物油和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、乳糖、脱脂奶粉、低聚果糖、低聚半乳糖、花生四烯酸、乳清蛋白粉、二十二碳六烯酸油酯(发酵法)、酪蛋白磷酸肽、左旋肉碱、牛磺酸、肌醇、
维生素、维生素C(抗坏血酸)、维生素E(d- α -生育酚)、维生素B₁(盐酸吡哆醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素A(视黄醇)、烟酸(烟酰胺)、泛酸(D-泛酸钙)、叶酸、维生素K₁(植物甲萘醌)、生物素(D-生物素)、维生素B₆(核黄素)、维生素B₁₂(钴胺素)、维生素D₂(麦角钙化醇)、氯化钾、
矿物质:氯化钾、柠檬酸钠、碳酸氢钙、磷酸三钙、硫酸镁、磷酸钾、磷酸铜、磷酸亚铁、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰。

本产品含有乳糖和乳蛋白质,乳糖不耐受和乳蛋白过敏者慎用或遵医嘱。

爱心提示

6-12月的较大婴儿食用本产品时,须配合添加辅助食品。食用和冲调较大婴儿配方奶粉以及其它与喂哺有关的事宜,请遵循专业人士的指示。

1. 喂奶时应抱着较大婴儿,如有疏忽可能会引起较大婴儿窒息或不适。
2. 水和奶瓶未经消毒或奶液浓度不当,可能会引起较大婴儿的不适。
3. 按照“喂哺用量建议表”的指示与冲调方法进行配制,每次调制一次用量并立即饮用,不要留存未喝完奶液。

请向商家索取价值

清洁卫生
绿化环境

6 930713 600485



国食注字:YP20230355

序号25


含有肌醇,含有左旋肉碱,含有牛磺酸,含有1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯。

喂哺用量建议表

每次喂哺份量

月龄	温开水(毫升)	奶粉(平勺)	每天喂哺次数(次)
12-36月龄	240	8	2-3

冲调方法



1. 调奶之前,请洗净双手,将干净的奶瓶、奶嘴、奶瓶盖放入沸水中煮5分钟消毒。
2. 调奶时,用煮沸后冷却至45°C-50°C温开水,依照喂哺用量建议表,在消毒后的奶瓶中加入需要温开水量。
3. 依照喂哺用量建议表,用产品所配粉勺量取准确份量(平勺)的幼儿配方奶粉,加入奶瓶中。
4. 盖严奶瓶盖,轻摇至奶粉充分溶解,待温度适宜时,即可喂哺幼儿。

贮存条件

本品应贮藏于阴凉干燥处,每次取出奶粉后请务必密封严密,以防止吸潮或进入异物,勿置于冰箱内,并于开启后四周内食用完。

制造商:青冈亚华乳多宝乳业有限公司

地址:青冈县中和镇(原乳粉厂院内)

产地:黑龙江省绥化市

产品类别及属性:乳基粉状幼儿配方食品

产品标准代号:GB 10767-2021

食品生产许可证编号:SC10523122302904

保质期:24个月

生产日期、保质期至、生产批号:见罐底

更多产品及服务请咨询(市话资费)

400-109-8968

www.sijiananshan.com

service@avadairy.com



领昱

幼儿配方奶粉

(12-36月龄,3段)

3段

净含量:800克



营养成分表

项目	单位	每100千焦	每100克
能量	kJ	100	2000
蛋白质	g	0.67	13.3
脂肪	g	1.10	21.9
亚油酸	g	0.13	2.5
α-亚麻酸	mg	16	315
碳水化合物	g	2.8	55.1
维生素			
维生素A	μg RE	23	464
维生素D	μg	0.65	13
维生素E	mg α-TE	0.29	5.8
维生素K ₁	μg	2.45	49
维生素B ₁	μg	22	442
维生素B ₂	μg	50	993
维生素B ₆	μg	18.7	373
维生素B ₁₂	μg	0.095	1.9
烟酸(烟酰胺)	μg	191	3811
叶酸	μg	5.3	106
泛酸	μg	171	3421
维生素C	mg	3.1	62
生物素	μg	0.95	19
矿物质			
钠	mg	7	134
钾	mg	24	486
铜	μg	12.6	251
铁	mg	1.9	38
锌	mg	0.31	6.1
钙	mg	0.18	3.5
镁	mg	22	434
磷	mg	11	229
碘	μg	5.4	107
氯	mg	17	336
可选择成分			
硒	μg	0.75	15
胆碱	mg	6.1	122
肌醇	mg	1.8	35
牛磺酸	mg	1.1	21
左旋肉碱	mg	0.7	13
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	1.7	33
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	2.2	44
低聚半乳糖	mg	28	553
低聚果糖	mg	143	2862
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.19	3.8
酪蛋白磷酸肽	mg	3.25	65

注:100毫升奶液≈13.5克奶粉+90毫升水(1平勺奶粉≈4.5克)。

配料

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、乳糖、脱脂奶粉、低聚果糖、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、酪蛋白磷酸肽、氯化胆碱、左旋肉碱、牛磺酸、肌醇。

维生素:维生素C(L-抗坏血酸)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素A(醋酸视黄酯)、烟酸(烟酰胺)、泛酸(D-泛酸钙)、生物素(D-生物素)、维生素B₁₂(核黄素)、维生素K₁(植物甲萘醌)、叶酸、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)。

矿物质:氯化钾、碳酸钾、磷酸三钙、柠檬酸钠、硫酸镁、碘酸钾、硫酸亚铁、硫酸铜、硫酸锌、亚硒酸钠。

- 生牛乳加工
- 本产品含有乳糖和乳蛋白质,乳糖不耐受和乳蛋白过敏者慎用或遵医嘱。

爱心提示

12-36月的幼儿食用本产品时,请在两餐之间补喂适量温开水,食用和冲调幼儿配方奶粉以及其它与喂哺有关的事宜,请遵循专业人员的指导。

1. 喂奶时应抱着幼儿,如有疏忽可能会引起幼儿窒息或不适。
2. 水和奶瓶未经消毒或奶液浓度不当,可能会引起幼儿的不适。
3. 按照“喂哺用量建议表”的指示与冲调方法进行配制,每次调制一次用量立即饮用,不要留存未喝完奶液。

请商品名称为准

清洁卫生
绿化环境

6 930713 600553


含有肌醇,含有左旋肉碱,含有牛磺酸,含有1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯。

喂哺用量建议表

每次喂哺份量

月龄	温开水(毫升)	奶粉(平勺)	每天喂哺次数(次)
12-36月龄	240	8	2-3

冲调方法



1. 调奶之前,请洗净双手,将干净的奶瓶、奶嘴、奶瓶盖放入沸水中煮5分钟消毒。
2. 调奶时,用煮沸后冷却至45°C-50°C温开水,依照喂哺用量建议表,在消毒后的奶瓶中加入需要温开水量。
3. 依照喂哺用量建议表,用产品所配粉勺量取准确份量(平勺)的幼儿配方奶粉,加入奶瓶中。
4. 盖严奶瓶盖,轻摇至奶粉充分溶解,待温度适宜时,即可喂哺幼儿。

贮存条件

本品应贮藏于阴凉干燥处。每次取出奶粉后请务必密封严密,以防止吸潮或进入异物,
勿置于冰箱内,并于开启后四周内食用完。

制造商:青冈亚华乳多宝乳业有限责任公司

地址:青冈县中和镇(原乳粉厂院内)

产地:黑龙江省绥化市

产品类别及属性:乳基粉状幼儿配方食品

产品标准代号:GB 10767-2021

食品生产许可证编号:SC10523122302904

保质期:24个月

生产日期、保质期至、生产批号:见罐底

更多产品及服务请咨询(市话资费)

400-109-8968

www.sijinanshan.com
service@avadairy.com

国食注字:YP20230355

领昱

幼儿配方奶粉

(12-36月龄,3段)

3段

净含量:418克



营养成分表

项目	单位	每100千焦	每100克
能量	kJ	100	2000
蛋白质	g	0.67	13.3
脂肪	g	1.10	21.9
亚油酸	g	0.13	2.5
α-亚油酸	mg	16	315
碳水化合物	g	2.8	55.1
维生素			
维生素A	μg RE	23	464
维生素D	μg	0.65	13
维生素E	mg α-TE	0.29	5.8
维生素K ₁	μg	2.45	49
维生素B ₁	μg	22	442
维生素B ₂	μg	50	993
维生素B ₆	μg	18.7	373
维生素B ₁₂	μg	0.095	1.9
烟酸(烟酰胺)	μg	191	3811
叶酸	μg	5.3	106
泛酸	μg	171	3421
维生素C	mg	3.1	62
生物素	μg	0.95	19
矿物质			
钠	mg	7	134
钾	mg	24	486
铜	μg	12.6	251
镁	mg	1.9	38
铁	mg	0.31	6.1
锌	mg	0.18	3.5
钙	mg	22	434
磷	mg	11	229
碘	μg	5.4	107
氯	mg	17	336
可选择成分			
硒	μg	0.75	15
胆碱	mg	6.1	122
肌醇	mg	1.8	35
牛磺酸	mg	1.1	21
左旋肉碱	mg	0.7	13
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	1.7	33
二十二碳四烯酸(AA/ARA)	mg	2.2	44
低聚半乳糖	mg	28	553
低聚果糖	mg	143	2862
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.19	3.8
酪蛋白磷酸肽	mg	3.25	65

注:100毫升奶液≈13.5克奶粉+90毫升水(1平勺奶粉≈4.5克)。

配料

生牛乳,脱盐乳清粉,食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、乳糖、脱脂奶粉、低聚果糖、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、酪蛋白磷酸肽、氯化胆碱、左旋肉碱、牛磺酸、肌醇、维生素维生素C(L-抗坏血酸)、维生素E(d-α-生育酚)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素A(醋酸视黄醇)、烟酸(烟酰胺)、泛酸(D-泛酸钙)、生物素(D-生物素)、维生素B₁₂(核黄素)、维生素K₁(植物甲萘醌)、叶酸、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(吡哆醇)、矿物质氯化钾、磷酸钙、磷酸二钙、柠檬酸钙、磷酸镁、磷酸钾、磷酸亚铁、硫酸铜、硫酸锌、亚硒酸钠。

*生牛乳加工

*本产品含有乳糖和乳蛋白,乳糖不耐受和乳蛋白过敏者慎用或遵医嘱。

爱心提示

12-36月的幼儿食用本产品时,请在两餐之间补喂适量温开水。食用和冲调幼儿配方奶粉以及其它与喂养有关的事宜,请遵循专业人员的指导。

1. 喂奶时应抱着幼儿,如有疏忽可能会引起幼儿窒息或不适。
2. 水和奶液未消毒或浓度不当可能会引起幼儿的不适。
3. 按照“喂哺用量建议表”的指示与冲调方法进行配制,每次调制一次用量并立即饮用,不要留存未喝完奶液。

食用用品名称:领昱

清洁卫生
绿化环境

6 9 3 0 7 1 3 6 0 0 4 9 2