

挚1-1

挚 1 1



婴儿配方奶粉 (0-6月龄, 1段)



净含量: 108克
国食注字 YP20170719

1 段

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、全脂乳粉、低聚半乳糖、低聚果糖、乳糖、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、乳清蛋白粉、矿物质【磷酸三钙、柠檬酸钙、氯化钠、氯化钾、硫酸镁、碳酸钾、碘酸钾、硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰】、维生素(维生素C(L-抗坏血酸)、氯化胆碱、维生素E(d-α-生育酚)、维生素B6(盐酸吡哆醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素A(视黄醇)、烟酰胺、泛酸(D-泛酸钙)、叶酸、生物素(D-生物素)、维生素K1(植物甲萘醌)、维生素B2(核黄素)、维生素B1(盐酸硫胺素)、维生素B12(氰钴胺))、酪蛋白磷酸肽、牛磺酸、核甘酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、肌醇、叶黄素、左旋肉碱

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	KJ	100	2100
蛋白质	g	0.53	11.10
脂肪	g	1.24	26.10
亚油酸	g	0.12	2.60
α-亚油酸	mg	15.2	320
碳水化合物	g	2.58	54.1
维生素A	μg RE	17.4	366
维生素D	μg TE	0.60	12.50
维生素E	mg α-TE	0.16	3.40
维生素K1	μg	1.27	26.70
维生素B1	μg	17.4	366
维生素B2	μg	23.7	497
维生素B6	μg	10.5	220.0
维生素B12	μg	0.030	0.620
烟酸(烟酰胺)	mg	119	2500
叶酸	μg	3.57	75.0
泛酸	mg	119	2500
维生素C	mg	3.35	70.3
生物素	μg	0.44	9.30
胆碱	mg	5.95	125.0
矿物质	mg	8.33	175
钠	mg	21.2	445
钾	mg	17.9	375.0
钙	mg	1.50	31.5
铁	mg	0.17	3.60
锌	mg	0.18	3.80
铜	μg	0.93	19.60
硒	μg	14.9	313
碘	μg	10.0	210
氟	μg	4.48	94.0
氯	mg	14.9	313
酒石酸	mg	0.89	18.70
可溶性成分	mg	1.25	26.2
肌醇	mg	1.00	21.0
牛磺酸	mg	0.52	11.0
左旋肉碱	mg	4.48	94.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.76	100.0
二十二碳四烯酸(ARA)	mg	0.08	1.60
低聚半乳糖	g	0.08	1.60
低聚果糖	g	0.26	5.5
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	1.67	35.0
叶黄素	mg	0.71	15.00
核黄素	mg	2.86	60
酪蛋白磷酸肽	mg		

喂哺建议表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(mL)	专用平匙数
0~1周	8	30	1
1~2周	7	60	2
2周~1月龄	6	90	3
1~2月龄	5~6	120	4
2~4月龄	5	150	5
4~6月龄	4~5	180	6

● 请使用本品随附专用量匙, 1平匙奶粉约4.5g。
● 也可根据宝宝个体差异, 按照医生建议, 调整喂哺量。未经医生建议请勿随意改变喂哺量。
● 请按随附喂哺建议表中所建议的比例用量冲调, 未经医生建议请勿改变冲调浓度。

100毫升奶液 = 13.5克奶粉 + 90毫升温开水

食用方法



1. 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净, 使用前用沸水煮沸至少5分钟, 待用, 冲调前请清洗双手并保持不真卫生。



2. 将饮用水煮沸5分钟, 冷却至50°C左右。



3. 依据宝宝月龄及喂哺建议表的推荐量, 将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。



4. 将所需的奶粉加入到奶瓶中。



5. 盖紧奶瓶, 轻轻摇动直至奶粉完全溶解。



6. 待奶液温度适宜时, 再给宝宝喂奶。

提示

1. 请按食用方法冲调奶粉, 方法不当可能会影响宝宝健康。
2. 冲调好的奶液应在1小时内喂哺完, 剩余的奶液应弃去。
3. 冲调好的奶液勿放入微波炉内加热, 以免烫伤。
4. 本品含有乳糖和乳蛋白质, 乳糖不耐和乳蛋白过敏体质的宝宝慎用或遵医嘱。

贮藏方法: 本产品应贮藏于阴凉干燥处, 勿放入冰箱内; 每次食用后及时将罐口封严, 开罐后请在一个月内食用完毕。

食品生产许可证编号: SC10523022404060
生产日期、保质期(至)及生产批号: 见罐底
保质期: 24个月
检验合格证号: 同批号
产品标准代号: GB 10765-2021
产品类别、属性: 乳基婴儿配方乳粉

重要声明

对于0~6月龄的婴儿, 最理想的食物是母乳, 在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

服务电话:

4006109988

(周一至周五8:30-17:00)

生产商: 黑龙江优贝特乳业有限公司
地址: 黑龙江省齐齐哈尔市泰来县汤池镇政府所在地
产地: 黑龙江省齐齐哈尔市
邮编: 162411



扫一扫了解更多



挚1-2

配料表

生牛乳、脱脂乳清粉、食用植物油(1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、全脂乳粉、低聚半乳糖、低聚果糖、乳糖、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、乳清蛋白粉、矿物质(磷酸三钙、柠檬酸钾、氯化钠、氯化钾、硫酸镁、硫酸钙、碘酸钾、碘酸钾、硫酸亚铁、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰)、维生素C(L-抗坏血酸)、氯化胆碱、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素B₆(吡哆吡哆醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素A(醋酸视黄醇)、烟酰胺、泛酸(D-泛酸钙)、叶酸、生物素(D-生物素)、维生素K₁(植物甲萘醌)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₁₂(氰钴胺)、酪蛋白磷酸盐、牛磺酸、核黄素(5'-胞苷酸二钠)、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、肌醇、叶黄素、左旋肉碱

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2100
蛋白质	g	0.53	11.10
脂肪	g	1.24	26.10
亚油酸	g	0.12	2.60
α-亚油酸	mg	15.2	320
碳水化合物	g	2.58	54.1
维生素A	μg RE	17.4	366
维生素D	μg	0.60	12.50
维生素E	mg α-TE	0.16	3.40
维生素K ₁	μg	1.27	26.70
维生素B ₁	μg	17.4	366
维生素B ₂	μg	23.7	497
维生素B ₆	μg	10.5	220.0
维生素B ₁₂	μg	0.030	0.620
烟酸(烟酰胺)	μg	119	2500
叶酸	μg	3.57	75.0
泛酸	μg	119	2500
维生素C	mg	3.35	70.3
生物素	μg	0.44	9.30
胆碱	mg	5.95	125.0
矿物质			
钠	mg	8.33	175
钾	mg	21.2	445
钙	mg	17.9	375.0
镁	mg	1.50	31.5
磷	mg	0.17	3.60
锌	mg	0.18	3.80
铁	μg	0.93	19.60
铜	μg	14.9	313
锰	μg	10.0	210
硒	μg	4.48	94.0
碘	μg	14.9	313
可选择成分			
肌醇	mg	1.25	26.2
牛磺酸	mg	1.00	21.0
左旋肉碱	mg	0.52	11.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.48	94.0
二十二碳四烯酸(ARA)	mg	4.76	100.0
膳食纤维	g		
低聚半乳糖	g	0.08	1.60
低聚果糖	g	0.08	1.60
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.26	5.5
叶黄素	μg	1.67	35.0
核黄素	mg	0.71	15.00
酪蛋白磷酸盐	mg	2.86	60

挚 1-2



婴儿配方奶粉 (0-6月龄, 1段)



净含量: 400克
国食注字YP20170719

1 段

食用方法



1. 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净, 使用前用清水煮至少5分钟, 待用。冲调前请清洗双手并保持环境卫生。



2. 将饮用水煮沸5分钟, 冷却至50°C左右。



3. 依据宝宝月龄及喂养建议表的推荐量, 将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。



4. 将所需的奶粉加入到奶瓶中。



5. 盖紧奶瓶, 轻轻晃动直至奶粉完全溶解。



6. 待奶液温度适宜时, 再给宝宝喂奶。

提示

1. 请按食用方法冲调奶粉, 方法不当可能会影响宝宝健康。
2. 冲调好的奶液应在1小时内喂哺完, 剩余的奶液应弃去。
3. 冲调好的奶液勿放入微波炉内加热, 以免烫伤。
4. 本品含有乳糖和乳蛋白质, 乳糖不耐和乳蛋白过敏体质的宝宝慎用或遵医嘱。

贮藏方法: 本产品应贮藏于阴凉干燥处, 勿放入冰箱内; 每次食用后及时将罐口封严, 开罐后请在一个月内食用完毕。
食品生产许可证编号: SC10523022404060
生产日期、保质期(至)及生产批号: 见罐底
保质期: 24个月
检验合格证号: 同批号
产品标准代号: GB 10765-2021
产品类别、属性: 乳基婴儿配方乳粉

重要声明

对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳。在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

服务电话:

4006109988

(周一至周三 8:30-17:00)

生产商: 黑龙江优贝特乳业有限公司
地址: 黑龙江省齐齐哈尔市泰来县汤池镇政府所在地
产地: 黑龙江省齐齐哈尔市
邮编: 162411



6 971147 716150 25

扫一扫了解更多



100毫升奶液 = 3.5克奶粉 + 90毫升温开水

(版本变更前)

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、椰子油、亚麻籽油)、全脂乳粉、低聚半乳糖、低聚果糖、乳糖、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、乳清蛋白粉、矿物质【磷酸三钙、柠檬酸钾、氯化钠、氯化钾、硫酸镁、碳酸钙、硝酸钾、硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰】、维生素【维生素C(L-抗坏血酸)、氯化胆碱、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素B6(盐酸吡哆醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素A(醋酸视黄醇)、烟酰胺、泛酸(D-泛酸钙)、叶酸、生物素(D-生物素)、维生素K1(植物甲萘醌)、维生素B2(核黄素)、维生素B1(盐酸硫胺素)、维生素B12(氰钴胺)、酪蛋白磷酸肽、牛磺酸、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、肌醇、叶黄素、左旋肉碱

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2100
蛋白质	g	0.53	11.10
脂肪	g	1.24	26.10
亚油酸	g	0.12	2.60
α-亚麻酸	mg	15.2	320
碳水化合物	g	2.58	54.1
维生素			
维生素A	μg RE	17.4	366
维生素D	μg	0.60	12.50
维生素E	mg α-TE	0.16	3.40
维生素K1	μg	1.27	26.70
维生素B1	μg	17.4	366
维生素B2	μg	23.7	497
维生素B6	μg	10.5	220.0
维生素B12	μg	0.030	0.620
烟酸(烟酰胺)	μg	119	2500
叶酸	μg	3.57	75.0
泛酸	μg	119	2500
维生素C	mg	3.35	70.3
生物素	μg	0.44	9.30
胆碱	mg	5.95	125.0
矿物质			
钠	mg	8.33	175
钾	mg	21.2	445
铜	μg	17.9	375.0
镁	mg	1.50	31.5
铁	mg	0.17	3.60
锌	mg	0.18	3.80
锰	μg	0.93	19.60
钙	mg	14.9	313
磷	mg	10.0	210
碘	μg	4.48	94.0
氯	mg	14.9	313
硒	μg	0.89	18.70
可选择成分			
肌醇	mg	1.25	26.2
牛磺酸	mg	1.00	21.0
左旋肉碱	mg	0.52	11.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.48	94.0
二十碳四烯酸(ARA)	mg	4.76	100.0
膳食纤维	g	0.08	1.60
低聚半乳糖	g	0.08	1.60
低聚果糖	g	0.26	5.5
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.26	5.5
叶黄素	μg	1.67	35.0
核苷酸	mg	0.71	15.00
酪蛋白磷酸肽	mg	2.86	60

100毫升奶液=13.5克奶粉+90毫升温开水

喂哺建议表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(mL)	专用平匙数
0-1周	8	30	1
1-2周	7	60	2
2周-1月龄	6	90	3
1-2月龄	5-6	120	4
2-4月龄	5	150	5
4-6月龄	4-5	180	6

- 请使用本品随附专用量匙,1平匙奶粉约4.5g。
- 也可根据宝宝个体差异,按照医生建议,调整喂哺量。未经医生建议请勿随意改变喂哺量。
- 请按照喂哺建议表中所示的比例用量冲调,未经医生建议请勿改变冲调浓度。

挚鑫



婴儿配方奶粉 (0-6月龄,1段)



1段

净含量: 818克
国食注字YP20170719

食用方法



1. 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净,使用前用沸水煮至少5分钟,待用。冲调前清洗双手并保持环境卫生。



2. 将饮用水煮沸5分钟,冷却至50°C左右。



3. 依据宝宝月龄及喂哺建议表的推荐量,将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。



4. 将所需的奶粉加入到奶瓶中。



5. 盖紧奶瓶,轻轻推动直至奶粉完全溶解。



6. 待奶液温度适宜时,再给宝宝喂奶。

提示

- 请按食用方法冲调奶粉,方法不当可能会影响宝宝健康。
- 冲调好的奶液应在1小时内喂哺完,剩余的奶液应弃去。
- 冲调好的奶液勿放入微波炉内加热,以免烫伤。
- 本品含有乳糖和乳蛋白质,乳糖不耐和乳蛋白过敏体质的宝宝慎用或遵医嘱。

贮藏方法:本产品应贮藏于阴凉干燥处,勿放入冰箱内;每次食用后及时将罐口封严,开罐后请在一个月内食用完毕。

食品生产许可证编号:SC10523022404060
生产日期、保质期(至)及生产批号:见罐底
保质期:24个月
检验合格证号:同批号
产品标准代号:GB 10765-2021
产品类别、属性:乳基婴儿配方乳粉

重要声明

对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

服务电话:

4006109988

(周一至周五8:30-17:00)

生产商:黑龙江优贝特乳业有限公司
地址:黑龙江省齐齐哈尔市泰来县汤池镇政府所在地
产地:黑龙江省齐齐哈尔市
邮编:162411



6 971477 612680

扫一扫了解更多



挚2-1

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物油和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、大豆油、玉米油、椰子油、亚麻籽油)、全脂乳粉、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、乳清蛋白粉、矿物质【磷酸三钙、柠檬酸钾、碳酸钙、氯化钠、氯化钾、硫酸铁、碘酸钾、硫酸亚铁、硫酸铜、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰】、维生素【维生素C(L-抗坏血酸)、氯化胆碱、维生素E(dl-α-醋酸生育酚)、维生素B₆(吡哆吡醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素A(视黄醇)、烟酰胺、泛酸(D-泛酸钙)、生物素(D-生物素)、叶酸、维生素K₁(植物甲萘醌)、维生素B₉(核黄素)、维生素B₁(盐酸硫胺素)、维生素B₁₂(氰钴胺)、酪蛋白磷酸肽、牛磺酸、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、肌醇、左旋肉碱、叶黄素

喂哺建议表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量 (mL)	专用平匙数
6~8月龄	5	210	7
8-12月龄	3~4	210	7

- 请在使用本品时附专用量匙,1平匙奶粉约4.5g。
- 也可根据宝宝个体差异或医生建议酌情调整喂哺量。
- 请按喂哺建议表中所示建议的比例用量冲调,未经医生建议请勿改变冲调浓度。

含有:1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、左旋肉碱、核苷酸

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	KJ	100	2043
蛋白质	g	0.58	11.80
脂肪	g	1.15	23.50
亚油酸	g	0.13	2.60
α-亚麻酸	mg	14.9	305
碳水化合物	g	2.73	55.7
维生素A	μg RE	22.4	458
维生素D	μg	0.60	12.20
维生素E	mg α-TE	0.17	3.40
维生素K ₁	μg	1.31	26.70
维生素B ₁	mg	17.4	356
维生素B ₂	mg	23.7	485
维生素B ₆	μg	13.7	280.0
维生素B ₁₂	μg	0.049	1.000
烟酸(维生素B ₃)	mg	137	2800
叶酸	μg	2.99	61.0
泛酸	mg	120	2450
维生素C	mg	3.13	64.0
生物素	μg	0.50	10.30
胆碱	mg	5.97	122.0
矿物质			
钠	mg	6.36	130
钾	mg	22.4	458
钙	mg	10.5	215.0
镁	mg	1.47	30.0
铁	mg	0.29	6.00
锌	mg	0.16	3.20
铜	mg	0.98	20.00
锰	mg	21.2	433
磷	mg	12.7	260
碘	μg	4.41	90.0
硒	μg	14.8	303
维生素B ₉	μg	0.63	12.90
可选择成分			
肌醇	mg	1.22	25.0
牛磺酸	mg	0.99	20.3
左旋肉碱	mg	0.53	10.9
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.41	90.0
花生四烯酸(ARA)	mg	4.89	100.0
膳食纤维			
低聚半乳糖	g	0.08	1.60
低聚果糖	g	0.08	1.60
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3.0
叶黄素	mg	6.61	135.0
核苷酸	mg	0.73	15.00
酪蛋白磷酸肽	mg	2.94	60

100毫升奶液=13.5克奶粉+90毫升温开水

挚靈

太子乐
Happy Prince

较大婴儿配方奶粉 (6-12月龄,2段)



2

净含量:400克
国食注字YP20170720

食用方法



1.将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净,使用前用沸水煮沸至少5分钟,待用,冲调前请清洗双手并保持环境卫生。



2.将饮用水煮沸5分钟,冷却至50°C左右。



3.依据宝宝月龄及喂哺建议表的推荐量,将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。



4.将所需的奶粉加入到奶瓶中。



5.盖紧奶瓶,轻轻晃动直至奶粉完全溶解。



6.待奶液温度适宜时,再给宝宝喂奶。

提示

- 请按食用方法冲调奶粉,方法不当可能会影响宝宝健康。
- 冲调好的奶液应在1小时内喂哺完,剩余的奶液应丢弃。
- 冲调好的奶液勿放入微波炉内加热,以免烫伤。
- 本品含有乳糖和乳蛋白质,乳糖不耐和乳蛋白过敏体质的宝宝慎用或遵医嘱。

重要声明

6个月龄以上婴儿食用本产品时,须配合添加辅助食品。

服务电话:

4006109988

(周一至周三8:30-17:00)

生产商:黑龙江优贝特乳业有限公司
地址:黑龙江省齐齐哈尔市泰来县汤池镇政府所在地
产地:黑龙江省齐齐哈尔市
邮编:162411



6 19711477615032

扫一扫了解更多



(版本变更前)

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、大豆油、玉米油、椰子油、亚麻籽油)、全脂乳粉、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、乳清蛋白粉、矿物质【磷酸三钙、柠檬酸钾、碳酸钙、氯化钠、氯化钾、硫酸镁、硫酸钾、硫酸亚铁、硫酸铜、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰】、维生素(维生素C(L-抗坏血酸)、氯化胆碱、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素B6(盐酸吡哆醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素A(视黄醇)、烟酰胺、泛酸(D-泛酸钙)、生物素(D-生物素)、叶酸、维生素K1(植物甲萘醌)、维生素B12(核黄素)、维生素B1(盐酸硫胺素)、维生素B12(氰钴胺)、酪蛋白磷酸肽、牛磺酸、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、肌醇、左旋肉碱、叶黄素

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2043
蛋白质	g	0.58	11.80
脂肪	g	1.15	23.50
亚油酸	g	0.13	2.60
α-亚麻酸	mg	14.9	305
碳水化合物	g	2.73	55.7
维生素			
维生素A	μg RE	22.4	458
维生素D	μg	0.60	12.20
维生素E	mg α-TE	0.17	3.40
维生素K1	μg	1.31	26.70
维生素B1	μg	17.4	356
维生素B2	μg	23.7	485
维生素B6	μg	13.7	280.0
维生素B12	μg	0.049	1.000
烟酸(烟酰胺)	μg	137	2800
叶酸	μg	2.99	61.0
泛酸	μg	120	2450
维生素C	mg	3.13	64.0
生物素	μg	0.50	10.30
胆碱	mg	5.97	122.0
矿物质			
钠	mg	6.36	130
钾	mg	22.4	458
铜	μg	10.5	215.0
镁	mg	1.47	30.0
铁	mg	0.29	6.00
锌	mg	0.16	3.20
锰	μg	0.98	20.00
钙	mg	21.2	433
磷	mg	12.7	260
氯	μg	4.41	90.0
硒	mg	14.8	303
碘	μg	0.63	12.90
可选择成分			
肌醇	mg	1.22	25.0
牛磺酸	mg	0.99	20.3
左旋肉碱	mg	0.53	10.9
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.41	90.0
二十碳四烯酸(ARA)	mg	4.89	100.0
膳食纤维			
低聚半乳糖	g	0.08	1.60
低聚果糖	g	0.08	1.60
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3.0
叶黄素	μg	6.61	135.0
核苷酸	mg	0.73	15.00
酪蛋白磷酸肽	mg	2.94	60

喂哺建议表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(mL)	专用平匙数
6~8月龄	5	210	7
8~12月龄	3~4	210	7

- 请使用本品随附专用量匙,1平匙奶粉约4.5g。
- 也可根据宝宝个体差异或医生建议酌情调整喂哺量。
- 请按照喂哺建议表中所建议的比例用量冲调,未经医生建议请勿改变冲调浓度。

含有:1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、左旋肉碱、核苷酸

100毫升奶液=13.5克奶粉+90毫升温开水

挚鑫



较大婴儿配方奶粉 (6-12月龄,2段)



2段

净含量: 818克
国食注字YP20170720

食用方法

- 1.将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净,使用前用沸水煮至少5分钟,待用。冲调前请清洗双手并保持环境卫生。
- 2.将饮用水煮沸5分钟,冷却至50°C左右。
- 3.依据宝宝月龄及喂哺建议表的推荐量,将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。
- 4.将所需的奶粉加入到奶瓶中。
- 5.盖紧奶瓶,轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- 6.待奶液温度适宜时,再给宝宝喂奶。

提示

- 请按食用方法冲调奶粉,方法不当可能会影响宝宝健康。
- 冲调好的奶液应在1小时内喂哺完,剩余的奶液应弃去。
- 冲调好的奶液勿放入微波炉内加热,以免烫伤。
- 本品含有乳糖和乳蛋白,乳糖不耐和乳蛋白过敏体质的宝宝慎用或遵医嘱。

贮藏方法:本产品应贮藏于阴凉干燥处,勿放入冰箱内;每次食用后及时将罐口封严,开罐后请在一个月内食用完毕。

食品生产许可证编号:SC10523022404060

生产日期、保质期(至)及生产批号:见罐底

保质期:24个月

检验合格证号:同批号

产品标准代号:GB 10766-2021

产品类别、属性:乳基较大婴儿配方乳粉

重要声明

6个月龄以上婴儿食用本产品时,须配合添加辅助食品。

服务电话:

4006109988

(周一至周五8:30-17:00)

生产商:黑龙江优贝特乳业有限公司
地址:黑龙江省齐齐哈尔市泰来县汤池镇政府所在地
产地:黑龙江省齐齐哈尔市
邮编:162411



6 971477 612697

扫一扫了解更多



挚3-1

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、全脂乳粉、食用植物油和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、大豆油、玉米油、椰子油、亚麻籽油)、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、乳清蛋白粉、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、矿物质【磷酸三钙、柠檬酸钾、硫酸钙、氯化钠、氯化钾、硫酸铁、碘酸钾、硫酸亚铁、硫酸铜、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰】、维生素【维生素C(L-抗坏血酸)、氯化胆碱、维生素E(dl-α-生育酚生育酚)、维生素B6(盐酸吡哆醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素A(视黄醇视黄酯)、烟酰胺、泛酸(D-泛酸钙)、生物素(D-生物素)、叶酸、维生素K1(植物甲萘醌)、维生素B1(核黄素)、维生素B12(盐酸硫胺素)、维生素B12(氰钴胺)】、酪蛋白磷酸肽、牛磺酸、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、肌醇、左旋肉碱、叶黄素

喂哺建议表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量 (mL)	专用平匙数
12~36月龄	3~4	210	7

12~36月龄 3~4 210 7

- 请使用本品附赠专用量匙，1平匙奶粉约4.5g。
- 也可根据宝宝个体差异或医生建议酌情调整喂哺量。
- 请按喂哺建议表中所示建议的比例用量冲泡，未经医生建议请勿改变冲泡浓度。

含有：1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、左旋肉碱、核苷酸

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2017
蛋白质	g	0.61	12.40
脂肪	g	1.11	22.30
亚油酸	g	0.11	2.20
α-亚麻酸	mg	14.9	300
碳水化合物	g	2.79	56.2
维生素A	μg RE	22.5	453
维生素D	μg	0.59	12.00
维生素E	mg α-TE	0.17	3.40
维生素K1	μg	1.34	27.10
维生素B1	μg	17.5	352
维生素B2	μg	24.9	503
维生素B6	μg	13.6	275.0
维生素B12	μg	0.050	1.000
烟酰胺(维生素B3)	μg	136	2750
叶酸	μg	2.97	60.0
泛酸	μg	119	2400
维生素C	mg	3.22	65.0
生物素	μg	0.51	10.20
矿物质			
钠	mg	6.79	137
钾	mg	22.8	459
钙	μg	10.9	220.0
镁	mg	1.74	35.0
磷	mg	0.30	6.10
铁	mg	0.16	3.30
锌	mg	21.7	437
铜	mg	13.7	277
锰	mg	3.97	80.0
碘	mg	16.1	324
可选择成分			
硒	μg	0.66	13.30
胆碱	mg	5.95	120.0
钙	μg	1.04	21.00
肌醇	mg	1.24	25.0
牛磺酸	mg	0.99	20.0
左旋肉碱	mg	0.56	11.2
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	0.99	20.0
二十二碳四烯酸(ARA)	mg	2.48	50.0
膳食纤维			
低聚半乳糖	g	0.08	1.60
低聚果糖	g	0.08	1.60
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3.0
叶黄素	μg	6.69	135.0
核苷酸	mg	0.74	15.00
酪蛋白磷酸肽	mg	2.97	60

100毫升奶液=3.5克奶粉+90毫升温开水

挚鑫

幼儿配方奶粉 (12-36月龄,3段)



3段

净含量:400克
国食注字YP20230279



食用方法



1.将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净,使用前用沸水煮沸至少5分钟,待用。冲调前请清洗双手并保持良好的卫生习惯。



2.将饮用水煮沸5分钟,冷却至50°C左右。



3.依据宝宝月龄及喂哺建议表的推荐量,将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。



4.将所需的奶粉加入到奶瓶中。



5.盖紧奶瓶,轻轻晃动直至奶粉完全溶解。



6.待奶液温度适宜时,再给宝宝喂奶。

提示

- 1.请按食用方法冲泡奶粉,方法不当可能会影响宝宝健康。
- 2.冲泡好的奶液应在1小时内喂哺完,剩余的奶液应弃去。
- 3.冲泡好的奶液勿放入微波炉内加热,以免烫伤。
- 4.本品含有乳糖和乳蛋白质,乳糖不耐和乳蛋白过敏体质的宝宝慎用或遵医嘱。

贮藏方法:本产品应贮藏于阴凉干燥处,勿放入冰箱内;每次食用后及时将罐口封严,开罐后请在一个月内食用完毕。

食品生产许可证编号:SC10523022404060
生产日期、保质期(至)及生产批号:见罐底。

保质期:24个月
检验合格证号:同批号
产品标准代号:GB 10767-2021
产品类别、属性:乳基幼儿配方乳粉

服务热线:
4006109988
(周一至周五8:30-17:00)

生产商:黑龙江优贝特乳业有限公司
地址:黑龙江省齐齐哈尔市泰来县汤池镇政府所在地
产地:黑龙江省齐齐哈尔市
邮编:162411



扫一扫了解更多



(版本变更前)

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、全脂乳粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、大豆油、玉米油、椰子油、亚麻籽油)、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、乳清蛋白粉、花生四烯酸(ARA)、二十二碳六烯酸(DHA)、矿物质【磷酸三钙、柠檬酸钾、碳酸钙、氯化钠、氯化钾、硫酸镁、硫酸钾、硫酸亚铁、硫酸铜、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰】、维生素【维生素C(L-抗坏血酸)、氯化胆碱、维生素E(dl-α-生育酚)、维生素B6(盐酸吡哆醇)、维生素D(胆钙化醇)、维生素A(视黄醇)、烟酰胺、泛酸(D-泛酸钙)、生物素(D-生物素)、叶酸、维生素K1(植物甲萘醌)、维生素B2(核黄素)、维生素B1(盐酸硫胺素)、维生素B12(氰钴胺)、酪蛋白磷酸肽、牛磺酸、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、肌醇、左旋肉碱、叶黄素

生牛乳加工

喂哺建议表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(mL)	专用平匙数
12-36月龄	3-4	210	7

- 请使用本品随附专用量匙,1平匙奶粉约4.5g。
- 也可根据宝宝个体差异或医生建议酌情调整喂哺量。
- 请按照喂哺建议表中所建议的比例用量冲调,未经医生建议请勿改变冲调浓度。

含有:1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、左旋肉碱、核苷酸

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2017
蛋白质	g	0.61	12.40
脂肪	g	1.11	22.30
亚油酸	g	0.11	2.20
α-亚麻酸	mg	14.9	300
碳水化合物	g	2.79	56.2
维生素			
维生素A	μg RE	22.5	453
维生素D	μg	0.59	12.00
维生素E	mg α-TE	0.17	3.40
维生素K1	μg	1.34	27.10
维生素B1	μg	17.5	352
维生素B2	μg	24.9	503
维生素B6	μg	13.6	275.0
维生素B12	μg	0.050	1.000
烟酸(烟酰胺)	μg	136	2750
叶酸	μg	2.97	60.0
泛酸	μg	119	2400
维生素C	mg	3.22	65.0
矿物质			
钠	mg	6.79	137
钾	mg	22.8	459
铜	μg	10.9	220.0
镁	mg	1.74	35.0
铁	mg	0.30	6.10
锌	mg	0.16	3.30
钙	mg	21.7	437
磷	mg	13.7	277
碘	μg	3.97	80.0
氯	mg	16.1	324
可选择成分			
硒	μg	0.66	13.30
胆碱	mg	5.95	120.0
锰	μg	1.04	21.00
肌醇	mg	1.24	25.0
牛磺酸	mg	0.99	20.0
左旋肉碱	mg	0.56	11.2
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	0.99	20.0
二十碳四烯酸(ARA)	mg	2.48	50.0
膳食纤维			
低聚半乳糖	g	0.08	1.60
低聚果糖	g	0.08	1.60
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3.0
叶黄素	μg	6.69	135.0
核苷酸	mg	0.74	15.00
酪蛋白磷酸肽	mg	2.97	60

100毫升奶液=13.5克奶粉+90毫升温开水

挚灵



幼儿配方奶粉 (12-36月龄,3段)



3段

净含量: 818克
国食注字 YP20230279

食用方法



1. 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净,使用前用沸水煮至少5分钟,待用。冲调前请清洗双手并保持环境卫生。



2. 将饮用水煮沸5分钟,冷却至50°C左右。



3. 依据宝宝月龄及喂哺建议表的推荐量,将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。



4. 将所需的奶粉加入到奶瓶中。



5. 盖紧奶瓶,轻轻摇动直至奶粉完全溶解。



6. 待奶液温度适宜时,再给宝宝喂奶。

提示

- 请按食用方法冲调奶粉,方法不当可能会影响宝宝健康。
- 冲调好的奶液应在1小时内喂哺完,剩余的奶液应弃去。
- 冲调好的奶液勿放入微波炉内加热,以免烫伤。
- 本品含有乳糖和乳蛋白质,乳糖不耐和乳蛋白过敏体质的宝宝慎用或遵医嘱。

贮藏方法:本产品应贮藏于阴凉干燥处,勿放入冰箱内;每次食用后及时将罐口封严,开罐后请在一个月内食用完毕。

食品生产许可证编号:SC10523022404060

生产日期、保质期(至)及生产批号:见罐底

保质期:24个月

检验合格证号:同批号

产品标准代号:GB 10767-2021

产品类别、属性:乳基幼儿配方乳粉

服务热线:

4006109988

(周一至周日8:30-17:00)

生产商:黑龙江优贝特乳业有限公司

地址:黑龙江省齐齐哈尔市泰来县汤池镇政府所在地

产地:黑龙江省齐齐哈尔市

邮编:162411



扫一扫了解更多



6 971477 612703