


1

奶具消毒及冲调方法



1 仔细清洗你的双手
2 奶瓶、奶嘴与盖子洗净并确保持有奶液残留后浸没于水中煮至水沸，然后关闭电源并放置至需要时取出
3 将饮用水煮沸，放凉**



4 参照喂哺表，先将水倒入奶瓶中，然后使用提供的量匙舀取奶粉，并小心抹平剩余奶粉
5 确保量匙干燥并放回罐中，每次使用后关闭罐盖，并置于阴凉干燥处
6 盖上奶瓶盖，摇晃奶瓶直至粉末完全溶解。喂食宝宝前请测试温度

* 如使用购买的奶具消毒器，请遵循厂家的指引进行操作
** 为保持动物双歧杆菌乳亚种Bb-12活性，添加奶粉前请将开水冷却至体温

喂哺表

注意：每次只调配一瓶奶。调好的奶液应根据指导立即饮用，不要将未喝完的奶液存留，倒掉剩奶。调奶时请按照以下指示。

婴儿年龄	每次喂哺份量		每日喂哺次数
	温开水(毫升)	奶粉(平匙)*	
第1-2周	90	3	6
第3-4周	120	4	5
第2个月	150	5	5
第3-4个月	180	6	5
第5-6个月	180	6	5

1平匙奶粉=4.3克。
100毫升标准奶液=90毫升水+12.9克奶粉。
*注意：调奶时只可用罐内所附的专用量匙。用少于或多于指定份量的奶粉，会令婴儿得不到适量的营养或导致脱水。未经医生建议切勿改变奶的浓度。



铂初能恩®



净含量:850克
国食字 YP20220153

婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段)



倾心聆听

雀巢消费者服务: 400-610-4868
www.nestle.com.cn

配料

配料: 生牛乳(脱脂), 乳糖, 食用植物调和油(1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯, 葵花籽油, 低芥酸菜籽油, 混合生育酚浓缩物, 抗坏血酸棕榈酸酯), 乳清蛋白粉, 肌醇(肌醇), 牛磺酸(牛磺酸), 左旋肉碱(左旋肉碱), 二十二碳六烯酸(DHA)(二十二碳六烯酸油酯), 花生四烯酸(ARA)(花生四烯酸油酯), L-苯丙氨酸, 核苷酸(5'-单磷酸胞苷, 5'-单磷酸腺苷, 5'-鸟苷二钠, 5'-尿苷二钠), 钠(柠檬酸钠), 钾(柠檬酸钾, 氯化钾), 铜(硫酸铜), 镁(氯化镁), 铁(硫酸亚铁), 锌(硫酸锌), 锰(硫酸锰), 钙(柠檬酸钙), 磷(磷酸氢钙), 碘(碘化钾), 硒(亚硒酸钠), 维生素A(醋酸视黄醇), 维生素D(维生素D₃), 维生素E(dl-α-生育酚), 维生素K(植物甲萘醌), 维生素B₁(硝酸硫胺素), 维生素B₂(核黄素), 维生素B₆(盐酸吡哆醇), 维生素B₁₂(氰钴胺), 烟酸(烟酰胺), 叶酸(叶酸), 泛酸(D-泛酸钙), 维生素C(L-抗坏血酸钠), 生物素(D-生物素), 胆碱(酒石酸氢胆碱), 动物双歧杆菌乳亚种Bb-12, 食品添加剂(大豆磷脂, 柠檬酸)。致敏物质提示: 含有乳及乳制品和大豆制品。

警示说明和注意事项

1. 注意: 未经煮沸的水、奶瓶或不正确的冲调方法, 均会引起婴儿不适。不恰当的贮存、调奶和喂养方法均有可能影响婴儿的健康。
2. 重要事项: 对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳, 在母乳不足或无母乳时可食用本产品。请尽可能的持续母乳喂养, 在您决定选用配方奶粉之前, 请先听取医生或保健人员的意见。
3. 提示: 喂奶时请注意您的宝宝, 如疏忽照顾可能会导致宝宝窒息。
4. 开启后请在三周内用完。

生产者: 双城雀巢有限公司
地址: 黑龙江省哈尔滨市双城区友谊路
产地: 黑龙江省哈尔滨市
检验合格证号: 同“保质期至”及随后二位字符
食品生产许可证编号: SC10523018250144
产品标准代号: GB 10765-2021

产品类别及属性: 乳基粉状婴儿配方食品
规格: 850g
本品条码持有人为雀巢(中国)有限公司
贮存条件: 放置于阴凉干燥处, 包装开启后请密封保存于阴凉干燥处, 并在三周内用完。
保质期至及生产日期(年/月/日)示于罐底

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	每100mL
能量	kJ	100	2171	280
蛋白质	g	0.44	9.6	1.24
脂肪	g	1.30	28.3	3.65
亚油酸	g	0.15	3.2	0.41
α-亚麻酸	mg	17.04	370	47.73
碳水化合物	g	2.60	56.5	7.29

维生素

维生素A	μg RE	17.50	380	49.02
维生素D	μg	0.58	12.7	1.64
维生素E	mg α-TE	0.28	6	0.77
维生素K ₁	μg	1.61	35	4.52
维生素B ₁	μg	25.79	560	72.24
维生素B ₂	μg	33.16	720	92.88
维生素B ₆	μg	17.50	380	49.02
维生素B ₁₂	μg	0.032	0.7	0.090
烟酸	μg	163.52	3550	457.95
叶酸	μg	3.64	79	10.19
泛酸	μg	122.06	2650	341.85
维生素C	mg	3.22	70	9.03
生物素	μg	0.60	13	1.68
胆碱	mg	7.51	163	21.03

矿物质

钠	mg	8.75	190	24.51
钾	mg	23.03	500	64.50
铜	μg	17.92	389	50.18
镁	mg	2.12	46	5.93
铁	mg	0.23	5.1	0.66
锌	mg	0.16	3.5	0.45
锰	μg	5.30	115	14.84
钙	mg	23.03	500	64.50
磷	mg	14.74	320	41.28
碘	μg	4.51	98	12.64
硒	mg	15.02	326	42.05
氯	μg	0.90	19.6	2.53

可选择成分

肌醇	mg	1.50	32.6	4.21
牛磺酸	mg	1.66	36	4.64
左旋肉碱	mg	0.50	10.9	1.41
二十二碳六烯酸	mg	4.51	98	12.64
花生四烯酸	mg	4.51	98	12.64
1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	g	0.18	4	0.52
核苷酸	mg	1.15	25	3.23



2

奶具消毒及冲调方法

1. 仔细清洗你的双手
2. 奶瓶、奶嘴与盖子洗净并确保没有奶液残留后浸没于水中直至煮沸，然后关闭电源并放置至需要时取出
3. 将饮用水煮沸，放凉**
4. 参照喂哺表，先将水倒入奶瓶中，然后使用提供的量匙舀取奶粉，并小心抹平剩余奶粉
5. 确保量匙干燥并放回罐中，每次使用后关闭罐盖，并放置于阴凉干燥处
6. 盖上奶瓶盖，摇晃奶瓶直至粉末完全溶解。喂食宝宝前请测试温度

* 如使用购买的奶具消毒器，请遵循厂家的指引进行操作
 ** 为保持动物双歧杆菌乳亚种Bb-12活性，添加奶粉前请将开水冷却至体温

喂哺表

注意：每次只调配一瓶奶，调好的奶液应根据指导立即饮用，不要将未喝完的奶液存留，倒掉剩奶。调奶时请按照以下指示。

婴儿年龄	每次喂哺份量		每日喂哺次数
	温开水(毫升)	奶粉(平匙)*	
第1-2周	90	3	6
第3-4周	120	4	5
第2个月	150	5	5
第3-4个月	180	6	5
第5-6个月	180	6	5

1平匙奶粉=4.3克
 100毫升标准奶液=90毫升水+12.9克奶粉。
 * 注意：调奶时只可用罐内所附的专用量匙。用少于或多于指定份量的奶粉，会让婴儿得不到适量的营养或导致脱水。未经医生建议切勿改变奶的浓度。



铂初能恩®

1

净含量: 400克
 国食注字 YP20220153

婴儿配方奶粉(0-6月龄, 1段)

倾心聆听
 雀巢消费者服务: 400-610-4868
 www.nestle.com.cn

配料

配料: 生牛乳(脱脂), 乳糖, 食用植物调和油(1, 3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯, 葵花籽油, 低芥酸菜籽油, 混合生育酚浓缩物, 抗坏血酸棕榈酸酯), 乳清蛋白粉, 肌醇(肌醇), 牛磺酸(牛磺酸), 左旋肉碱(左旋肉碱), 二十二碳六烯酸(DHA)(二十二碳六烯酸油脂), 花生四烯酸(ARA)(花生四烯酸油脂), L-苯丙氨酸, 核苷酸(5'-单磷酸胞苷, 5'-单磷酸腺苷, 5'-鸟苷酸二钠, 5'-尿苷酸二钠), 钠(柠檬酸钠), 钾(柠檬酸钾, 氯化钾), 铜(硫酸铜), 镁(氯化镁), 铁(硫酸亚铁), 锌(硫酸锌), 锰(硫酸锰), 钙(柠檬酸钙), 磷(磷酸氢钙), 碘(碘化钾), 硒(亚硒酸钠), 维生素A(醋酸视黄醇), 维生素D(维生素D₃), 维生素E(dl-α-醋酸生育酚), 维生素K(植物甲萘醌), 维生素B₁(硝酸硫胺素), 维生素B₂(核黄素), 维生素B₆(盐酸吡哆醇), 维生素B₁₂(氰钴胺), 烟酸(烟酰胺), 叶酸(叶酸), 泛酸(D-泛酸钙), 维生素C(L-抗坏血酸钠), 生物素(D-生物素), 胆碱(酒石酸氢胆碱), 动物双歧杆菌乳亚种Bb-12, 食品添加剂(大豆磷脂, 柠檬酸)。
 致敏物质提示: 含有乳及乳制品和大豆制品。

生产者: 双城雀巢有限公司
 地址: 黑龙江省哈尔滨市双城区友谊路
 产地: 黑龙江省哈尔滨市
 食品生产许可证编号: SC10523018250144
 规格: 400g
 产品标准代号: GB 10765-2021

产品类别及属性: 乳基粉状婴儿配方食品
 检验合格证号: 同“保质期至”及随后二位字符
 本品条码持有人为雀巢(中国)有限公司
 贮存条件: 放置于阴凉干燥处, 包装开启后请密封保存于阴凉干燥处, 并在三周内用完。
 保质期至及生产日期(年/月/日)示于罐底

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	每100mL
能量	kJ	100	2171	280
蛋白质	g	0.44	9.6	1.24
脂肪	g	1.30	28.3	3.65
亚油酸	g	0.15	3.2	0.41
α-亚麻酸	mg	17.04	370	47.73
碳水化合物	g	2.60	56.5	7.29

项目	单位	每100kJ	每100g	每100mL
矿物质				
钠	mg	8.75	190	24.51
钾	mg	23.03	500	64.50
铜	μg	17.92	389	50.18
镁	mg	2.12	46	5.93
铁	mg	0.23	5.1	0.66
锌	mg	0.16	3.5	0.45
锰	μg	5.30	115	14.84
钙	mg	23.03	500	64.50
磷	mg	14.74	320	41.28
碘	μg	4.51	98	12.64
硒	mg	15.02	326	42.05
胆碱	μg	0.90	19.6	2.53
可选择成分				
肌醇	mg	1.50	32.6	4.21
牛磺酸	mg	1.66	36	4.64
左旋肉碱	mg	0.50	10.9	1.41
二十二碳六烯酸	mg	4.51	98	12.64
二十碳四烯酸	mg	4.51	98	12.64
1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	g	0.18	4	0.52
核苷酸	mg	1.15	25	3.23

警示说明和注意事项

1. 注意: 未经煮沸的水、奶瓶或不正确的冲调方法, 均会引起婴儿不适。不恰当的贮存、调奶和喂养方法均有可能影响婴儿的健康。
2. 重要事项: 对于0-6月龄的婴儿最理想的食品是母乳, 在母乳不足或无母乳时可食用本产品。请尽可能的持续母乳喂养, 在您决定选用配方奶粉之前, 请先听取医生或保健人员的意见。
3. 提示: 喂奶时请注意您的宝宝, 如疏忽照顾可能会引致宝宝窒息。
4. 开启后请在三周内用完。



44263069

3

奶具消毒及冲调方法

1. 仔细清洗你的双手
2. 奶瓶、奶嘴与盖子洗净，并确保没有奶液残留后，浸没于水中煮至水沸，然后关闭电源并放置至需要时取出*
3. 将饮用水煮沸，放凉**
4. 参照喂哺表，先将水倒入奶瓶中，然后使用提供的量匙舀取奶粉，并小心抹平剩余奶粉
5. 确保量匙干燥并放回罐中，每次使用后关闭罐盖，并放置于阴凉干燥处
6. 盖上奶瓶盖，摇晃奶瓶直至粉末完全溶解。喂食宝宝前请测试温度

* 如使用购买的奶具消毒器，请遵循厂家的指引进行操作
** 为保持动物双歧杆菌乳亚种Bb-12活性，添加奶粉前请将开水冷却至体温

喂哺表

注意：每次只调配一瓶奶。调好的奶液应根据指导立即饮用，不要将未喝完的奶液存留，倒掉剩奶。调奶时请按照以下指示。当婴儿足够大时建议换成奶杯喂养。

婴儿年龄	每次喂哺份量		每日喂哺次数	
	温开水(毫升)	奶粉(平匙)*	奶粉(次)	其他(次)
第6个月	180	6	5	-
第7-9个月	180	6	4-3	1-2**
第10个月起	180	6	3-2	2-3**

1平匙奶粉=4.6克
100毫升标准奶液=90毫升水+13.8克奶粉。
* 注意：调奶时只可用罐内所附的专用量匙。用少于或多于指定份量的奶粉，会让婴儿得不到适量的营养或导致脱水。未经医生建议切勿改变奶的浓度。
** 在该年龄段，婴儿的饮食变得更加多样(谷物，婴儿辅食)，须配合添加辅食。在添加任何食品前，应先咨询医生的意见。如果从医生或保健人员处得到任何提前添加新食品的建议，建议减少奶粉摄入量。



铂初能恩®



净含量: 850克
国食注字 YP20220154

较大婴儿配方奶粉(6-12月龄, 2段)

二十二碳六烯酸(DHA)有助于婴儿视力的正常发育。

含有肌醇，牛磺酸，左旋肉碱，核苷酸，1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯

雀巢 Nestlé
倾心聆听
雀巢消费者服务: 400-610-4868
www.nestle.com.cn

配料

配料: 生牛乳(脱脂), 乳糖, 食用植物调和油(1, 3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯, 葵花籽油, 低芥酸菜籽油), 乳清蛋白粉, 肌醇(肌醇), 牛磺酸(牛磺酸), 左旋肉碱(左旋肉碱), 二十二碳六烯酸(DHA)(二十二碳六烯酸油脂), 花生四烯酸(ARA)(花生四烯酸油脂), 核苷酸(5'-单磷酸胞苷, 5'-单磷酸腺苷, 5'-鸟苷二钠, 5'-尿苷二钠), 钠(柠檬酸钠), 钾(柠檬酸钾), 铜(硫酸铜), 镁(氯化镁), 铁(硫酸亚铁), 锌(硫酸锌), 锰(硫酸锰), 钙(柠檬酸钙), 磷(磷酸氢钙), 碘(碘化钾), 硒(亚硒酸钠), 维生素A(醋酸视黄醇), 维生素D(维生素D₃), 维生素E(dl-α-生育酚), 维生素K(植物甲萘醌), 维生素B₁(磷酸硫胺素), 维生素B₂(核黄素), 维生素B₆(盐酸吡哆醇), 维生素B₁₂(氰钴胺), 烟酸(烟酰胺), 叶酸(叶酸), 泛酸(D-泛酸钙), 维生素C(L-抗坏血酸钠), 生物素(D-生物素), 胆碱(酒石酸胆碱), 动物双歧杆菌乳亚种Bb-12, 食品添加剂(大豆磷脂)。

致敏物质提示: 含有乳及乳制品和大豆制品。

警示说明和注意事项

1. 注意: 未经煮沸的水、奶瓶或不正确的冲调方法, 均会引起婴儿不适。不恰当的贮存、调奶和喂养方法均有可能影响婴儿的健康。
2. 重要事项: 宝宝最理想的食物是母乳, 请尽可能的持续母乳喂养, 在您决定选用较大婴儿配方奶粉之前, 请先听取医生或保健人员的意见。
3. 提示: 喂奶时请注意您的宝宝, 如疏忽照顾可能会引致宝宝窒息。
4. 开启后请在三周内用完。

生产者: 双城雀巢有限公司
地址: 黑龙江省哈尔滨市双城区友谊路
产地: 黑龙江省哈尔滨市
检验合格证号: 同“保质期至”及随后二位字符
食品生产许可证编号: SC10523018250144
产品标准代号: GB 10766-2021

产品类别及属性: 乳基粉状较大婴儿配方食品
规格: 850g
本品条码持有人为雀巢(中国)有限公司
贮存条件: 放置于阴凉干燥处, 包装开启后请密封保存于阴凉干燥处, 并在三周内用完。
保质期至及生产日期(年/月/日)示于罐底

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	每100mL
能量	kJ	100	2034	281
蛋白质	g	0.46	9.4	1.30
脂肪	g	1.08	21.9	3.02
亚油酸	g	0.11	2.3	0.32
α-亚麻酸	mg	15.24	310	42.78
碳水化合物	g	3.08	62.58	8.64
维生素				
维生素A	µg RE	22.52	458	63.20
维生素D	µg	0.60	12.3	1.70
维生素E	mg α-TE	0.32	6.5	0.90
维生素K ₁	µg	1.33	27	3.73
维生素B ₁	µg	29.99	610	84.18
维生素B ₂	µg	39.33	800	110.40
维生素B ₆	µg	21.14	430	59.34
维生素B ₁₂	µg	0.054	1.1	0.152
烟酸	µg	181.91	3700	510.60
叶酸	µg	3.05	62	8.56
泛酸	µg	167.16	3400	469.20
维生素C	mg	3.93	80	11.04
生物素	µg	0.71	14.5	2.00
胆碱	mg	7.52	153	21.11
矿物质				
钠	mg	7.13	145	20.01
钾	mg	23.11	470	64.86
铜	µg	15.24	310	42.78
镁	mg	2.46	50	6.90
铁	mg	0.31	6.3	0.87
锌	mg	0.20	4.0	0.55
锰	µg	6.64	135	18.63
钙	mg	27.78	565	77.97
磷	mg	16.96	345	47.61
碘	µg	4.52	92	12.70
硒	µg	0.74	15	2.07
可选择成分				
肌醇	mg	1.50	30.6	4.22
牛磺酸	mg	1.57	32	4.42
左旋肉碱	mg	0.50	10.2	1.41
二十二碳六烯酸	mg	4.52	92	12.70
花生四烯酸	mg	4.52	92	12.70
1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3	0.41
核苷酸	mg	1.18	24	3.31



44262847

4

奶具消毒及冲调方法

1. 仔细清洗双手
2. 奶瓶、奶嘴与盖子洗净并晾干
3. 将饮用水煮沸，然后将水倒入奶瓶中，冷却至适宜温度
4. 参照喂哺表，先加水后加奶粉
5. 确保量匙干燥并放于阴凉干燥处
6. 盖上奶瓶盖，摇晃均匀

注意：每次只调配一瓶奶。调好的奶液应根据指导立即饮用，不要将未喝完的奶液存留，倒掉剩奶。请随时请按照左侧指示，当婴儿足够大时建议换成奶嘴喂养。

婴儿年龄段	每次喂奶份量		每日喂奶次数	
	温开水(毫升)	奶粉(平匙)*	奶粉(次)	其他(次)
第6个月	180	6	5	-
第7-9个月	180	6	4-3	1-2**
第10个月起	180	6	3-2	2-3**

* 1平匙奶粉=4.6克；100毫升标准奶液=90毫升水+13.8克奶粉。
 ** 在该年龄段，婴儿的饮食应变得更加多样(谷物、婴儿辅食)，须配合添加辅食食品。在添加任何食品前，应先咨询医生的意见。如果从医生或保健人员处得到任何提前添加新食品的建议，建议减少奶粉摄入量。

Fe 铁

清洁卫生 绿化环境

铂初能恩®

2

净含量:200克
国食注字 YP20220154

较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段)

二十二碳六烯酸(DHA)有助于婴儿视力的正常发育。

含有肌醇，牛磺酸，左旋肉碱，核苷酸，1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯

雀巢 Nestlé
Nestlé

倾心聆听
雀巢消费者服务: 400-610-4868
www.nestle.com.cn

配料

配料: 生牛乳(脱脂), 乳糖, 食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯; 葵花籽油, 低芥酸菜籽油), 乳清蛋白粉, 肌醇(肌醇), 牛磺酸(牛磺酸), 左旋肉碱(左旋肉碱), 二十二碳六烯酸(DHA)(二十二碳六烯酸油脂), 花生四烯酸(ARA)(花生四烯酸油脂), 核苷酸(5'-单磷酸胞苷, 5'-单磷酸腺苷, 5'-鸟苷酸二钠, 5'-尿苷酸二钠), 钠(柠檬酸钠), 钾(柠檬酸钾), 铜(硫酸铜), 镁(氯化镁), 铁(硫酸亚铁), 锌(硫酸锌), 锰(硫酸锰), 钙(柠檬酸钙), 磷(磷酸氢钙), 碘(碘化钾), 硒(亚硒酸钠), 维生素A(醋酸视黄酯), 维生素D(维生素D₃), 维生素E(dl-α-醋酸生育酚), 维生素K(植甲萘醌), 维生素B₁(磷酸硫胺素), 维生素B₂(核黄素), 维生素B₆(盐酸吡哆醇), 维生素B₁₂(氰钴胺), 烟酸(烟酰胺), 叶酸(叶酸), 泛酸(D-泛酸钙), 维生素C(L-抗坏血酸钠), 生物素(D-生物素), 胆碱(酒石酸氢胆碱), 动物双歧杆菌乳亚种Bb-12, 食品添加剂(大豆磷脂)。

致敏物质提示: 含有乳及乳制品和大豆制品。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	每100mL
能量	kJ	100	2034	281
蛋白质	g	0.46	9.4	1.30
脂肪	g	1.08	21.9	3.02
亚油酸	g	0.11	2.3	0.32
(L-亚麻酸)	mg	15.24	310	42.78
碳水化合物	g	3.08	62.58	8.64

项目	单位	每100kJ	每100g	每100mL
钠	mg	7.13	145	20.01
钾	mg	23.11	470	64.86
钙	mg	15.24	310	42.78
镁	mg	2.46	50	6.90
铁	mg	0.31	6.3	0.87
锌	mg	0.20	4.0	0.55
铜	μg	6.64	135	18.63
锰	mg	27.78	565	77.97
磷	mg	16.96	345	47.61
碘	μg	4.52	92	12.70
硒	mg	12.00	244	33.67
维生素A	μg RE	22.52	458	63.20
维生素D	μg	0.60	12.3	1.70
维生素E	mg α-TE	0.32	6.5	0.90
维生素K ₁	μg	1.33	27	3.73
维生素B ₁	μg	29.99	610	84.18
维生素B ₂	μg	39.33	800	110.40
维生素B ₆	μg	21.14	430	59.34
维生素B ₁₂	μg	0.054	1.1	0.152
烟酸	μg	181.91	3700	510.60
叶酸	μg	3.05	62	8.56
泛酸	μg	167.16	3400	469.20
维生素C	mg	3.93	80	11.04
生物素	μg	0.71	14.5	2.00
胆碱	mg	7.52	153	21.11

项目	单位	每100kJ	每100g	每100mL
钠	mg	7.13	145	20.01
钾	mg	23.11	470	64.86
钙	mg	15.24	310	42.78
镁	mg	2.46	50	6.90
铁	mg	0.31	6.3	0.87
锌	mg	0.20	4.0	0.55
铜	μg	6.64	135	18.63
锰	mg	27.78	565	77.97
磷	mg	16.96	345	47.61
碘	μg	4.52	92	12.70
硒	μg	12.00	244	33.67

项目	单位	每100kJ	每100g	每100mL
肌醇	mg	1.50	30.6	4.22
牛磺酸	mg	1.57	32	4.42
左旋肉碱	mg	0.50	10.2	1.41
二十二碳六烯酸	mg	4.52	92	12.70
花生四烯酸	mg	4.52	92	12.70
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3	0.41
核苷酸	mg	1.18	24	3.31

警示说明和注意事项

1. 注意: 未经煮沸的水、奶瓶或不正确的冲调方法, 均会引起婴儿不适。不恰当的贮存、调奶和喂养方法均有可能影响婴儿的健康。
2. 重要事项: 宝宝最理想的食物是母乳, 请尽可能的持续母乳喂养, 在您决定选用较大婴儿配方奶粉之前, 请先听取医生或保健人员的意见。
3. 提示: 喂奶时请注意您的宝宝, 如疏忽照顾可能会引起宝宝窒息。
4. 开启后请在三周内用完。

生产者: 双城雀巢有限公司 地址: 黑龙江省哈尔滨市双城区友谊路
 产地: 黑龙江省哈尔滨市 检验合格证号: 同“保质期至”及随后二位字符
 食品生产许可证编号: SC10523018250144 产品标准代号: GB 10766-2021
 产品类别及属性: 乳基粉状较大婴儿配方食品 规格: 200g
 本品条码持有人为雀巢(中国)有限公司
 贮存条件: 放置于阴凉干燥处, 包装开启后请密封保存于阴凉干燥处, 并在三周内用完。

保质期至及生产日期(年/月/日)示于罐底

44264304

5

奶具消毒及冲调方法

1. 仔细清洗你的双手
2. 奶杯与盖子洗净并确保没有奶液残留后浸没于水中煮至水沸，然后关闭电源并放置至需要时取出*
3. 将饮用水煮沸，放凉**
4. 参照喂哺表，先将水倒入奶杯中，然后使用提供的量匙舀取奶粉，并小心抹平剩余奶粉
5. 确保量匙干燥并放回罐中，每次使用后关闭罐盖，并放置于阴凉干燥处
6. 搅拌直至粉末完全溶解，喂食宝宝前请测试温度

* 如使用购买的奶具消毒器，请遵循厂家的指引进行操作
** 为保持动物双歧杆菌乳亚种Bb-12活性，添加奶粉前请将开水冷却至体温

喂哺表

注意：每次只调配一杯奶。调好的奶液应根据指导立即饮用，不要将未喝完的奶液存留，倒掉剩奶。调奶时请按照以下指示。

幼儿年龄	每次喂哺份量		每日喂哺次数	
	温开水(毫升)	奶粉(平匙)*	奶粉(勺)**	其他(勺)
第12个月起	180	6	3	2-3

1平匙奶粉=4.6克；
100毫升标准奶液=90毫升水+13.8克奶粉。
* 调奶时只可用罐内所附的专用量匙。用少于或多于指定份量的奶粉，会令幼儿得不到适量的营养或导致脱水。未经医生建议切勿改变奶的浓度。
** 12个月以上幼儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。



雀巢 Nestlé
NAN Pt.

铂初能恩®

3

净含量: 850克
国食注字 YP20220155

幼儿配方奶粉(12-36月龄, 3段)

含有硒

含有胆碱, 肌醇, 牛磺酸, 左旋肉碱, 核苷酸, 1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯

雀巢 Nestlé

倾心聆听
雀巢消费者服务: 400-610-4868
www.nestle.com.cn

配料

配料: 生牛乳(脱脂), 乳糖, 食用植物调和油(1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯, 葵花籽油, 低芥酸菜籽油), 乳清蛋白粉, 脱脂乳粉, 硒(亚硒酸钠), 胆碱(酒石酸氢胆碱), 肌醇(肌醇), 牛磺酸(牛磺酸), 左旋肉碱(左旋肉碱), 二十二碳六烯酸(DHA)(二十二碳六烯酸油脂), 花生四烯酸(ARA)(花生四烯酸油脂), 核苷酸(5'-单磷酸胞苷, 5'-单磷酸腺苷, 5'-鸟苷二钠, 5'-尿苷二钠), 钠(柠檬酸钠), 钾(柠檬酸钾), 铜(硫酸铜), 镁(氯化镁), 铁(硫酸亚铁), 锌(硫酸锌), 钙(柠檬酸钙), 磷(磷酸氢钙), 碘(碘化钾), 维生素A(醋酸视黄酯), 维生素D(维生素D₃), 维生素E(dl-α-生育酚), 维生素K(植物甲萘醌), 维生素B₁(硫胺素), 维生素B₂(核黄素), 维生素B₆(盐酸吡哆醇), 维生素B₁₂(氰钴胺), 烟酸(烟酰胺), 叶酸(叶酸), 泛酸(D-泛酸钙), 维生素C(L-抗坏血酸钠), 生物素(D-生物素), 动物双歧杆菌乳亚种Bb-12, 食品添加剂(大豆磷脂)。

致敏物质提示: 含有乳及乳制品和大豆制品。

警示说明和注意事项

1. 注意: 未经煮沸的水、奶杯或不正确的冲调方法, 均会引起幼儿不适。不恰当的贮存、调奶和喂养方法均有可能影响幼儿的健康。
2. 重要事项: 本产品不是母乳代用品, 而是一种适合12-36月龄健康幼儿的配方奶粉, 请尽可能持续母乳喂养。
3. 提示: 喂奶时请注意您的宝宝, 如疏忽照顾可能会引致宝宝窒息。
4. 开启后请在三周内用完。

生产者: 双城雀巢有限公司
地址: 黑龙江省哈尔滨市双城区友谊路
产地: 黑龙江省哈尔滨市
检验合格证号: 同“保质期至”及随后二位字符
食品生产许可证编号: SC10523018250144
产品标准代号: GB 10767-2021

产品类别及属性: 乳基粉状幼儿配方食品
规格: 850g
本品条码持有人为雀巢(中国)有限公司
贮存条件: 放置于阴凉干燥处, 包装开启后请密封保存于阴凉干燥处, 并在三周内用完。
保质期至及生产日期(年/月/日)示于罐底

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	每100mL
能量	kJ	100	2025	279
蛋白质	g	0.46	9.3	1.28
脂肪	g	1.10	22.2	3.06
亚油酸	g	0.12	2.4	0.33
(l-亚麻酸)	mg	15.56	315	43.47
碳水化合物	g	3.04	61.5	8.49

维生素

维生素A	µg RE	22.52	456	62.93
维生素D	µg	0.60	12.2	1.68
维生素E	mg (α-TE)	0.32	6.5	0.90
维生素K ₁	µg	1.33	27	3.73
维生素B ₁	µg	31.11	630	86.94
维生素B ₂	µg	40.49	820	113.16
维生素B ₆	µg	21.73	440	60.72
维生素B ₁₂	µg	0.054	1.1	0.152
烟酸	µg	187.65	3800	524.40
叶酸	µg	3.95	80	11.04
泛酸	µg	182.72	3700	510.60
维生素C	mg	4.20	85	11.73
生物素	µg	0.89	18	2.48

矿物质

钠	mg	8.99	182	25.12
钾	mg	34.57	700	96.60
铜	µg	15.31	310	42.78
镁	mg	2.47	50	6.90
铁	mg	0.32	6.4	0.88
锌	mg	0.20	4.1	0.57
钙	mg	29.88	605	83.49
磷	mg	17.53	355	48.99
碘	µg	2.96	60	8.28
硒	mg	12.84	260	35.88

可选择成分

硒	µg	0.79	16	2.21
胆碱	mg	7.51	152	20.98
肌醇	mg	1.51	30.5	4.21
牛磺酸	mg	2.00	40.5	5.59
左旋肉碱	mg	0.50	10.2	1.41
二十二碳六烯酸	mg	4.54	92	12.70
二十碳四烯酸	mg	4.54	92	12.70
1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3	0.41
核苷酸	mg	1.48	30	4.14



44263092

6

奶具消毒及冲调方法

1. 仔细清洗你的双手
2. 奶杯与盖子洗净并消毒，确保没有奶液残留后浸沸，放凉
3. 将饮用水煮沸，放凉
4. 参照喂哺表，先将水倒入奶杯中，然后使用提供的量匙舀取奶粉，并小心抹平剩余奶粉
5. 确保量匙干燥并放回罐中，每次使用后关闭罐盖，并放置于阴凉干燥处
6. 搅拌均匀至粉末完全溶解，喂食宝宝前请测试温度

* 如使用购买的奶具消毒器，请遵循厂家的指引进行操作
** 为保持动物双歧杆菌乳亚种Bb-12活性，添加奶粉前请将开水冷却至体温

喂哺表

幼儿年龄	每次喂哺份量	每日喂哺次数
第12个月起	180	6
		3
		2-3

注意：每次只调配一杯奶。调好的奶液应根据指导立即饮用，不要将未喝完的奶液存留，倒掉剩奶。调奶时请按照左侧指示。

1平匙奶粉≈4.6克；100毫升标准奶液=90毫升水+13.8克奶粉。
* 调奶时只可用罐内所附的专用量匙。用少于或多于指定份量的奶粉，会令幼儿得不到适量的营养或导致脱水。未经医生建议切勿改变奶的浓度。
** 12个月以上幼儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。清洁卫生

Fe 铁
绿化环境

铂初能恩

NAN Pt.

3

净含量: 200克
国食注字 YP20220155

幼儿配方奶粉(12-36月龄, 3段)

含有硒

含有胆碱, 肌醇, 牛磺酸, 左旋肉碱, 核苷酸, 1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯

雀巢 Nestlé
倾心聆听
雀巢消费者服务: 400-610-4868
www.nestle.com.cn

配料

配料: 生牛乳(脱脂), 乳糖, 食用植物调和油(1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯, 葵花籽油, 低芥酸菜籽油), 乳清蛋白粉, 脱脂乳粉, 硒(亚硒酸钠), 胆碱(酒石酸氢胆碱), 肌醇(肌醇), 牛磺酸(牛磺酸), 左旋肉碱(左旋肉碱), 二十二碳六烯酸(DHA)(二十二碳六烯酸油脂), 花生四烯酸(ARA)(花生四烯酸油脂), 核苷酸(5'-单磷酸胞苷, 5'-单磷酸腺苷, 5'-鸟苷酸二钠, 5'-尿苷酸二钠), 软(柠檬酸钠), 钾(柠檬酸钾), 铜(硫酸铜), 镁(氯化镁), 铁(硫酸亚铁), 锌(硫酸锌), 钙(柠檬酸钙), 磷(磷酸氢钙), 碘(碘化钾), 维生素A(醋酸视黄醇), 维生素D(维生素D₃), 维生素E(dl-α-生育酚), 维生素K(植物甲萘醌), 维生素B₁(硝酸硫胺素), 维生素B₂(核黄素), 维生素B₆(盐酸吡哆醇), 维生素B₁₂(氰钴胺), 烟酸(烟酰胺), 叶酸(叶酸), 泛酸(D-泛酸钙), 维生素C(L-抗坏血酸钠), 生物素(D-生物素), 动物双歧杆菌乳亚种Bb-12, 食品添加剂(大豆磷脂)。

致敏物质提示: 含有乳及乳制品和大豆制品。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	每100mL
能量	kJ	100	2025	279
蛋白质	g	0.46	9.3	1.28
脂肪	g	1.10	22.2	3.06
亚油酸	g	0.12	2.4	0.33
α-亚麻酸	mg	15.56	315	43.47
碳水化合物	g	3.04	61.5	8.49

维生素

维生素A	μg RE	22.52	456	62.93
维生素D	μg	0.60	12.2	1.68
维生素E	mg (I-TE)	0.32	6.5	0.90
维生素K	μg	1.33	27	3.73
维生素B ₁	μg	31.11	630	86.94
维生素B ₂	μg	40.49	820	113.16
维生素B ₆	μg	21.73	440	60.72
维生素B ₁₂	μg	0.054	1.1	0.152
烟酸	μg	187.65	3800	524.40
叶酸	μg	3.95	80	11.04
泛酸	μg	182.72	3700	510.60
维生素C	mg	4.20	85	11.73
生物素	μg	0.89	18	2.48

矿物质

钠	mg	8.99	182	25.12
钾	mg	34.57	700	96.60
钠	μg	15.31	310	42.78
镁	mg	2.47	50	6.90
铁	mg	0.32	6.4	0.88
锌	mg	0.20	4.1	0.57
铜	mg	29.88	605	83.49
磷	mg	17.53	355	48.99
碘	μg	2.96	60	8.28
硒	mg	12.84	260	35.88

可选择成分

硒	μg	0.79	16	2.21
胆碱	mg	7.51	152	20.98
肌醇	mg	1.51	30.5	4.21
牛磺酸	mg	2.00	40.5	5.59
左旋肉碱	mg	0.50	10.2	1.41
二十二碳六烯酸	mg	4.54	92	12.70
二十碳四烯酸	mg	4.54	92	12.70
1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3	0.41
核苷酸	mg	1.48	30	4.14

警示说明和注意事项

1. 注意: 未经煮沸的水、奶杯或不正确的冲调方法, 均会引起幼儿不适。不恰当的贮存、调奶和喂哺方法均有可能影响幼儿的健康。
2. 重要事项: 本产品不是母乳代用品, 而是一种适合12-36月龄健康幼儿的配方奶粉, 请尽可能持续母乳喂养。
3. 提示: 喂奶时请注意您的宝宝, 如疏忽照顾可能会引致宝宝窒息。
4. 开启后请在三周内用完。

生产者: 双城雀巢有限公司
地址: 黑龙江省哈尔滨市双城区友谊路
产地: 黑龙江省哈尔滨市
检验合格证号: 同“保质期至”及随后二位字符
食品生产许可证编号: SC10523018250144
产品标准代号: GB 10767-2021
产品类别及属性: 乳基粉状幼儿配方食品
规格: 200g
本品条码持有人为雀巢(中国)有限公司
贮存条件: 放置于阴凉干燥处, 包装开启后请密封保存于阴凉干燥处, 并在三周内用完。

保质期至及生产日期(年/月/日)示于罐底

44264102

7

奶具消毒及冲调方法

- 1 仔细清洗你的双手。
- 2 洗净奶瓶、奶嘴与瓶盖直到没有奶液残留。完全浸没在水中，煮沸后关火，使用前保持盖子盖好。
- 3 将饮用水煮沸后关火，放凉。
- 4 参照喂哺表，先将水倒入奶瓶中，然后回罐中，每次使用后关闭罐盖，并放回量匙舀取奶粉，置于阴凉干燥处，并小心抹平剩余奶粉。
- 5 确保量匙干燥并放回罐中，每次使用前奶嘴至粉未完全溶解。喂食宝宝前请测试温度。
- 6 盖上奶瓶盖，摇晃奶瓶至粉未完全溶解。喂食宝宝前请测试温度。
- 7 制备后立即饮用。

* 如果你使用的是蒸汽消毒器，请遵循制造商的说明。
** 为保持动物双歧杆菌乳亚种Bb-12活性，添加奶粉前请将开水冷却至体温。

喂哺表

注意：每次只调配一瓶奶。请好的奶液应根据指导立即饮用，不要将未喝完的奶液存留，倒掉剩奶。请奶时请按照以下指示。

婴儿年龄	每次喂哺份量		每日喂哺次数
	温开水(毫升)	奶粉(平匙)*	
第1-2周	90	3	6
第3-4周	120	4	5
第2个月	150	5	5
第3-4个月	180	6	5
第5-6个月	180	6	5

1平匙奶粉=4.3克；
100毫升标准奶液=90毫升水+12.9克奶粉。
*注意：调奶时只可用罐内所附的专用量匙，用少于或多于指定份量的奶粉，会让婴儿得不到适量的营养或导致脱水。未经医生建议切勿改变奶的浓度。

Fe 铁 | 清洁卫生 | 净化环境

雀巢 Nestlé
NAN Pt.

铂初能恩®



1 段

净含量: 760克
国食注字 YP20250051

婴儿配方奶粉(0-6月龄, 1段)

雀巢 Nestlé

倾心聆听
雀巢消费者服务:
400-610-4868
www.nestle.com.cn

配料

配料：生牛乳(脱脂)、乳糖、食用植物油和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、低芥酸菜籽油、混合生育酚浓缩物、抗坏血酸棕榈酸酯)、乳清蛋白粉、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸(DHA)、花生四烯酸、L-苯丙氨酸、核苷酸(5'-单磷酸腺苷、5'-单磷酸尿苷、5'-鸟苷二磷酸、5'-尿苷二磷酸)、2'-岩藻糖基乳糖、乳糖-N-新四糖、钠(柠檬酸钠)、钾(柠檬酸钾、氯化钾)、铜(硫酸铜)、镁(氯化镁)、铁(硫酸亚铁)、锌(硫酸锌)、锰(硫酸锰)、钙(柠檬酸钙)、磷(磷酸氢钙)、碘(碘化钾)、硒(亚硒酸钠)、维生素A(视黄醇)、维生素D(维生素D₃)、维生素E(dl-α-生育酚)、混合生育酚浓缩物、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B₁(磷酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸钠、抗坏血酸棕榈酸酯)、生物素(D-生物素)、胆碱(酒石酸氢胆碱)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、磷脂、柠檬酸。

致敏物质提示：含有乳及乳制品和大豆制品。

生产者：双城雀巢有限公司
地址：黑龙江省哈尔滨市双城区友谊路
产地：黑龙江省哈尔滨市
检验合格证书：同批号 (LOT)
食品生产许可证编号：SC10523018250144
产品标准代号：GB 10765-2021
产品类别及属性：乳基粉状婴儿配方食品
贮存条件：放置于阴凉干燥处，包装开启后请密封保存于阴凉干燥处，并在三周内用完，保质期至及生产日期(年/月/日)见罐底

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	每100mL
能量	kJ	100	2171	280
蛋白质	g	0.44	9.6	1.24
脂肪	g	1.30	28.3	3.65
亚油酸	g	0.15	3.2	0.41
α-亚油酸	mg	17.04	370	47.73
碳水化合物	g	2.56	55.59	7.17

矿物质

项目	单位	每100kJ	每100g	每100mL
钠	mg	8.75	190	24.51
钾	mg	23.03	500	64.50
铜	μg	17.92	389	50.18
镁	mg	2.12	46	5.93
铁	mg	0.23	5.1	0.66
锌	mg	0.16	3.5	0.45
锰	μg	5.30	115	14.84
钙	mg	23.03	500	64.50
磷	mg	14.74	320	41.28
碘	μg	4.51	98	12.64
硒	mg	15.02	326	42.05
钼	μg	0.90	19.6	2.53

可选择成分

项目	单位	每100kJ	每100g	每100mL
肌醇	mg	1.50	32.6	4.21
牛磺酸	mg	1.66	36	4.64
左旋肉碱	mg	0.50	10.9	1.41
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.51	98	12.64
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.51	98	12.64
2'-岩藻糖基乳糖	g	0.071	1.548	0.20
乳糖-N-新四糖	g	0.018	0.388	0.05
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.18	4	0.52
核苷酸	mg	1.15	25	3.23

警示说明和注意事项

1.注意：未经煮沸的水、奶瓶或不正确的冲调方法，均会引起婴儿不适。不恰当的贮存、调奶和喂养方法均有可能影响婴儿的健康。2.重要事项：对于0-6月龄的婴儿最理想的食品是母乳。在母乳不足或无母乳时可食用本产品。请尽可能的持续母乳喂养。在您决定选用配方奶粉之前，请先听取医生或保健人员的意见。3.提示：喂奶时请抱着您的宝宝，如疏忽照顾可能会导致宝宝窒息。4.开启后请在三周内用完。

共同保护环境 妥善处理包装材料



罐子、勺子、盖子均为可回收再生设计

本条条码持有人为雀巢(中国)有限公司



6 917878 370057

44448134

奶具消毒及冲调方法

- 1** 仔细清洗你的双手。
- 2** 洗净奶瓶、奶嘴与瓶盖直到没有奶液残留。完全浸没在水中，煮沸后关火，使用前保持盖子盖好。*
- 3** 将饮用水煮沸后关火，放凉。**
- 4** 参照喂哺表，先将水倒入奶瓶中，然后使用罐内所提供的量匙舀取奶粉，并小心抹平剩余奶粉。
- 5** 确保量匙干燥并放回罐中，每次使用后关闭罐盖，并放置于阴凉干燥处。
- 6** 盖上奶瓶盖，摇晃奶瓶至粉末完全溶解。喂食宝宝前请测试温度。
- 7** 制备后立即饮用。

* 如果你使用的是蒸汽消毒器，请遵循制造商的说明。
** 为保持动物双歧杆菌乳亚种Bb-12活性，添加奶粉前请将开水冷却至体温。

喂哺表

注意：每次只调配一瓶奶。调好的奶液应根据指导立即饮用，不要将未喝完的奶液存留，倒掉剩奶。调奶时请按照以下指示。

婴儿年龄	每次喂哺份量			每日喂哺次数
	温开水(毫升)	奶粉(平匙)*	奶粉(次)	
第1-2周	90	3	6	
第3-4周	120	4	5	
第2个月	150	5	5	
第3-4个月	180	6	5	
第5-6个月	180	6	5	

1平匙奶粉=4.3克；
100毫升标准奶液=90毫升水+12.9克奶粉。
*注意：调奶时只可用罐内所附的专用量匙。用少于或多于指定份量的奶粉，会令婴儿得不到适量的营养或导致脱水。未经医生建议切勿改变奶的浓度。

Fe 铁 清洁卫生 绿化环境

铂初能恩®

1 段

净含量: 400克
国食注字 YP20250051

婴儿配方奶粉(0-6月龄, 1段)

倾心聆听
雀巢消费者服务:
400-610-4868
www.nestle.com.cn

配料

配料: 生牛乳(脱脂)、乳糖、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、低芥酸菜籽油、混合生育酚浓缩物、抗坏血酸棕榈酸酯)、乳清蛋白粉、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸油脂、L-苯丙氨酸、核苷酸(5'-单磷酸胞苷, 5'-单磷酸腺苷, 5'-鸟苷二核苷酸, 5'-尿苷二核苷酸)、2'-岩藻糖基乳糖、乳糖-N-新四糖、钠(柠檬酸钠)、钾(柠檬酸钾, 氯化钾)、铜(硫酸铜)、镁(氯化镁)、铁(硫酸亚铁)、锌(硫酸锌)、锰(硫酸锰)、钙(柠檬酸钙)、磷(磷酸氢钙)、碘(碘化钾)、硒(亚硒酸钠)、维生素A(醋酸视黄酯)、维生素D(维生素D₃)、维生素E(dl-α-醋酸生育酚、混合生育酚浓缩物)、维生素K(植物甲萘醌)、维生素B₁(硝酸硫胺素)、维生素B₂(核黄素)、维生素B₆(盐酸吡哆醇)、维生素B₁₂(氰钴胺)、烟酸(烟酰胺)、叶酸、泛酸(D-泛酸钙)、维生素C(L-抗坏血酸钠、抗坏血酸棕榈酸酯)、生物素(D-生物素)、胆碱(酒石酸氢胆碱)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、磷脂、柠檬酸。

致敏物质提示: 含有乳及乳制品和大豆制品。

生产者: 双城雀巢有限公司
地址: 黑龙江省哈尔滨市双城区友谊路 产地: 黑龙江省哈尔滨市
检验合格证号: 同批号 (LOT)
食品生产许可证编号: SC10523018250144
产品标准代号: GB 10765-2021
产品类别及属性: 乳基粉状婴儿配方食品
本品条码持有人为雀巢(中国)有限公司
贮存条件: 放置于阴凉干燥处, 包装开启后请密封保存于阴凉干燥处, 并在三周内用完。
保质期至及生产日期(年/月/日)见罐底

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	每100mL
能量	kJ	100	2171	280
蛋白质	g	0.44	9.6	1.24
脂肪	g	1.30	28.3	3.65
亚油酸	g	0.15	3.2	0.41
α-亚麻酸	mg	17.04	370	47.73
碳水化合物	g	2.56	55.59	7.17

矿物质

项目	单位	每100kJ	每100g	每100mL
钠	mg	8.75	190	24.51
钾	mg	23.03	500	64.50
铜	μg	17.92	389	50.18
镁	mg	2.12	46	5.93
铁	mg	0.23	5.1	0.66
锌	mg	0.16	3.5	0.45
锰	μg	5.30	115	14.84
钙	mg	23.03	500	64.50
磷	mg	14.74	320	41.28
碘	μg	4.51	98	12.64
氯	mg	15.02	326	42.05
硒	μg	0.90	19.6	2.53

可选择成分

项目	单位	每100kJ	每100g	每100mL
肌醇	mg	1.50	32.6	4.21
牛磺酸	mg	1.66	36	4.64
左旋肉碱	mg	0.50	10.9	1.41
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.51	98	12.64
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.51	98	12.64
2'-岩藻糖基乳糖	g	0.071	1.548	0.20
乳糖-N-新四糖	g	0.018	0.388	0.05
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.18	4	0.52
核苷酸	mg	1.15	25	3.23

警示说明和注意事项

- 注意: 未经煮沸的水、奶瓶或不正确的冲调方法, 均会引起婴儿不适。不恰当的贮存、调奶和喂养方法均有可能影响婴儿的健康。
- 重要事项: 对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳, 在母乳不足或无母乳时可食用本产品。请尽可能的持续母乳喂养, 在您决定选用配方奶粉之前, 请先听取医生或保健人员的意见。
- 提示: 喂奶时请抱着您的宝宝, 如疏忽照顾可能会导致宝宝窒息。
- 开启后请在三周内用完。

共同保护环境 妥善处理包装材料

罐子、勺子、盖子均为可回收再生设计

6 917878 353074

奶具消毒及冲调方法

1. 仔细清洗你的双手。
2. 洗净奶瓶、奶嘴与瓶盖直到没有奶液残留。完全浸没在水中，煮沸后关火，使用前保持盖子盖好。
3. 将饮用水煮沸后关火，放凉。
4. 参照喷壶表，先将水倒入奶瓶中，然后使用罐内所提供的量匙舀取奶粉，并小心抹平剩余奶粉。
5. 确保量匙干燥并放回罐中，每次使用后关闭罐盖，并置于阴凉干燥处。
6. 摇晃奶瓶，使奶粉完全溶解。喂食宝宝前请测试温度。
7. 制备后立即饮用。

• 如果你使用的是蒸汽消毒器，请遵循制造商的说明。
• 为保持动物双歧杆菌乳亚种Bb-12活性，添加奶粉前请将水冷却至体温。

喂哺表

注意：每次只调配一瓶奶，调好的奶液应根据指导立即饮用，不要将未喝完的奶液存留，倒掉剩奶。调奶时请按照以下指示，当婴儿足够大时建议换成奶杯喂养。

婴儿年龄	每次喂哺分量		每日喂哺次数	
	温开水(毫升)	奶粉(平匙)*	奶粉(勺)	其他(勺)
第6个月	180	6	5	-
第7-9个月	180	6	4-3	1-2**
第10个月起	180	6	3-2	2-3**

1平匙奶粉=4.6克，100毫升标准奶液=90毫升水+13.8克奶粉。
*注意：调奶时只可用罐内所附的专用量匙。用少于或多于指定份量的奶粉，会让婴儿得不到适量的营养或导致脱水。未经医生建议切勿改变奶的浓度。
**在该年龄段，婴儿的饮食应变得更加多样(谷物、婴儿辅食)，须配合添加辅食食品。在添加任何食品前，应先咨询医生的意见。如果从医生或保健人员处得到任何提前添加新食品的建议，建议减少奶粉摄入量。

铁 **清洁卫生** **保护环境**

雀巢 Nestlé
NAN Pt.

铂初能恩®



2段

净含量: 760克
国食注字 YP20250049

较大婴儿配方奶粉(6-12月龄, 2段)

二十碳六烯酸(DHA)有助于婴儿视力的正常发育。

含有肌醇，牛磺酸，左旋肉碱，核苷酸，1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯

雀巢 Nestlé

倾心聆听
雀巢消费者服务:
400-610-4868
www.nestle.com.cn

配料

配料：生牛乳(脱脂)、乳糖、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、低芥酸菜籽油)、乳清蛋白粉、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十碳六烯酸油酯(发酵法)、花生四烯酸油酯、核苷酸(5'-单磷酸胞苷, 5'-单磷酸腺苷, 5'-鸟苷酸二钠, 5'-尿苷酸二钠), 2'-岩藻糖基乳糖, 乳糖-N-新四糖, 钠(柠檬酸钠), 钾(柠檬酸钾), 铜(硫酸铜), 镁(氯化镁), 铁(硫酸亚铁), 锌(硫酸锌), 锰(硫酸锰), 钙(柠檬酸钙), 碘(碘酸钾), 磷(磷酸钾), 硒(亚硒酸钠), 维生素A(醋酸视黄醇), 维生素D(维生素D₃), 维生素E(dl-α-生育酚), 混合生育酚浓缩物, 维生素K(植物甲萘醌), 维生素B₁(磷酸吡哆素), 维生素B₂(核黄素), 维生素B₃(烟酰胺), 维生素B₆(氯化吡哆素), 维生素B₁₂(氰钴胺), 烟酸(烟酰胺), 叶酸, 泛酸(D-泛酸钙), 维生素C(L-抗坏血酸钠, 抗坏血酸棕榈酸酯), 生物素(D-生物素), 胆碱(酒石酸氢胆碱), 动物双歧杆菌乳亚种Bb-12, 磷脂, 柠檬酸。

致敏物质提示：含有乳及乳制品和大豆制品。

生产者：双城雀巢有限公司
地址：黑龙江省哈尔滨市双城区友谊路
产地：黑龙江省哈尔滨市
检验合格证书：同批号(LOT)
食品生产许可证编号：SC10523018250144
产品标准代号：GB 10766-2021
产品类别及属性：乳基粉状较大婴儿配方食品
贮存条件：放置于阴凉干燥处，包装开启后请密封保存于阴凉干燥处，并在三周内用完，保质期至及生产日期(年/月/日)见罐底


营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	每100mL
能量	kJ	100	2034	281
蛋白质	g	0.46	9.4	1.30
脂肪	g	1.08	21.9	3.02
亚油酸	g	0.11	2.3	0.32
α-亚麻酸	mg	15.24	310	42.78
碳水化合物	g	3.03	61.73	8.52
维生素				
维生素A	μg RE	22.52	458	63.20
维生素D	μg	0.60	12.3	1.70
维生素E	mg α-TE	0.32	6.5	0.90
维生素K ₁	μg	1.33	27	3.73
维生素B ₁	μg	27.04	550	75.90
维生素B ₂	μg	39.33	800	110.40
维生素B ₆	μg	21.14	430	59.34
维生素B ₁₂	μg	0.054	1.1	0.152
烟酸	μg	181.91	3700	510.60
叶酸	μg	3.05	62	8.56
泛酸	μg	187.16	3400	469.20
维生素C	mg	3.93	80	11.04
生物素	μg	0.71	14.5	2.00
胆碱	mg	7.52	153	21.11
矿物质				
钠	mg	7.13	145	20.01
钾	mg	23.11	470	64.86
铜	μg	15.24	310	42.78
镁	mg	2.46	50	6.90
铁	mg	0.31	6.3	0.87
锌	mg	0.20	4.0	0.55
锰	μg	6.64	135	18.63
钙	mg	27.78	565	77.97
磷	mg	16.86	345	47.61
碘	μg	4.52	92	12.70
硒	μg	12.00	244	33.67
钠	μg	0.74	15	2.07
可选择成分				
肌醇	mg	1.50	30.6	4.22
牛磺酸	mg	1.57	32	4.42
左旋肉碱	mg	0.50	10.2	1.41
二十碳六烯酸(DHA)	mg	4.52	92	12.70
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.52	92	12.70
2'-岩藻糖基乳糖	g	0.071	1.447	0.20
乳糖-N-新四糖	g	0.018	0.363	0.05
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3	0.41
核苷酸	mg	1.18	24	3.31

警告说明和注意事项


1. 注意：未经煮沸的水、奶瓶或不正确的冲调方法，均会引起婴儿不适。不恰当的贮存、调奶和喂养方法均有可能影响婴儿的健康。
2. 重要事项：宝宝最理想的食物是母乳，请尽可能的持续母乳喂养，在您决定选用较大婴儿配方奶粉之前，请先听取医生或保健人员的意见。
3. 提示：喂奶时请抱着您的宝宝，如疏忽照顾可能会引起宝宝窒息。
4. 开启后请在三周内用完。

共同保护环境 妥善处理包装材料



罐子、勺子、盖子均为可回收再生设计

本品条码持有人为雀巢(中国)有限公司



6 917878 370040

10

奶具消毒及冲调方法

1. 仔细清洗你的双手。
2. 洗净奶杯与盖子直到没有奶液残留。
3. 将饮用水煮沸后关火，放凉。
4. 参照喂哺表，先将水倒入奶杯中，然后使用罐内所提供的量匙舀取奶粉，并小心抹平剩余奶粉。
5. 确保量匙干燥并放回罐中，每次使用后关闭罐盖，并置于阴凉干燥处。
6. 搅拌均匀至粉末完全溶解，喂食宝宝前请测试温度。
7. 制备后立即饮用。

• 如果你使用的是蒸汽消毒器，请遵循制造商的说明。
• 为保持动物双歧杆菌乳亚种Bb-12活性，添加奶粉前请将开水冷却至体温。

喂哺表

注意：每次只调配一杯奶。调好的奶液应根据指导立即饮用，不要将未喝完的奶液存留，剩掉剩奶。调奶时请按照以下指示。

幼儿年龄	每次喂哺份量		每日喂哺次数	
	温开水(毫升)	奶粉(平匙)*	奶粉(心勺)**	其他心勺
第12个月起	180	6	3	2-3

1平匙奶粉=4.6克；
100毫升标准奶液=90毫升水+13.8克奶粉。
* 调奶时只可用罐内所附的专用量匙。用少于或多于指定份量的奶粉，会令幼儿得不到适量的营养或导致脱水。未经医生建议切勿改变奶粉的浓度。
** 12个月以上幼儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。

Fe 清洁卫生 绿色环境

Nestlé NAN Pt.

铂初能恩®

3段

净含量: 760克
国食注字 YP20250050

幼儿配方奶粉(12-36月龄, 3段)

含有硒

含有胆碱, 肌醇, 牛磺酸, 左旋肉碱, 核苷酸, 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯

雀巢 Nestlé

倾心聆听
雀巢消费者服务:
400-610-4868
www.nestle.com.cn

配料

配料: 生牛乳(脱脂), 乳糖, 食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯, 葵花籽油, 低芥酸菜籽油), 乳清蛋白粉, 脱脂乳粉, 硒(亚硒酸钠), 胆碱(酒石酸胆碱), 肌醇, 牛磺酸, 左旋肉碱, 二十二碳六烯酸油酯(发酵法), 花生四烯酸油酯, 核苷酸(5'-单磷酸胞苷, 5'-单磷酸腺苷, 5'-鸟苷二钠, 5'-尿苷二钠), 2'-岩藻糖基乳糖, 乳糖-N-新四糖, 钠(柠檬酸钠), 钾(柠檬酸钾), 铜(硫酸铜), 镁(氯化镁), 铁(硫酸亚铁), 锌(硫酸锌), 钙(柠檬酸钙), 磷(磷酸氢钙), 碘(碘化钾), 维生素A(视黄醇), 维生素D(维生素D₃), 维生素E(dl-α-生育酚), 混合生育酚浓缩物, 维生素K(植物甲萘醌), 维生素B₁(磷酸硫胺素), 维生素B₂(核黄素), 维生素B₆(盐酸吡哆醇), 维生素B₁₂(氰钴胺), 烟酸(烟酰胺), 叶酸, 泛酸(D-泛酸钙), 维生素C(L-抗坏血酸钠), 抗坏血酸棕榈酸酯, 生物素(D-生物素), 动物双歧杆菌乳亚种Bb-12, 磷脂, 柠檬酸致敏物质提示: 含有乳及乳制品和大豆制品。

生产者: 双城雀巢有限公司
地址: 黑龙江省哈尔滨市双城区友谊路
产地: 黑龙江省哈尔滨市
检验合格证号: 同批号 (LOT)
食品生产许可证编号: SC10523018250144
产品标准代号: GB 10767-2021
产品类别及属性: 乳基粉状幼儿配方食品
贮存条件: 放置于阴凉干燥处, 包装开启后请密封保存于阴凉干燥处, 并在三周内用完, 保质期至及生产日期(年/月/日)见罐底

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	每100mL
能量	kJ	100	2025	279
蛋白质	g	0.46	9.3	1.28
脂肪	g	1.10	22.2	3.06
亚油酸	g	0.12	2.4	0.33
α-亚麻酸	mg	15.56	315	43.47
碳水化合物	g	3.00	60.65	8.37

项目	单位	每100kJ	每100g	每100mL
钾	mg	34.57	700	96.60
铜	μg	15.31	310	42.78
镁	mg	2.47	50	6.90
铁	mg	0.32	6.4	0.88
锌	mg	0.20	4.1	0.57
钙	mg	29.88	605	83.49
磷	mg	17.53	355	48.99
碘	μg	2.96	60	8.28
硒	mg	12.84	260	35.88

可选择成分

项目	单位	每100kJ	每100g	每100mL
硒	μg	0.79	16	2.21
胆碱	mg	7.51	152	20.98
肌醇	mg	1.51	30.5	4.21
牛磺酸	mg	2.00	40.5	5.59
左旋肉碱	mg	0.50	10.2	1.41
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.54	92	12.70
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.54	92	12.70
2'-岩藻糖基乳糖	g	0.071	1.447	0.20
乳糖-N-新四糖	g	0.018	0.363	0.05
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.16	3	0.41
核苷酸	mg	1.48	30	4.14

警示说明和注意事项

1. 注意: 未经煮沸的水、奶杯或不正确的冲调方法, 均会引起幼儿不适。不恰当的贮存、调奶和喂养方法均有可能影响幼儿的健康。
2. 重要事项: 本产品不是母乳代用品, 而是一种适合12-36月龄健康幼儿的配方奶粉, 请尽可能持续母乳喂养。
3. 提示: 喂奶时请注意您的宝宝, 如疏忽照顾可能会引致宝宝窒息。
4. 开启后请在三周内用完。

共同保护环境 妥善处理包装材料

罐子、勺子、盖子均为可回收再生设计

本品条码持有人为雀巢(中国)有限公司

6 917878 370033

44448150

奶具消毒及冲调方法

1. 仔细清洗你的双手
2. 奶瓶、奶嘴与盖子洗净并确保没有奶液残留后浸没于水中煮沸至水沸，然后关闭电源并放置至需要时取出
3. 将饮用水煮沸，放凉
4. 参照喂哺表，先将水倒入奶瓶中，然后使用提供的量匙舀取奶粉，并小心抹平剩余奶粉
5. 确保量匙干燥并放回罐中，每次使用后关闭罐盖，并放置于阴凉干燥处
6. 盖上奶瓶盖，摇晃奶瓶至粉末完全溶解。喂食宝宝前请测试温度

• 如使用购买的奶具消毒器，请遵循厂家的指引进行操作
 • 为保持动物双歧杆菌乳亚种Bb-12活性，添加奶粉前请将开水冷却至体温

喂哺表

注意：每次只调配一瓶奶。调好的奶液应根据指导立即饮用，不要将未喝完的奶液存留，倒掉剩奶。调奶时请按照以下指示。

婴儿年龄	每次喂哺份量		每日喂哺次数
	温开水(毫升)	奶粉(平匙)*	
第1-2周	90	3	6
第3-4周	120	4	5
第2个月	150	5	5
第3-4个月	180	6	5
第5-6个月	180	6	5

1平匙奶粉=4.4克
 100毫升标准奶液=90毫升水+13.2克奶粉。
 *注意：调奶时只可用罐内所附的专用量匙。用少于或多于指定份量的奶粉，会令婴儿得不到适量的营养或导致脱水。未经医生建议请勿改变奶的浓度。



舒宜能恩

1

净含量: 900克
 国食注字 YP20220078

婴儿配方奶粉(0-6月龄, 1段)

倾心聆听
 雀巢消费者服务: 400-610-4868
 www.nestle.com.cn

配料

配料：生牛乳(部分脱脂)，乳糖，乳清蛋白粉，食用植物调和油(葵花籽油，低芥酸菜籽油)，低聚半乳糖，肌醇(肌醇)，牛磺酸(牛磺酸)，左旋肉碱(左旋肉碱)，二十二碳六烯酸(DHA)(二十二碳六烯酸油脂)，花生四烯酸(ARA)(花生四烯酸油脂)，L-苯丙氨酸，钠(柠檬酸钠)，钾(柠檬酸钾，氯化钾)，铜(硫酸铜)，镁(氯化镁)，铁(硫酸亚铁)，锌(硫酸锌)，锰(硫酸锰)，钙(柠檬酸钙)，磷(磷酸氢钙)，碘(碘化钾)，硒(亚硒酸钠)，维生素A(视黄醇)，维生素D(维生素D₃)，维生素E(dl-α-生育酚)，维生素K(植物甲萘醌)，维生素B₁(硫胺素)，维生素B₂(核黄素)，维生素B₆(盐酸吡哆醇)，维生素B₁₂(氰钴胺)，烟酸(烟酰胺)，叶酸(叶酸)，泛酸(D-泛酸钙)，维生素C(L-抗坏血酸钠)，生物素(D-生物素)，胆碱(酒石酸氢胆碱)，动物双歧杆菌乳亚种Bb-12，食品添加剂(大豆磷脂，柠檬酸)。

致敏物质提示：含有乳及乳制品和大豆制品。

警示说明和注意事项

1. 注意：未经煮沸的水、奶瓶或不正确的冲调方法，均会引起婴儿不适。不恰当的贮存、调奶和喂养方法均有可能影响婴儿的健康。
2. 重要事项：对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。请尽可能的持续母乳喂养，在您决定选用配方奶粉之前，请先听取医生或保健人员的意见。
3. 提示：喂奶时请注意您的宝宝，如疏忽照顾可能会引起宝宝窒息。
4. 开启后请在三周内用完。

生产者：双城雀巢有限公司
 地址：黑龙江省哈尔滨市双城区友谊路
 产地：黑龙江省哈尔滨市
 检验合格证号：同“保质期至”及随后二位字符
 食品生产许可证编号：SC10523018250144
 产品标准代号：GB 10765-2021

产品类别及属性：乳基粉状婴儿配方食品
 规格：900g
 本品条码持有人为雀巢(中国)有限公司
 贮存条件：放置于阴凉干燥处，包装开启后请密封保存于阴凉干燥处，并在三周内用完。
 保质期至及生产日期(年/月/日)示于罐底

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	每100mL
能量	kJ	100	2116	279
蛋白质	g	0.45	9.5	1.25
脂肪	g	1.31	27.7	3.66
亚油酸	g	0.14	2.9	0.38
α-亚麻酸	mg	23.39	495	65.34
碳水化合物	g	2.52	53.26	7.03
维生素				
维生素A	μg RE	17.72	375	49.5
维生素D	μg	0.57	12	1.58
维生素E	mg (α-TE)	0.28	6	0.79
维生素K ₁	μg	1.61	34	4.49
维生素B ₁	μg	26.47	560	73.92
维生素B ₂	μg	33.08	700	92.4
维生素B ₆	μg	17.96	380	50.16
维生素B ₁₂	μg	0.033	0.7	0.09
烟酸	μg	165.41	3500	462
叶酸	μg	3.64	77	10.16
泛酸	μg	122.87	2600	343.2
维生素C	mg	3.31	70	9.24
生物素	μg	0.61	13	1.72
胆碱	mg	6.14	130	17.16
矿物质				
钠	mg	8.84	187	24.68
钾	mg	26.23	555	73.26
铜	μg	17.96	380	50.16
镁	mg	2.27	48	6.34
铁	mg	0.24	5	0.66
锌	mg	0.16	3.3	0.44
锰	μg	5.20	110	14.52
钙	mg	23.63	500	66
磷	mg	15.12	320	42.24
碘	μg	4.54	96	12.67
硒	μg	15.12	320	42.24
维生素	μg	0.95	20	2.64
可选择成分				
肌醇	mg	1.42	30	3.96
牛磺酸	mg	1.70	36	4.75
左旋肉碱	mg	0.43	9	1.19
二十二碳六烯酸	mg	4.54	96	12.67
花生四烯酸	mg	4.54	96	12.67
低聚半乳糖	g	0.14	3.02	0.40



奶具消毒及冲调方法

1. 仔细清洗你的双手
2. 奶瓶、奶嘴与盖子洗净并确没有奶液残留后浸没于水中煮沸5分钟，然后关闭电源并放置至需要时取出
3. 将饮用水煮沸，放凉
4. 参照喂哺表，先将水倒入奶瓶中，然后使用提供的量匙舀取奶粉，并小心抹平剩余奶粉
5. 确保量匙干燥并放回罐中，每次使用后关闭罐盖，并放置于阴凉干燥处
6. 盖上奶瓶盖，摇晃回罐中，每次使用奶粉至粉末完全溶解。喂食宝宝前请测试温度

• 如使用购买的奶具消毒器，请遵循厂家的指引进行操作
 • 为保持动物双歧杆菌乳亚种Bb-12活性，添加奶粉前请将开水冷却至体温

喂哺表

注意：每次只调配一瓶奶，调好的奶液应根据指导立即饮用，不要将未喝完的奶液存留，倒掉剩奶。请奶时请按照以下指示。当婴儿足够大时建议换成奶杯喂养。

婴儿年龄	每次喂哺份量		每日喂哺次数	
	温开水(毫升)	奶粉(平匙)*	奶粉(次)	其他(次)
第6个月	180	6	5	-
第7-9个月	180	6	4-3	1-2**
第10个月起	180	6	3-2	2-3**

1平匙奶粉=4.73克。
 100毫升标准奶液=90毫升水+14.2克奶粉。
 • 注意：调奶时只可用罐内所附的专用量匙。用少于或多于指定份量的奶粉，会令婴儿得不到适量的营养或导致脱水。未经医生建议请勿改变奶的浓度。
 • 在该年龄段，婴儿的饮食变得更加多样(谷物，婴儿辅食)，须配合添加辅食食品。在添加任何食品前，应先咨询医生的意见。如果从医生或保健人员处得到任何提前添加新食品的建议，建议减少奶粉摄入量。



舒宜能恩



净含量:900克
 国食注字 YP20220079

较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段)

含有牛磺酸，左旋肉碱，肌醇

二十二碳六烯酸(DHA)有助于婴儿视力的正常发育。

雀巢 Nestlé

倾心聆听
 雀巢消费者服务: 400-610-4868
 www.nestle.com.cn

配料

配料：生牛乳(部分脱脂)，乳糖，乳清蛋白粉，食用植物调和油(葵花籽油，低芥酸菜籽油)，低聚半乳糖，肌醇(肌醇)，牛磺酸(牛磺酸)，左旋肉碱(左旋肉碱)，二十二碳六烯酸(DHA)(二十二碳六烯酸油脂)，花生四烯酸(ARA)(花生四烯酸油脂)，钠(柠檬酸钠)，钾(柠檬酸钾)，铜(硫酸铜)，镁(氯化镁)，铁(硫酸亚铁)，锌(硫酸锌)，锰(硫酸锰)，钙(柠檬酸钙)，磷(磷酸氢钙)，碘(碘化钾)，硒(亚硒酸钠)，维生素A(醋酸视黄酯)，维生素D(维生素D₃)，维生素E(dl-α-生育酚)，维生素K(植物甲萘醌)，维生素B₁(硝酸硫胺素)，维生素B₂(核黄素)，维生素B₆(盐酸吡哆醇)，维生素B₁₂(氰钴胺)，烟酸(烟酰胺)，叶酸(叶酸)，泛酸(D-泛酸钙)，维生素C(L-抗坏血酸钠)，生物素(D-生物素)，胆碱(酒石酸氢胆碱)，动物双歧杆菌乳亚种Bb-12，食品添加剂(大豆磷脂)。

致敏物质提示：含有乳及乳制品和大豆制品。

警示说明和注意事项

1. 注意：未经煮沸的水、奶瓶或不正确的冲调方法，均会引起婴儿不适。不恰当的贮存、调奶和喂养方法均有可能影响婴儿的健康。
2. 重要事项：婴儿最理想的食物是母乳，请尽可能的持续母乳喂养，在您决定选用较大婴儿配方奶粉之前，请先听取医生或保健人员的意见。
3. 提示：喂奶时请注意您的宝宝，如疏忽照顾可能会引起宝宝窒息。
4. 开启后请在三周内用完。

生产者：双城雀巢有限公司
 地址：黑龙江省哈尔滨市双城区友谊路
 产地：黑龙江省哈尔滨市
 检验合格证书：同“保质期至”及随后二位字符
 食品生产许可证编号：SC10523018250144
 产品标准代号：GB 10766-2021

产品类别及属性：乳基粉状较大婴儿配方食品
 规格：900g
 本品条码持有人为雀巢(中国)有限公司
 贮存条件：放置于阴凉干燥处，包装开启后请密封保存于阴凉干燥处，并在三周内用完。
 保质期至及生产日期(年/月/日)示于罐底

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	每100mL
能量	kJ	100	1974	280
蛋白质	g	0.47	9.3	1.32
脂肪	g	1.02	20.2	2.87
亚油酸	g	0.11	2.2	0.31
α-亚麻酸	mg	17.73	350	49.7
碳水化合物	g	3.12	61.53	8.74
维生素				
维生素A	μg RE	22.80	450	63.9
维生素D	μg	0.60	11.9	1.69
维生素E	mg (α-TE)	0.33	6.5	0.92
维生素K ₁	μg	1.32	26	3.69
维生素B ₁	μg	30.40	600	85.2
维生素B ₂	μg	40.53	800	113.6
维生素B ₆	μg	21.28	420	59.64
维生素B ₁₂	μg	0.056	1.1	0.16
烟酸	μg	182.37	3600	511.2
叶酸	μg	3.04	60	8.52
泛酸	μg	167.17	3300	468.6
维生素C	mg	4.05	80	11.36
生物素	μg	0.73	14.5	2.06
胆碱	mg	6.08	120	17.04
矿物质				
钠	mg	7.09	140	19.88
钾	mg	25.33	500	71
铜	μg	15.20	300	42.6
铁	mg	2.53	50	7.1
锌	mg	0.30	6	0.85
锰	mg	0.20	4	0.57
钙	μg	6.59	130	18.46
磷	mg	28.37	560	79.52
碘	mg	17.73	350	49.7
硒	μg	4.56	90	12.78
肌醇	mg	11.96	236	33.51
牛磺酸	μg	0.66	13	1.85
可溶性成分				
肌醇	mg	1.52	30	4.26
牛磺酸	mg	1.62	32	4.54
左旋肉碱	mg	0.46	9	1.28
二十二碳六烯酸	mg	4.56	90	12.78
二十二碳四烯酸	mg	4.56	90	12.78
低聚半乳糖	g	0.14	2.82	0.40



13

奶具消毒及冲调方法

1. 仔细清洗你的双手
2. 奶杯与盖子洗净并确保没有奶液残留后浸没于水中煮至水沸, 然后关闭电源并放置至需要时取出
3. 将饮用水煮沸, 放凉
4. 参照喂哺表, 先将水倒入奶杯中, 然后使用提供的量匙舀取奶粉, 并小心抹平剩余奶粉
5. 确保量匙干燥并放回罐中, 每次使用后关闭罐盖, 并放置于阴凉干燥处
6. 搅拌均匀至粉末完全溶解, 喂给宝宝前请测试温度

• 如使用购买的奶具消毒器, 请遵循厂家的指引进行操作
 • 为保持动物双歧杆菌乳亚种Bb-12活性, 添加奶粉前请将开水冷却至体温

喂哺表

注意: 每次只调配一杯奶, 调好的奶液应根据指导立即饮用, 不要将未喝完的奶液存留, 倒掉剩奶, 调奶时请按照以下指示。

幼儿年龄	每次喂哺份量		每日喂哺次数	
	温开水(毫升)	奶粉(平匙)*	奶粉(勺)**	其他(C)次
第12个月起	180	6	3	2-3

1平匙奶粉=4.76克,
 100毫升标准奶液=90毫升水+14.3克奶粉。
 *调奶时只可用罐内所附的专用量匙, 用少于或多于指定份量的奶粉, 会令幼儿得不到适量的营养或导致脱水, 未经医生建议切勿改变奶的浓度。
 **12个月以上幼儿食用本产品时, 须配合添加辅助食品。



舒宜能恩

3

雀巢 Nestlé
NAN.

净含量: 900克
国食注字 YP20220080

幼儿配方奶粉(12-36月龄, 3段)

含有牛磺酸, 左旋肉碱, 肌醇

含有胆碱, 硒

雀巢 Nestlé

倾心聆听
雀巢消费者服务: 400-610-4868
www.nestle.com.cn

配料

配料: 生牛乳(部分脱脂), 乳糖, 食用植物调和油(葵花籽油, 低芥酸菜籽油), 乳清蛋白粉, 脱脂奶粉, 低聚半乳糖, 硒(亚硒酸钠), 胆碱(酒石酸氢胆碱), 肌醇(肌醇), 牛磺酸(牛磺酸), 左旋肉碱(左旋肉碱), 二十二碳六烯酸(DHA)(二十二碳六烯酸油脂), 花生四烯酸(ARA)(花生四烯酸油脂), 钠(柠檬酸钠), 钾(柠檬酸钾), 铜(硫酸铜), 镁(氯化镁), 铁(硫酸亚铁), 锌(硫酸锌), 钙(柠檬酸钙), 磷(磷酸氢钙), 碘(碘化钾), 维生素A(醋酸视黄醇), 维生素D(维生素D₃), 维生素E(dl-α-生育酚), 维生素K(植物甲萘醌), 维生素B₁(磷酸硫胺素), 维生素B₂(核黄素), 维生素B₆(盐酸吡哆醇), 维生素B₁₂(氰钴胺), 烟酸(烟酰胺), 叶酸(叶酸), 泛酸(D-泛酸钙), 维生素C(L-抗坏血酸钠), 生物素(D-生物素), 动物双歧杆菌乳亚种Bb-12, 食品添加剂(大豆磷脂)。

致敏物质提示: 含有乳及乳制品和大豆制品。

警示说明和注意事项

1. 注意: 未经煮沸的水、奶杯或不正确的冲调方法, 均会引起幼儿不适。不恰当的贮存、调奶和喂养方法均有可能影响幼儿的健康。
2. 重要事项: 本产品不是母乳代用品, 而是一种适合12-36月龄健康幼儿的配方奶粉, 请尽可能持续母乳喂养。
3. 提示: 喂奶时请注意您的宝宝, 如疏忽照顾可能会引致宝宝窒息。
4. 开启后请在三周内用完。

生产者: 双城雀巢有限公司
 地址: 黑龙江省哈尔滨市双城区友谊路
 产地: 黑龙江省哈尔滨市
 检验合格证号: 同“保质期至”及随后二位字符
 食品生产许可证编号: SC10523018250144
 产品标准代号: GB 10767-2021

产品类别及属性: 乳基粉状幼儿配方食品
 规格: 900g
 本品条码持有人为雀巢(中国)有限公司
 贮存条件: 放置于阴凉干燥处, 包装开启后请密封保存于阴凉干燥处, 并在三周内用完。
 保质期至及生产日期(年/月/日)示于罐底

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	每100mL
能量	kJ	100	1965	281
蛋白质	g	0.47	9.2	1.32
脂肪	g	1.03	20.2	2.89
亚油酸	g	0.11	2.2	0.31
α-亚麻酸	mg	18.32	360	51.48
碳水化合物	g	3.11	61.11	8.74
维生素				
维生素A	μg RE	22.70	446	63.78
维生素D	μg	0.61	12	1.72
维生素E	mg α-TE	0.33	6.5	0.93
维生素K ₁	μg	1.32	26	3.72
维生素B ₁	μg	31.55	620	88.66
维生素B ₂	μg	40.71	800	114.4
维生素B ₆	μg	21.37	420	60.06
维生素B ₁₂	μg	0.056	1.1	0.16
烟酸	μg	188.30	3700	529.1
叶酸	μg	4.07	80	11.44
泛酸	μg	183.21	3600	514.8
维生素C	mg	4.07	80	11.44
生物素	μg	0.89	17.5	2.5
矿物质				
钠	mg	9.16	180	25.74
钾	mg	38.17	750	107.25
铜	μg	15.27	300	42.9
镁	mg	2.54	50	7.15
铁	mg	0.31	6	0.86
锌	mg	0.20	4	0.57
钙	mg	30.53	600	85.8
磷	mg	17.81	350	50.05
碘	μg	3.05	60	8.58
硒	mg	12.98	255	36.47
可能含成分				
硒	μg	0.76	15	2.15
胆碱	mg	6.11	120	17.16
肌醇	mg	1.53	30	4.29
牛磺酸	mg	2.04	40	5.72
左旋肉碱	mg	0.46	9	1.29
二十二碳六烯酸	mg	4.58	90	12.87
二十二碳四烯酸	mg	4.58	90	12.87
低聚半乳糖	g	0.14	2.8	0.40



44243399

奶具消毒及冲调方法

1. 仔细清洗你的双手
2. 奶杯与盖子洗净并消毒，确保没有奶液残留后浸没于水中煮沸，然后关闭电源并放置至需要时取出
3. 将饮用水煮沸，放凉**
4. 参照喂哺表，先将水倒入奶杯中，然后使用提供的量匙舀取奶粉，并小心抹平剩余奶粉
5. 确保量匙干燥并全溶解。喂食宝宝前请测试温度
6. 搅拌直至粉末完全溶解。喂食宝宝前请测试温度

* 如使用购买的奶具消毒器，请遵循厂家的指引进行操作
 ** 为保持动物双歧杆菌乳亚种Bb-12活性，添加奶粉前请将开水冷却至体温

喂哺表

幼儿年龄	每次喂哺份量	每日喂哺次数	注意：每次只调配一杯奶。调好的奶液应根据指导立即饮用，不要将未喝完的奶液存留，倒掉剩奶。调奶时请按照左侧指示。
第12个月起	180	6	3
			2-3

1 平匙奶粉=4.76克；100毫升标准奶液=90毫升水+14.3克奶粉。
 * 调奶时只可用罐内所附的专用量匙。用少于或多于指定份量的奶粉，会让幼儿得不到适量的营养或导致脱水。未经医生建议切勿改变奶的浓度。
 ** 12个月以上幼儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。清洁卫生 绿化环境

舒宜能恩

3

雀巢 Nestlé
NAN

净含量: 200克
国食注字 YP20220080

幼儿配方奶粉(12-36月龄, 3段)

含有牛磺酸, 左旋肉碱, 肌醇

含有胆碱, 硒

雀巢 Nestlé

倾心聆听
雀巢消费者服务: 400-610-4868
www.nestle.com.cn

配料

配料: 生牛乳(部分脱脂), 乳糖, 食用植物调和油(葵花籽油, 低芥酸菜籽油), 乳清蛋白粉, 脱脂乳粉, 低聚半乳糖, 硒(亚硒酸钠), 胆碱(酒石酸氢胆碱), 肌醇(肌醇), 牛磺酸(牛磺酸), 左旋肉碱(左旋肉碱), 二十二碳六烯酸(DHA)(二十二碳六烯酸油脂), 花生四烯酸(ARA)(花生四烯酸油脂), 钠(柠檬酸钠), 钾(柠檬酸钾), 铜(硫酸铜), 镁(氯化镁), 铁(硫酸亚铁), 锌(硫酸锌), 钙(柠檬酸钙), 磷(磷酸氢钙), 碘(碘化钾), 维生素A(醋酸视黄醇), 维生素D(维生素D₃), 维生素E(dl-α-生育酚), 维生素K(植物甲萘醌), 维生素B₁(磷酸硫胺素), 维生素B₂(核黄素), 维生素B₆(盐酸吡哆醇), 维生素B₁₂(氰钴胺), 烟酸(烟酰胺), 叶酸(叶酸), 泛酸(D-泛酸钙), 维生素C(L-抗坏血酸钠), 生物素(D-生物素), 动物双歧杆菌乳亚种Bb-12, 食品添加剂(大豆磷脂)。
 致敏物质提示: 含有乳及乳制品和大豆制品。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	每100mL
能量	kJ	100	1965	281
蛋白质	g	0.47	9.2	1.32
脂肪	g	1.03	20.2	2.89
亚油酸	g	0.11	2.2	0.31
α-亚麻酸	mg	18.32	360	51.48
碳水化合物	g	3.11	61.11	8.74

矿物质

项目	单位	每100kJ	每100g	每100mL
钠	mg	9.16	180	25.74
钾	mg	38.17	750	107.25
铜	μg	15.27	300	42.9
镁	mg	2.54	50	7.15
铁	mg	0.31	6	0.86
锌	mg	0.20	4	0.57
钙	mg	30.53	600	85.8
磷	mg	17.81	350	50.05
碘	μg	3.05	60	8.58
硒	μg	12.98	255	36.47

可选择成分

项目	单位	每100kJ	每100g	每100mL
硒	μg	0.76	15	2.15
胆碱	mg	6.11	120	17.16
肌醇	mg	1.53	30	4.29
牛磺酸	mg	2.04	40	5.72
左旋肉碱	mg	0.46	9	1.29
二十二碳六烯酸	mg	4.58	90	12.87
二十碳四烯酸	mg	4.58	90	12.87
低聚半乳糖	g	0.14	2.8	0.40

维生素

项目	单位	每100kJ	每100g	每100mL
维生素A	μg RE	22.70	446	63.78
维生素D	μg	0.61	12	1.72
维生素E	mg (I-TE)	0.33	6.5	0.93
维生素K ₁	μg	1.32	26	3.72
维生素B ₁	μg	31.55	620	88.66
维生素B ₂	μg	40.71	800	114.4
维生素B ₆	μg	21.37	420	60.06
维生素B ₁₂	μg	0.056	1.1	0.16
烟酸	μg	188.30	3700	529.1
叶酸	μg	4.07	80	11.44
泛酸	μg	183.21	3600	514.8
维生素C	mg	4.07	80	11.44
生物素	μg	0.89	17.5	2.5

警示说明和注意事项

1. 注意: 未经煮沸的水、奶杯或不正确的冲调方法, 均会引起幼儿不适。不恰当的贮存、调奶和喂哺方法均有可能影响幼儿的健康。
2. 重要事项: 本产品不是母乳代用品, 而是一种适合12-36月龄健康幼儿的配方奶粉, 请尽可能持续母乳喂养。
3. 提示: 喂奶时请注意您的宝宝, 如疏忽照顾可能会导致宝宝窒息。
4. 开启后请在三周内用完。

生产者: 双城雀巢有限公司
 产地: 黑龙江省哈尔滨市
 食品生产许可证编号: SC10523018250144
 产品类别及属性: 乳基粉状幼儿配方食品
 本品条码持有人为雀巢(中国)有限公司
 贮存条件: 放置于阴凉干燥处, 包装开启后请密封保存于阴凉干燥处, 并在三周内用完。

保质期至及生产日期(年/月/日)示于罐底



营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	每100mL
能量	kJ	100	1965	261
蛋白质	g	0.47	9.2	1.32
脂肪	g	1.03	20.2	2.89
亚油酸	g	0.11	2.2	0.31
α-亚麻酸	mg	18.32	360	51.48
碳水化合物	g	3.11	61.11	8.74

维生素

维生素A	μg RE	22.70	446	63.78
维生素D	μg	0.61	12	1.72
维生素E	mg α-TE	0.33	6.5	0.93
维生素K	μg	1.32	26	3.72
维生素B ₁	μg	31.55	620	88.66
维生素B ₂	μg	40.71	800	114.4
维生素B ₆	μg	21.37	420	60.06
维生素B ₁₂	μg	0.056	1.1	0.16
烟酸	μg	188.30	3700	529.1
叶酸	μg	4.07	80	11.44
泛酸	μg	183.21	3600	514.8
维生素C	mg	4.07	80	11.44
生物素	μg	0.89	17.5	2.5

矿物质

钠	mg	9.16	180	25.74
钾	mg	38.17	750	107.25
铜	μg	15.27	300	42.9
镁	mg	2.54	50	7.15
铁	mg	0.31	6	0.86
锌	mg	0.20	4	0.57
钙	mg	30.53	600	85.8
磷	mg	17.81	350	50.05
碘	μg	3.05	60	8.58
氯	mg	12.98	255	36.47

可选择成分

硒	μg	0.76	15	2.15
胆碱	mg	6.11	120	17.16
肌醇	mg	1.53	30	4.29
牛磺酸	mg	2.04	40	5.72
左旋肉碱	mg	0.46	9	1.29
二十二碳六烯酸	mg	4.58	90	12.87
二十碳四烯酸	mg	4.58	90	12.87
低聚半乳糖	g	0.14	2.8	0.40

配料

配料: 生牛乳(部分脱脂), 乳糖, 食用植物调和油(葵花籽油, 低芥酸菜籽油), 乳清蛋白粉, 脱脂奶粉, 低聚半乳糖, 硒(亚硒酸钠), 胆碱(酒石酸氢胆碱), 肌醇(肌醇), 牛磺酸(牛磺酸), 左旋肉碱(左旋肉碱), 二十二碳六烯酸(DHA)(二十二碳六烯酸油脂), 花生四烯酸(ARA)(花生四烯酸油脂), 钠(柠檬酸钠), 钾(柠檬酸钾), 铜(硫酸铜), 镁(氯化镁), 铁(硫酸亚铁), 锌(硫酸锌), 钙(柠檬酸钙), 磷(磷酸氢钙, 磷酸钾), 维生素A(醋酸视黄酯), 维生素D(维生素D₂), 维生素E(dl-α-醋酸生育酚), 维生素K(植物甲萘醌), 维生素B₁(硝酸硫胺素), 维生素B₂(核黄素), 维生素B₆(盐酸吡哆醇), 维生素B₁₂(氰钴胺), 烟酸(烟酰胺), 叶酸(叶酸), 泛酸(D-泛酸钙), 维生素C(L-抗坏血酸钠), 生物素(D-生物素), 动物双歧杆菌乳亚种Bb-12, 食品添加剂(大豆磷脂)。

致敏物质提示: 含有乳及乳制品和大豆制品。

喂哺表

注意: 每次只调配一杯奶。调好的奶液应根据指导立即饮用, 不要将未喝完的奶液存留, 倒掉剩奶。调奶时请按照以下指示。

幼儿年龄	每次喂哺份量		每日喂哺次数	
	温开水(毫升)	奶粉(平匙)*	奶粉(次)**	其他(次)
第12个月起	180	6	3	2-3

1平匙奶粉=4.76克, 100毫升标准奶液=90毫升水+14.3克奶粉。
*调奶时只可用盒内所附的专用量匙。用少于或多于指定份量的奶粉, 会令幼儿得不到适量的营养或导致脱水。未经医生建议切勿改变奶的浓度。
**12个月以上幼儿食用本产品时, 须配合添加辅助食品。

警示说明和注意事项

- 注意: 未经煮沸的水、奶杯或不正确的冲调方法, 均会引起幼儿不适。不恰当的贮存、调奶和喂养方法均有可能影响幼儿的健康。
- 重要事项: 本产品不是母乳代用品, 而是一种适合12-36月龄健康幼儿的配方奶粉, 请尽可能持续母乳喂养。
- 提示: 喂奶时请注意您的宝宝, 如疏忽照顾可能会引致宝宝窒息。
- 开启后请在三周内用完。

保质期至及生产日期(年/月/日)



舒宜能恩

3

净含量: 3x400克
国食注字 YP20220080

幼儿配方奶粉(12-36月龄, 3段)

雀巢 Nestlé
NAN

奶具消毒及冲调方法

- 1 仔细清洗你的双手
- 2 奶杯与盖子洗净并确保没有奶液残留后浸没于水中煮沸, 然后关闭电源并放置至需要时取出*
- 3 将饮用水煮沸, 放凉**
- 4 参照喂哺表, 先将水倒入奶杯中, 然后使用提供的量匙舀取(平匙)奶粉
- 5 确保量匙干燥并放回袋中, 每次使用后请密封保存于阴凉干燥处
- 6 搅拌直至粉末完全溶解。喂食宝宝前请测试温度

* 如使用购买的奶具消毒器, 请遵循厂家的指引进行操作
** 为保持动物双歧杆菌乳亚种Bb-12活性, 添加奶粉前请将开水冷却至体温

生产者: 双城雀巢有限公司
地址: 黑龙江省哈尔滨市双城区友谊路
产地: 黑龙江省哈尔滨市
检验合格证号: 同“保质期至”及随后二位字符
食品生产许可证编号: SC10523018250144
规格: 3x400g
产品标准代号: GB 10767-2021
产品类别及属性: 乳基粉状幼儿配方食品
本品条码持有人为雀巢(中国)有限公司
贮存条件: 放置于阴凉干燥处。
包装开启后请密封保存于阴凉干燥处, 并在三周内用完。
保质期至及生产日期(年/月/日)示于包装侧面

6 917878 082691

重要事项

对于0~6月龄的婴儿最理想
的食品是母乳，在母乳不足
或无母乳时可食用本产品。



倾心聆听

雀巢消费者服务 400-610-4868

www.nestle.com.cn

力多精[®] 挚宝[®]

1

雀巢 Nestlé
LACTOGEN LUV[®]

净含量:900克
国食注字 YP20170078

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	每100ml
能量	kJ	100	2083	280
蛋白质	g	0.46	9.5	1.28
脂肪	g	1.27	26.5	3.57
亚油酸	g	0.16	3.3	0.44
α-亚麻酸	g	25.68	535	72.01
碳水化合物	g	2.57	53.58	7.21
维生素A	μg RE	17.52	365	49.13
维生素D	μg	0.58	12	1.62
维生素E	mg α-TE	0.29	6	0.81
维生素K	μg	1.63	34	4.58
维生素B ₁	μg	25.92	540	72.68
维生素B ₂	μg	24.96	520	69.99
维生素B ₆	μg	17.76	370	49.80
维生素B ₁₂	μg	0.034	0.7	0.09
烟酸	mg	168.03	3500	471.1
叶酸	μg	3.65	76	10.23
泛酸	μg	120.02	2500	336.5
维生素C	mg	3.84	80	10.77
生物素	μg	0.72	15	2.02
胆碱	mg	6.00	125	16.83
可待物质				
钠	mg	8.9	185	24.90
钾	mg	21.4	445	59.90
钙	mg	18	375	50.48
镁	mg	2.40	50	6.73
铁	mg	0.24	5	0.67
锌	mg	0.15	3.2	0.43
锰	mg	5.28	110	14.81
铜	mg	23.04	480	64.61
磷	mg	14.40	300	40.38
氯	mg	4.56	95	12.79
碘	μg	15.17	316	42.53
硒	μg	0.91	19	2.56
可选择成分				
牛磺酸	mg	1.73	36	4.85
左旋肉碱	mg	0.58	12	1.62
二十二碳六烯酸	mg	4.56	95	12.79
二十二碳四烯酸	mg	4.56	95	12.79
低聚半乳糖	g	0.162	3.38	0.465
低聚果糖	g	0.018	0.38	0.051

配料: 乳糖, 食用植物调和油(葵花籽油, 低芥酸菜籽油), 乳清蛋白粉, 脱脂乳粉, 低聚半乳糖, 牛磺酸(牛磺酸), 左旋肉碱(左旋肉碱), 二十二碳六烯酸(DHA)(二十二碳六烯酸油脂), 花生四烯酸(ARA)(花生四烯酸油脂), L-苯丙氨酸, 低聚果糖, 钠(柠檬酸钠), 钾(柠檬酸钾), 氯化钾, 铜(硫酸铜), 镁(氯化镁), 铁(硫酸亚铁), 锌(硫酸锌), 锰(硫酸锰), 钙(柠檬酸钙), 磷(磷酸氢钙), 碘(碘化钾), 硒(亚硒酸钠), 维生素A(醋酸视黄醇), 维生素D(维生素D₃), 维生素E(dl-α-生育酚), 维生素K(植物甲萘醌), 维生素B₁(磷酸硫胺素), 维生素B₂(核黄素), 维生素B₆(盐酸吡哆醇), 维生素B₁₂(氰钴胺), 烟酸(烟酰胺), 叶酸(叶酸), 泛酸(D-泛酸钙), 维生素C(L-抗坏血酸钠), 生物素(D-生物素), 胆碱(酒石酸氢胆碱), 食品添加剂(大豆磷脂, 柠檬酸)。

致敏物质提示: 含有乳制品和大豆制品。

Fe 铁

清洁卫生 绿化环境



6 917878 353456

婴儿配方奶粉(0-6月龄, 1段)

器具消毒及冲调方法

注意: 未经煮沸消毒的水、奶瓶或不正确的冲调方法, 均会导致宝宝不适。不恰当的贮存、调奶和喂养方法也有可能影响宝宝的健康, 请保持奶瓶放置区域的清洁。

1. 仔细清洗你的双手
2. 奶瓶、奶嘴与盖子洗净并确保没有奶液残留后浸没于水中煮沸至水沸, 然后关闭电源并放置至需要时取出
3. 将饮用水煮沸, 放凉
4. 参照喂哺表, 先将水倒入奶瓶中, 然后使用提供的量匙舀取奶粉
5. 确保量匙干燥并放回罐中, 每次使用后关闭罐盖, 并放置于阴凉干燥处
6. 盖上奶瓶盖, 摇晃奶瓶直至粉未完全溶解。喂食宝宝前请测试温度

* 如使用购买的奶具消毒器, 请遵循厂家的指引进行操作

重要事项: 对于0~6月龄的婴儿最理想的食物是母乳, 在母乳不足或无母乳时可食用本产品。请尽可能的持续母乳喂养。在您决定选用婴儿配方奶粉之前, 请先听取医生或保健人员的意见。

提示: 喂奶时应抱着婴儿, 如疏忽照顾可能会引起婴儿窒息。

喂哺表

注意: 每次只开调一瓶奶。调好的奶液应立即饮用, 不要将未喝完的奶液存留。调奶时请按照以下指示。

* 注意: 调奶时只可用罐内所附的专用量匙。用少于或多于指定份量的奶粉, 会令婴儿得不到适量的营养或导致脱水。未经医生建议请勿改变奶的浓度。

婴儿年龄	每次喂哺份量		每日喂哺次数
	温开水(毫升)	奶粉(平匙)*	
第1~2周	90	3	6
第3~4周	120	4	5
第2个月	150	5	5
第3~4个月	180	6	5
第5~6个月	180	6	5

* 1平匙奶粉=4.486克, 100毫升标准奶液=90毫升水+13.46克奶粉

生产者: 双城雀巢有限公司
地址: 黑龙江省哈尔滨市双城区友谊路
产地: 黑龙江省哈尔滨市
本品条码持有人为雀巢(中国)有限公司
产品标准代号: GB 10765-2021
规格: 900克
食品生产许可证编号: SC10523018250144
产品类别及属性: 乳基粉状婴儿配方食品
贮存条件: 放置于阴凉干燥处; 包装开启后请密封保存于阴凉干燥处, 并在三周内用完。
检验合格证号: 同“保质期至”及随后二位字符
保质期至及生产日期(年/月/日)示于罐底

喂哺表

注意：每次只开调一瓶奶。调好的奶液应立即饮用，不要将未喝完的奶液存留。调奶时请按照以下指示。

* 注意：调奶时只可用盒内所附的专用量匙。用少于或多于指定份量的奶粉，会让婴儿得不到适量的营养或导致脱水。未经医生建议请勿改变奶的浓度。

婴儿年龄	每次喂哺份量		每日喂哺次数
	温开水 (毫升)	奶粉 (平匙)*	奶粉 (次)
第1~2周	90	3	6
第3~4周	120	4	5
第2个月	150	5	5
第3~4个月	180	6	5
第5~6个月	180	6	5

1平匙奶粉=4.486克
100毫升标准奶液=90毫升水+13.46克奶粉

生产者：双城雀巢有限公司
地址：黑龙江省哈尔滨市双城区友谊路
产地：黑龙江省哈尔滨市
本品条码持有人为雀巢(中国)有限公司
产品标准代号：GB 10765-2021
规格：400克
食品生产许可证编号：SC10523018250144
产品类别及属性：乳基粉状婴儿配方食品
贮存条件：放置于阴凉干燥处；包装开启后请密封保存于阴凉干燥处，并在三周内用完。
检验合格证号：向“保质期至”及随后二位字符
保质期至及生产日期(年/月/日)
示于盒底

力多精 挚宝

1

雀巢 Nestlé LACTOGEN LUV

净含量: 400克
国食注字 YP20170078

婴儿配方奶粉(0-6月龄, 1段)

奶具消毒及冲调方法

注意：未经煮沸消毒的水、奶瓶或不正确的冲调方法，均会引致宝宝不适。不恰当的贮存、调奶和喂养方法也有可能影响宝宝的健康，请保持奶瓶放置区域的清洁。

- 1** 仔细清洗你的双手
- 2** 奶瓶、奶嘴与盖子洗净并确保没有奶液残留后浸没于水中煮至水沸，然后关闭电源并放置至需要时取出*
- 3** 将饮用水煮沸，放凉
- 4** 参照喂哺表，先将水倒入奶瓶中，然后使用提供的量匙舀取奶粉
- 5** 确保量匙干燥并放回袋中，每次使用后封闭保存，并放置于阴凉干燥处
- 6** 盖上奶瓶盖，摇晃奶瓶直至粉末完全溶解。喂食宝宝前请测试温度

* 如使用购买的奶具消毒器，请遵循厂家的指引进行操作

重要事项： 对于0~6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。请尽可能的持续母乳喂养。在您决定选用婴儿配方奶粉之前，请先听取医生或保健人员的意见。

提示： 喂奶时应抱着婴儿，如疏忽照顾可能会引致婴儿窒息。

重要事项

对于0~6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

雀巢消费者服务 400-610-4868
www.nestle.com.cn

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	每100mL
能量	kJ	100	2083	280
蛋白质	g	0.46	9.5	1.28
脂肪	g	1.27	26.5	3.57
亚油酸	g	0.16	3.3	0.44
(L-亚麻酸	mg	25.68	535	72.01
碳水化合物	g	2.57	53.58	7.21
维生素				
维生素A	µg RE	17.52	365	49.13
维生素D	µg	0.58	12	1.62
维生素E	mg (I-TE)	0.29	6	0.81
维生素K	µg	1.63	34	4.58
维生素B ₁	µg	25.92	540	72.68
维生素B ₂	µg	24.96	520	69.99
维生素B ₃	µg	17.76	370	49.80
维生素B ₆	µg	0.034	0.7	0.09
烟酸	µg	168.03	3500	471.1
叶酸	µg	3.65	76	10.23
泛酸	µg	120.02	2500	336.5
维生素C	mg	3.84	80	10.77
生物素	µg	0.72	15	2.02
胆碱	mg	6.00	125	16.83
矿物质				
钠	mg	8.9	185	24.90
钾	mg	21.4	445	59.90
铜	µg	18	375	50.48
镁	mg	2.40	50	6.73
铁	mg	0.24	5	0.67
锌	mg	0.15	3.2	0.43
锰	µg	5.28	110	14.81
钙	mg	23.04	480	64.61
磷	mg	14.40	300	40.38
碘	µg	4.56	95	12.79
氯	mg	15.17	316	42.53
硒	µg	0.91	19	2.56
可选择成分				
牛磺酸	mg	1.73	36	4.85
左旋肉碱	mg	0.58	12	1.62
二十二碳六烯酸	mg	4.56	95	12.79
二十碳四烯酸	mg	4.56	95	12.79
低聚半乳糖	g	0.162	3.38	0.455
低聚果糖	g	0.018	0.38	0.051

配料：乳糖，食用植物调和油(葵花籽油，低芥酸菜籽油)，乳清蛋白粉，脱脂乳粉，低聚半乳糖，牛磺酸(牛磺酸)，左旋肉碱(左旋肉碱)，二十二碳六烯酸(DHA)(二十二碳六烯酸油脂)，花生四烯酸(ARA)(花生四烯酸油脂)，L-苯丙氨酸，低聚果糖，钠(柠檬酸钠)，钾(柠檬酸钾，氯化钾)，铜(硫酸铜)，镁(氯化镁)，铁(硫酸亚铁)，锌(硫酸锌)，锰(硫酸锰)，钙(柠檬酸钙)，磷(磷酸氢钙)，碘(碘化钾)，硒(亚硒酸钠)，维生素A(醋酸视黄醇)，维生素D(维生素D₃)，维生素E(dl-α-生育酚)，维生素K(植物甲萘醌)，维生素B₁(硝酸硫胺素)，维生素B₂(核黄素)，维生素B₆(盐酸吡哆醇)，维生素B₁₂(氰钴胺)，烟酸(烟酰胺)，叶酸(叶酸)，泛酸(D-泛酸钙)，维生素C(L-抗坏血酸钠)，生物素(D-生物素)，胆碱(酒石酸氢胆碱)，食品添加剂(大豆磷脂，柠檬酸)。

致敏物质提示：含有乳制品和大豆制品。

清洁卫生 绿色环保

6 9 1 7 8 7 8 1 3 5 4 5 3 8

喂哺表

注意：每次只开调一瓶奶。调好的奶液应立即饮用，不要将未喝完的奶液存留。调奶时请按照以下指示。

• 注意：调奶时只可用盒内所附的专用量匙。用少于或多于指定份量的奶粉，会令婴儿得不到适量的营养或导致脱水。未经医生建议请勿改变奶的浓度。

婴儿年龄	每次喂哺份量		每日喂哺次数
	温开水 (毫升)	奶粉 (平匙)*	
第1~2周	90	3	6
第3~4周	120	4	5
第2个月	150	5	5
第3~4个月	180	6	5
第5~6个月	180	6	5

1平匙奶粉≈4.486克，
100毫升标准奶液=90毫升水+13.46克奶粉

生产者：双城雀巢有限公司
地址：黑龙江省哈尔滨市双城区友谊路
产地：黑龙江省哈尔滨市
本品条码持有人为雀巢(中国)有限公司
产品标准代号：GB 10765-2021
规格：400克
食品生产许可证编号：SC10523018250144
产品类别及属性：乳基粉状婴儿配方食品
贮存条件：放置于阴凉干燥处；包装开启后请密封保存于阴凉干燥处，并在三周内用完。
检验合格证号：同“保质期至”及随后二位字符
保质期至及生产日期(年/月/日)
示于盒底

雀巢 Nestlé
LACTOGEN LUV®

力多精® 挚宝®



1

净含量: 400克
国食注字 YP20170078

婴儿配方奶粉(0-6月龄, 1段)

奶具消毒及冲调方法

注意：未经煮沸消毒的水、奶瓶或不正确的冲调方法，均会引致宝宝不适。不恰当的贮存、调奶和喂养方法也有可能影响宝宝的健康，请保持奶瓶放置区域的清洁。

- 仔细清洗你的双手
- 奶瓶、奶嘴与盖子洗净并确保没有奶液残留后浸没于水中煮至水沸，然后关闭电源并放置至需要时取出*
- 将饮用水煮沸，放凉
- 参照喂哺表，先将水倒入奶瓶中，然后使用提供的量匙舀取奶粉
- 确保量匙干燥并放回袋中，每次使用后封闭保存，并放置于阴凉干燥处
- 盖上奶瓶盖，摇晃奶瓶直至粉末完全溶解。喂食宝宝前请测试温度

* 如使用购买的奶具消毒器，请遵循厂家的指引进行操作

重要事项：对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。请尽可能的持续母乳喂养。在您决定选用婴儿配方奶粉之前，请先听取医生或保健人员的意见。

提示：喂奶时应抱着婴儿，如疏忽照顾可能会引致婴儿窒息。

重要事项

对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	每100mL
能量	kJ	100	2083	280
蛋白质	g	0.46	9.5	1.28
脂肪	g	1.27	26.5	3.57
亚油酸	g	0.16	3.3	0.44
(L-亚麻酸	mg	25.68	535	72.01
碳水化合物	g	2.57	53.58	7.21
维生素				
维生素A	µg RE	17.52	365	49.13
维生素D	µg	0.58	12	1.62
维生素E	mg (I-TE)	0.29	6	0.81
维生素K ₁	µg	1.63	34	4.58
维生素B ₁	µg	25.92	540	72.68
维生素B ₂	µg	24.96	520	69.99
维生素B ₆	µg	17.76	370	49.80
维生素B ₁₂	µg	0.034	0.7	0.09
烟酸	µg	168.03	3500	471.1
叶酸	µg	3.65	76	10.23
泛酸	µg	120.02	2500	336.5
维生素C	mg	3.84	80	10.77
生物素	µg	0.72	15	2.02
胆碱	mg	6.00	125	16.83
矿物质				
钠	mg	8.9	185	24.90
钾	mg	21.4	445	59.90
铜	µg	18	375	50.48
镁	mg	2.40	50	6.73
铁	mg	0.24	5	0.67
锌	mg	0.15	3.2	0.43
锰	µg	5.28	110	14.81
钙	mg	23.04	480	64.61
磷	mg	14.40	300	40.38
碘	µg	4.56	95	12.79
氯	mg	15.17	316	42.53
硒	µg	0.91	19	2.56
可选择成分				
牛磺酸	mg	1.73	36	4.85
左旋肉碱	mg	0.58	12	1.62
二十二碳六烯酸	mg	4.56	95	12.79
二十碳四烯酸	mg	4.56	95	12.79
低聚半乳糖	g	0.162	3.38	0.455
低聚果糖	g	0.018	0.38	0.051

倾心聆听

雀巢消费者服务 400-610-4868
www.nestle.com.cn



配料：乳糖，食用植物调和油(葵花籽油，低芥酸菜籽油)，乳清蛋白粉，脱脂乳粉，低聚半乳糖，牛磺酸(牛磺酸)，左旋肉碱(左旋肉碱)，二十二碳六烯酸(DHA)(二十二碳六烯酸油脂)，花生四烯酸(ARA)(花生四烯酸油脂)，L-苯丙氨酸，低聚果糖，钠(柠檬酸钠)，钾(柠檬酸钾，氯化钾)，铜(硫酸铜)，镁(氯化镁)，铁(硫酸亚铁)，锌(硫酸锌)，锰(硫酸锰)，钙(柠檬酸钙)，磷(磷酸氢钙)，碘(碘化钾)，硒(亚硒酸钠)，维生素A(醋酸视黄醇)，维生素D(维生素D₃)，维生素E(dl-α-醋酸生育酚)，维生素K(植物甲萘醌)，维生素B₁(硝酸硫胺素)，维生素B₂(核黄素)，维生素B₆(盐酸吡哆醇)，维生素B₁₂(氰钴胺)，烟酸(烟酰胺)，叶酸(叶酸)，泛酸(D-泛酸钙)，维生素C(L-抗坏血酸钠)，生物素(D-生物素)，胆碱(酒石酸氢胆碱)，食品添加剂(大豆磷脂，柠檬酸)。

致敏物质提示：含有乳制品和豆制品。



清洁卫生 绿化环境



力多精[®]挚宝[®]



2

净含量: 900克
国食注字 YP20170079

较大婴儿配方奶粉(6-12月龄, 2段)

膳食纤维有助于维持正常的肠道功能。



雀巢 Nestlé

雀巢消费者服务 400-610-4868
www.nestle.com.cn

配料: 乳糖, 脱脂乳粉, 食用植物调和油(葵花籽油, 低芥酸菜籽油), 乳清蛋白粉, 低聚半乳糖, 牛磺酸(牛磺酸), 二十二碳六烯酸(DHA)(二十二碳六烯酸油酯), 花生四烯酸(ARA)(花生四烯酸油酯), 低聚果糖, 钠(柠檬酸钠), 钾(柠檬酸钾), 铜(硫酸铜), 镁(氯化镁), 铁(硫酸亚铁), 锌(硫酸锌), 锰(硫酸锰), 钙(柠檬酸钙), 磷(磷酸氢钙), 碘(碘化钾), 硒(亚硒酸钠), 维生素A(视黄醇), 维生素D(维生素D₃), 维生素E(dl-α-生育酚), 维生素K(植物甲萘醌), 维生素B₁(硝酸硫胺素), 维生素B₂(核黄素), 维生素B₆(盐酸吡哆醇), 维生素B₁₂(氰钴胺), 烟酸(烟酰胺), 叶酸(叶酸), 泛酸(D-泛酸钙), 维生素C(L-抗坏血酸钠), 生物素(D-生物素), 胆碱(酒石酸氢胆碱), 食品添加剂(大豆磷脂)。
致敏物质提示: 含有乳制品和大豆制品。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	每100mL
能量	kJ	100	1953	280
蛋白质	g	0.48	9.3	1.33
脂肪	g	1.03	20.09	2.88
亚油酸	g	0.12	2.3	0.33
D-亚油酸	mg	20.23	395	56.68
碳水化合物	g	3.08	60.09	8.62
维生素				
维生素A	μg RE	20.99	410	58.84
维生素D	μg	0.60	11.8	1.69
维生素E	mg α-TE	0.36	7	1
维生素K	μg	1.33	26	3.73
维生素B ₁	μg	30.72	600	86.10
维生素B ₂	μg	25.60	500	71.75
维生素B ₆	μg	18.95	370	53.10
维生素B ₁₂	μg	0.05	1	0.14
烟酸	mg	184.33	3600	516.6
叶酸	μg	3.07	60	8.61
泛酸	μg	153.61	3000	430.5
维生素C	mg	4.10	80	11.48
生物素	μg	0.77	15	2.15
胆碱	mg	6.14	120	17.22
矿物质				
钠	mg	7.42	145	20.81
钾	mg	22.53	440	63.14
钙	mg	15.36	300	43.05
镁	mg	2.15	42	6.03
铁	mg	0.31	6	0.86
锌	mg	0.17	3.4	0.49
铜	μg	6.14	120	17.22
锰	μg	28.2	550	78.93
碘	μg	15.36	300	43.05
硒	μg	4.51	88	12.63
可溶性成分				
牛磺酸	mg	1.64	32	4.59
二十二碳六烯酸	mg	4.51	88	12.63
花生四烯酸	mg	4.51	88	12.63
低聚半乳糖	g	0.173	3.38	0.485
低聚果糖	g	0.019	0.38	0.055

奶具消毒及冲调方法

注意: 未经煮沸消毒的水、奶瓶/杯或不正确的冲调方法, 均会引起宝宝不适。不恰当的贮存、调奶和喂养方法均有可能影响宝宝的健康, 同时应保持奶瓶/杯放置区域的清洁。
* 当宝宝成长至适当年龄, 应以奶杯取代奶瓶喂奶。

- 1 仔细清洗你的双手
- 2 奶瓶、奶嘴与盖子洗净并确保没有奶液残留后浸没于水中煮沸至水沸, 然后关闭电源并放置至需要时取出
- 3 将饮用水煮沸, 放凉
- 4 参照喂哺表, 先将水倒入奶瓶中, 然后使用提供的量匙舀取奶粉
- 5 确保量匙干燥并放回罐中, 每次使用后关闭罐盖, 并放置于阴凉干燥处
- 6 盖上奶瓶盖, 摇晃奶瓶直至粉末完全溶解, 喂给宝宝前请测试温度

如使用购买的奶具消毒器, 请遵循厂家的指引进行操作

重要事项: 婴儿最理想的食品是母乳, 在母乳不足或无母乳时可食用本产品, 请尽可能的持续母乳喂养。在您决定选用较大婴儿配方奶粉之前, 请先听取医生或保健人员的意见。

提示: 喂奶时应抱着婴儿, 如疏忽照顾可能会引起婴儿窒息。

喂哺表

注意: 每次只开调一瓶奶。调好的奶液应立即饮用, 不要将未喝完的奶液留存。调奶时请依照以下指示。

* 注意: 调奶时只可用罐内所附的专用量匙。用少于或多于指定份量的奶粉, 会让婴儿得不到适量的营养或导致脱水。未经医生建议请勿改变奶的浓度。

** 在该年龄段, 婴儿的饮食变得更加多样(谷物, 婴儿辅食), 须配合添加辅食食品。在添加任何食品前, 应先咨询医生的意见。如果从医生或保健人员处得到任何提前添加新食品的建议, 建议减少奶粉摄入量。

婴儿年龄	每次喂哺份量		每日喂哺次数	
	温开水(毫升)	奶粉(平匙)*	奶粉(次)	其他(次)
第6个月	180	6	5	-
第7~9个月	180	6	4-3	1-2**
第10个月起	180	6	3-2	2-3**

1平匙奶粉=4.784克, 100毫升标准奶液=90毫升水+14.35克奶粉

生产者: 双城雀巢有限公司
地址: 黑龙江省哈尔滨市双城区友谊路
产地: 黑龙江省哈尔滨市
本品条码持有人为雀巢(中国)有限公司
产品标准代号: GB 10766-2021
规格: 900克
食品生产许可证编号: SC10523018250144
产品类别及属性: 乳基粉状较大婴儿配方食品
贮存条件: 放置于阴凉干燥处; 包装开启后请密封保存于阴凉干燥处, 并在三周内用完。
检验合格证书: 同“保质期至”及随后二位字符
保质期至及生产日期(年/月/日)示于罐底

Fe 铁

清洁卫生 绿化环境



6 917878 353463

喂哺表

注意：每次只开调一瓶/杯奶。调好的奶液应立即饮用，不要将未喝完的奶液留存。调奶时请依照以下指示。

• 注意：调奶时只可用盒内所附的专用量匙。用少于或多于指定份量的奶粉，会令婴儿得不到适量的营养或导致脱水。未经医生建议请勿改变奶的浓度。

** 在该年龄段，婴儿的饮食变得更加多样(谷物、婴儿辅食)，须配合添加辅助食品。在添加任何食品前，应先咨询医生的意见。如果从医生或保健人员处得到任何提前添加新食品的推荐，建议减少奶粉摄入量。

婴儿年龄	每次喂哺份量		每日喂哺次数	
	温开水 (毫升)	奶粉 (平匙)*	奶粉 (次)	其他 (次)
第6个月	180	6	5	-
第7~9个月	180	6	4-3	1-2**
第10个月起	180	6	3-2	2-3**

1平匙奶粉=4.784克，
100毫升标准奶液=90毫升水+14.35克奶粉

生产者：双城雀巢有限公司
地址：黑龙江省哈尔滨市双城区友谊路
产地：黑龙江省哈尔滨市
本品条码持有人为雀巢(中国)有限公司
产品标准代号：GB 10766-2021
规格：400克
食品生产许可证编号：SC10523018250144
产品类别及属性：乳基粉状较大婴儿配方食品
贮存条件：放置于阴凉干燥处；包装开启后请密封保存于阴凉干燥处，并在三周内用完。
检验合格证号：同“保质期至”及随后二位字符
保质期至及生产日期(年/月/日)
示于盒底



力多精 挚宝

2

净含量:400克
国食注字 YP20170079

较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段)

奶具消毒及冲调方法

注意：未经煮沸消毒的水、奶瓶/杯或不正确的冲调方法，均会引致宝宝不适。不恰当的贮存、调奶和喂哺方法均有可能影响宝宝的健康，同时应保持奶瓶/杯放置区域的清洁。

• 当宝宝成长至适当年龄，应以奶杯取代奶瓶喂奶。

- 1

1 仔细清洗你的双手
- 2

2 奶瓶、奶嘴与盖子洗净并确保没有奶液残留后浸没于水中煮至水沸，然后关闭电源并放置至需要时取出*
- 3

3 将饮用水煮沸，放凉
- 4

4 参照喂哺表，先将水倒入奶瓶中，然后使用提供的量匙舀取奶粉
- 5

5 确保量匙干燥并放回袋中。每次使用后封闭保存，并放置于阴凉干燥处
- 6

6 盖上奶瓶盖，摇晃奶瓶直至粉末完全溶解。喂食宝宝前请测试温度

* 如使用购买的奶具消毒器，请遵循厂家的指引进行操作

重要事项：婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。请尽可能的持续母乳喂哺。在您决定选用较大婴儿配方奶粉之前，请先听取医生或保健人员的意见。

提示：喂奶时应抱着婴儿，如疏忽照顾可能会引致婴儿窒息。



膳食纤维有助于
维持正常的肠道功能。

倾心聆听

雀巢消费者服务 400-610-4868
www.nestle.com.cn



营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g 每100mL
能量	kJ	100	1953 280
蛋白质	g	0.48	9.3 1.33
脂肪	g	1.03	20.09 2.88
亚油酸	g	0.12	2.3 0.33
(L-亚麻酸	mg	20.23	395 56.68
碳水化合物	g	3.08	60.09 8.62
维生素			
维生素A	µg RE	20.99	410 58.84
维生素D	µg	0.60	11.8 1.69
维生素E	mg α-TE	0.36	7 1
维生素K ₁	µg	1.33	26 3.73
维生素B ₁	µg	30.72	600 86.10
维生素B ₂	µg	25.60	500 71.75
维生素B ₆	µg	18.95	370 53.10
维生素B ₁₂	µg	0.05	1 0.14
烟酸	µg	184.33	3600 516.6
叶酸	µg	3.07	60 8.61
泛酸	µg	153.61	3000 430.5
维生素C	mg	4.10	80 11.48
生物素	µg	0.77	15 2.15
胆碱	mg	6.14	120 17.22
矿物质			
钠	mg	7.42	145 20.81
钾	mg	22.53	440 63.14
铜	µg	15.36	300 43.05
镁	mg	2.15	42 6.03
铁	mg	0.31	6 0.86
锌	mg	0.17	3.4 0.49
锰	µg	6.14	120 17.22
钙	mg	28.2	550 78.93
磷	mg	15.36	300 43.05
碘	µg	4.51	88 12.63
氯	mg	12.03	235 33.72
硒	µg	0.64	12.5 1.79
可选择成分			
牛磺酸	mg	1.64	32 4.59
二十二碳六烯酸	mg	4.51	88 12.63
二十二碳四烯酸	mg	4.51	88 12.63
低聚半乳糖	g	0.173	3.38 0.485
低聚果糖	g	0.019	0.38 0.055

配料：乳糖，脱脂乳粉，食用植物调和油(葵花籽油，低芥酸菜籽油)，乳清蛋白粉，低聚半乳糖，牛磺酸(牛磺酸)，二十二碳六烯酸(DHA)(二十二碳六烯酸油脂)，花生四烯酸(ARA)(花生四烯酸油脂)，低聚果糖，钠(柠檬酸钠)，钾(柠檬酸钾)，铜(硫酸铜)，镁(氯化镁)，铁(硫酸亚铁)，锌(硫酸锌)，锰(硫酸锰)，钙(柠檬酸钙)，磷(磷酸氢钙)，碘(碘化钾)，硒(亚硒酸钠)，维生素A(视黄醇)，维生素D(维生素D₃)，维生素E(dl-α-生育酚)，维生素K(植物甲萘醌)，维生素B₁(硫胺素)，维生素B₂(核黄素)，维生素B₆(盐酸吡哆醇)，维生素B₁₂(氰钴胺)，烟酸(烟酰胺)，叶酸(叶酸)，泛酸(D-泛酸钙)，维生素C(L-抗坏血酸钠)，生物素(D-生物素)，胆碱(酒石酸氢胆碱)，食品添加剂(大豆磷脂)。

致敏物质提示：含有乳制品和大豆制品。



纸



6 917878 135454 5



清洁卫生 绿化环境

喂哺表

注意：每次只开调一瓶/杯奶。调好的奶液应立即饮用，不要将未喝完的奶液留存。调奶时请依照以下指示。

• 注意：调奶时只可用盒内所附的专用量匙。用少于或多于指定份量的奶粉，会令婴儿得不到适量的营养或导致脱水。未经医生建议请勿改变奶的浓度。

•• 在该年龄段，婴儿的饮食变得更加多样(谷物，婴儿辅食)，须配合添加辅助食品。在添加任何食品前，应先咨询医生的意见。如果从医生或保健人员处得到任何提前添加新食品的推荐，建议减少奶粉摄入量。

婴儿年龄	每次喂哺份量		每日喂哺次数	
	温开水(毫升)	奶粉(平匙)*	奶粉(次)	其他(次)
第6周	180	6	5	-
第7~9个月	180	6	4-3	1-2**
第10个月起	180	6	3-2	2-3**

1平匙奶粉≈4.784克，
100毫升标准奶液=90毫升水+14.35克奶粉

生产者：双城雀巢有限公司
地址：黑龙江省哈尔滨市双城区友谊路
产地：黑龙江省哈尔滨市
本品条码持有人为雀巢(中国)有限公司
产品标准代号：GB 10766-2021
规格：400克
食品生产许可证编号：SC10523018250144
产品类别及属性：乳基粉状较大婴儿配方食品
贮存条件：放置于阴凉干燥处；包装开启后请密封保存于阴凉干燥处，并在三周内用完。
检验合格证号：同“保质期至”及随后二位字符
保质期至及生产日期(年/月/日)
示于盒底



力多精 挚宝



净含量: 400克
国食注字 YP20170079

较大婴儿配方奶粉(6-12月龄, 2段)

奶具消毒及冲调方法

注意：未经煮沸消毒的水、奶瓶/杯或不正确的冲调方法，均会引致宝宝不适。不恰当的贮存、调奶和喂养方法均有可能影响宝宝的健康，同时应保持奶瓶/杯放置区域的清洁。

• 当宝宝成长至适当年龄，应以奶杯取代奶瓶喂奶。

1. 仔细清洗你的双手
2. 奶瓶、奶嘴与盖子洗净并确保没有奶液残留后浸没于水中煮至水沸，然后关闭电源并放置至需要时取出*

3. 将饮用水煮沸，放凉
4. 参照喂哺表，先将水倒入奶瓶中，然后使用提供的量匙舀取奶粉

5. 确保量匙干燥并放回袋中，每次使用后封闭保存，并放置于阴凉干燥处
6. 盖上奶瓶盖，摇晃奶瓶直至粉末完全溶解。喂食宝宝前请测试温度

* 如使用购买的奶具消毒器，请遵循厂家的指引进行操作

提示：喂奶时应抱着婴儿，如疏忽照顾可能会引致婴儿窒息。

膳食纤维有助于
维持正常的肠道功能。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	每100mL
能量	kJ	100	1953	280
蛋白质	g	0.48	9.3	1.33
脂肪	g	1.03	20.09	2.88
亚油酸	g	0.12	2.3	0.33
α-亚麻酸	mg	20.23	395	56.68
碳水化合物	g	3.08	60.09	8.62
维生素				
维生素A	µg RE	20.99	410	58.84
维生素D	µg	0.60	11.8	1.69
维生素E	mg (I-TE)	0.36	7	1
维生素K ₁	µg	1.33	26	3.73
维生素B ₁	µg	30.72	600	86.10
维生素B ₂	µg	25.60	500	71.75
维生素B ₆	µg	18.95	370	53.10
维生素B ₁₂	µg	0.05	1	0.14
烟酸	µg	184.33	3600	516.6
叶酸	µg	3.07	60	8.61
泛酸	µg	153.61	3000	430.5
维生素C	mg	4.10	80	11.48
生物素	µg	0.77	15	2.15
胆碱	mg	6.14	120	17.22
矿物质				
钠	mg	7.42	145	20.81
钾	mg	22.53	440	63.14
铜	µg	15.36	300	43.05
镁	mg	2.15	42	6.03
铁	mg	0.31	6	0.86
锌	mg	0.17	3.4	0.49
锰	µg	6.14	120	17.22
钙	mg	28.2	550	78.93
磷	mg	15.36	300	43.05
碘	µg	4.51	88	12.63
氯	mg	12.03	235	33.72
硒	µg	0.64	12.5	1.79
可选择成分				
牛磺酸	mg	1.64	32	4.59
二十二碳六烯酸	mg	4.51	88	12.63
二十碳四烯酸	mg	4.51	88	12.63
低聚半乳糖	g	0.173	3.38	0.485
低聚果糖	g	0.019	0.38	0.055

倾心聆听

雀巢消费者服务 400-610-4868
www.nestle.com.cn



配料：乳糖，脱脂乳粉，食用植物调和油(葵花籽油，低芥酸菜籽油)，乳清蛋白粉，低聚半乳糖，牛磺酸(牛磺酸)，二十二碳六烯酸(OHA)(二十二碳六烯酸油脂)，花生四烯酸(ARA)(花生四烯酸油脂)，低聚果糖，钠(柠檬酸钠)，钾(柠檬酸钾)，铜(硫酸铜)，镁(氯化镁)，铁(硫酸亚铁)，锌(硫酸锌)，锰(硫酸锰)，钙(柠檬酸钙)，磷(磷酸氢钙)，碘(碘化钾)，硒(亚硒酸钠)，维生素A(醋酸视黄醇)，维生素D(维生素D₃)，维生素E(dl-α-生育酚)，维生素K(植物甲萘醌)，维生素B₁(硝酸硫胺素)，维生素B₂(核黄素)，维生素B₆(盐酸吡哆醇)，维生素B₁₂(氰钴胺)，烟酸(烟酰胺)，叶酸(叶酸)，泛酸(D-泛酸钙)，维生素C(L-抗坏血酸钠)，生物素(D-生物素)，胆碱(酒石酸氢胆碱)，食品添加剂(大豆磷脂)。

致敏物质提示：含有乳制品和大豆制品。





膳食纤维有助于
维持正常的肠道功能。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	每100mL
能量	kJ	100	1957	280
蛋白质	g	0.47	9.2	1.32
脂肪	g	1.03	20.1	2.88
亚油酸	g	0.12	2.4	0.34
0-亚麻酸	mg	20.44	400	57.32
碳水化合物	g	3.09	60.41	8.66
维生素				
维生素A	µg RE	22.53	441	63.20
维生素D	µg	0.61	12	1.72
维生素E	mg α-TE	0.38	7.5	1.07
维生素K ₁	µg	1.33	26	3.73
维生素B ₁	µg	31.68	620	88.85
维生素B ₂	µg	26.06	510	73.08
维生素B ₆	µg	19.42	380	54.45
维生素B ₁₂	µg	0.06	1.1	0.16
烟酸	µg	189.1	3700	530.21
叶酸	µg	4.09	80	11.46
泛酸	µg	158.41	3100	444.23
维生素C	mg	4.09	80	11.46
生物素	µg	0.79	15.5	2.22
矿物质				
钠	mg	4.80	94	13.47
钾	mg	28.1	550	78.82
铜	µg	14.31	280	40.12
镁	mg	1.79	35	5.02
铁	mg	0.31	6	0.86
锌	mg	0.18	3.6	0.52
钙	mg	28.6	560	80.25
磷	mg	16.35	320	45.86
碘	µg	1.94	38	5.45
硒	µg	12.52	245	35.11
可选择成分				
糖	µg	0.69	13.5	1.93
牛磺酸	mg	1.84	36	5.16
二十二碳六烯酸	mg	4.50	88	12.61
二十碳四烯酸	mg	4.50	88	12.61
低聚半乳糖	g	0.173	3.38	0.48
低聚果糖	g	0.019	0.38	0.054



力多精[®]挚宝[®]



3

雀巢 Nestlé
LACTOGEN LUV

净含量: 900克
国食注字 YP20170080

幼儿配方奶粉(12-36月龄, 3段)

奶具消毒及冲调方法

注意: 未经煮沸消毒的水、奶瓶/杯或不正确的冲调方法, 均会引致幼儿不适, 不恰当的贮存、调奶和喂养方法均有可能影响幼儿的健康, 同时应保持奶瓶/杯放置区域的清洁。

- 当幼儿成长至适当年龄, 应以奶杯取代奶瓶喂奶。

-  仔细清洗你的双手
-  奶杯与盖子洗净并确保没有奶液残留后浸于水中煮至水沸, 然后关闭电源并放置至需要时取出
-  将饮用水煮沸, 放凉
-  参照喂哺表, 先将水倒入奶杯中, 然后使用提供的量匙舀取奶粉
-  确保量匙干燥并放回罐中, 每次使用后关闭罐盖, 并放置于阴凉干燥处
-  搅拌直至粉未完全溶解, 喂食幼儿前请测试温度

如使用购买的奶具消毒器, 请遵循厂家的指引进行操作

重要事项: 请尽可能持续母乳喂养。
本产品是为12-36月龄健康幼儿配制的幼儿配方奶粉, 不可当作母乳代用品。

提示: 喂奶时请注意您的孩子, 如疏忽照顾可能会引致孩子窒息。

喂哺表

注意: 每次只开调一瓶/杯奶。调好的奶液应立即饮用, 不要将未喝完的奶液留存。调奶时请依照以下指示。

- 注意: 调奶时只可用罐内所附的专用量匙。用少于或多于指定份量的奶粉, 会令幼儿得不到适量的营养或导致脱水, 未经医生建议切勿改变奶的浓度。
- 12个月以上幼儿食用本产品时, 须配合添加辅食。

幼儿年龄	每次喂哺份量		每日喂哺次数	
	温开水 (毫升)	奶粉 (平匙)*	奶粉 (次)**	其他 (次)
第12个月起	180	6	3	2-3

*1平匙奶粉=4.775克, 100毫升标准奶液=90毫升水+14.33克奶粉

生产者: 双城雀巢有限公司
地址: 黑龙江省哈尔滨市双城区友谊路
产地: 黑龙江省哈尔滨市
本品条码持有人为雀巢(中国)有限公司
产品标准代号: GB 10767-2021
规格: 900克
食品生产许可证编号: SC10523018250144
产品类别及属性: 乳基粉状幼儿配方食品
贮存条件: 放置于阴凉干燥处, 包装开启后请密封保存于阴凉干燥处, 并在三周内用完。
检验合格证号: 同“保质期至”及随后二位字符
保质期至及生产日期(年/月/日)示于罐底

倾心聆听

雀巢消费者服务 400-610-4868

www.nestle.com.cn





铁



清洁卫生 绿化环境



6 917878 353470

奶具消毒及冲调方法

1 仔细清洗你的双手

2 奶瓶、奶嘴与盖子洗净并确没有奶液残留后浸没于水中煮至水沸，然后关闭电源并放置至需要时取出*

3 将饮用水煮沸，关闭电源，放凉**

4 参照喂哺表，先将水倒入奶瓶中，然后使用提供的量匙舀取奶粉，并小心抹平剩余奶粉

5 确保量匙干燥并放回罐中，每次使用后关闭罐盖，并放置于阴凉干燥处

6 盖上奶瓶盖，摇晃奶瓶直至粉未完全溶解，喂食宝宝前请测试温度

- * 如使用购买的奶具消毒器，请遵循厂家的指引进行操作
- ** 为保持动物双歧杆菌乳亚种Bb-12活性，添加奶粉前请将开水冷却至体温

喂哺表

注意：每次只调配一瓶奶。调好的奶液应根据指导立即饮用，不要将未喝完的奶液存留，倒掉剩奶。调奶时请按照以下指示。当婴儿足够大时建议换成奶杯喂养。

宝宝年龄	每次喂哺份量		每日喂哺次数	
	温开水(毫升)	奶粉(平匙)*	奶粉(次)	其他(次)
第6个月	180	6	5	-
第7-9个月	180	6	4-3	1-2**
第10个月起	180	6	3-2	2-3**

1平匙奶粉=4.558克；
100毫升标准奶液=90毫升水+13.67克奶粉

* 注意：调奶时只可用罐内所附的专用量匙。用少于或多于指定份量的奶粉，会令婴儿得不到适量的营养或导致脱水。未经医生建议切勿改变奶的浓度。

** 在该年龄段，婴儿的饮食变得更加多样(谷物，婴儿辅食)，须配合添加辅食食品。在添加任何食品前，应先咨询医生的意见。如果从医生或保健人员处得到任何提前添加新食品的建议，建议减少奶粉摄入量。



超启能恩



2

净含量:850克
国食注字 YP20235014

较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段)

二十二碳六烯酸(DHA)有助于婴儿视力的正常发育。

含有肌醇，牛磺酸，左旋肉碱，1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯，核苷酸

雀巢 Nestlé
倾心聆听
雀巢消费者服务: 400-610-4868
www.nestle.com.cn

配料

配料：水解乳清蛋白和乳糖混合物(水解乳清蛋白，乳糖)，乳糖，食用植物调和油(1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯，葵花籽油，低芥酸菜籽油)，肌醇(肌醇)，牛磺酸(牛磺酸)，左旋肉碱(左旋肉碱)，二十二碳六烯酸(DHA)(金枪鱼油)，花生四烯酸(ARA)(花生四烯酸油酯)，L-组氨酸，L-苯丙氨酸，L-酪氨酸，核苷酸(5'-单磷酸胞苷，5'-单磷酸腺苷，5'-鸟苷二钠，5'-尿苷二钠)，钠(氯化钠)，钾(氯化钾)，铜(硫酸铜)，镁(氯化镁)，铁(硫酸亚铁)，锌(硫酸锌)，锰(硫酸锰)，钙(氯化钙，甘油磷酸钙)，磷(磷酸氢钙)，碘(碘化钾)，硒(硒酸钠)，维生素A(视黄醇)，维生素D(维生素D₃)，维生素E(dl-α-生育酚)，维生素K(植物甲萘醌)，维生素B₁(硝酸硫胺素)，维生素B₂(核黄素)，维生素B₆(盐酸吡哆醇)，维生素B₁₂(氰钴胺)，烟酸(烟酰胺)，叶酸(叶酸)，泛酸(D-泛酸钙)，维生素C(L-抗坏血酸钠)，生物素(D-生物素)，胆碱(酒石酸氢胆碱)，动物双歧杆菌乳亚种Bb-12，食品添加剂(柠檬酸)。

致敏物质提示：含有乳制品和鱼油。

警示说明和注意事项

1. 注意：未经煮沸的水、奶液或不正确的冲调方法，均会引起婴儿不适。不恰当的贮存、调奶和喂养方法均有可能影响婴儿的健康。
2. 重要事项：宝宝最理想的食物是母乳。请尽可能的持续母乳喂养，在您决定选用较大婴儿配方奶粉之前，请先听取医生或保健人员的意见。
3. 提示：喂奶时请抱着您的宝宝，如疏忽照顾可能会引致宝宝窒息。
4. 开启后请在3周内用完。

生产者：双城雀巢有限公司
地址：黑龙江省哈尔滨市双城区友谊路
产地：黑龙江省哈尔滨市
检验合格证号：同“保质期至”及随后二位字符
食品生产许可证编号：SC10523018250144
产品标准代号：GB 10766-2021

产品类别及属性：乳基粉状较大婴儿配方食品
规格：850g
本品条码持有人为雀巢(中国)有限公司
贮存条件：放置于阴凉干燥处，包装开启后请密封保存于阴凉干燥处，并在三周内用完。
保质期至及生产日期(年/月/日)示于罐底

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	每100mL
能量	kJ	100	2050	280
蛋白质	g	0.45	9.31	1.27
脂肪	g	1.11	22.79	3.12
亚油酸	g	0.14	2.9	0.40
α-亚麻酸	mg	15.61	320	43.74
碳水化合物	g	3.01	61.69	8.43
维生素				
维生素A	µg RE	22.54	462	63.16
维生素D	µg	0.60	12.3	1.68
维生素E	mg (α-TE)	0.37	7.5	1.03
维生素K ₁	µg	1.46	30	4.10
维生素B ₁	µg	24.39	500	68.35
维生素B ₂	µg	48.78	1000	136.70
维生素B ₆	µg	19.51	400	54.68
维生素B ₁₂	µg	0.051	1.05	0.14
烟酸	µg	185.37	3800	519.46
叶酸	µg	4.39	90	12.30
泛酸	µg	136.59	2800	382.76
维生素C	mg	3.80	78	10.66
生物素	µg	0.51	10.5	1.44
胆碱	mg	6.10	125	17.09
矿物质				
钠	mg	8.10	166	22.69
钾	mg	24.39	500	68.35
钙	µg	17.56	360	49.21
镁	mg	2.34	48	6.56
铁	mg	0.34	6.9	0.94
锌	mg	0.20	4.0	0.55
铜	µg	3.12	64	8.75
锰	mg	24.63	505	69.03
碘	µg	14.63	300	41.01
硒	µg	5.12	105	14.35
维生素	mg	26.83	550	75.19
胆碱	µg	0.61	12.5	1.71
可选择成分				
肌醇	mg	2.05	42	5.74
牛磺酸	mg	1.66	34	4.65
左旋肉碱	mg	0.52	10.6	1.45
二十二碳六烯酸	mg	4.54	93	12.71
花生四烯酸	mg	4.54	93	12.71
1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3	0.41
核苷酸	mg	1.20	24.5	3.35



奶具消毒及冲调方法

- 1 仔细清洗你的双手
- 2 奶杯洗净并确保没有奶液残留后浸没于水中煮至水沸，然后关闭电源并放置至需要时取出*
- 3 将饮用水煮沸，关闭电源，放凉**

- 4 参照眼图表，先将水倒入奶杯中，然后使用提供的量匙舀取奶粉，并小心抹平剩余奶粉
- 5 确保量匙干燥并放回罐中，每次使用后关闭罐盖，并放置于阴凉干燥处
- 6 搅拌均匀至粉末完全溶解，喂食宝宝前请测试温度

* 如使用购买的奶具消毒器，请遵循厂家的指引进行操作
 ** 为保持动物双歧杆菌乳亚种Bb-12活性，添加奶粉前请将开水冷却至体温

喂哺表

注意：每次只调配一杯奶。调好的奶液应根据指导立即饮用，不要将未喝完的奶液存留，倒掉剩奶。调奶时请按照以下指示。

幼儿年龄	每次喂哺份量		每日喂哺次数	
	温开水(毫升)	奶粉(平匙)*	奶粉(勺)**	其他(次)
第12个月起	180	6	3	2-3

1平匙奶粉=4.56克；
 100毫升标准奶液=90毫升水+13.68克奶粉
 * 调奶时只可用罐内所附的专用量匙，用少于或多于指定份量的奶粉，会让幼儿得不到适量的营养或导致脱水。未经医生建议切勿改变奶的浓度。
 ** 12个月以上幼儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。



超启能恩



净含量: 850克
 国食注字 YP20235015

幼儿配方奶粉(12-36月龄, 3段)

含有硒, 锰, 牛磺酸, 左旋肉碱, 1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯, 核苷酸

雀巢 Nestlé
 倾心聆听
 雀巢消费者服务: 400-610-4868
 www.nestle.com.cn

配 料

配料: 水解乳清蛋白和乳糖混合物(水解乳清蛋白, 乳糖), 乳糖, 食用植物调和油(1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯, 葵花籽油, 低芥酸菜籽油), 硒(硒酸钠), 锰(硫酸锰), 牛磺酸(牛磺酸), 左旋肉碱(左旋肉碱), 二十二碳六烯酸(DHA)(金枪鱼油), 花生四烯酸(ARA)(花生四烯酸油脂), 核苷酸(5'-单磷酸腺苷, 5'-单磷酸尿苷, 5'-鸟苷酸二钠, 5'-尿苷酸二钠), 钾(氯化钾), 铜(硫酸铜), 镁(氯化镁), 铁(硫酸亚铁), 锌(硫酸锌), 钙(氯化钙, 甘油磷酸钙), 磷(磷酸氢钙), 碘(碘化钾), 维生素A(醋酸视黄醇), 维生素D(维生素D₃), 维生素E(dl-α-醋酸生育酚), 维生素K(植物甲萘醌), 维生素B₁(磷酸硫胺素), 维生素B₂(核黄素), 维生素B₆(盐酸吡哆醇), 维生素B₁₂(氰钴胺), 烟酸(烟酰胺), 叶酸(叶酸), 泛酸(D-泛酸钙), 维生素C(L-抗坏血酸钠), 生物素(D-生物素), 动物双歧杆菌乳亚种Bb-12, 食品添加剂(柠檬酸)。

致敏物质提示: 含有乳制品和鱼油。

警示说明和注意事项

1. 注意: 未经煮沸的水、奶杯或不正确的冲调方法, 均会引起幼儿不适。不恰当的贮存、调奶和喂养方法均有可能影响幼儿的健康。
2. 重要事项: 本产品不是母乳代用品, 是为12-36月龄健康宝宝配制的幼儿配方奶粉。请尽可能的持续母乳喂养。
3. 提示: 喂奶时请注意您的宝宝, 如疏忽照顾可能会引起宝宝窒息。
4. 开启后请在3周内用完。

生产者: 双城雀巢有限公司
 地址: 黑龙江省哈尔滨市双城区友谊路
 产地: 黑龙江省哈尔滨市
 检验合格证号: 同“保质期至”及随后二位字符
 食品生产许可证编号: SC10523018250144
 产品标准代号: GB 10767-2021

产品类别及属性: 乳基粉状幼儿配方食品
 规格: 850g
 本品条码持有人为雀巢(中国)有限公司
 贮存条件: 放置于阴凉干燥处, 包装开启后请密封保存于阴凉干燥处, 并在三周内用完。
 保质期至及生产日期(年/月/日)示于罐底

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	每100mL
能量	kJ	100	2050	280
蛋白质	g	0.45	9.31	1.27
脂肪	g	1.10	22.6	3.09
亚油酸	g	0.14	2.9	0.40
α-亚麻酸	mg	15.61	320	43.78
碳水化合物	g	3.03	62.1	8.50

维生素

维生素A	µg RE	22.54	462	63.20
维生素D	µg	0.60	12.3	1.68
维生素E	mg (I-TE)	0.37	7.5	1.03
维生素K ₁	µg	1.46	30	4.10
维生素B ₁	µg	24.39	500	68.40
维生素B ₂	µg	48.78	1000	136.80
维生素B ₆	µg	19.51	400	54.72
维生素B ₁₂	µg	0.051	1.05	0.14
烟酸	µg	185.37	3800	519.84
叶酸	µg	4.39	90	12.31
泛酸	µg	136.59	2800	383.04
维生素C	mg	3.80	78	10.67
生物素	µg	0.51	10.5	1.44

矿物质

钠	mg	7.07	145	19.84
钾	mg	25.61	525	71.82
铜	µg	17.56	360	49.25
镁	mg	2.34	48	6.57
铁	mg	0.34	6.9	0.94
锌	mg	0.20	4.0	0.55
钙	mg	27.12	556	76.06
磷	mg	16.34	335	45.83
碘	µg	2.83	58	7.93
硒	µg	25.85	530	72.50

可选择成分

硒	µg	0.61	12.5	1.71
锰	µg	5.00	102.5	14.02
牛磺酸	mg	1.66	34	4.65
左旋肉碱	mg	0.52	10.6	1.45
二十二碳六烯酸	mg	4.54	93	12.72
二十碳四烯酸	mg	4.54	93	12.72
1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3	0.41
核苷酸	mg	1.46	30	4.10



奶具消毒及冲调方法

- 1** 仔细清洗你的双手
- 2** 奶杯洗净并确保没有奶液残留后浸没于水中煮沸，然后关闭电源并放置至需要时取出*
- 3** 将饮用水煮沸，关闭电源，放凉**
- 4** 参照喂哺表，先将水倒入奶杯中，然后使用提供的量匙舀取奶粉，并小心抹平剩余奶粉
- 5** 确保量匙干燥并放回罐中，每次使用后关闭罐盖，并放置于阴凉干燥处
- 6** 搅拌直至粉末完全溶解。喂食宝宝前请测试温度

* 如使用购买的奶具消毒器，请遵循厂家的指引进行操作
** 为保持动物双歧杆菌乳亚种Bb-12活性，添加奶粉前请将开水冷却至体温

喂哺表

注意：每次只调配一杯奶。调好的奶液应根据指导立即饮用，不要将未喝完的奶液存留，倒掉剩奶。调奶时请按照以下指示。

幼儿年龄	每次喂哺份量				每日喂哺次数			
	温开水(毫升)	奶粉(平匙)*	奶粉(次)**	其他(次)	温开水(毫升)	奶粉(平匙)*	奶粉(次)**	其他(次)
第12个月起	180	6	3	2-3				

1平匙奶粉=4.56克；
100毫升标准奶液=90毫升水+13.68克奶粉
* 调奶时只可用罐内所附的专用量匙。用少于或多于指定份量的奶粉，会让幼儿得不到适量的营养或导致脱水。未经医生建议切勿改变奶的浓度。
** 12个月以上幼儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。

雀巢 Nestlé
NAN^{HA}

超启能恩

3

净含量: 720克
国食注字 YP20235015

幼儿配方奶粉(12-36月龄, 3段)

含有硒, 锰, 牛磺酸, 左旋肉碱,
1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯, 核苷酸

雀巢 Nestlé
倾心聆听
雀巢消费者服务:
400-610-4868
www.nestle.com.cn

配 料

配料: 水解乳清蛋白和乳糖混合物(水解乳清蛋白, 乳糖), 乳糖, 食用植物调和油(1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯, 葵花籽油, 低芥酸菜籽油), 硒(硒酸钠), 锰(硫酸锰), 牛磺酸(牛磺酸), 左旋肉碱(左旋肉碱), 二十二碳六烯酸(DHA)(金枪鱼油), 花生四烯酸(ARA)(花生四烯酸油脂), 核苷酸(5'-单磷酸胞苷, 5'-单磷酸腺苷, 5'-鸟苷二钠, 5'-尿苷二钠), 钾(氯化钾), 铜(硫酸铜), 镁(氯化镁), 铁(硫酸亚铁), 锌(硫酸锌), 钙(氯化钙, 甘油磷酸钙), 磷(磷酸氢钙), 碘(碘化钾), 维生素A(醋酸视黄酯), 维生素D(维生素D₃), 维生素E(dl-α-醋酸生育酚), 维生素K(植物甲萘醌), 维生素B₁(硝酸硫胺素), 维生素B₂(核黄素), 维生素B₆(盐酸吡哆醇), 维生素B₁₂(氰钴胺), 烟酸(烟酰胺), 叶酸(叶酸), 泛酸(D-泛酸钙), 维生素C(L-抗坏血酸钠), 生物素(D-生物素), 动物双歧杆菌乳亚种Bb-12, 食品添加剂(柠檬酸)。
致敬物质提示: 含有乳制品和鱼油。

生产者: 双城雀巢有限公司
地址: 黑龙江省哈尔滨市双城区友谊路
产地: 黑龙江省哈尔滨市
检验合格证号: 同“保质期至”及随后二位字符
食品生产许可证编号: SC10523018250144
产品标准代号: GB 10767-2021

产品类别及属性: 乳基粉状幼儿配方食品
规格: 720g
本品条码持有人为雀巢(中国)有限公司
贮存条件: 放置于阴凉干燥处, 包装开启后请密封保存于阴凉干燥处, 并在三周内用完。
保质期至及生产日期(年/月/日)示于罐底

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	每100mL
能量	kJ	100	2050	280
蛋白质	g	0.45	9.31	1.27
脂肪	g	1.10	22.6	3.09
亚油酸	g	0.14	2.9	0.40
α-亚麻酸	mg	15.61	320	43.78
碳水化合物	g	3.03	62.1	8.50

项目	单位	每100kJ	每100g	每100mL
钠	mg	7.07	145	19.84
钾	mg	25.61	525	71.82
铜	μg	17.56	360	49.25
镁	mg	2.34	48	6.57
铁	mg	0.34	6.9	0.94
锌	mg	0.20	4.0	0.55
钙	mg	27.12	556	76.06
磷	mg	16.34	335	45.83
碘	μg	2.83	58	7.93
氯	mg	25.85	530	72.50

项目	单位	每100kJ	每100g	每100mL
维生素A	μg RE	22.54	462	63.20
维生素D	μg	0.60	12.3	1.68
维生素E	mg (α-TE)	0.37	7.5	1.03
维生素K ₁	μg	1.46	30	4.10
维生素B ₁	μg	24.39	500	68.40
维生素B ₂	μg	48.78	1000	136.80
维生素B ₆	μg	19.51	400	54.72
维生素B ₁₂	μg	0.051	1.05	0.14
烟酸	μg	185.37	3800	519.84
叶酸	μg	4.39	90	12.31
泛酸	μg	136.59	2800	383.04
维生素C	mg	3.80	78	10.67
生物素	μg	0.51	10.5	1.44

可选择成分

硒	μg	0.61	12.5	1.71
锰	μg	5.00	102.5	14.02
牛磺酸	mg	1.66	34	4.65
左旋肉碱	mg	0.52	10.6	1.45
二十二碳六烯酸	mg	4.54	93	12.72
二十碳四烯酸	mg	4.54	93	12.72
1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3	0.41
核苷酸	mg	1.46	30	4.10

警示说明和注意事项

- 注意: 未经煮沸的水、奶杯或不正确的冲调方法, 均会引起幼儿不适。不恰当的贮存、调奶和喂养方法均有可能影响幼儿的健康。
- 重要事项: 本产品不是母乳代用品, 是为12-36月龄健康宝宝配制的幼儿配方奶粉。请尽可能的持续母乳喂养。
- 提示: 喂奶时请注意您的宝宝, 如疏忽照顾可能会引致宝宝窒息。
- 开启后请在3周内用完。

Fe 铁

清洁卫生 绿化环境

6 917878 366029

奶具消毒及冲调方法

- 仔细清洗你的双手
- 奶杯洗净并确保没有奶液残留后浸没于水中煮沸，然后关闭电源并放置至需要时取出
- 将饮用水煮沸，关闭电源，放凉
- 参照喂哺表，先将水倒入奶杯中，然后使用提供的量匙舀取奶粉，并小心抹平剩余奶粉
- 确保量匙干燥并放回罐中，每次使用后关闭罐盖，并放置于阴凉干燥处
- 搅拌直至粉末完全溶解。喂给宝宝前请测试温度

• 如使用购买的奶具消毒器，请遵循厂家的指引进行操作
 •• 为保持动物双歧杆菌乳亚种Bb-12活性，添加奶粉前请将开水冷却至体温

喂哺表

注意：每次只调一杯奶。调好的奶液应根据指导立即饮用，不要将未喝完的奶液存留，倒掉剩奶。调奶时请按照以下指示。

幼儿年龄	每次喂哺份量		每日喂哺次数		
	温开水(毫升)	奶粉(平匙)*	奶粉(次)**	其他(次)	
第12个月起	180	6	3	2-3	

1平匙奶粉=4.56克；
 100毫升标准奶液=90毫升水+13.68克奶粉
 *调奶时只可用罐内所附的专用量匙。用少于或多于指定份量的奶粉，会令幼儿得不到适量的营养或导致脱水。未经医生建议切勿改变奶的浓度。
 **12个月以上幼儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。



超启能恩®

幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段)

雀巢 Nestlé
NAN^{HA.}



3

净含量:780克
国食注字 YP20235015

含有硒, 锰, 牛磺酸, 左旋肉碱, 1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯, 核苷酸

雀巢 Nestlé
倾心聆听
雀巢消费者服务: 400-610-4868
www.nestle.com.cn

配料

配料：水解乳清蛋白和乳糖混合物(水解乳清蛋白，乳糖)，乳糖，食用植物调和油(1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯，葵花籽油，低芥酸菜籽油)，硒(硒酸钠)，锰(硫酸锰)，牛磺酸(牛磺酸)，左旋肉碱(左旋肉碱)，二十二碳六烯酸(DHA)(金枪鱼油)，花生四烯酸(ARA)(花生四烯酸油脂)，核苷酸(5'-单磷酸胞苷，5'-单磷酸腺苷，5'-鸟苷酸二钠，5'-尿苷酸二钠)，钾(氯化钾)，铜(硫酸铜)，镁(氯化镁)，铁(硫酸亚铁)，锌(硫酸锌)，钙(氯化钙，甘油磷酸钙)，磷(磷酸氢钙)，碘(碘化钾)，维生素A(醋酸视黄醇)，维生素D(维生素D₃)，维生素E(di-l-α-醋酸生育醇)，维生素K(植物甲萘醌)，维生素B₁(磷酸硫胺素)，维生素B₂(核黄素)，维生素B₆(盐酸吡哆醇)，维生素B₁₂(氰钴胺)，烟酸(烟酰胺)，叶酸(叶酸)，泛酸(D-泛酸钙)，维生素C(L-抗坏血酸钠)，生物素(D-生物素)，动物双歧杆菌乳亚种Bb-12，食品添加剂(柠檬酸)。

致敏物质提示：含有乳制品和鱼油。

警示说明和注意事项

- 注意：未经煮沸的水、奶杯或不正确的冲调方法，均会引起幼儿不适，不恰当的贮存，调奶和喂哺方法均有可能影响幼儿的健康。
- 重要事项：本产品不是母乳代用品，是为12-36月龄健康宝宝配制的幼儿配方奶粉。请尽可能的持续母乳喂养。
- 提示：喂奶时请注意您的宝宝，如疏忽照顾可能会导致宝宝窒息。
- 开启后请在3周内用完。

生产者：双城雀巢有限公司
 地址：黑龙江省哈尔滨市双城区友谊路
 产地：黑龙江省哈尔滨市
 检验合格证号：同“保质期至”及随后二位字符
 食品生产许可证编号：SC10523018250144
 产品标准代号：GB 10767-2021

产品类别及属性：乳基粉状幼儿配方食品
 规格：780g
 本品条码持有人为雀巢(中国)有限公司
 贮存条件：放置于阴凉干燥处，包装开启后请密封保存于阴凉干燥处，并在三周内用完。
 保质期至及生产日期(年/月/日)示于罐底

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	每100mL
能量	kJ	100	2050	280
蛋白质	g	0.45	9.31	1.27
脂肪	g	1.10	22.6	3.09
亚油酸	g	0.14	2.9	0.40
α-亚麻酸	mg	15.61	320	43.78
碳水化合物	g	3.03	62.1	8.50

维生素

维生素A	μg RE	22.54	462	63.20
维生素D	μg	0.60	12.3	1.68
维生素E	mg (α-TE)	0.37	7.5	1.03
维生素K ₁	μg	1.46	30	4.10
维生素B ₁	μg	24.39	500	68.40
维生素B ₂	μg	48.78	1000	136.80
维生素B ₆	μg	19.51	400	54.72
维生素B ₁₂	μg	0.051	1.05	0.14
烟酸	μg	185.37	3800	519.84
叶酸	μg	4.39	90	12.31
泛酸	μg	136.59	2800	383.04
维生素C	mg	3.80	78	10.67
生物素	μg	0.51	10.5	1.44

矿物质

钠	mg	7.07	145	19.84
钾	mg	25.61	525	71.82
铜	μg	17.56	360	49.25
镁	mg	2.34	48	6.57
铁	mg	0.34	6.9	0.94
锌	mg	0.20	4.0	0.55
钙	mg	27.12	556	76.06
磷	mg	16.34	335	45.83
碘	μg	2.83	58	7.93
硒	μg	25.85	530	72.50

可选择成分

硒	μg	0.61	12.5	1.71
锰	μg	5.00	102.5	14.02
牛磺酸	mg	1.66	34	4.65
左旋肉碱	mg	0.52	10.6	1.45
二十二碳六烯酸	mg	4.54	93	12.72
二十碳四烯酸	mg	4.54	93	12.72
1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3	0.41
核苷酸	mg	1.46	30	4.10



27

雀巢 Nestlé NAN HA 超启能恩

超启能恩

3

净含量: 230克

国食注字 YP20235015

幼儿配方奶粉(12-36月龄, 3段)

器具消毒及冲调方法

1. 仔细清洗你的双手
2. 奶杯洗净并确保没有奶液残留后浸没于水中煮沸, 然后关闭电源, 关闭电
3. 将饮用水煮沸, 关闭电源, 冷却
4. 参照喂哺表, 先将水倒入奶杯中, 然后使用提供的量匙
5. 确保量匙干燥并放回罐中, 每次使用后关闭罐盖, 并放置于阴凉干燥处
6. 搅拌均匀至粉末完全溶解, 喂食宝宝前请测试温度

* 如使用购买的器具消毒器, 请遵循厂家的指引进行操作
** 为保持动物双歧杆菌乳亚种Bb-12活性, 添加奶粉前请将开水冷却至体温

喂哺表

幼儿年龄	每次喂哺份量	每日喂哺次数
第12个月起	180	6
		3
		2-3

注意: 每次只调配一杯奶。调好的奶液应根据指导立即饮用, 不要将未喝完的奶液存盘。倒掉剩奶。调奶时请按照左侧指示。

Fe 铁

11 个月以上幼儿食用本产品时, 须配合添加辅助食品, 清洁卫生, 绿化环境

幼儿配方奶粉(12-36月龄, 3段)

含有硒, 锰, 牛磺酸, 左旋肉碱, 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯, 核苷酸

雀巢 Nestlé 倾心聆听
雀巢消费者服务: 400-610-4868
www.nestle.com.cn

配料

配料: 水解乳清蛋白和乳糖混合物(水解乳清蛋白, 乳糖), 乳糖, 食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯, 葵花籽油, 低芥酸菜籽油), 硒(硒酸钠), 锰(硫酸锰), 牛磺酸(牛磺酸), 左旋肉碱(左旋肉碱), 二十二碳六烯酸(DHA)(金枪鱼油), 花生四烯酸(ARA)(花生四烯酸油脂), 核苷酸(5'-单磷酸胞苷, 5'-单磷酸腺苷, 5'-鸟苷酸二钠, 5'-尿苷酸二钠), 钾(氯化钾), 铜(硫酸铜), 镁(氯化镁), 铁(硫酸亚铁), 锌(硫酸锌), 钙(氯化钙, 甘油磷酸钙), 磷(磷酸氢钙), 碘(碘化钾), 维生素A(醋酸视黄酯), 维生素D(维生素D₃), 维生素E(dl-α-醋酸生育酚), 维生素K(植物甲萘醌), 维生素B₁(硝酸硫胺素), 维生素B₂(核黄素), 维生素B₆(盐酸吡哆醇), 维生素B₁₂(氰钴胺), 烟酸(烟酰胺), 叶酸(叶酸), 泛酸(D-泛酸钙), 维生素C(L-抗坏血酸钠), 生物素(D-生物素), 动物双歧杆菌乳亚种Bb-12, 食品添加剂(柠檬酸)。
致敏物质提示: 含有乳制品和鱼油。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	每100mL
能量	kJ	100	2050	280
蛋白质	g	0.45	9.31	1.27
脂肪	g	1.10	22.6	3.09
亚油酸	g	0.14	2.9	0.40
(L-亚麻酸	mg	15.61	320	43.78
碳水化合物	g	3.03	62.1	8.50

矿物质

项目	单位	每100kJ	每100g	每100mL
钠	mg	7.07	145	19.84
钾	mg	25.61	525	71.82
铜	μg	17.56	360	49.25
铁	mg	2.34	48	6.57
锌	mg	0.34	6.9	0.94
镁	mg	0.20	4.0	0.55
钙	mg	27.12	556	76.06
磷	mg	16.34	335	45.83
碘	μg	2.83	58	7.93
硒	mg	25.85	530	72.50

可选择成分

项目	单位	每100kJ	每100g	每100mL
酒精	μg	0.61	12.5	1.71
蔗糖	μg	5.00	102.5	14.02
牛磺酸	mg	1.66	34	4.65
左旋肉碱	mg	0.52	10.6	1.45
二十二碳六烯酸	mg	4.54	93	12.72
花生四烯酸	mg	4.54	93	12.72
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.15	3	0.41
核苷酸	mg	1.46	30	4.10

警示说明和注意事项

1. 注意: 未经煮沸的水、奶杯或不正确的冲调方法, 均会引起幼儿不适, 不恰当的贮存、调奶和喂养方法均有可能影响幼儿的健康。
2. 重要事项: 本产品不是母乳代用品, 是为12-36月龄健康宝宝配制的幼儿配方奶粉。请尽可能的持续母乳喂养。
3. 提示: 喂奶时请注意您的宝宝, 如疏忽照顾可能会引致宝宝窒息。
4. 开启后请在3周内用完。

生产者: 双城雀巢有限公司 地址: 黑龙江省哈尔滨市双城区友谊路
产地: 黑龙江省哈尔滨市 检验合格证号: 同“保质期至”及随后二位字符
食品生产许可证编号: SC10523018250144 产品标准代号: GB 10767-2021
产品类别及属性: 乳基粉状幼儿配方食品 规格: 230g
本品条码持有人为雀巢(中国)有限公司
贮存条件: 放置于阴凉干燥处, 包装开启后请密封保存于阴凉干燥处, 并在三周内用完。

保质期至及
生产日期
(年/月/日)
示于罐底

6 917878 363165

44380190