

注意事项

未经煮沸消毒过的水、奶瓶或不恰当
的浓度均有可能引起宝宝不适。
每次尽可能准备一次用量,并及时给
宝宝喂哺,不要将未喝完的奶液留存。

贮存方法

每次食用后请将罐口封严,且置于清
洁阴凉干燥处保存。

服务热线

400-660-3567

了解更多产品和服务
资讯欢迎扫描官方微
信二维码或登录



产品类别: 婴儿配方食品

产品属性: 乳基粉状

执行标准: GB 10765-2021

生产许可证编号: SC10523128101060

生产日期/批号: 见罐底

保质期: 24个月

生产商: 黑龙江华丹乳业有限公司

生产地址: 黑龙江省绥化市安达市滨佳

牧业科技园区



6 954180 509003

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2041
蛋白质	g	0.53	10.85
脂肪	g	1.21	24.78
亚油酸	g	0.19	3.91
α-亚麻酸	mg	19	378
碳水化合物	g	2.7	55.3
维生素			
维生素A	μg RE	24	486
维生素D	μg	0.63	12.83
维生素E	mg α-TE	0.18	3.62
维生素K ₁	μg	2.01	40.98
维生素B ₁	μg	18	376
维生素B ₂	μg	31	627
维生素B ₆	μg	18.6	379.9
维生素B ₁₂	μg	0.076	1.557
烟酸(烟酰胺)	μg	148	3030
叶酸	μg	4.9	99.6
泛酸	μg	155	3169
维生素C	mg	4.0	82.6
生物素	μg	0.55	11.20
胆碱	mg	6.2	125.6
矿物质			
钠	mg	9	190
钾	mg	22	452
铜	μg	17.1	348.5
镁	mg	1.6	32.5
铁	mg	0.17	3.41
锌	mg	0.17	3.54
锰	μg	1.96	39.91
钙	mg	15	314
磷	mg	10	206
碘	μg	4.8	97.8
氯	mg	15	312
硒	μg	1.03	21.01
可选择成分			
肌醇	mg	1.8	35.9
牛磺酸	mg	1.3	25.9
左旋肉碱	mg	0.6	11.8
1,3-二油酸 2-棕 桐酸甘油三酯	g	0.44	9.04
核黄素	mg	1.62	33.10
乳铁蛋白	mg	27.4	560



华丹

婴儿配方奶粉 (0-6月龄, 1段)



1

段

净含量: 800克
国食注字YP20170690

重要声明

对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳,在母乳不足
或无母乳时可食用本产品。

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物油和油(1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、玉米油)、乳糖、乳清蛋白粉、柠檬酸钠、氯化钾、磷酸钙、磷酸三钙、乳铁蛋白、L-抗坏血酸、牛磺酸、肌醇、dl-α-酮酸生育醇、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、胆钙化醇、胆钙化醇、胆钙化醇、D-泛酸钙、叶酸、植物甲萘酚、D-生物素、核黄素、盐酸硫胺素、维生素B₁₂、硫酸铜、硫酸钾、硫酸亚铁、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰、氯化胆碱、核黄素(5'-脱氧腺二核苷、5'-腺苷二核苷、5'-腺苷三核苷、5'-腺苷二核苷、5'-腺苷三核苷)、动物双歧杆菌乳亚种8b-12、左旋肉碱。
过敏原信息: 本品含有乳及乳制品。

喂哺建议表

- 100毫升奶液=13.5克奶粉+90毫升温开水
- 一平勺奶粉约为4.5克,听盖内附有专用量勺。
- 喂哺建议表是根据平均需要量而定,请遵照表中所建议的比例用量冲调。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水用量(毫升)	奶粉(平勺)	
0-1周	60	2	7-8
1-2周	90	3	5-6
2-4周	120	4	4-5
1-2个月	150	5	4-5
2-4个月	180	6	4-5
4-6个月	210	7	4-5

冲调及食用方法

- 用清水洗净双手和所有用具。
- 将奶粉、奶嘴在沸水中煮沸消毒。
- 将饮用水煮沸5分钟并冷却至约40°C,将正确份量的温水倒入已经消毒过的奶瓶中。
- 按喂哺建议表,用量勺量取正确份量的奶粉倒入奶瓶。
- 盖紧奶瓶,轻轻摇晃至完全溶解。
- 喂哺前测试奶液的温度,是否适宜宝宝食用。调制好的奶液建议在1小时内喂哺,食用后剩余的奶液应弃用。

37°C



注意事项

未经煮沸消毒过的水、奶瓶或不恰当
的浓度均有可能引起宝宝不适。
每次尽可能准备一次喂量,并及时给
宝宝喂哺,不要将未喝完的奶液留存。



贮存方法

每次食用后请将罐口封严,且置于清
洁阴凉干燥处保存。



服务热线

400-660-3567

了解更多产品和服务
资讯欢迎扫描官方微
信二维码



产品类别: 婴儿配方食品

产品属性: 乳基粉状

执行标准: GB 10765-2021

生产许可证编号: SC10523128101060

生产日期/批号: 见罐底

保质期: 24个月

生产商: 黑龙江华丹乳业有限公司

生产地址: 黑龙江省绥化市安达市澳佳

牧业科技园区



6 954180 501564

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2041
蛋白质	g	0.53	10.85
脂肪	g	1.21	24.78
亚油酸	g	0.19	3.91
α-亚麻酸	mg	19	378
碳水化合物	g	2.7	55.3
维生素			
维生素A	μg RE	24	486
维生素D	μg	0.63	12.83
维生素E	mg α-TE	0.18	3.62
维生素K ₁	μg	2.01	40.98
维生素B ₁	μg	18	376
维生素B ₂	μg	31	627
维生素B ₆	μg	18.6	379.9
维生素B ₁₂	μg	0.076	1.557
烟酸(烟酰胺)	μg	148	3030
叶酸	μg	4.9	99.6
泛酸	μg	155	3169
维生素C	mg	4.0	82.6
生物素	μg	0.55	11.20
胆碱	mg	6.2	125.6
矿物质			
钠	mg	9	190
钾	mg	22	452
铜	μg	17.1	348.5
镁	mg	1.6	32.5
铁	mg	0.17	3.41
锌	mg	0.17	3.54
锰	μg	1.96	39.91
钙	mg	15	314
磷	mg	10	206
碘	μg	4.8	97.8
氯	mg	15	312
硒	μg	1.03	21.01
可选择成分			
肌醇	mg	1.8	35.9
牛磺酸	mg	1.3	25.9
左旋肉碱	mg	0.6	11.8
1,3-二油酸 2-棕 桐酸甘油三酯	g	0.44	9.04
核苷酸	mg	1.62	33.10
乳铁蛋白	mg	27.4	560



华丹

婴儿配方奶粉 (0-6月龄, 1段)



1 段

净含量: 700克
国食注字YP20170690



重要声明

对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳,在母乳不足
或无母乳时可食用本产品。



配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物油和油(1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、玉米油)、乳糖、乳清蛋白粉、柠檬酸钠、氯化钾、磷酸钙、磷酸三钙、乳铁蛋白、L-抗坏血酸、牛磺酸、肌醇、dl-α-磷酸生育酚、蛋氨酸、胆钙化醇、胆钙化醇、胆钙化醇、D-泛酸钙、叶酸、植物甲萘醌、D-生物素、核黄素、盐酸硫胺素、氰钴胺、硫酸镁、磷酸钾、硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰、氯化胆碱、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、动物双歧杆菌乳亚种D-12、左旋肉碱。
过敏原信息: 本品含有乳及乳制品。

喂哺建议表

- 100毫升奶液=13.5克奶粉+90毫升温开水
- 一平勺奶粉约为4.5克,听盖内附有专用量勺。
- 喂哺建议表是根据平均需要量而定,请遵照表中所建议的比例用量冲调。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水用量(毫升)	奶粉(平勺)	
0-1周	60	2	7-8
1-2周	90	3	5-6
2-4周	120	4	4-5
1-2个月	150	5	4-5
2-4个月	180	6	4-5
4-6个月	210	7	4-5

冲调及食用方法

1. 用清水洗净双手和所有用具。
2. 将奶瓶、奶嘴在沸水中煮沸消毒。
3. 将饮用水煮沸5分钟并冷却至约40°C,将正确份量的温水倒入已经消毒过的奶瓶中。
4. 按喂哺建议表,用量勺量取正确份量的奶粉倒入奶瓶。
5. 盖紧奶瓶,轻摇至奶粉完全溶解。
6. 喂哺前测试奶液的温度,是否适宜宝宝食用。调好的奶液建议在1小时内喂哺,食用后剩余的奶液应弃用。

37°C

注意事项

未经煮沸消毒过的水、奶瓶或不恰当的浓度均有可能引起宝宝不适。
每次尽可能准备一次喂量,并及时给宝宝喂哺,不要将未喝完的奶液留存。

贮存方法

每次食用后请将罐口封严,且置于清洁阴凉干燥处保存。

服务热线

400-660-3567

了解更多产品和服务
资讯欢迎扫描官方微信二维码或登录

http://www.huadanruye.com

产品类别: 婴儿配方食品

产品属性: 乳基粉状

执行标准: GB 10765-2021

生产许可证编号: SC10523128101060

生产日期/批号: 见罐底

保质期: 24个月

生产商: 黑龙江华丹乳业有限公司

生产地址: 黑龙江省绥化市安达市滨佳

牧业科技园区

联系电话: 0455-7567777



6 954180 500703

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2041
蛋白质	g	0.53	10.85
脂肪	g	1.21	24.78
亚油酸	g	0.19	3.91
α-亚麻酸	mg	19	378
碳水化合物	g	2.7	55.3
维生素			
维生素A	μg RE	24	486
维生素D	μg	0.63	12.83
维生素E	mg α-TE	0.18	3.62
维生素K ₁	μg	2.01	40.98
维生素B ₁	μg	18	376
维生素B ₂	μg	31	627
维生素B ₆	μg	18.6	379.9
维生素B ₁₂	μg	0.076	1.557
烟酸(烟酰胺)	μg	148	3030
叶酸	μg	4.9	99.6
泛酸	μg	155	3169
维生素C	mg	4.0	82.6
生物素	μg	0.55	11.20
胆碱	mg	6.2	125.6
矿物质			
钠	mg	9	190
钾	mg	22	452
铜	μg	17.1	348.5
镁	mg	1.6	32.5
铁	mg	0.17	3.41
锌	mg	0.17	3.54
锰	μg	1.96	39.91
钙	mg	15	314
磷	mg	10	206
碘	μg	4.8	97.8
氯	mg	15	312
硒	μg	1.03	21.01
可选择成分			
肌醇	mg	1.8	35.9
牛磺酸	mg	1.3	25.9
左旋肉碱	mg	0.6	11.8
1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	g	0.44	9.04
核苷酸	mg	1.62	33.10
乳铁蛋白	mg	27.4	560



华丹

婴儿配方奶粉 (0-6月龄, 1段)



1段

净含量: 400克
国食注字YP20170630



重要声明

对于0-6月龄的婴儿,最理想的食物是母乳。在母乳不足或无母乳时可食用本产品。



配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物油和油(1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、玉米油)、乳糖、乳清蛋白粉、柠檬酸钠、氯化钾、碳酸钾、磷酸三钙、乳铁蛋白、L-抗坏血酸、牛磺酸、肌醇、dl-α-磷酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、维生素A、烟酰胺、D-泛酸钙、叶酸、植物甲萘醌、D-生物素、核黄素、盐酸硫胺素、氯化胆碱、硫酸镁、硫酸钾、硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰、氯化胆碱、核苷酸(5'-核苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、动物双歧杆菌乳亚种0b-12、左旋肉碱。
过敏原信息: 本品含有乳及乳制品。

喂哺建议表

- 100毫升奶液=13.5克奶粉+90毫升温开水
- 一平勺奶粉约为4.5克,听盖内附有专用量勺。
- 喂哺建议表是根据平均需要量而定,请遵照表中所建议的比例用量冲调。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水用量(毫升)	奶粉(平勺)	
0-1周	60	2	7-8
1-2周	90	3	5-6
2-4周	120	4	4-5
1-2个月	150	5	4-5
2-4个月	180	6	4-5
4-6个月	210	7	4-5

冲调及食用方法

- 用清水洗净双手和所有用具。
- 将奶瓶、奶嘴在沸水中煮沸消毒。
- 将饮用水煮沸5分钟并冷却至约40℃,将正确份量的温水倒入已经消毒过的奶瓶中。
- 按喂哺建议表,用量勺量取正确份量的奶粉倒入奶瓶。
- 盖紧奶瓶,轻摇至奶粉完全溶解。
- 喂哺前测试奶液的温度,是否适宜宝宝食用。调制好的奶液建议在1个小时内喂哺,食用后剩余的奶液应弃用。

注意事项

未经煮沸消毒过的水、奶瓶或不恰当
的浓度均有可能引起宝宝不适。
每次尽可能准备一次喂量,并及时给
宝宝喂哺,不要将未喝完的奶液留存。

贮存方法

每次食用后请将罐口封严,且置于清
洁阴凉干燥处保存。

服务热线

400-660-3567

了解更多产品和服务
资讯欢迎扫描官方微
信二维码或登录



产品类别: 较大婴儿配方食品

产品属性: 乳基粉状

执行标准: GB 10766-2021

生产许可证编号: SC10523128101060

生产日期/批号: 见罐底

保质期: 24个月

生产商: 黑龙江华丹乳业有限公司

生产地址: 黑龙江省绥化市安达市澳佳
牧业科技园区

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1993
蛋白质	g	0.60	11.94
脂肪	g	1.12	22.40
亚油酸	g	0.15	2.96
α -亚麻酸	mg	16	309
碳水化合物	g	2.8	56.6
维生素			
维生素A	$\mu\text{g RE}$	26	516
维生素D	μg	0.68	13.55
维生素E	mg α -TE	0.24	4.85
维生素K ₁	μg	2.41	47.98
维生素B ₁	μg	21	414
维生素B ₂	μg	33	666
维生素B ₆	μg	21.4	425.7
维生素B ₁₂	μg	0.088	1.760
烟酸(烟酰胺)	μg	177	3531
叶酸	μg	4.7	93.5
泛酸	μg	187	3724
维生素C	mg	3.7	73.9
生物素	μg	0.71	14.08
胆碱	mg	6.3	125.7
矿物质			
钠	mg	6	119
钾	mg	25	490
铜	μg	11.8	235.2
镁	mg	1.8	36.4
铁	mg	0.30	5.94
锌	mg	0.18	3.53
锰	μg	1.58	31.58
钙	mg	19	386
磷	mg	13	253
碘	μg	5.0	98.8
氯	mg	11	220
硒	μg	0.77	15.30
可选择成分			
肌醇	mg	1.8	36.2
牛磺酸	mg	1.3	25.8
左旋肉碱	mg	0.6	12.2
1,3-二油酸 2-棕 桐酸甘油三酯	g	0.35	6.99
核苷酸	mg	1.66	33.18
乳铁蛋白	mg	13.5	269



华丹

较大婴儿配方奶粉 (6-12月龄, 2段)



2段

净含量: 800克
国食注字YP20170691

重要声明

6-12月的较大婴儿食用本品时,
须配合添加辅助食品。

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、玉米油)、乳糖、乳清蛋白粉、柠檬酸钾、碳酸钾、磷酸三钙、L-抗坏血酸、牛磺酸、肌醇、dl- α -醋酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄酯、烟酰胺、D-泛酸钙、D-生物素、叶酸、植物甲萘醌、核黄素、盐酸硫胺素、氯化胆碱、硫酸镁、磷酸钾、硫酸亚铁、硫酸铜、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰、氯化胆碱、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、左旋肉碱。

过敏原信息: 本品含有乳及乳制品。

喂哺建议表

- 100毫升奶液=13.5克奶粉+90毫升温开水
- 一平勺奶粉约为4.5克, 听盖内附有专用量勺。
- 喂哺建议表是根据平均需要量而定, 请遵照表中所建议的比例用量冲调。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水用量(毫升)	奶粉(平勺)	
6-9个月	210	7	4
9-12个月	240	8	3

冲调及食用方法

1. 用清水洗净双手和所有用具。
2. 将奶瓶、奶嘴在沸水中煮沸消毒。
3. 将饮用水煮沸5分钟并冷却至约40°C, 将正确份量的温水倒入已经消毒过的奶瓶中。
4. 按喂哺建议表, 用量勺量取正确份量的奶粉倒入奶瓶。
5. 盖紧奶瓶, 轻轻摇晃至奶粉完全溶解。
6. 喂哺前测试奶液的温度, 是否适宜宝宝食用。调制好的奶液建议在1小时内喂哺, 食用后剩余的奶液应弃用。

37°C



6 954180 509010

注意事项

未经煮沸消毒过的水、奶瓶或不恰当的浓度均有可能引起宝宝不适。
每次尽可能准备一次喂量,并及时给宝宝喂哺,不要将未喝完的奶液留存。

贮存方法

每次食用后将罐口封严,且置于清洁阴凉干燥处保存。

服务热线

400-660-3567

了解更多产品和服务
资讯欢迎扫描官方微信二维码



产品类别: 较大婴儿配方食品

产品属性: 乳基粉状

执行标准: GB 10766-2021

生产许可证编号: SC10523128101060

生产日期/批号: 见罐底

保质期: 24个月

生产商: 黑龙江华丹乳业有限公司

生产地址: 黑龙江省绥化市安达市滨佳牧业科技园区



营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1993
蛋白质	g	0.60	11.94
脂肪	g	1.12	22.40
亚油酸	g	0.15	2.96
α -亚油酸	mg	16	309
碳水化合物	g	2.8	56.6
维生素			
维生素A	$\mu\text{g RE}$	26	516
维生素D	μg	0.68	13.55
维生素E	$\text{mg } \alpha\text{-TE}$	0.24	4.85
维生素K ₁	μg	2.41	47.98
维生素B ₁	μg	21	414
维生素B ₂	μg	33	666
维生素B ₆	μg	21.4	425.7
维生素B ₁₂	μg	0.088	1.760
烟酸(烟酰胺)	μg	177	3531
叶酸	μg	4.7	93.5
泛酸	μg	187	3724
维生素C	mg	3.7	73.9
生物素	μg	0.71	14.08
胆碱	mg	6.3	125.7
矿物质			
钠	mg	6	119
钾	mg	25	490
铜	μg	11.8	235.2
镁	mg	1.8	36.4
铁	mg	0.30	5.94
锌	mg	0.18	3.53
锰	μg	1.58	31.58
钙	mg	19	386
磷	mg	13	253
碘	μg	5.0	98.8
氯	mg	11	220
硒	μg	0.77	15.30
可选择成分			
肌醇	mg	1.8	36.2
牛磺酸	mg	1.3	25.8
左旋肉碱	mg	0.6	12.2
1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	g	0.35	6.99
核苷酸	mg	1.66	33.18
乳铁蛋白	mg	13.5	269



华丹

较大婴儿配方奶粉 (6-12月龄, 2段)



2段

净含量: 700克
国食注字YP20170691

重要声明

6-12月的较大婴儿食用本品时,
须配合添加辅助食品。

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、玉米油)、乳糖、乳清蛋白粉、柠檬酸钾、碳酸钾、磷酸三钙、L-抗坏血酸、牛磺酸、肌醇、dl- α -醋酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄酯、烟酰胺、D-泛酸钙、D-生物素、叶酸、植物甲萘酚、核黄素、盐酸硫胺素、氰钴胺、乳铁蛋白、硫酸镁、碘酸钾、硫酸亚铁、硫酸铜、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰、氯化胆碱、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、左旋肉碱。

过敏原信息: 本品含有乳及乳制品。

喂养建议表

- 100毫升奶液=13.5克奶粉+90毫升温开水
- 一平勺乳粉约为4.5克, 听盖内附有专用量勺。
- 喂养建议表是根据平均需要量而定, 请遵照表中所建议的比例用量冲调。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水用量(毫升)	奶粉(平勺)	
6-9个月	210	7	4
9-12个月	240	8	3

冲调及食用方法

- 用清水洗净双手和所有用具。
- 将奶瓶、奶嘴在沸水中煮沸消毒。
- 将饮用水煮沸5分钟并冷却至约40°C, 将正确份量的温水倒入已经消毒过的奶瓶中。
- 按喂哺建议表, 用量勺量取正确份量的奶粉倒入奶瓶。
- 盖紧奶瓶, 轻轻至奶粉完全溶解。
- 喂哺前测试奶液的温度, 是否适宜宝宝食用。调制好的奶液建议在1个小时内喂哺, 食用后剩余的奶液应弃用。

! 注意事项

未经煮沸消毒的水、奶瓶或不恰当
的浓度均有可能引起宝宝不适。
每次尽可能准备一次喂量,并及时给
宝宝喂哺,不要将未喝完的奶液留存。

🔑 贮存方法

每次食用后请将罐口封严,且置于清
洁阴凉干燥处保存。

☎ 服务热线

400-660-3567

了解更多产品和服务
资讯欢迎扫描官方微
信二维码或登录

<http://www.huadanruye.com>



产品类别: 较大婴儿配方食品

产品属性: 乳基粉状

执行标准: GB 10766-2021

生产许可证编号: SC10523128101060

生产日期/批号: 见罐底

保质期: 24个月

生产商: 黑龙江华丹乳业有限公司

生产地址: 黑龙江省绥化市安达市凌佳

牧业科技园区

联系电话: 0455-7567777

营养成分表

项目	单位	每100J	每100g
能量	kJ	100	1993
蛋白质	g	0.60	11.94
脂肪	g	1.12	22.40
亚油酸	g	0.15	2.96
α-亚麻酸	mg	16	309
碳水化合物	g	2.8	56.6
维生素			
维生素A	μg RE	26	516
维生素D	μg	0.68	13.55
维生素E	mg α-TE	0.24	4.85
维生素K	μg	2.41	47.98
维生素B ₁	μg	21	414
维生素B ₂	μg	33	666
维生素B ₆	μg	21.4	425.7
维生素B ₁₂	μg	0.068	1.760
烟酸(烟酰胺)	μg	177	3531
叶酸	μg	4.7	93.5
泛酸	μg	187	3724
维生素C	mg	3.7	73.9
生物素	μg	0.71	14.08
胆碱	mg	6.3	125.7
矿物质			
钠	mg	6	119
钾	mg	25	490
铜	μg	11.8	235.2
镁	mg	1.8	36.4
铁	mg	0.30	5.94
锌	mg	0.18	3.53
锰	μg	1.58	31.58
钙	mg	19	386
磷	mg	13	253
碘	μg	5.0	98.8
氯	mg	11	220
硒	μg	0.77	15.30
可选择成分			
肌醇	mg	1.8	36.2
牛磺酸	mg	1.3	25.8
左旋肉碱	mg	0.6	12.2
1,3-二油酸 2-棕 桐酸甘油三酯	g	0.35	6.99
核苷酸	mg	1.66	33.18
乳铁蛋白	mg	13.5	269



华丹

较大婴儿配方奶粉 (6-12月龄, 2段)



2 段

净含量: 400克
国食注字YP20170691



重要声明

6-12月的较大婴儿食用本品时,
须配合添加辅助食品。



配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、玉米油)、乳糖、乳清蛋白粉、柠檬酸钾、碳酸钾、磷酸三钙、L-抗坏血酸、牛磺酸、肌醇、dl-α-脂酰生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄酯、烟酰胺、D-泛酸钙、D-生物素、叶酸、植物甲萘酚、核黄素、盐酸硫胺素、氰钴胺、乳铁蛋白、硫酸镁、硫酸钾、硫酸亚铁、硫酸铜、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰、氯化胆碱、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、左旋肉碱。

过敏原信息: 本品含有乳及乳制品。

喂哺建议表

- 100毫升奶液=13.5克奶粉+90毫升温开水
- 一平勺乳粉约为4.5克,听盖内附有专用量勺。
- 喂哺建议表是根据平均需要量而定,请遵照表中所建议的比例用量冲调。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水用量(毫升)	奶粉(平勺)	
6-9个月	210	7	4
9-12个月	240	8	3

冲调及食用方法

- 用清水洗净双手和所有用具。
- 将奶瓶、奶嘴在沸水中煮沸消毒。
- 将饮用水煮沸5分钟并冷却至约40°C,将正确份量的温水倒入已经消毒过的奶瓶中。
- 按喂哺建议表,用量勺量取正确份量的奶粉倒入奶瓶。
- 盖紧奶瓶,轻摇至奶粉完全溶解。
- 喂哺前测试奶液的温度,是否适宜宝宝食用。调制好的奶液建议在1小时内喂哺,食用后剩余的奶液应弃用。



6 954180 500734

! 注意事项

未经煮沸消毒过的水、奶瓶或不恰当
的浓度均有可能引起宝宝不适。
每次尽可能准备一次喂量,并及时给
宝宝喂哺,不要将未喝完的奶液留存。

📦 贮存方法

每次食用后请将罐口封严,且置于清
洁阴凉干燥处保存。

☎ 服务热线

400-660-3567

了解更多产品和服务
资讯欢迎扫描官方微
信二维码或登录



产品类别: 幼儿配方食品

产品属性: 乳基粉状

执行标准: GB 10767-2021

生产许可证编号: SC10523128101060

生产日期/批号: 见罐底

保质期: 24个月

生产商: 黑龙江华丹乳业有限公司

生产地址: 黑龙江省绥化市安达市滨佳
牧业科技园区



营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1963
蛋白质	g	0.66	12.86
脂肪	g	1.06	20.87
亚油酸	g	0.12	2.35
α-亚麻酸	mg	13	263
碳水化合物	g	2.9	57.2
维生素			
维生素A	μg RE	27	527
维生素D	μg	0.69	13.58
维生素E	mg α-TE	0.25	4.88
维生素K ₁	μg	2.45	48.08
维生素B ₁	μg	21	421
维生素B ₂	μg	37	718
维生素B ₆	μg	22.2	435.0
维生素B ₁₂	μg	0.097	1.896
烟酸(烟酰胺)	μg	186	3655
叶酸	μg	4.8	93.7
泛酸	μg	207	4065
维生素C	mg	3.8	74.2
生物素	μg	0.74	14.52
矿物质			
钠	mg	7	134
钾	mg	26	507
铜	μg	12.0	235.1
镁	mg	2.0	38.5
铁	mg	0.30	5.95
锌	mg	0.17	3.24
钙	mg	22	433
磷	mg	14	282
碘	μg	5.3	103.6
氯	mg	13	261
可选择成分			
胆碱	mg	6.4	125.5
锰	μg	1.59	31.13
肌醇	mg	1.8	36.1
牛磺酸	mg	1.3	25.7
左旋肉碱	mg	0.6	12.4
1,3-二油酸 2-棕 榈酸甘油三酯	g	0.29	5.65
核苷酸	mg	1.69	33.20
乳铁蛋白	mg	5.2	103



华丹 幼儿配方奶粉 (12-36月龄,3段)



3 段

净含量: 800克
国食注字YP20170692



配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、玉米油)、乳糖、乳清蛋白粉、碳酸钾、柠檬酸钾、磷酸三钙、L-抗坏血酸、牛磺酸、肌醇、dl-α-酮酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄酯、烟酰胺、D-泛酸钙、D-生物素、核黄素、叶酸、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、氟化钾、硫酸镁、碘酸钾、硫酸亚铁、硫酸铜、硫酸锌、硫酸锰、乳铁蛋白、氯化胆碱、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、左旋肉碱。
过敏原信息: 本品含有乳及乳制品。

喂哺建议表

- 100毫升奶液=13.5克奶粉+90毫升温开水
- 一平勺乳粉约为4.5克,听盖内附有专用量勺。
- 喂哺建议表是根据平均需要量而定,请遵照表中所建议的比例用量冲调。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水用量(毫升)	奶粉(平勺)	
12-36个月	240	8	2-3

冲调及食用方法

1. 用清水洗净双手和所有用具。
2. 将奶瓶、奶嘴在沸水中煮沸消毒。
3. 将饮用水煮沸5分钟并冷却至约40°C,将正确份量的温水倒入已经消毒过的奶瓶中。
4. 按喂哺建议表,用量勺量取正确份量的奶粉倒入奶瓶。
5. 盖紧奶瓶,轻摇至奶粉完全溶解。
6. 喂哺前测试奶液的温度,是否适宜宝宝食用。调制好的奶液建议在1小时内喂哺,食用后剩余的奶液应弃用。

37°C

注意事项

未经煮沸消毒过的水、奶瓶或不恰当的浓度均有可能引起宝宝不适。
每次尽可能准备一次喂量,并及时给宝宝喂哺,不要将未喝完的奶液留存。

贮存方法

每次食用后请将罐口封严,且置于清洁阴凉干燥处保存。

服务热线

400-660-3567

了解更多产品和服务
资讯欢迎扫描下方二维码
信二维码或登录

<http://www.huadanruye.com>

产品类别: 幼儿配方食品
产品属性: 乳基粉状
执行标准: GB 10767-2021
生产许可证编号: SC10523128101060
生产日期/批号: 见罐底
保质期: 24个月
生产商: 黑龙江华丹乳业有限公司
生产地址: 黑龙江省绥化市安达市凌佳
牧业科技园区
联系电话: 0455-7567777



6 954180 500765

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1963
蛋白质	g	0.66	12.86
脂肪	g	1.06	20.87
亚油酸	g	0.12	2.35
α-亚麻酸	mg	13	263
碳水化合物	g	2.9	57.2
维生素			
维生素A	μg RE	27	527
维生素D	μg	0.69	13.58
维生素E	mg α-TE	0.25	4.88
维生素K ₁	μg	2.45	48.08
维生素B ₁	μg	21	421
维生素B ₂	μg	37	718
维生素B ₆	μg	22.2	435.0
维生素B ₁₂	μg	0.097	1.896
烟酸(烟酰胺)	μg	186	3655
叶酸	μg	4.8	93.7
泛酸	μg	207	4065
维生素C	mg	3.8	74.2
生物素	μg	0.74	14.52
矿物质			
钠	mg	7	134
钾	mg	26	507
铜	μg	12.0	235.1
镁	mg	2.0	38.5
铁	mg	0.30	5.95
锌	mg	0.17	3.24
钙	mg	22	433
磷	mg	14	282
碘	μg	5.3	103.6
氯	mg	13	261
可选择成分			
胆碱	mg	6.4	125.5
锰	μg	1.59	31.13
肌醇	mg	1.8	36.1
牛磺酸	mg	1.3	25.7
左旋肉碱	mg	0.6	12.4
1,3-二油酸 2-烯	g	0.29	5.65
植酸甘油三酯	g	0.29	5.65
核苷酸	mg	1.69	33.20
乳铁蛋白	mg	5.2	103



华丹

幼儿配方奶粉
(12-36月龄,3段)



3 段

净含量: 400克
国食注字YP20170692



配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、玉米油)、乳糖、乳清蛋白粉、碳酸钾、柠檬酸钾、磷酸三钙、L-抗坏血酸、牛磺酸、肌醇、D-泛酸钙、D-生物素、核黄素、叶酸、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、氰钴胺、硫酸镁、碘酸钾、硫酸亚铁、硫酸铜、硫酸锌、硫酸锰、乳铁蛋白、氯化胆碱、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、左旋肉碱。
过敏原信息: 本品含有乳及乳制品。

喂哺建议表

- 100毫升奶液=13.5克奶粉+90毫升温开水
- 一平勺乳粉约为4.5克,听盖内附有专用量勺。
- 喂哺建议表是根据平均需要量而定,请遵照表中所建议的比例用量冲调。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水用量(毫升)	奶粉(平勺)	
12-36个月	240	8	2-3

冲调及食用方法

- 用清水洗净双手和所有用具。
- 将奶瓶、奶嘴在沸水中煮沸消毒。
- 将饮用水煮沸5分钟并冷却至约40°C,将正确份量的温水倒入已经消毒过的奶瓶中。
- 按喂哺建议表,用量勺量取正确份量的奶粉倒入奶瓶。
- 盖紧奶瓶,轻摇至奶粉完全溶解。
- 喂哺前测试奶液的温度,是否适宜宝宝食用,调好的奶液建议在1小时内喂哺,食用后剩余的奶液应弃用。

37°C

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1984
蛋白质	g	0.51	10.21
脂肪	g	1.21	24.06
亚油酸	g	0.20	4.03
α -亚麻酸	mg	19	386
碳水化合物	g	2.6	52.0
维生素			
维生素A	$\mu\text{g RE}$	24	479
维生素D	μg	0.64	12.66
维生素E	$\text{mg } \alpha\text{-TE}$	0.18	3.57
维生素K1	μg	2.04	40.44
维生素B1	μg	19	371
维生素B2	μg	31	614
维生素B6	μg	18.9	375.0
维生素B12	μg	0.078	1.541
烟酸(尼克酸)	μg	151	2991
叶酸	μg	4.9	98.2
泛酸	μg	158	3127
维生素C	mg	4.1	81.6
生物素	μg	0.56	11.04
胆碱	mg	6.2	123.2
矿物质			
钠	mg	9	187
钾	mg	22	443
铜	μg	17.3	343.2
镁	mg	1.6	31.6
铁	mg	0.17	3.37
锌	mg	0.18	3.49
锰	μg	1.99	39.39
钙	mg	15	307
磷	mg	10	200
碘	μg	4.9	96.3
氯	mg	16	308
硒	μg	1.03	20.52
可选择成分			
牛磺酸	mg	1.3	25.6
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	5.1	100.4
二十碳四烯酸(EA/ARA)	mg	6.1	121.3
低聚半乳糖	mg	82	1624
低聚果糖	mg	152	3024
叶黄素	μg	5	102
乳铁蛋白	mg	2.9	58

100毫升奶液=13.5克奶粉+90毫升温开水

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物油和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、乳清蛋白粉、柠檬酸钠、氯化钾、磷酸钙、磷酸三钙、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、L-抗坏血酸、牛磺酸、dl- α -醋酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄酯、烟酰胺、D-泛酸钙、叶黄素、叶酸、植物甲萘醌、D-生物素、核黄素、盐酸硫胺素、氯化钾、硫酸镁、碘酸钾、硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰、氯化胆碱、乳铁蛋白。

重要提示

- 本品含有乳及乳制品(包括乳糖)。
- 不恰当的制备、贮存和冲调本产品,可能会影响宝宝的健康。如若改变喂哺建议表中所建议的冲调比例,请咨询医护人员和专业营养师。
- 请保持操作环境的整洁和卫生,请保持提供的量勺的干燥清洁。
- 奶液过度摇晃,可能产生较多气泡,请待气泡破碎消失之后再喂哺宝宝。
- 已冲调好的本品应在调制后两小时内食用完,否则应丢弃。

温馨提示

- 1、本产品为乳基粉状产品,如粉体中有少量可见颜色物质或冲调时有少量点状物,其是维生素和矿物质类物质,属正常现象,请放心食用。
- 2、对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

臻佑



婴儿配方奶粉

(0-6月龄, 1段)

国食注字YP20230405

净含量: 800克

喂哺用量建议

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水用量(毫升)	奶粉(平勺)	
0-1周	60	2	7-8
1-2周	90	3	5-6
2-4周	120	4	4-5
1-2月	150	5	4-5
2-4月	180	6	4-5
4-6月	210	7	4-5

冲调奶液时注意参照下表的奶粉量和温开水量进行冲调,用太少或过多于指定份量的奶粉,会让婴儿得不到适量的营养或导致脱水。未经医生建议切勿改变奶的浓度。一平勺奶粉约为4.5克。

冲调使用说明

- 1、冲调奶液前请先洗净双手。
- 2、将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净,使用前用沸水煮沸至少5分钟,待用。
- 3、将饮用水煮沸5分钟,冷却至50℃左右。
- 4、依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量,将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。
- 5、将所需的奶粉加入到奶瓶中。
- 6、盖紧奶瓶,轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- 7、待奶液温度适宜时,再给宝宝喂哺。



注:冲调奶液时,请保证环境及操作过程的卫生。冲调方法不正确,可能影响宝宝健康。

贮存方法:本产品应贮存于清洁阴凉干燥处,勿放入冰箱内;每次食用后及时将瓶盖封严,开封后,建议1个月内食用完。

产品类别: 婴儿配方食品
产品属性: 乳基粉状
产品执行标准: GB 10765-2021
生产许可证编号: SC10523128101060
生产日期/批号: 见罐底
保质期: 24个月
曾用名: 欧唯雅
生产商: 黑龙江丹阳乳业有限公司
生产地址: 黑龙江省绥化市安达市赛佳牧业科技园区
网址: <http://www.ouruier.vip>
产品服务热线: 400-820-7003
工作时间: 周一至周五 8:30-17:00



官方公众号



6 954180 501298

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1984
蛋白质	g	0.51	10.21
脂肪	g	1.21	24.06
亚油酸	g	0.20	4.03
α -亚麻酸	mg	19	386
碳水化合物	g	2.6	52.0
维生素			
维生素A	$\mu\text{g RE}$	24	479
维生素D	μg	0.64	12.66
维生素E	$\text{mg } \alpha\text{-TE}$	0.18	3.57
维生素K ₁	μg	2.04	40.44
维生素B ₁	μg	19	371
维生素B ₂	μg	31	614
维生素B ₆	μg	18.9	375.0
维生素B ₁₂	μg	0.078	1.541
烟酸(烟酰胺)	μg	151	2991
叶酸	μg	4.9	98.2
泛酸	μg	158	3127
维生素C	mg	4.1	81.6
生物素	μg	0.56	11.04
胆碱	mg	6.2	123.2
矿物质			
钠	mg	9	187
钾	mg	22	443
铜	μg	17.3	343.2
镁	mg	1.6	31.6
铁	mg	0.17	3.37
锌	mg	0.18	3.49
锰	μg	1.99	39.39
钙	mg	15	307
磷	mg	10	200
碘	μg	4.9	96.3
氯	mg	16	308
硒	μg	1.03	20.52
可选择成分			
牛磺酸	mg	1.3	25.6
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	5.1	100.4
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	6.1	121.3
低聚半乳糖	mg	82	1624
低聚果糖	mg	152	3024
叶黄素	μg	5	102
乳铁蛋白	mg	2.9	58

100毫升奶液=13.5克奶粉+90毫升温开水

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、乳清蛋白粉、柠檬酸钠、氯化钾、磷酸钙、磷酸三钙、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油酯(发酵法)、L-抗坏血酸、牛磺酸、dl- α -醋酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄酯、烟酰胺、D-泛酸钙、叶黄素、叶酸、植物甲萘醌、D-生物素、核黄素、硫酸铜、氯化胆碱、硫酸钾、碘酸钾、硫酸锰、氯化胆碱、乳铁蛋白。

重要提示

- 本品含有乳及乳制品(包括乳糖)。
- 不恰当的制备、贮存和冲调本产品,可能会影响宝宝的健康。如若改变喂哺建议表中所建议的冲调比例,请咨询医护人员和专业营养师。
- 请保持操作环境的整洁和卫生,请保持提供的量勺的干燥清洁。
- 奶液过度摇晃,可能产生较多气泡,请待气泡破碎消失之后再喂哺宝宝。
- 已冲调好的本品应在调制后两小时内食用完,否则应丢弃。

温馨提示

- 1、本产品为乳基粉状产品,如粉体中有少量可见颜色物质或冲调时有少量点状物,其是维生素、矿物质类物质,属正常现象,请放心食用。
- 2、对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

臻佑



婴儿配方奶粉

(0-6月龄, 1段)

国食注字YP20230405

净含量: 400克

喂哺用量建议

冲调奶液时注意参照下表的奶粉量和温开水量进行冲调,用太少或过多于指定份量的奶粉,会令婴儿得不到适量的营养或导致脱水。未经医生建议切勿改变奶的浓度。一平均奶粉约为4.5克。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水用量(毫升)	奶粉(平均)	
0-1周	60	2	7-8
1-2周	90	3	5-6
2-4周	120	4	4-5
1-2月	150	5	4-5
2-4月	180	6	4-5
4-6月	210	7	4-5

冲调使用说明

- 1、冲调奶液前请先洗净双手。
- 2、将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净,使用前用沸水煮沸至少5分钟,待用。
- 3、将饮用水煮沸5分钟,冷却至50℃左右。
- 4、依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量,将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。
- 5、将所需的奶粉加入到奶瓶中。
- 6、盖紧奶瓶,轻轻晃动直至奶粉完全溶解。
- 7、待奶液温度适宜时,再给宝宝喂哺。



注: 冲调奶液时,请保证环境及操作过程的卫生。冲调方法不正确,可能影响宝宝健康。

贮存方法: 本产品应贮存于清洁阴凉干燥处,勿放入冰箱内;每次食用后及时将罐盖封严,开封后,建议1个月内食用完。

产品类别: 婴儿配方食品
 产品属性: 乳基粉状
 产品执行标准: GB 10765-2021
 生产许可证编号: SC10523128101060
 生产日期/批号: 见罐底
 保质期: 24个月
 曾用名: 欧芮雅
 生产商: 黑龙江丹凤乳业有限公司
 生产地址: 黑龙江省绥化市安达市康佳板业科技园区
 网址: <http://www.ouruier.vip>
 产品服务热线: 400-820-7003
 工作时间: 周一至周五 8:30-17:00



官方公众号



6 954180 501328

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1935
蛋白质	g	0.59	11.42
脂肪	g	1.11	21.56
亚油酸	g	0.15	2.99
α -亚麻酸	mg	16	309
碳水化合物	g	2.8	53.3
维生素			
维生素A	$\mu\text{g RE}$	26	507
维生素D	μg	0.69	13.33
维生素E	$\text{mg } \alpha\text{-TE}$	0.25	4.77
维生素K ₁	μg	2.44	47.19
维生素B ₁	μg	21	407
维生素B ₂	μg	34	649
维生素B ₆	μg	21.6	418.6
维生素B ₁₂	μg	0.090	1.733
烟酸(烟酰胺)	μg	179	3473
叶酸	μg	4.7	91.8
泛酸	μg	189	3662
维生素C	mg	3.8	72.7
生物素	μg	0.71	13.83
胆碱	mg	6.3	122.6
矿物质			
钠	mg	6	115
钾	mg	25	478
钙	mg	11.9	230.2
镁	mg	1.8	35.2
铁	mg	0.30	5.84
锌	mg	0.18	3.47
锰	μg	1.61	31.06
铜	mg	19	376
磷	mg	13	245
碘	μg	5.0	96.9
氯	mg	11	216
硒	μg	0.76	14.69
可溶性成分			
牛磺酸	mg	1.3	25.4
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	5.2	100.4
二十碳四烯酸(EA/ARA)	mg	6.1	119.0
低聚半乳糖	mg	84	1624
低聚果糖	mg	156	3024
叶黄素	μg	11	205
乳铁蛋白	mg	3.0	58

100毫升奶液=13.5克奶粉+90毫升温开水

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、柠檬酸钾、碳酸钾、磷酸三钙、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、乳清蛋白粉、L-抗坏血酸、牛磺酸、dl- α -酮酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄酯、叶黄素、烟酰胺、D-泛酸钙、D-生物素、叶酸、植物甲萘醌、核黄素、盐酸硫胺素、氰钴胺、硫酸镁、碘酸钾、硫酸亚铁、硫酸铜、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰、氯化胆碱、乳铁蛋白。

重要提示

- 本品含有乳及乳制品(包括乳糖)。
- 不恰当的准备、贮存和冲调本产品,可能会影响宝宝的健康。如若改变喂哺建议表中所建议的冲调比例,请咨询医护人员和专业营养师。
- 请保持操作环境的整洁和卫生,请保持提供的量勺的干燥清洁。
- 奶液过度摇晃,可能产生较多气泡,请待气泡被吸收之后再喂哺宝宝。
- 已冲调好的本品应在调制后两小时内食用完,否则应丢弃。

温馨提示

- 本产品为乳基粉状产品,如粉体中有少量可见颜色物质或冲调时有少量点状物,其是维生素、矿物质类物质,属正常现象,请放心食用。
- 对于6月以上的较大婴儿食用本品时,须配合添加辅食。

臻佑



较大婴儿配方奶粉
(6-12月龄, 2段)

国食注字YP20230406

净含量: 800克

喂哺用量建议

冲调奶液时注意参照下表的奶粉量和温开水量进行冲调,用太少或过多于指定份量的奶粉,会令婴儿得不到适量的营养或导致脱水。未经医生建议切勿改变奶的浓度。一平勺奶粉约为4.5克。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水量(毫升)	奶粉(平勺)	
6-9月	210	7	4
9-12月	240	8	3

冲调使用说明

- 1、冲调奶液前请先洗净双手。
- 2、将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净,使用前用沸水煮沸5分钟,待用。
- 3、将饮用水煮沸5分钟,冷却至50℃左右。
- 4、依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量,将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。
- 5、将所需的奶粉加入到奶瓶中。
- 6、盖紧奶瓶,轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- 7、待奶液温度适宜时,再给宝宝喂哺。



注: 冲调奶液时,请保证环境及操作过程的卫生。冲调方法不正确,可能影响宝宝健康。

贮存方法: 本产品应贮存于清洁阴凉干燥处,勿放入冰箱内;每次食用后及时将罐盖封严。开封后,建议1个月内食用完。

产品类别: 较大婴儿配方食品
产品属性: 乳基粉状
产品执行标准: GB 10766-2021
生产许可证编号: SC10523128101060
生产日期/批号: 见罐底
保质期: 24个月
曾用名: 欧芮雅
生产商: 黑龙江华丹乳业有限公司
生产地址: 黑龙江省绥化市安达市澳佳牧业科技园区
网址: <http://www.ouruier.vip>
产品服务热线: 400-820-7003
工作时间: 周一至周五 8:30-17:00



官方公众号



6 195418 015013 04

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1935
蛋白质	g	0.59	11.42
脂肪	g	1.11	21.56
亚油酸	g	0.15	2.99
α -亚麻酸	mg	16	309
碳水化合物	g	2.8	53.3
维生素			
维生素A	$\mu\text{g RE}$	26	507
维生素D	μg	0.69	13.33
维生素E	$\text{mg } \alpha\text{-TE}$	0.25	4.77
维生素K ₁	μg	2.44	47.19
维生素B ₁	μg	21	407
维生素B ₂	μg	34	649
维生素B ₆	μg	21.6	418.6
维生素B ₁₂	μg	0.090	1.733
烟酸(烟酰胺)	μg	179	3473
叶酸	μg	4.7	91.8
泛酸	μg	189	3662
维生素C	mg	3.8	72.7
生物素	μg	0.71	13.83
胆碱	mg	6.3	122.6
矿物质			
钠	mg	6	115
钾	mg	25	478
铜	μg	11.9	230.2
镁	mg	1.8	35.2
铁	mg	0.30	5.84
锌	mg	0.18	3.47
锰	μg	1.61	31.06
钙	mg	19	376
磷	mg	13	245
碘	μg	5.0	96.9
氯	mg	11	216
硒	μg	0.76	14.69
可选择成分			
牛磺酸	mg	1.3	25.4
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	5.2	100.4
二十碳四烯酸(EPA/ARA)	mg	6.1	119.0
低聚果糖	mg	84	1624
低聚半乳糖	mg	156	3024
叶黄素	μg	11	205
乳铁蛋白	mg	3.0	58

100毫升奶液=13.5克奶粉+90毫升温开水

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物油和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、花生四烯酸、柠檬酸钾、碳酸钾、磷酸三钙、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、乳清蛋白粉、L-抗坏血酸、牛磺酸、D- α -酮酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄酯、叶黄素、烟酰胺、D-泛酸钙、D-生物素、叶酸、植物甲萘醌、核黄素、盐酸硫胺素、胍钴胺、硫酸镁、硫酸钾、硫酸亚铁、硫酸铜、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰、氯化胆碱、乳铁蛋白。

重要提示

- 本品含有乳及乳制品(包括乳糖)。
- 不恰当的制备、贮存和冲调本产品,可能会影响宝宝的健康。如若改变喂哺建议表中所建议的冲调比例,请咨询医护人员和专业营养师。
- 请保持操作环境的整洁和卫生,请保持提供的量勺的干燥清洁。
- 奶液过度摇晃,可能产生较多气泡,请待气泡破裂消失之后再喂哺宝宝。
- 已冲调好的本品应在调制后两小时内食用完,否则应丢弃。

温馨提示

- 1、本产品为乳基粉状产品,如奶液中有少量可见颜色物质或冲调时有少量点状物,其是维生素、矿物质类物质,属正常现象,请放心食用。
- 2、对于6个月以上的较大婴儿食用本品时,须配合添加辅食。

臻佑



较大婴儿配方奶粉
(6-12月龄, 2段)

国食注字YP20230406

净含量: 400克

喂哺用量建议

冲调奶液时注意参照下表的奶粉量和温开水量进行冲调,用太少或过多于指定份量的奶粉,会令婴儿得不到适量的营养或导致脱水。未经医生建议切勿改变奶的浓度。一平均奶粉约为4.5克。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水用量(毫升)	奶粉(平均)	
6-9月	210	7	4
9-12月	240	8	3

冲调使用说明

- 1、冲调奶液前请先洗净双手。
- 2、将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净,使用前用沸水煮沸至少5分钟,待用。
- 3、将饮用水煮沸5分钟,冷却至50℃左右。
- 4、依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量,将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。
- 5、将所需的奶粉加入到奶瓶中。
- 6、盖紧奶瓶,轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- 7、待奶液温度适宜时,再给宝宝喂哺。



注:冲调奶液时,请保证环境及操作过程的卫生。冲调方法不正确,可能影响宝宝健康。

贮存方法:本产品应贮存于清洁阴凉干燥处,勿放入冰箱内;每次食用后及时将罐盖封严。开封后,建议1个月内食用完。

产品类别:较大婴儿配方食品
产品属性:乳基粉状
产品执行标准:GB 10766-2021
生产许可证编号:SC10523128101060
生产日期/批号:见罐底
保质期:24个月
曾用名:欧芮雅
生产商:黑龙江华丹乳业有限公司
生产地址:黑龙江省绥化市安达市澳佳农业科技园区
网址: <http://www.ouruier.vip>
产品服务热线:400-820-7003
工作时间:周一至周五 8:30-17:00



官方公众号



6 954180 501335

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1902
蛋白质	g	0.65	12.45
脂肪	g	1.05	19.95
亚油酸	g	0.12	2.35
α -亚麻酸	mg	14	262
碳水化合物	g	2.8	53.8
维生素			
维生素A	$\mu\text{g RE}$	28	524
维生素D	μg	0.71	13.51
维生素E	$\text{mg } \alpha\text{-TE}$	0.26	4.86
维生素K ₁	μg	2.51	47.82
维生素B ₁	μg	22	418
维生素B ₂	μg	37	708
维生素B ₆	μg	22.7	432.6
维生素B ₁₂	μg	0.099	1.888
烟酸(烟酰胺)	μg	191	3635
叶酸	μg	4.9	93.1
泛酸	μg	213	4043
维生素C	mg	3.9	73.7
生物素	μg	0.76	14.43
矿物质			
钠	mg	7	131
钾	mg	26	501
铜	μg	12.2	232.7
镁	mg	2.0	37.7
铁	mg	0.31	5.92
锌	mg	0.17	3.22
钙	mg	22	427
磷	mg	15	276
碘	μg	5.4	102.8
氯	mg	11	203
可选择成分			
硒	μg	0.82	15.64
胆碱	mg	6.5	123.8
牛磺酸	mg	1.3	25.6
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	1.8	33.4
二十二碳四烯酸(AA/ARA)	mg	2.4	44.8
低聚半乳糖	mg	87	1646
低聚果糖	mg	161	3065
叶黄素	μg	11	208
乳铁蛋白	mg	3.0	58

100毫升奶液=13.5克奶粉+90毫升温开水

配料表

——生牛乳加工——

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、碳酸钾、柠檬酸钾、磷酸三钙、乳清蛋白粉、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、L-抗坏血酸、牛磺酸、dl- α -醋酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄酯、叶黄素、烟酰胺、D-泛酸钙、D-生物素、核黄素、叶酸、植物甲萘醌、硫酸硫酸素、羧基胺、硫酸镁、硫酸钾、硫酸亚铁、硫酸铜、硫酸锌、亚硒酸钠、氯化胆碱、乳铁蛋白。

重要提示

- 本品含有乳及乳制品(包括乳糖)。
- 不恰当的准备、贮存和冲调本产品,可能会影响宝宝的健康。如若改变喂哺建议表中所建议的冲调比例,请咨询医护人员和专业营养师。
- 请保持操作环境的整洁和卫生,请保持提供的量勺的干燥清洁。
- 奶液过度摇晃,可能产生较多气泡,请待气泡破碎消失之后再喂给宝宝。
- 已冲调好的本品应在调制后两小时内食用完,否则应丢弃。

温馨提示

本产品为乳基粉状产品,如粉体中有少量可见颜色物质或冲调时有少量点状物,其是维生素、矿物质类物质,属正常现象,请放心食用。

臻佑



幼儿配方奶粉

(12-36月龄,3段)

国食注字YP20230407

净含量: 800克

喂哺用量建议

冲调奶液时注意参照下表的奶粉量和温开水量进行冲调,用太少或过多于指定份量的奶粉,会令婴儿得不到适量的营养或导致脱水。未经医生建议切勿改变奶的浓度。一平勺奶粉约为4.5克。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水量(毫升)	奶粉(平勺)	
12-36月	240	8	2-3

冲调使用说明

- 1、冲调奶液前请先洗净双手。
- 2、将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净,使用前用沸水煮沸至少5分钟,待用。
- 3、将饮用水煮沸5分钟,冷却至50℃左右。
- 4、依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量,将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。
- 5、将所需的奶粉加入奶瓶中。
- 6、盖紧奶瓶,轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- 7、待奶液温度适宜时,再给宝宝喂哺。



注:冲调奶液时,请保证环境及操作过程的卫生。冲调方法不正确,可能影响宝宝健康。

贮存方法:本产品应贮存于清洁阴凉干燥处,勿放入冰箱内;每次食用后及时将罐盖封严,开封后,建议1个月内食用完。

产品类别: 幼儿配方食品
产品属性: 乳基粉状
产品执行标准: GB 10767-2021
生产许可证编号: SC10523128101060
生产日期/批号: 见罐底
保质期: 24个月
曾用名: 欧恩雅
生产商: 黑龙江华丹乳业有限公司
生产地址: 黑龙江省绥化市安达市滨佳农业科技园区
网址: <http://www.ouruier.vip>
产品服务热线: 400-820-7003
工作时间: 周一至周五 8:30-17:00



官方公众号



619541801501311

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1902
蛋白质	g	0.65	12.45
脂肪	g	1.05	19.95
亚油酸	g	0.12	2.35
α -亚麻酸	mg	14	262
碳水化合物	g	2.8	53.8
维生素			
维生素A	$\mu\text{g RE}$	28	524
维生素D	μg	0.71	13.51
维生素E	$\text{mg } \alpha\text{-TE}$	0.26	4.86
维生素K ₁	μg	2.51	47.82
维生素B ₁	μg	22	418
维生素B ₂	μg	37	708
维生素B ₆	μg	22.7	432.6
维生素B ₁₂	μg	0.089	1.888
烟酸(烟酰胺)	μg	191	3635
叶酸	μg	4.9	93.1
泛酸	μg	213	4043
维生素C	mg	3.9	73.7
生物素	μg	0.76	14.43
矿物质			
钠	mg	7	131
钾	mg	26	501
铜	μg	12.2	232.7
镁	mg	2.0	37.7
铁	mg	0.31	5.92
锌	mg	0.17	3.22
钙	mg	22	427
磷	mg	15	276
碘	μg	5.4	102.8
氯	mg	11	203
可溶性成分			
糖	μg	0.82	15.64
胆碱	mg	6.5	123.8
牛磺酸	mg	1.3	25.6
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	1.8	33.4
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	2.4	44.8
低聚半乳糖	mg	87	1646
低聚果糖	mg	161	3065
叶黄素	μg	11	208
乳铁蛋白	mg	3.0	58

100毫升奶液=13.5克奶粉+90毫升温开水

配料表

——生牛乳加工——

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(玉米油、低芥酸菜籽油、椰子油、葵花籽油、大豆油)、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、碳酸钾、柠檬酸钾、磷酸三钙、乳清蛋白粉、花生四烯酸、二十二碳六烯酸油酯(发酵法)、L-抗坏血酸、牛磺酸、dl- α -醋酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄酯、叶黄素、烟酰胺、D-泛酸钙、D-生物素、核黄素、叶酸、植物甲萘醌、硫酸硫酸素、葡萄糖、硫酸镁、硫酸钾、硫酸亚铁、硫酸铜、硫酸锌、亚硒酸钠、氯化胆碱、乳铁蛋白。

重要提示

- 本品含有乳及乳制品(包括乳糖)。
- 不恰当的制备、贮存和冲调本产品,可能会影响宝宝的健康。如若改变喂哺建议表中所建议的冲调比例,请咨询医护人员和专业营养师。
- 请保持操作环境的整洁和卫生,请保持提供的量勺的干燥清洁。
- 奶液过度摇晃,可能产生较多气泡,请将气泡破碎消失之后再喂哺宝宝。
- 已冲调好的本品应在调制后两小时内食用完,否则应丢弃。

温馨提示

本产品为乳基粉状产品,如粉体中有少量可见颜色物质或冲调时有少量点状物,其是维生素、矿物质类物质,属正常现象,请放心食用。

臻佑



幼儿配方奶粉
(12-36月龄,3段)

国食注字YP20230407

净含量: 400克

喂哺用量建议

冲调奶液时注意参照下表的奶粉量和温开水量进行冲调,用过多或少于指定份量的奶粉,会令婴儿得不到适量的营养或导致脱水。未经医生建议切勿改变奶的浓度。一平勺奶粉约为4.5克。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水量(毫升)	奶粉(平勺)	
12-36月	240	8	2-3

冲调使用说明

1. 冲调奶液前请先洗净双手。
2. 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净,使用前用沸水煮沸至少5分钟,待用。
3. 将饮用水煮沸5分钟,冷却至50℃左右。
4. 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量,将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。
5. 将所需的奶粉加入到奶瓶中。
6. 盖紧奶瓶盖,轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
7. 待奶液温度适宜时,再给宝宝喂哺。



注: 冲调奶液时, 请保证环境及操作过程的卫生。冲调方法不正确, 可能影响宝宝健康。

贮存方法: 本产品应贮存于清洁阴凉干燥处, 勿放入冰箱内; 每次食用后及时将罐盖封严。开封后, 建议1个月内食用完。

产品类别: 幼儿配方食品
产品属性: 乳基粉状
产品执行标准: GB 10767-2021
生产许可证编号: SC10523128101060
生产日期/批号: 见罐底
保质期: 24个月
曾用名: 欧芮雅
生产商: 黑龙江华丹乳业有限公司
生产地址: 黑龙江省绥化市安达市澳佳农业科技园区
网址: <http://www.ouruier.vip>
产品服务热线: 400-820-7003
工作时间: 周一至周五 8:30-17:00



官方公众号



6 954180 501342

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、玉米油)、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、乳清蛋白粉、柠檬酸钠、氯化钾、碳酸钙、磷酸三钙、L-抗坏血酸、牛磺酸、肌醇、dl-α-酮酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄醇、烟酰胺、D-泛酸钙、叶酸、植物甲萘醌、D-生物素、核黄素、盐酸硫胺素、氰钴胺、硫酸镁、磷酸钾、硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰、氯化胆碱、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、左旋肉碱、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

过敏原信息:本品含有乳及乳制品。

冲调方法及食用说明



喂哺建议表

100毫升奶液=13.5克奶粉+90毫升温开水;一平勺奶粉约为4.5克,听盖内附有专用量勺。

喂哺建议表是根据平均需要量而定,请遵照表中所建议的比例用量冲调。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水用量(毫升)	奶粉(平勺)	
0-1周	60	2	7-8
1-2周	90	3	5-6
2-4周	120	4	4-5
1-2个月	150	5	4-5
2-4个月	180	6	4-5
4-6个月	210	7	4-5

注意事项

未经煮沸消毒过的水、奶瓶或不恰当的温度均有可能引起宝宝不适。
每次尽可能准备一次喂量,并及时给宝宝喂哺,不要将未喝完的奶液留存。

产品类别:婴儿配方食品

产品属性:乳基粉状

执行标准:GB 10765-2021

生产许可证编号:SC10523128101060

生产日期/批号:见罐底

保质期:24个月

生产商:黑龙江华丹乳业有限公司

生产地址:黑龙江省绥化市安达市澳佳牧业科

技园区

产品曾用名:爱哺婴儿配方乳粉(0-6月龄,

1段)

服务热线:

400-660-3567

了解更多产品和服务资讯

欢迎扫描官方微信二维码



6 954180 509065



稚因爱

婴儿配方奶粉 (0-6月龄, 1段)



净含量:800克

国食注字YP20170696

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2002
蛋白质	g	0.52	10.37
脂肪	g	1.25	24.95
亚油酸	g	0.20	3.93
α-亚麻酸	mg	19	380
碳水化合物	g	2.5	50.9
维生素			
维生素A	μg RE	24	489
维生素D	μg	0.64	12.91
维生素E	mg α-TE	0.18	3.64
维生素K ₁	μg	2.06	41.26
维生素B ₁	μg	19	379
维生素B ₂	μg	34	674
维生素B ₆	μg	19.1	382.5
维生素B ₁₂	μg	0.078	1.566
烟酸(烟酰胺)	μg	152	3044
叶酸	μg	5.0	100.3
泛酸	μg	203	4055
维生素C	mg	4.2	83.2
生物素	μg	0.56	11.27
胆碱	mg	6.3	126.4
矿物质			
钠	mg	10	191
钾	mg	23	454
钙	μg	17.5	350.8
镁	mg	1.6	32.3
铁	mg	0.17	3.43
锌	μg	0.18	3.56
锰	μg	1.95	39.11
铜	μg	16	314
磷	mg	10	206
碘	μg	4.9	98.4
氯	mg	16	314
硒	μg	1.06	21.15
可选择成分			
肌醇	mg	1.8	36.1
牛磺酸	mg	1.3	25.7
左旋肉碱	mg	0.6	11.9
低聚半乳糖	mg	83	1657
低聚果糖	mg	154	3085
1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	g	0.45	9.10
核苷酸	mg	1.65	33.12

重要声明:

对于0-6月龄的婴儿最理想的食品是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

贮存方法


每次食用后请将罐口封严,且置于清洁阴凉干燥处保存。

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、玉米油)、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、乳清蛋白粉、柠檬酸钠、氯化钾、碳酸钾、磷酸三钙、L-抗坏血酸、牛磺酸、肌醇、dl-α-酮酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、胆钙化醇、烟酰胺、D-泛酸钙、叶酸、植物甲萘酮、D-生物素、核黄素、盐酸硫胺素、氯化钾、硫酸钾、硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰、氯化胆碱、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、左旋肉碱、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

过敏原信息:本品含有乳及乳制品。

冲调方法及食用说明



喂哺建议表

100毫升奶液=13.5克奶粉+90毫升温开水;一平勺奶粉约为4.5克,听盖内附有专用量勺。
喂哺建议表是根据平均需要量而定,请遵照表中所建议的比例用量冲调。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水用量(毫升)	奶粉(平勺)	
0-1周	60	2	7-8
1-2周	90	3	5-6
2-4周	120	4	4-5
1-2个月	150	5	4-5
2-4个月	180	6	4-5
4-6个月	210	7	4-5

注意事项

未经煮沸消毒过的水、奶瓶或不恰当的浓度均有可能引起宝宝不适。
每次尽可能准备一次喂量,并及时给宝宝喂哺,不要将未喝完的奶液留存。

产品类别:婴儿配方食品

产品属性:乳基粉状

执行标准:GB 10765-2021

生产许可证编号:SC10523128101060

生产日期/批号:见罐底

保质期:24个月

生产商:黑龙江华丹乳业有限公司

生产地址:黑龙江省绥化市安达市澳佳牧业科技园

产品曾用名:爱维婴儿配方乳粉(0-6月龄,1段)



6 954180 500611



稚因爱

婴儿配方奶粉 (0-6月龄,1段)



净含量:400克

国食注字YP20170696

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2002
蛋白质	g	0.52	10.37
脂肪	g	1.25	24.95
亚油酸	g	0.20	3.93
α-亚麻酸	mg	19	380
碳水化合物	g	2.5	50.9
维生素			
维生素A	μg RE	24	489
维生素D	μg	0.64	12.91
维生素E	mg α-TE	0.18	3.64
维生素K ₁	μg	2.06	41.26
维生素B ₁	μg	19	379
维生素B ₂	μg	34	674
维生素B ₆	μg	19.1	382.5
维生素B ₁₂	μg	0.078	1.566
烟酸(尼克酸)	μg	152	3044
叶酸	μg	5.0	100.3
泛酸	μg	203	4055
维生素C	mg	4.2	83.2
生物素	μg	0.56	11.27
胆碱	mg	6.3	126.4
矿物质			
钠	mg	10	191
钾	mg	23	454
铜	μg	17.5	350.8
镁	mg	1.6	32.3
铁	mg	0.17	3.43
锌	mg	0.18	3.56
锰	μg	1.95	39.11
钙	mg	16	314
磷	mg	10	206
碘	μg	4.9	98.4
硒	μg	16	314
铬	μg	1.06	21.15
可选择成分			
肌醇	mg	1.8	36.1
牛磺酸	mg	1.3	25.7
左旋肉碱	mg	0.6	11.9
低聚半乳糖	mg	83	1657
低聚果糖	mg	154	3085
1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	g	0.45	9.10
核苷酸	mg	1.65	33.12

重要声明:

对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

贮存方法

每次食用后将罐口封严,且置于清洁阴凉干燥处保存。

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油酯、大豆油、玉米油)、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、乳清蛋白粉、柠檬酸钾、磷酸钙、磷酸三钙、L-抗坏血酸、牛磺酸、肌醇、dl-α-醋酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、胆钙化醇、烟酰胺、D-泛酸钙、D-生物素、叶酸、植物甲萘醌、核黄素、盐酸硫胺素、氰钴胺、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸铜、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰、氯化胆碱、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、左旋肉碱。

过敏原信息:本品含有乳及乳制品。

冲调方法及食用说明



喂哺建议表

100毫升奶液=13.5克奶粉+90毫升温开水;一平勺奶粉约为4.5克,听盖内附有专用量勺。

喂哺建议表是根据平均需要量而定,请遵照表中所建议的比例用量冲调。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水用量(毫升)	奶粉(平勺)	
6-9个月	210	7	4
9-12个月	240	8	3

注意事项

未经煮沸消毒过的水、奶瓶或不恰当的浓度均有可能引起宝宝不适。
每次尽可能准备一次喂量,并及时给宝宝喂哺,不要将未喝完的奶液留存。

产品类别:较大婴儿配方食品
产品属性:乳基粉状
执行标准:GB 10766-2021
生产许可证编号:SC10523128101060
生产日期/批号:见罐底
保质期:24个月
生产商:黑龙江华丹乳业有限公司
生产地址:黑龙江省绥化市安达市澳佳牧业科技园
产品曾用名:赋博较大婴儿配方乳粉(6-12月龄,2段)

服务热线:
400-660-3567
了解更多产品和服务资讯
欢迎扫描官方微信二维码



6 954180 509072



稚因爱

较大婴儿配方奶粉 (6-12月龄, 2段)



净含量:800克

国食注字YP20170697

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1951
蛋白质	g	0.60	11.73
脂肪	g	1.15	22.38
亚油酸	g	0.15	2.97
α-亚麻酸	mg	16	309
碳水化合物	g	2.7	52.1
维生素			
维生素A	μg RE	27	518
维生素D	μg	0.70	13.59
维生素E	mg α-TE	0.25	4.87
维生素K ₁	μg	2.47	48.14
维生素B ₁	μg	21	415
维生素B ₂	μg	34	663
维生素B ₆	μg	21.9	427.1
维生素B ₁₂	μg	0.091	1.766
烟酸(烟酰胺)	μg	181	3535
叶酸	μg	4.8	93.8
泛酸	μg	191	3736
维生素C	mg	3.8	74.1
生物素	μg	0.72	14.13
胆碱	mg	6.5	126.1
矿物质			
钠	mg	6	118
钾	mg	25	490
铜	μg	12.1	236.0
镁	mg	1.8	36.0
铁	mg	0.31	5.96
锌	mg	0.18	3.54
锰	μg	1.62	31.69
钙	mg	20	385
磷	mg	13	252
碘	μg	5.1	99.1
氯	mg	11	221
硒	μg	0.79	15.35
可选择成分			
肌醇	mg	1.9	36.4
牛磺酸	mg	1.3	25.9
左旋肉碱	mg	0.6	12.3
低聚半乳糖	mg	85	1657
低聚果糖	mg	158	3085
1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油酯	g	0.36	7.01
核苷酸	mg	1.70	33.19

重要声明:

6-12月龄的较大婴儿食用本品时,须配合添加辅食。

贮存方法

每次食用后请将罐口封严,且置于清洁阴凉干燥处保存。

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、玉米油)、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、乳清蛋白粉、柠檬酸钾、磷酸钙、磷酸三钙、L-抗坏血酸、牛磺酸、肌醇、dl-α-磷酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄醇、烟酰胺、D-泛酸钙、D-生物素、叶酸、植物甲萘酚、核黄素、盐酸硫胺素、氰钴胺、硫酸镁、磷酸钾、硫酸亚铁、硫酸铜、硫酸锌、亚硒酸钠、硫酸锰、氯化胆碱、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、左旋肉碱。

过敏原信息:本品含有乳及乳制品。

冲泡方法及食用说明



喂哺建议表

100毫升奶液=13.5克奶粉+90毫升温开水;一平勺奶粉约为4.5克,听盖内附有专用量勺。
喂哺建议表是根据平均需要量而定,请遵照表中所建议的比例用量冲调。

月龄	每次喂哺量 温开水用量(毫升)	奶粉(平勺)	每日喂哺次数
6-9个月	210	7	4
9-12个月	240	8	3

注意事项

未经煮沸消毒过的水、奶瓶或不恰当的浓度均有可能引起宝宝不适。
每次尽可能准备一次喂量,并及时给宝宝喂哺,不要将未喝完的奶液留存。

产品类别:较大婴儿配方食品
产品属性:乳基粉状
执行标准:GB 10766-2021
生产许可证编号:SC10523128101060
生产日期/批号:见罐底
保质期:24个月
生产商:黑龙江华丹乳业有限公司
生产地址:黑龙江省绥化市安达市澳佳牧业科技园区
联系电话:0455-7567777
产品曾用名:赋博较大婴儿配方乳粉(6-12月龄,2段)

服务热线:
400-660-3567
了解更多产品和服务资讯
欢迎扫描官方微信二维码
或登录<http://www.huadanrue.com>



稚因爱

较大婴儿配方奶粉 (6-12月龄,2段)



净含量:400克
国食注字YP20170697

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1951
蛋白质	g	0.60	11.73
脂肪	g	1.15	22.38
亚油酸	g	0.15	2.97
α-亚麻酸	mg	16	309
碳水化合物	g	2.7	52.1
维生素			
维生素A	μg RE	27	518
维生素D	μg	0.70	13.59
维生素E	mg α-TE	0.25	4.87
维生素K	μg	2.47	48.14
维生素B ₁	μg	21	415
维生素B ₂	μg	34	663
维生素B ₆	μg	21.9	427.1
维生素B ₁₂	μg	0.091	1.766
烟酸(烟酰胺)	μg	181	3535
叶酸	μg	4.8	93.8
泛酸	μg	191	3736
维生素C	mg	3.8	74.1
生物素	μg	0.72	14.13
胆碱	mg	6.5	126.1
矿物质			
钠	mg	6	118
钾	mg	25	490
钙	μg	12.1	236.0
镁	mg	1.8	36.0
铁	mg	0.31	5.96
锌	mg	0.18	3.54
铜	μg	1.62	31.69
磷	mg	20	385
碘	mg	13	252
硒	μg	5.1	99.1
氯	mg	11	221
硫	μg	0.79	15.35
可选择成分			
肌醇	mg	1.9	36.4
牛磺酸	mg	1.3	25.9
左旋肉碱	mg	0.6	12.3
低聚半乳糖	mg	85	1657
低聚果糖	mg	158	3085
1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	g	0.36	7.01
核苷酸	mg	1.70	33.19

重要声明:
6-12月龄的较大婴儿食用本品时,须配合添加辅食。

贮存方法

每次食用后请将罐口封严,且置于清洁阴凉干燥处保存。

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、玉米油)、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、乳清蛋白粉、柠檬酸钾、碳酸钙、磷酸三钙、L-抗坏血酸、牛磺酸、肌醇、dl-α-醋酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、维生素A、烟酰胺、D-泛酸钙、D-生物素、核黄素、叶酸、植物甲萘醌、硫酸硫胺素、氰钴胺、硫酸镁、硫酸钾、硫酸亚铁、硫酸铜、硫酸锌、氯化胆碱、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、左旋肉碱。

过敏原信息:本品含有乳及乳制品。

冲调方法及食用说明

1	1)用清水洗净双手和所有用具。 2)将奶瓶、奶嘴在沸水中煮沸消毒。	3	4)按喂哺用量建议表,用量勺量取正确份量的奶粉倒入奶瓶。
2	3)将饮用水煮沸5分钟并冷却至约40°C,将正确份量的温水倒入已经消毒过的奶瓶中。	4	5)盖紧奶瓶,轻摇至奶粉完全溶解。 6)喂哺前测试奶液的温度,是否适宜宝宝食用。调制好的奶液建议在1个小时内喂哺,食用后剩余的奶液应弃用。

喂哺建议表

100毫升奶液=13.5克奶粉+90毫升温开水;一平勺奶粉约为4.5克,听盖内附有专用量勺。

喂哺建议表是根据平均需要量而定,请遵照表中所建议的比例用量冲调。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水用量(毫升)	奶粉(平勺)	
12-36个月	240	8	2-3

注意事项

未经煮沸消毒过的水、奶瓶或不恰当的浓度均有可能引起宝宝不适。

每次尽可能准备一次喂量,并及时给宝宝喂哺,不要将未喝完的奶液留存。

产品类别:幼儿配方食品

产品属性:乳基粉状

执行标准:GB 10767-2021

生产许可证编号:SC10523128101060

生产日期/批号:见罐底

保质期:24个月

生产商:黑龙江华丹乳业有限公司

生产地址:黑龙江省绥化市安达市澳佳牧业科技园

产品曾用名:赋博幼儿配方乳粉(12-36月龄,3段)

服务热线:

400-660-3567

了解更多产品和服务资讯

欢迎扫描官方微信二维码



6 954180 509089



稚因爱

幼儿配方奶粉 (12-36月龄,3段)



净含量:800克

国食注字YP20220001

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1920
蛋白质	g	0.67	12.78
脂肪	g	1.09	20.89
亚油酸	g	0.12	2.35
α-亚麻酸	mg	14	264
碳水化合物	g	2.7	52.5
维生素			
维生素A	μg RE	27	527
维生素D	μg	0.71	13.59
维生素E	mg α-TE	0.25	4.89
维生素K ₁	μg	2.51	48.14
维生素B ₁	μg	22	421
维生素B ₂	μg	37	709
维生素B ₆	μg	22.7	435.5
维生素B ₁₂	μg	0.099	1.899
烟酸(烟酰胺)	μg	190	3644
叶酸	μg	4.9	93.8
泛酸	μg	212	4070
维生素C	mg	3.9	74.2
生物素	μg	0.76	14.54
矿物质			
钠	mg	7	133
钾	mg	26	506
铜	μg	12.3	235.4
镁	mg	2.0	37.6
铁	mg	0.31	5.96
锌	mg	0.17	3.25
钙	mg	22	428
磷	mg	15	279
碘	μg	5.4	103.7
氯	mg	14	261
可选择成分			
胆碱	mg	6.5	125.7
锰	μg	1.62	31.17
肌醇	mg	1.9	36.2
牛磺酸	mg	1.3	25.8
左旋肉碱	mg	0.7	12.5
低聚半乳糖	mg	86	1657
低聚果糖	mg	161	3085
1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	g	0.29	5.66
核苷酸	mg	1.73	33.20

贮存方法

每次食用后将罐口封严,且置于清洁阴凉干燥处保存。

配料表

生牛乳、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、大豆油、玉米油)、乳糖、低聚半乳糖、低聚果糖、乳清蛋白粉、柠檬酸钾、磷酸钙、磷酸三钙、L-抗坏血酸、牛磺酸、肌醇、dl-α-醋酸生育酚、盐酸吡哆醇、胆钙化醇、醋酸视黄酯、烟酰胺、D-泛酸钙、D-生物素、核黄素、叶酸、植物甲萘醌、硫酸硫酸素、氰钴胺、硫酸镁、碘酸钾、硫酸亚铁、硫酸铜、硫酸锌、硫酸锰、氯化胆碱、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12、左旋肉碱。

过敏原信息:本品含有乳及乳制品。

冲泡方法及食用说明



喂哺建议表

100毫升奶液=13.5克奶粉+90毫升温开水;一平勺奶粉约为4.5克,听盖内附有专用量勺。

喂哺建议表是根据平均需要量而定,请遵照表中所建议的比例用量冲调。

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水用量(毫升)	奶粉(平勺)	
12-36个月	240	8	2-3

注意事项

未经煮沸消毒过的水、奶瓶或不恰当的浓度均有可能引起宝宝不适。
每次尽可能准备一次喂量,并及时给宝宝喂哺,不要将未喝完的奶液留存。

产品类别:幼儿配方食品
产品属性:乳基粉状
执行标准:GB 10767-2021
生产许可证编号:SC10523128101060
生产日期/批号:见罐底
保质期:24个月
生产商:黑龙江华丹乳业有限公司
生产地址:黑龙江省绥化市安达市澳佳牧业科技园
联系电话:0455-7567777
产品曾用名:爱博幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段)

服务热线:
400-660-3567
了解更多产品和服务资讯
欢迎扫描官方微信二维码
或登录<http://www.huadanruiye.com>



6 954180 500673



稚因爱

幼儿配方奶粉 (12-36月龄,3段)



净含量:400克

国食注字YP20220001

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1920
蛋白质	g	0.67	12.78
脂肪	g	1.09	20.89
亚油酸	g	0.12	2.35
α-亚麻酸	mg	14	264
碳水化合物	g	2.7	52.5
维生素			
维生素A	μg RE	27	527
维生素D	μg	0.71	13.59
维生素E	mg α-TE	0.25	4.89
维生素K	μg	2.51	48.14
维生素B ₁	μg	22	421
维生素B ₂	μg	37	709
维生素B ₆	μg	22.7	435.5
维生素B ₁₂	μg	0.099	1.899
烟酸(烟酰胺)	μg	190	3644
叶酸	μg	4.9	93.8
泛酸	μg	212	4070
维生素C	mg	3.9	74.2
生物素	μg	0.76	14.54
矿物质			
钠	mg	7	133
钾	mg	26	506
铜	μg	12.3	235.4
镁	mg	2.0	37.6
铁	mg	0.31	5.96
锌	mg	0.17	3.25
钙	mg	22	428
磷	mg	15	279
碘	μg	5.4	103.7
氯	mg	14	261
可选择成分			
胆碱	mg	6.5	125.7
锰	μg	1.62	31.17
肌醇	mg	1.9	36.2
牛磺酸	mg	1.3	25.8
左旋肉碱	mg	0.7	12.5
低聚半乳糖	mg	86	1657
低聚果糖	mg	161	3085
1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	g	0.29	5.66
核苷酸	mg	1.73	33.20

贮存方法

每次食用后将罐口封严,且置于清洁阴凉干燥处保存。