

变更后



爱诺达



1 段

净含量:800克
国食注字 YP20240025

婴儿配方奶粉(0-6月龄, 1段)

配料 Ingredients

脱盐乳清粉、全脂奶粉、食用植物调和油(1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、菜籽油、棕榈仁油、葵花籽油、磷脂)、乳糖、无水奶油、低聚果糖、浓缩乳清蛋白粉、聚葡萄糖、乳清蛋白粉、水解乳清蛋白粉、脂肪酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、柠檬酸钠、氯化钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

！ 过敏提示：本品含乳制品及大豆制品。

生产商：黑龙江安嘉乳业有限公司
地址：黑龙江省铁力农场场直二八九大街9号
产地：黑龙江省伊春市
曾用名：倍顺
食品生产许可证编号：SC10523300800298
产品标准号：GB 10765-2021
产品类别及属性：乳基婴儿配方乳粉
保质期：24个月
批号、生产日期及保质期(至)：见罐底
检验合格证号：同批号
贮存条件：常温、阴凉干燥处



6 948894 001298

营养成分表 nutrition information

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2067
蛋白质	g	0.54	11.10
乳清蛋白	g	0.35	7.25
脂肪	g	1.25	25.90
亚油酸	g	0.14	2.82
α-亚麻酸	mg	21	430
碳水化合物	g	2.5	52.0
维生素			
维生素A	μg RE	18	372
维生素D	μg	0.57	11.81
维生素E	mg α-TE	0.24	4.90
维生素K1	μg	2.31	47.80
维生素B1	μg	20	422
维生素B2	μg	43	892
维生素B6	μg	19.4	401.0
维生素B12	μg	0.078	1.620
烟酸(烟酰胺)	μg	202	4172
叶酸	μg	5.1	104.5
泛酸	μg	170	3519
维生素C	mg	3.7	77.5
生物素	μg	1.00	20.70
胆碱	mg	6.5	135.0
矿物质			
钠	mg	9	180
钾	mg	18	377
铜	μg	18.3	378.0
镁	mg	1.8	36.2
铁	mg	0.19	3.96
锌	mg	0.19	3.94
锰	μg	4.64	96.00
钙	mg	16	326
磷	mg	11	234
碘	μg	4.4	90.0
氯	mg	19	383
硒	μg	0.97	20.00
可选择成分			
肌醇	mg	1.8	37.9
牛磺酸	mg	2.1	44.0
左旋肉碱	mg	0.4	9.1
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.0	83.7
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.4	90.4
低聚果糖	mg	135.46	2800.00
聚葡萄糖	mg	82.24	1700.00
1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	g	0.17	3.5
叶黄素	μg	4.0	82.0
核苷酸	mg	1.0	21.0
乳铁蛋白	mg	1.0	20.0

每100毫升奶液含奶粉13.5克

AJRY-27

爱诺达婴儿配方奶粉(0-6月龄, 1段)



喂哺建议表 Feeding Table

月龄	奶粉量(平匙)	水用量(毫升)	每天喂哺次数
0~1周	1	30	8
1~2周	2	60	7
2~4周	3	90	6
1~2月龄	4	120	5~6
2~4月龄	5	150	5
4~6月龄	6	180	5

注：请使用本品随附专用量匙，1平匙奶粉≈4.5g

注意事项 Attention

请遵照冲调及食用方法和喂哺用量建议表喂哺，除非有专业资质人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害。切记不要将冲调好喝剩的奶液留到下次食用。请在保质期内食用，开封后必须保证密封，建议在一个月内用完。如您发现包装破损、变形或其他任何疑问请勿食用，并致电贝因美咨询服务热线95105377或400-1777-177。

重要声明 Important Notice

对于0~6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

咨询服务热线 Enquiry Hotline

①95105377
②400-1777-177
(免拨区号，市话费)
了解更多产品和服务资讯欢迎登录
www.beingmate.com

转奶小贴士 Milk Transfer Tips

奶粉换品牌换阶段都涉及配方不同，为了顺利适应，需要给宝宝循序渐进的进行转奶过渡，以宝宝每天吃5顿奶粉为例：

原奶粉	新奶粉
第1~3天 50% 50%	第8~9天 50% 50%
第4~5天 50% 50%	第10天 50% 50%
第6~7天 50% 50%	

温馨提示：转奶应在宝宝身体健康时进行，在生病或者出现其他身体不适情况下不宜转奶。同时，转奶时注意观察宝宝大便的性状，以便掌握宝宝转奶的适应情况。以上建议仅供参考，实际需根据宝宝的具体情况加以判断和调整。

食用方法 Preparation

- 用清水洗净双手和所有用具。
- 将奶瓶和奶嘴在沸水中煮沸消毒。
- 将饮用水煮沸5分钟并冷却至约50°C，将正确份量的温水倒入已消毒过的奶瓶。
- 按喂哺用量建议表，用量匙量取正确份量的奶粉倒入奶瓶。
- 盖好瓶盖，摇晃奶瓶直至奶粉完全溶解。
- 喂哺前测试奶的温度，是否适宜宝宝食用。调制好的奶液建议在1小时内喂哺，食用后剩余的奶液应弃用。

图示仅作参考，请以实物为准

变更前

喂养建议表			
月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量 (mL)	专用平匙数
0-1周	8	30	1
1-2周	7	60	2
2周-1月龄	6	90	3
1-2月龄	5-6	120	4
2-4月龄	5	150	5
4-6月龄	5	180	6

注：请使用本品随附专用量匙，1平匙奶粉≈4.5g

也可根据宝宝个体差异，按照医生建议，调整喂哺量。未经医生建议请勿随意改变喂哺量。
请按照喂哺建议表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。

食用方法	
	1. 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净，使用前用沸水煮沸至少5分钟，待用。 冲调前请清洗双手并保持环境卫生。
	2. 将饮用水煮沸5分钟，冷却至50℃左右。
	3. 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量，将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。
	4. 将所需的奶粉加入到奶瓶中。
	5. 盖紧奶瓶，轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
	6. 待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。

重要声明
对于0~6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。


温馨提示
- 请按以上方法冲调奶粉，方法不当可能会影响宝宝健康。 - 冲调好的奶液应在1小时内喂哺完，剩余的奶液应丢弃。 - 冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。 - 本品含有乳糖和蛋白质，乳糖不耐和蛋白质过敏体质的宝宝慎用或遵医嘱。



咨询热线:(周一至周五9:00-17:00)
400-6798-911
www.inboschina.com



倍顺



配料表	
脱盐乳清粉、全脂奶粉、食用植物调和油(1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、菜籽油、棕榈仁油、葵花籽油、磷脂)、乳糖、无水奶油、低聚果糖、浓缩乳清蛋白粉、聚葡萄糖、乳清蛋白粉、水解乳清蛋白粉、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘酚、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、葡胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、柠檬酸钠、氯化钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸(DHA)、花生四烯酸(ARA)、叶黄素、核甘酸(5'-胞苷二钠、5'-尿苷二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷二钠、5'-鸟苷二钠)、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。	

生产商：黑龙江安嘉乳业有限公司
地址：黑龙江省铁力农场场直二八九大街9号
产地：黑龙江省伊春市
食品生产许可证编号：SC10523300800298
营销热线：0571-86852110
产品标准代号：GB 10765-2021
产品类别、属性：婴儿配方奶粉
保质期：24个月
批号、生产日期及保质期(至)：见罐底
检验合格证号：同批号

1 段
净含量:800克
国食注字 YP20240025

营养成分表				
项目	单位	100g 每 100g	100g 每 100g	100g 每 100g
		每 100g	每 100g	每 100g
能量	kJ	100	2067	100
蛋白质	g	0.54	11.10	11.10
乳清蛋白	g	0.35	7.25	7.25
脂肪	g	1.25	25.90	25.90
亚油酸	g	0.14	2.82	2.82
α-亚麻酸	mg	21	430	430
碳水化合物	g	2.5	52.0	52.0
维生素A	μg RE	18	372	372
维生素D	μg	0.57	11.81	11.81
维生素E	mg α-TE	0.24	4.90	4.90
维生素K	μg	2.31	47.80	47.80
维生素B ₁	μg	20	422	422
维生素B ₂	μg	43	892	892
维生素B ₆	μg	19.4	401.0	401.0
维生素B ₁₂	μg	0.078	1.620	1.620
烟酸(烟酰胺)	μg	202	4172	4172
叶酸	μg	5.1	104.5	104.5
泛酸	μg	170	3519	3519
维生素C	mg	3.7	77.5	77.5
生物素	μg	1.00	20.70	20.70
胆碱	mg	6.5	135.0	135.0
矿物质				
钠	mg	9	180	180
钾	mg	18	377	377
铜	μg	18.3	378.0	378.0
镁	mg	1.8	36.2	36.2
铁	mg	0.19	3.96	3.96
锌	mg	0.19	3.94	3.94
锰	μg	4.64	96.00	96.00
钙	mg	16	326	326
磷	mg	11	234	234
碘	μg	4.4	90.0	90.0
氯	mg	19	383	383
硒	μg	0.97	20.00	20.00
可选择成分				
肌醇	mg	1.8	37.9	37.9
牛磺酸	mg	2.1	44.0	44.0
左旋肉碱	mg	0.4	9.1	9.1
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.0	83.7	83.7
二十碳四烯酸(ARA)	mg	4.4	90.4	90.4
低聚果糖	mg	135.46	2800.00	2800.00
聚葡萄糖	mg	82.24	1700.00	1700.00
1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	g	0.17	3.5	3.5
叶黄素	μg	4.0	82.0	82.0
核甘酸	mg	1.0	21.0	21.0
乳铁蛋白	mg	1.0	20.0	20.0

贮藏方法：本产品应贮藏于阴凉干燥处，勿放入冰箱内。
每次食用后及时将罐口封严，开罐后请在一个月内食用完毕。

配料 Ingredients
脱盐乳清粉、全脂奶粉、食用植物调和油(1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、菜籽油、棕榈仁油、葵花籽油、磷脂)、乳糖、无水奶油、低聚果糖、浓缩乳清蛋白粉、聚葡萄糖、乳清蛋白粉、水解乳清蛋白粉、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、柠檬酸钠、氯化钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钾、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。
! 过敏提示:本品含乳制品及大豆制品。

生产商:黑龙江安嘉乳业有限公司
 地址:黑龙江省铁力农场场直二八九大街9号
 产地:黑龙江省伊春市
 曾用名:信顺
 食品生产许可证编号:SC10523300800298
 产品标准号:GB 10765-2021
 产品类别及属性:乳基婴儿配方乳粉
 保质期:24个月
 批号、生产日期及保质期(至):见罐底
 检验合格证号:同批号
 贮存条件:常温、阴凉干燥处



6 948894 001267

营养成分表 nutrition information			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2067
蛋白质	g	0.54	11.10
乳清蛋白	g	0.35	7.25
脂肪	g	1.25	25.90
亚油酸	g	0.14	2.82
α-亚麻酸	mg	21	430
碳水化合物	g	2.5	52.0
维生素			
维生素A	μg RE	18	372
维生素D	μg	0.57	11.81
维生素E	mg α-TE	0.24	4.90
维生素K1	μg	2.31	47.80
维生素B1	μg	20	422
维生素B2	μg	43	892
维生素B6	μg	19.4	401.0
维生素B12	μg	0.078	1.620
烟酸(烟酰胺)	μg	202	4172
叶酸	μg	5.1	104.5
泛酸	μg	170	3519
维生素C	mg	3.7	77.5
生物素	μg	1.00	20.70
胆碱	mg	6.5	135.0
矿物质			
钠	mg	9	180
钾	mg	18	377
铜	μg	18.3	378.0
镁	mg	1.8	36.2
铁	mg	0.19	3.96
锌	mg	0.19	3.94
锰	μg	4.64	96.00
钙	mg	16	326
磷	mg	11	234
碘	μg	4.4	90.0
氯	mg	19	383
硒	μg	0.97	20.00
可选择成分			
肌醇	mg	1.8	37.9
牛磺酸	mg	2.1	44.0
左旋肉碱	mg	0.4	9.1
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.0	83.7
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.4	90.4
低聚果糖	mg	135.46	2800.00
聚葡萄糖	mg	82.24	1700.00
1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯	g	0.17	3.5
叶黄素	μg	4.0	82.0
核黄素	μg	1.0	21.0
乳铁蛋白	mg	1.0	20.0

每100毫升奶液含奶粉13.5克

貝因美®

爱诺达



1 段

净含量:400克
 国食注字 YP20240025

婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段)

爱诺达婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段)



喂哺建议表 Feeding Table

月龄	奶粉量 (平匙)	用水量 (毫升)	每天喂哺 次数
0~1周	1	30	8
1~2周	2	60	7
2~4周	3	90	6
1~2月龄	4	120	5~6
2~4月龄	5	150	5
4~6月龄	6	180	5

注:请使用本品随附专用量匙,1平匙奶粉≈4.5g

注意事项 Attention

请遵照冲调及食用方法和喂哺用量建议表喂养,除非有专业资质人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害。切记不要将冲调好喝剩的奶液留到下次食用。请在保质期内食用,开封后必须保证密封,建议在一个月内用完。
 如您发现包装破损、变形或其他任何疑问请勿食用,并致电贝因美咨询服务热线95105377或400-1777-177。

重要声明 Important Notice

对于0~6月龄的婴儿最理想的食物是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

咨询服务热线 Enquiry Hotline

①95105377
 ②400-1777-177
 (免拨区号,市话资费)
 了解更多产品和服务资讯欢迎登录
www.beingmate.com

转奶小贴士 Milk Transfer Tips

奶粉换品牌阶段都涉及配方不同,为了顺利适应,需要给宝宝循序渐进的进行转奶过渡,以宝宝每天吃5顿奶粉为例:

原奶粉	新奶粉
第1~3天	第8~9天
第4~5天	第10天
第6~7天	

温馨提示:转奶应在宝宝身体健康时进行,在生病或者出现其他身体不适情况下不宜转奶。同时,转奶时注意观察宝宝大便的性状,以便掌握宝宝转奶的适应情况。以上建议仅供参考,实际需根据宝宝的具体情况加以判断和调整。

食用方法 Preparation



1.用清水洗净双手和所有用具。



2.将奶瓶和奶嘴在沸水中煮沸消毒。



3.将饮用水煮沸5分钟并冷却至约50°C,将正确份量的温水倒入已消毒过的奶瓶。



4.按喂哺用量建议表,用量量取正确份量的奶粉倒入奶瓶。



5.盖好瓶盖,摇晃奶瓶直至奶粉完全溶解。



6.喂哺前测试奶的温度,是否适宜宝宝食用。调制好的奶液建议在1小时内喂哺,食用后剩余的奶液应弃用。

图示仅作参考,请以实物为准

貝因美®

爱诺达



1 段

婴儿配方奶粉(0-6月龄, 1段)

净含量:150克

国食注字 YP20240025

配料 Ingredients

脱盐乳清粉、全脂奶粉、食用植物调和油(1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、菜籽油、棕榈仁油、葵花籽油、磷脂)、乳糖、无水奶油、低聚果糖、浓缩乳清蛋白粉、聚葡萄糖、乳清蛋白粉、水解乳清蛋白粉、酯化视黄醇、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘酚、硫酸胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、柠檬酸钠、氯化钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、磷酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油酯(发酵法)、花生四烯酸、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

! 过敏提示:本品含乳制品及大豆制品。

生产商:黑龙江安嘉乳业有限公司
地址:黑龙江省铁力农场场直二八九大街9号
产地:黑龙江省伊春市
曾用名:信顺
食品生产许可证编号:SC10523300800298
产品标准号:GB 10765-2021
产品类别及属性:乳基婴儿配方乳粉
保质期:24个月
批号、生产日期及保质期(至):见罐底
检验合格证号:同批号
贮存条件:常温、阴凉干燥处



营养成分表 nutrition information

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2067
蛋白质	g	0.54	11.10
乳清蛋白	g	0.35	7.25
脂肪	g	1.25	25.90
亚油酸	g	0.14	2.82
α-亚麻酸	g	21	430
碳水化合物	g	2.5	52.0
维生素A	μg RE	18	372
维生素D	μg	0.57	11.81
维生素E	mg α-TE	0.24	4.90
维生素K1	μg	2.31	47.80
维生素B1	μg	20	422
维生素B2	μg	43	892
维生素B6	μg	19.4	401.0
维生素B12	μg	0.078	1.620
烟酸(烟酰胺)	mg	202	4172
叶酸	μg	5.1	104.5
泛酸	mg	170	3519
维生素C	mg	3.7	77.5
生物素	mg	1.00	20.70
胆碱	mg	6.5	135.0
矿物质			
钠	mg	9	180
钾	mg	18	377
钙	mg	18.3	378.0
镁	mg	1.8	36.2
铁	mg	0.19	3.96
锌	mg	0.19	3.94
铜	mg	4.64	96.00
锰	mg	16	326
碘	μg	11	234
硒	μg	4.4	90.0
氯	mg	19	383
酒石酸	mg	0.97	20.00
可选择成分			
肌醇	mg	1.8	37.9
牛磺酸	mg	2.1	44.0
左旋肉碱	mg	0.4	9.1
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.0	83.7
二十二碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.4	90.4
低聚果糖	mg	135.46	2800.00
聚葡萄糖	mg	82.24	1700.00
1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯	mg	0.17	3.5
叶黄素	μg	4.0	82.0
核苷酸	mg	1.0	21.0
乳清蛋白	mg	1.0	20.0

每100毫升奶液含奶粉13.5克

爱诺达婴儿配方奶粉(0-6月龄, 1段)



喂哺建议表 Feeding Table

月龄	奶粉量 (平匙)	水用量 (毫升)	每天喂哺 次数
0~1周	1	30	8
1~2周	2	60	7
2~4周	3	90	6
1~2月龄	4	120	5~6
2~4月龄	5	150	5
4~6月龄	6	180	5

注:请使用本品随附专用量匙, 1平匙奶粉≈4.5g

注意事项 Attention

请遵照冲调及食用方法和喂哺用量建议表喂哺, 除非有专业资质人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害。切记不要将冲调好喝剩的奶液留到下次食用。请在保质期内食用, 开封后必须保证密封, 建议在一个月内用完。
如您发现包装破损、变形或其他任何疑问请勿食用, 并致电贝因美咨询服务热线95105377或400-1777-177。

重要声明 Important Notice

对于0-6月龄的婴儿, 最理想的食物是母乳, 在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

咨询服务热线 Enquiry Hotline

①95105377
②400-1777-177
(免拨区号, 市话费)
了解更多产品和服务资讯欢迎登录
www.beingmate.com

转奶小贴士 Milk Transfer Tips

奶粉换品牌阶段都涉及配方不同, 为了顺利适应, 需要给宝宝循序渐进的进行转奶过渡, 以宝宝每天吃5顿奶粉为例:

原奶粉	新奶粉
第1~3天	第8~9天
第4~5天	第10天
第6~7天	

温馨提示:转奶应在宝宝身体健康时进行, 在生病或者出现其他身体不适情况下不宜转奶。同时, 转奶时注意观察宝宝大便的性状, 以便掌握宝宝转奶的适应情况。以上建议仅供参考, 实际需根据宝宝的具体情况加以判断和调整。

食用方法 Preparation



1. 用清水洗净双手和所有用具。



2. 将奶瓶和奶嘴在沸水中煮沸消毒。



3. 将饮用水煮沸5分钟并冷却至约50°C, 将正确份量的温水倒入已消毒过的奶瓶。



4. 按喂哺用量建议表, 用量匙量取正确份量的奶粉倒入奶瓶。



5. 盖好瓶盖, 摇晃奶瓶直至奶粉完全溶解。



6. 喂哺前测试奶的温度, 是否适宜宝宝食用。调制好的奶液建议在1小时内喂哺, 食用后剩余的奶液应弃用。

图示仅作参考, 请以实物为准

变更后

貝因美®

爱诺达



2段

净含量:800克
国食注字 YP20240026

较大婴儿配方奶粉(6-12月龄, 2段)

AJRY-30

配料 Ingredients

脱盐乳清粉、全脂奶粉、食用植物调和油(1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、菜籽油、棕榈仁油、葵花籽油、磷脂)、乳糖、无水奶油、低聚果糖、聚葡萄糖、乳清蛋白粉、水解乳清蛋白粉、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

！ 过敏提示：本品含乳制品及大豆制品。

生产商：黑龙江安嘉乳业有限公司
地址：黑龙江省铁力农场场直二八九大街9号
产地：黑龙江省伊春市
曾用名：信顺
食品生产许可证编号：SC10523300800298
产品标准号：GB 10766-2021
产品类别及属性：乳基较大婴儿配方乳粉
保质期：24个月
批号、生产日期及保质期(至)：见罐底
检验合格证号：同批号
贮存条件：常温、阴凉干燥处

营养成分表 nutrition information			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1984
蛋白质	g	0.65	12.80
乳清蛋白	g	0.32	6.28
脂肪	g	1.14	22.60
亚油酸	g	0.09	1.84
α-亚麻酸	mg	14	287
碳水化合物	g	2.7	52.6
维生素			
维生素A	μg RE	21	414
维生素D	μg	0.56	11.10
维生素E	mg α-TE	0.23	4.61
维生素K1	μg	2.22	44.00
维生素B1	μg	26	516
维生素B2	μg	54	1064
维生素B6	μg	26.6	527.0
维生素B12	μg	0.105	2.080
烟酸(烟酰胺)	μg	171	3386
叶酸	μg	5.3	105.3
泛酸	μg	172	3422
维生素C	mg	3.5	70.4
生物素	μg	1.02	20.30
胆碱	mg	8.7	172.0
矿物质			
钠	mg	7	144
钾	mg	24	467
铜	μg	13.6	270.0
镁	mg	2.1	41.3
铁	mg	0.33	6.50
锌	mg	0.20	4.00
锰	μg	8.17	162.00
钙	mg	21	410
磷	mg	16	315
碘	μg	4.2	83.0
氯	mg	18	360
硒	μg	0.91	18.00
可选择成分			
肌醇	mg	2.2	44.1
牛磺酸	mg	2.2	43.0
左旋肉碱	mg	0.5	9.5
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.2	84.1
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.7	93.3
低聚果糖	mg	141.13	2800.00
聚葡萄糖	mg	85.69	1700.00
1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯	g	0.13	2.5
叶黄素	μg	8.3	165.0
核苷酸	mg	1.1	21.0
乳铁蛋白	mg	1.0	20.0

每100毫升奶液含奶粉13.5克

爱诺达较大婴儿配方奶粉(6-12月龄, 2段)

喂哺建议表 Feeding Table

月龄	奶粉量(平匙)	水用量(毫升)	每天喂哺次数
6-7月龄	5	150	5
7-9月龄	5-6	150-180	4-5
9-12月龄	5	180	4

注：请使用本品随附专用量匙，1平匙奶粉≈4.5g

注意事项 Attention

请遵照冲调及食用方法和喂哺用量建议表喂养，除非有专业资质人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害。切记不要将冲调好喝剩的奶液留到下次食用。请在保质期内食用，开封后必须保证密封，建议在一个月内存完。如您发现包装破损、变形或其他任何疑问请勿食用，并致电贝因美咨询服务热线95105377或400-1777-177。

重要声明 Important Notice

6月龄以上较大婴儿食用本品时，须配合添加辅助食品。

咨询服务热线 Enquiry Hotline

①95105377
②400-1777-177
(免收区号，市话费)
了解更多产品和服务资讯欢迎登录
www.beingmate.com

转奶小贴士 Milk Transfer Tips

奶粉换品牌阶段都涉及配方不同，为了顺利适应，需要给宝宝循序渐进的进行转奶过渡，以宝宝每天吃4顿奶粉为例：

原奶粉	新奶粉
第1-3天	第6-7天
第4-5天	第8天

温馨提示：转奶应在宝宝身体健康时进行，在生病或者出现其他身体不适情况下不宜转奶。同时，转奶时注意观察宝宝大便的性状，以掌握宝宝转奶的适应情况。以上建议仅供参考，实际需根据宝宝的具体情况加以判断和调整。

食用方法 Preparation

- 用清水洗净双手和所有用具。
- 将奶瓶和奶嘴在沸水中煮沸消毒。
- 将饮用水煮沸5分钟并冷却至约50°C，将正确份量的温水倒入已消毒过的奶瓶。
- 按喂哺用量建议表，用量匙量取正确份量的奶粉倒入奶瓶。
- 盖好瓶盖，摇晃奶瓶直至奶粉完全溶解。
- 喂哺前测试奶的温度，是否适宜宝宝食用。调制好的奶液建议在1小时内喂哺，食用后剩余的奶液应弃用。

图示仅作参考，请以实物为准

变更前

喂哺建议表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(mL)	专用平匙数
6-7个月	5	150	5
7-9个月	4-5	150-180	5-6
9-12个月	4	180	5

注: 请使用本品随附专用量匙, 1平匙奶粉≈4.5g

也可根据宝宝个体差异, 按照医生建议, 调整喂哺量。未经医生建议请勿随意改变喂哺量。
请按照喂哺建议表中所建议的比例用量冲调, 未经医生建议请勿改变冲调浓度。

食用方法

1. 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净, 使用前用沸水煮至少5分钟, 待用。
冲调前请清洗双手并保持环境卫生。
2. 将饮用水煮沸5分钟, 冷却至50℃左右。
3. 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量, 将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。
4. 将所需的奶粉加入到奶瓶中。
5. 盖紧奶瓶, 轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
6. 待奶液温度适宜时, 再给宝宝喂哺。

重要声明

6个月龄以上婴儿食用本产品时, 须配合添加辅助食品。

温馨提示

- 请按以上方法冲调奶粉, 方法不当可能会影响宝宝健康。
- 冲调好的奶液应在1小时内喂哺完, 剩余的奶液应弃去。
- 冲调好的奶液勿放入微波炉内加热, 以免烫伤。
- 本品含有乳糖和蛋白质, 乳糖不耐和蛋白质过敏体质的宝宝慎用或遵医嘱。



(官方二维码)




咨询热线:(周一至周五9:00-17:00)
☎400-6798-911
www.inboschina.com

英博®

倍顺

SEBILER



بۇۋاقلار رەسىملىك سۈپەت جەۋھىرى

较大婴儿配方奶粉

(6~12 ئايلىق قىچە ماس كېلىدۇ، 2-باسقۇچ)

(6-12月龄, 2段)

2 段

净含量: 800克
国食注字 YP20240026

配料表

脱盐乳清粉、全脂奶粉、食用植物调和油 (1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、菜籽油、棕榈仁油、葵花籽油、磷脂)、乳糖、无水奶油、低聚果糖、聚葡萄糖、乳清蛋白粉、水解乳清蛋白粉、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-酮酸生育醇、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锰、硫酸锌、碳酸钾、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸 (DHA)、花生四烯酸 (ARA)、叶黄素、核苷酸 (5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12。

生产商: 黑龙江安嘉乳业有限公司
地址: 黑龙江省铁力农场场直二八九大街9号
产地: 黑龙江省伊春市
食品生产许可证编号: SC10523300800298
营销热线: 0571-86852110
产品标准代号: GB 10766-2021
产品类别、属性: 乳基较大婴儿配方乳粉
保质期: 24个月
批号、生产日期及保质期 (至): 见罐底
检验合格证号: 同批号

营养成分表 ۋىزۋە ۋۇق تەركىبى جەدۋىلى

项目	单位	每100kJ 1000kJ	每100g 100g
能量	kJ	100	1984
蛋白质	g	0.65	12.80
乳清蛋白	g	0.32	6.28
脂肪	g	1.14	22.60
亚油酸	g	0.09	1.84
α-亚麻酸	mg	14	287
碳水化合物	g	2.7	52.6
维生素A	μg RE	21	414
维生素D	μg	0.56	11.10
维生素E	mg α-TE	0.23	4.61
维生素K	μg	2.22	44.00
维生素B ₁	μg	26	516
维生素B ₂	μg	54	1064
维生素B ₆	μg	26.6	527.0
维生素B ₁₂	μg	0.105	2.080
烟酸(烟酰胺)	μg	171	3386
叶酸	μg	5.3	105.3
泛酸	μg	172	3422
维生素C	mg	3.5	70.4
生物素	μg	1.02	20.30
胆碱	mg	8.7	172.0
矿物质			
钠	mg	7	144
钾	mg	24	467
铜	μg	13.6	270.0
镁	mg	2.1	41.3
铁	mg	0.33	6.50
锌	mg	0.20	4.00
锰	μg	8.17	162.00
钙	mg	21	410
磷	mg	14	315
碘	μg	18	360
硒	μg	0.91	18.00
可选择成分			
肌醇	mg	2.2	44.1
牛磺酸	mg	2.2	43.0
左旋肉碱	mg	0.5	9.5
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.2	84.1
二十二碳四烯酸(ARA)	mg	4.7	93.3
低聚果糖	mg	141.13	2800.00
聚葡萄糖	mg	85.69	1700.00
1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	g	0.13	2.5
叶黄素	μg	8.3	165.0
核苷酸	mg	1.1	21.0
乳铁蛋白	mg	1.0	20.0

贮藏方法: 本产品应贮藏于阴凉干燥处, 勿放入冰箱内;
每次食用后及时将罐口封严, 开罐后请在一个月内食用完毕。

配料 Ingredients	
脱盐乳清粉、全脂奶粉、食用植物调和油(1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、菜籽油、棕榈仁油、葵花籽油、磷脂)、乳糖、无水奶油、低聚果糖、聚葡萄糖、乳清蛋白粉、水解乳清蛋白粉、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12。	
! 过敏提示:本品含乳制品及大豆制品。	

生产商:黑龙江安嘉乳业有限公司
地址:黑龙江省铁力农场直二八九大街9号
产地:黑龙江省伊春市
曾用名:倍顺
食品生产许可证编号:SC10523300800298
产品标准号:GB 10766-2021
产品类别及属性:乳基较大婴儿配方乳粉
保质期:24个月
批号、生产日期及保质期(至):见罐底
检验合格证号:同批号
贮存条件:常温、阴凉干燥处



营养成分表 nutrition information			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1984
蛋白质	g	0.65	12.80
乳清蛋白	g	0.32	6.28
脂肪	g	1.14	22.60
亚油酸	g	0.09	1.84
α-亚麻酸	mg	14	287
碳水化合物	g	2.7	52.6
维生素			
维生素A	μg RE	21	414
维生素D	μg	0.56	11.10
维生素E	mg α-TE	0.23	4.61
维生素K1	μg	2.22	44.00
维生素B1	μg	26	516
维生素B2	μg	54	1064
维生素B6	μg	26.6	527.0
维生素B12	μg	0.105	2.080
烟酸(烟酰胺)	μg	171	3386
叶酸	μg	5.3	105.3
泛酸	μg	172	3422
维生素C	mg	3.5	70.4
生物素	μg	1.02	20.30
胆碱	mg	8.7	172.0
矿物质			
钠	mg	7	144
钾	mg	24	467
铜	μg	13.6	270.0
镁	mg	2.1	41.3
铁	mg	0.33	6.50
锌	mg	0.20	4.00
锰	μg	8.17	162.00
钴	μg	21	410
磷	mg	16	315
碘	μg	4.2	83.0
氯	mg	18	360
硒	μg	0.91	18.00
可选择成分			
肌醇	mg	2.2	44.1
牛磺酸	mg	2.2	43.0
左旋肉碱	mg	0.5	9.5
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.2	84.1
二十二碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.7	93.3
低聚果糖	mg	141.13	2800.00
聚葡萄糖	mg	85.69	1700.00
1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯	g	0.13	2.5
叶黄素	μg	8.3	165.0
核苷酸	mg	1.1	21.0
乳铁蛋白	mg	1.0	20.0
每100毫升奶液含奶粉13.5克			



2段
净含量:400克
国食注字 YP20240026
较大婴儿配方奶粉(6-12月龄, 2段)

爱诺达较大婴儿配方奶粉(6-12月龄, 2段)			
喂哺建议表 Feeding Table			
月龄	奶粉量(平匙)	水用量(毫升)	每天喂哺次数
6-7月龄	5	150	5
7-9月龄	5-6	150-180	4-5
9-12月龄	5	180	4
注:请使用本品随附专用量匙, 1平匙奶粉≈4.5g			

注意事项 Attention
请遵照冲调及食用方法和喂哺用量建议表喂养, 除非有专业资质人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害。切记不要将冲调好喝剩的奶液留到下次食用。请在保质期内食用, 开封后必须保证密封, 建议在一个月内用完。
如您发现包装破损、变形或其他任何疑问请勿食用, 并致电贝因美咨询服务热线95105377或400-1777-177。

重要声明 Important Notice
6月龄以上较大婴儿食用本品时, 须配合添加辅助食品。

咨询服务热线 Enquiry Hotline
①95105377
②400-1777-177
(免拨区号, 市话资费)
了解更多产品和服务资讯欢迎登录
www.beingmate.com

转奶小贴士 Milk Transfer Tips	
奶粉换品牌阶段都涉及配方不同, 为了顺利适应, 需要给宝宝循序渐进的进行转奶过渡, 以宝宝每天吃4顿奶粉为例:	
第1-3天	第6-7天
第4-5天	第8天
温馨提示: 转奶应在宝宝身体健康时进行, 在生病或者出现其他身体不适情况下不宜转奶。同时, 转奶时注意观察宝宝大便的性状, 以便掌握宝宝转奶的适应情况。以上建议仅供参考, 实际需根据宝宝的具体情况加以判断和调整。	

- 食用方法 Preparation
- 1.用清水洗净双手和所有用具。
 - 2.将奶瓶和奶嘴在沸水中煮沸消毒。
 - 3.将饮用水煮沸5分钟并冷却至约50°C, 将正确份量的温水倒入已消毒过的奶瓶。
 - 4.按喂哺用量建议表, 用量匙量取正确份量的奶粉倒入奶瓶。
 - 5.盖好瓶盖, 摇晃奶瓶直至奶粉完全溶解。
 - 6.喂哺前测试奶的温度, 是否适宜宝宝食用。调制好的奶液建议在1小时内喂哺, 食用后剩余的奶液应弃用。
- 图示仅作参考, 请以实物为准

貝因美®

爱诺达



2 段

净含量:150克
国食注字 YP20240026

较大婴儿配方奶粉(6-12月龄, 2段)

配料 Ingredients

脱盐乳清粉、全脂奶粉、食用植物调和油(1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、菜籽油、棕榈仁油、葵花籽油、磷脂)、乳糖、无水奶油、低聚果糖、聚葡萄糖、乳清蛋白粉、水解乳清蛋白粉、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、硫酸胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钾、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

! 过敏提示:本品含乳制品及大豆制品。

生产商:黑龙江安嘉乳业有限公司
地址:黑龙江省铁力农场场直二八九大街9号

产地:黑龙江省伊春市

曾用名:信顺

食品生产许可证编号:SC10523300800298

产品标准号:GB 10766-2021

产品类别及属性:乳基较大婴儿配方乳粉

保质期:24个月

批号、生产日期及保质期(至):见罐底

检验合格证号:同批号

贮存条件:常温、阴凉干燥处

营养成分表 nutrition information

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1984
蛋白质	g	0.65	12.80
乳清蛋白	g	0.32	6.28
脂肪	g	1.14	22.60
亚油酸	g	0.09	1.84
α-亚麻酸	g	14	287
碳水化合物	g	2.7	52.6
维生素A	μg RE	21	414
维生素D	μg	0.56	11.10
维生素E	mg α-TE	0.23	4.61
维生素K1	μg	2.22	44.00
维生素B1	μg	26	516
维生素B2	μg	54	1064
维生素B6	μg	26.6	527.0
维生素B12	μg	0.105	2.080
烟酸(烟酰胺)	mg	171	3386
叶酸	μg	5.3	105.3
泛酸	mg	172	3422
维生素C	mg	3.5	70.4
生物素	μg	1.02	20.30
胆碱	mg	8.7	172.0
矿物质	mg	7	144
钠	mg	24	467
钾	mg	13.6	270.0
钙	mg	2.1	41.3
镁	mg	0.33	6.50
铁	mg	0.20	4.00
锌	mg	8.17	162.00
锰	mg	21	410
铜	mg	16	315
磷	mg	4.2	83.0
氯	mg	18	360
硒	μg	0.91	18.00
可选择成分	mg	2.2	44.1
肌醇	mg	2.2	43.0
牛磺酸	mg	0.5	9.5
左旋肉碱	mg	4.2	84.1
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.7	93.3
二十二碳四烯酸(AA/ARA)	mg	141.13	2800.00
低聚果糖	mg	85.69	1700.00
聚葡萄糖	mg	0.13	2.5
1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯	mg	8.3	165.0
叶黄素	mg	1.1	21.0
核苷酸	mg	1.0	20.0
乳清蛋白	mg	1.0	20.0

每100毫升奶液含奶粉13.5克

爱诺达较大婴儿配方奶粉(6-12月龄, 2段)



喂哺建议表 Feeding Table

月龄	奶粉量 (平匙)	水用量 (毫升)	每天喂哺 次数
6~7月龄	5	150	5
7~9月龄	5~6	150~180	4~5
9~12月龄	5	180	4

注:请使用本品随附专用量匙, 1平匙奶粉≈4.5g

注意事项 Attention

请遵照冲调及食用方法和喂哺用量建议表喂养, 除非有专业资质人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害。切记不要将冲调好喝的奶液留到下次食用。请在保质期内食用, 开封后必须保证密封, 建议在一个月内用完。
如您发现包装破损、变形或其他任何疑问请勿食用, 并致电贝因美咨询服务热线95105377或400-1777-177。

重要声明 Important Notice

6月龄以上较大婴儿食用本品时, 须配合添加辅助食品。

咨询服务热线 Enquiry Hotline

①95105377
②400-1777-177
(免拨区号, 市话费)
了解更多产品和服务资讯欢迎登录
www.beingmate.com

转奶小贴士 Milk Transfer Tips

奶粉换品牌阶段都涉及配方不同, 为了顺利适应, 需要给宝宝循序渐进的进行转奶过渡, 以宝宝每天吃4顿奶粉为例:

原奶粉 新奶粉

第1~3天	第6~7天
第4~5天	第8天

温馨提示: 转奶应在宝宝身体健康时进行, 在生病或者出现其他身体不适情况下不宜转奶。同时, 转奶时注意观察宝宝大便的性状, 以便掌握宝宝转奶的适应情况。以上建议仅供参考, 实际需根据宝宝的具体情况加以判断和调整。

食用方法 Preparation

1. 用清水洗净双手和所有用具。
2. 将奶瓶和奶嘴在沸水中煮沸消毒。
3. 将饮用水煮沸5分钟并冷却至约50°C, 将正确份量的温水倒入已消毒过的奶瓶。
4. 按喂哺用量建议表, 用量匙量取正确份量的奶粉倒入奶瓶。
5. 盖好瓶盖, 摇晃奶瓶直至奶粉完全溶解。
6. 喂哺前测试奶的温度, 是否适宜宝宝食用。调制好的奶液建议在1小时内喂哺, 食用后剩余的奶液应弃用。

图示仅作参考, 请以实物为准

变更后



爱诺达



3 段

净含量:800克
国食注字 YP20240027

幼儿配方奶粉(12-36月龄, 3段)

配料 Ingredients
全脂奶粉、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、菜籽油、棕榈仁油、葵花籽油、磷脂)、乳糖、无水奶油、低聚果糖、聚葡萄糖、乳清蛋白粉、水解乳清蛋白粉、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、碳酸钾、磷酸三钙、磷酸钾、亚硒酸钠、硫酸锰、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5' 单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

！ 过敏提示:本品含乳制品及大豆制品。

生产商:黑龙江安嘉乳业有限公司
地址:黑龙江省铁力农场场直二八九大街9号
产地:黑龙江省伊春市
曾用名:倍顺
食品生产许可证编号:SC10523300800298
产品标准号:GB 10767-2021
产品类别及属性:乳基幼儿配方乳粉
保质期:24个月
批号、生产日期及保质期(至):见罐底
检验合格证号:同批号
贮存条件:常温、阴凉干燥处



营养成分表 nutrition information			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1996
蛋白质	g	0.66	13.10
脂肪	g	1.17	23.30
亚油酸	g	0.09	1.88
α-亚麻酸	mg	14	283
碳水化合物	g	2.6	51.5
维生素			
维生素A	μg RE	21	410
维生素D	μg	0.55	10.90
维生素E	mg α-TE	0.23	4.55
维生素K1	μg	2.18	43.60
维生素B1	μg	26	519
维生素B2	μg	54	1079
维生素B6	μg	23.1	462.0
维生素B12	μg	0.108	2.160
烟酸(烟酰胺)	μg	170	3387
叶酸	μg	5.0	100.0
泛酸	μg	175	3492
维生素C	mg	3.4	66.9
生物素	μg	1.20	23.90
矿物质			
钠	mg	7	141
钾	mg	20	408
铜	μg	14.0	279.0
镁	mg	2.0	40.1
铁	mg	0.33	6.62
锌	mg	0.19	3.70
钙	mg	23	462
磷	mg	17	343
碘	μg	4.1	82.0
氯	mg	17	341
可选择成分			
硒	μg	0.95	19.00
胆碱	mg	8.5	169.0
锰	μg	8.02	160.00
肌醇	mg	2.3	45.3
牛磺酸	mg	2.2	43.0
左旋肉碱	mg	0.6	11.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	1.0	20.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	1.4	27.0
低聚果糖	mg	140.28	2800.00
聚葡萄糖	mg	85.17	1700.00
1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	g	0.13	2.5
叶黄素	μg	8.2	164.0
核苷酸	mg	1.0	20.0
乳铁蛋白	mg	1.0	20.0

每100毫升奶液含奶粉13.5克

AJRY-33

爱诺达幼儿配方奶粉(12-36月龄, 3段)



转奶小贴士 Milk Transfer Tips

奶粉换品牌阶段都涉及配方不同,为了顺利适应,需要给宝宝循序渐进的进行转奶过渡,以宝宝每天吃3顿奶粉为例:

原奶粉	新奶粉
第1-3天	第7天
第4-6天	

温馨提示:转奶应在宝宝身体健康时进行,在生病或者出现其他身体不适情况下不宜转奶。同时,转奶时注意观察宝宝大便的性状,以便掌握宝宝转奶的适应情况。以上建议仅供参考,实际需根据宝宝的具体情况加以判断和调整。

食用方法 Preparation

- 用清水洗净双手和所有用具。
- 将奶瓶和奶嘴在沸水中煮沸消毒。
- 将饮用水煮沸5分钟并冷却至约50°C,将正确份量的温水倒入已消毒过的奶瓶。
- 按喂哺用量建议表,用量匙取正确份量的奶粉倒入奶瓶。
- 盖好瓶盖,摇晃奶瓶直至奶粉完全溶解。
- 喂哺前测试奶的温度,是否适宜宝宝食用。调制好的奶液建议在1小时内喂哺,食用后剩余的奶液应弃用。

图示仅作参考,请以实物为准

注意事项 Attention

请遵照冲调及食用方法和喂哺用量建议表喂养,除非有专业资质人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害。切记不要将冲调好喝剩的奶液留到下次食用。请在保质期内食用,开封后必须保证密封,建议在一个月内用完。如您发现包装破损、变形或其他任何疑问请勿食用,并致电贝因美咨询热线95105377或400-1777-177。

咨询服务热线 Enquiry Hotline

①95105377
②400-1777-177
(免拨区号,市话费)
了解更多产品和服务资讯欢迎登录
www.beingmate.com

变更前

喂哺建议表			
月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(mL)	专用平匙数
12-24个月	2-3	180-210	6-7
24-36个月	2	210	7

注：请使用本品随附专用量匙，1平匙奶粉≈4.5g

也可根据宝宝个体差异，按照医生建议，调整喂哺量。未经医生建议请勿随意改变喂哺量。请按照喂哺建议表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。

食用方法	
	1. 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净，使用前用沸水煮沸至少5分钟，待用。
	2. 将奶瓶用沸水煮沸5分钟，冷却至50℃左右。
	3. 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量，将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。
	4. 将所需的奶粉加入到奶瓶中。
	5. 盖紧奶瓶，轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
	6. 待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。

温馨提示	
- 请按以上方法冲调奶粉，方法不当可能会影响宝宝健康。 - 冲调好的奶液应在1小时内喂哺完，剩余的奶液应丢弃。 - 冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。 - 本品含有乳糖和蛋白质，乳糖不耐和蛋白质过敏体质的宝宝慎用或遵医嘱。	



倍顺



بۇۋاقلار رەسىملىك سۈنە جەۋھىرى


幼儿配方奶粉

(12-36 月龄, 3 段)

(12-36 月龄, 3 段)

3 段
净含量: 800 克
国食注字 YP20240027

SEBILER



配料表

全脂奶粉、脱盐乳清粉、食用植物调和油（1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、菜籽油、棕榈仁油、葵花籽油、磷脂）、乳糖、无水奶油、低聚果糖、聚葡萄糖、乳清蛋白粉、水解乳清蛋白粉、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、碳酸钙、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠、硫酸锰、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸（DHA）、花生四烯酸（ARA）、叶黄素、核苷酸（5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠）、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种 Bb-12。

生产商：黑龙江安嘉乳业有限公司
地址：黑龙江省铁力农场直二八九大街9号
产地：黑龙江省伊春市
食品生产许可证编号：SC10523300800298
营销热线：0571-86852110
产品标准代号：GB 10767-2021
产品类别、属性：乳基幼儿配方乳粉
保质期：24个月
批号、生产日期及保质期（至）：见罐底
检验合格证号：同批号

营养成分表

项目	单位	每100g	每100g
能量	kJ	100	1996
蛋白质	g	0.66	13.10
脂肪	g	1.17	23.30
碳水化合物	g	0.09	1.88
α-亚麻酸	g	14	283
维生素A	μg RE	21	410
维生素D	μg	0.55	10.90
维生素E	mg α-TE	0.23	4.55
维生素K	μg	2.18	43.60
维生素B ₁	μg	26	519
维生素B ₂	μg	54	1079
维生素B ₆	μg	23.1	462.0
维生素B ₁₂	μg	0.108	2.160
烟酸(烟酰胺)	μg	170	3387
叶酸	μg	5.0	100.0
维生素C	mg	175	3492
维生素	μg	3.4	66.9
矿物质	μg	1.20	23.90
钠	mg	7	141
钾	mg	20	408
铜	μg	14.0	279.0
镁	mg	2.0	40.1
铁	mg	0.33	6.62
锌	mg	0.19	3.70
钙	mg	23	462
磷	mg	17	343
碘	μg	4.1	82.0
硒	μg	17	341
可选择成分	μg	0.95	19.00
植	mg	8.5	169.0
胆碱	μg	8.02	160.00
肌醇	mg	2.3	45.3
牛磺酸	mg	2.2	43.0
左旋肉碱	mg	0.6	11.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	1.0	20.0
二十碳四烯酸(ARA)	mg	1.4	27.0
低聚果糖	mg	140.28	2800.00
聚葡萄糖	mg	85.17	1700.00
1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	g	0.13	2.5
叶黄素	μg	8.2	164.0
核苷酸	mg	1.0	20.0
乳铁蛋白	mg	1.0	20.0

贮藏方法：本产品应贮藏于阴凉干燥处，勿放入冰箱内。每次食用后及时将罐口封严，开罐后请在一个月内食用完毕。



咨询热线: (周一至周五 9:00-17:00)
400-6798-911
www.inboschina.com

配料 Ingredients	
全脂奶粉、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、菜籽油、棕榈仁油、葵花籽油、磷脂)、乳糖、无水奶油、低聚果糖、聚葡萄糖、乳清蛋白粉、水解乳清蛋白粉、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、碳酸钙、磷酸三钙、碘酸钾、亚硒酸钠、硫酸锰、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。	
! 过敏提示:本品含乳制品及大豆制品。	

生产商:黑龙江安嘉乳业有限公司
地址:黑龙江省铁力农场场直二八九大街9号
产地:黑龙江省伊春市
曾用名:倍顺
食品生产许可证编号:SC10523300800298
产品标准号:GB 10767-2021
产品类别及属性:乳基幼儿配方乳粉
保质期:24个月
批号、生产日期及保质期(至):见罐底
检验合格证号:同批号
贮存条件:常温、阴凉干燥处



营养成分表 nutrition information			
项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1996
蛋白质	g	0.66	13.10
脂肪	g	1.17	23.30
亚油酸	g	0.09	1.88
α-亚麻酸	mg	14	283
碳水化合物	g	2.6	51.5
维生素			
维生素A	μg RE	21	410
维生素D	μg	0.55	10.90
维生素E	mg α-TE	0.23	4.55
维生素K1	μg	2.18	43.60
维生素B1	μg	26	519
维生素B2	μg	54	1079
维生素B6	μg	23.1	462.0
维生素B12	μg	0.108	2.160
烟酸(烟酰胺)	μg	170	3387
叶酸	μg	5.0	100.0
泛酸	μg	175	3492
维生素C	mg	3.4	66.9
生物素	μg	1.20	23.90
矿物质			
钠	mg	7	141
钾	mg	20	408
铜	μg	14.0	279.0
镁	mg	2.0	40.1
铁	mg	0.33	6.62
锌	mg	0.19	3.70
钙	mg	23	462
磷	mg	17	343
碘	μg	4.1	82.0
氯	mg	17	341
可选择成分			
硒	μg	0.95	19.00
胆碱	mg	8.5	169.0
锰	μg	8.02	160.00
肌醇	mg	2.3	45.3
牛磺酸	mg	2.2	43.0
左旋肉碱	mg	0.6	11.0
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	1.0	20.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	1.4	27.0
低聚果糖	mg	140.28	2800.00
聚葡萄糖	mg	85.17	1700.00
1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯	g	0.13	2.5
叶黄素	μg	8.2	164.0
核苷酸	mg	1.0	20.0
乳铁蛋白	mg	1.0	20.0

每100毫升奶液含奶粉13.5克



3段

爱诺达

净含量:400克
国食注字 YP20240027

幼儿配方奶粉(12-36月龄, 3段)

爱诺达幼儿配方奶粉(12-36月龄, 3段)

喂哺建议表 Feeding Table			
月龄	奶粉量(平匙)	用水量(毫升)	每天喂哺次数
12-24月龄	6-7	180~210	2-3
24-36月龄	7	210	2

注:请使用本品随附专用量匙, 1平匙奶粉≈4.5g

注意事项 Attention

请遵照冲调及食用方法和喂哺用量建议表喂哺, 除非有专业资质人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害。切记不要将冲调好喝剩的奶液留到下次食用。请在保质期内食用, 开封后必须保证密封, 建议在一个月内用完。如您发现包装破损、变形或其他任何疑问请勿食用, 并致电贝因美咨询服务热线95105377或400-1777-177。

咨询服务热线 Enquiry Hotline

①95105377
②400-1777-177
(免拨区号, 市话资费)
了解更多产品和服务资讯欢迎登录
www.beingmate.com

转奶小贴士 Milk Transfer Tips

奶粉换品牌阶段都涉及配方不同, 为了顺利适应, 需要给宝宝循序渐进的进行转奶过渡, 以宝宝每天吃3顿奶粉为例:

原奶粉	新奶粉
第1~3天	第7天
第4~6天	

温馨提示: 转奶应在宝宝身体健康时进行, 在生病或者出现其他身体不适情况下不宜转奶。同时, 转奶时注意观察宝宝大便的性状, 以便掌握宝宝转奶的适应情况。以上建议仅供参考, 实际需根据宝宝的具体情况加以判断和调整。

食用方法 Preparation

1. 用清水洗净双手和所有用具。
2. 将奶瓶和奶嘴在沸水中煮沸消毒。
3. 将饮用水煮沸5分钟并冷却至约50°C, 将正确份量的温水倒入已消毒过的奶瓶。
4. 按喂哺用量建议表, 用量匙量取正确份量的奶粉倒入奶瓶。
5. 盖好瓶盖, 摇晃奶瓶直至奶粉完全溶解。
6. 喂哺前测试奶的温度, 是否适宜宝宝食用。调制好的奶液建议在1小时内喂哺, 食用后剩余的奶液应弃用。

图示仅作参考, 请以实物为准

配料 Ingredients

全脂奶粉、脱盐乳清粉、食用植物调和油(1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、菜籽油、棕榈仁油、葵花籽油、磷脂)、乳糖、无水奶油、低聚果糖、聚葡萄糖、乳清蛋白粉、水解乳清蛋白粉、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、磷酸三钙、磷酸钾、亚硒酸钠、硫酸锰、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

! 过敏提示: 本品含乳制品及大豆制品。

生产商: 黑龙江安嘉乳业有限公司
地址: 黑龙江省铁力农场场直二八九大街9号
产地: 黑龙江省伊春市
曾用名: 倍顺
食品生产许可证编号: SC10523300800298
产品标准号: GB 10767-2021
产品类别及属性: 乳基幼儿配方乳粉
保质期: 24个月
批号、生产日期及保质期(至): 见罐底
检验合格证号: 同批号
贮存条件: 常温、阴凉干燥处



6 948894 001250

营养成分表 nutrition information

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1996
蛋白质	g	0.66	13.10
脂肪	g	1.17	23.30
碳水化合物	g	0.09	1.88
维生素A	μg RE	21	410
维生素D	μg	0.55	10.90
维生素E	mg α-TE	0.23	4.55
维生素K1	μg	2.18	43.60
维生素B1	mg	26	519
维生素B2	mg	54	1079
维生素B6	mg	23.1	462.0
维生素B12	μg	0.108	2.160
烟酸(烟酰胺)	mg	170	3387
叶酸	μg	5.0	100.0
泛酸	mg	175	3492
维生素C	mg	3.4	66.9
生物素	μg	1.20	23.90
矿物质	mg	7	141
钠	mg	20	408
钾	mg	14.0	279.0
钙	mg	2.0	40.1
镁	mg	0.33	6.62
铁	mg	0.19	3.70
锌	mg	23	462
铜	mg	17	343
锰	mg	4.1	82.0
碘	μg	17	341
可选择成分			
硒	μg	0.95	19.00
胆碱	mg	8.5	169.0
铬	μg	8.02	160.00
肌醇	mg	2.3	45.3
牛磺酸	mg	2.2	43.0
左旋肉碱	mg	0.6	11.0
二十二碳六烯酸(DHA)	g	1.0	20.0
二十碳四烯酸(AA/ARA)	g	1.4	27.0
低聚果糖	g	140.28	2800.00
聚葡萄糖	g	85.17	1700.00
1,3-二油酸2-棕榈酸甘油三酯	g	0.13	2.5
叶黄素	mg	8.2	164.0
核黄素	mg	1.0	20.0
乳铁蛋白	mg	1.0	20.0

每100毫升奶液含奶粉13.5克

貝因美®

爱诺达



3 段

净含量: 150克

国食注字 YP20240027

幼儿配方奶粉(12-36月龄, 3段)

爱诺达幼儿配方奶粉(12-36月龄, 3段)



喂哺建议表 Feeding Table

月龄	奶粉量(平匙)	用水量(毫升)	每天喂哺次数
12-24月龄	6-7	180-210	2-3
24-36月龄	7	210	2

注: 请使用本品随附专用量匙, 1平匙奶粉≈4.5g

注意事项 Attention

请遵照冲调及食用方法和喂哺用量建议表喂养, 除非有专业资质人员建议。不当配制和使用不当可能引起健康危害。切记不要将冲调好喝剩的奶液留到下次食用。请在保质期内食用, 开封后必须保证密封, 建议在一个月内存用。如您发现包装破损、变形或其他任何疑问请勿食用, 并致电贝因美咨询服务热线95105377或400-1777-177。

咨询服务热线 Enquiry Hotline

①95105377
②400-1777-177
(免拨区号, 市话资费)
了解更多产品和服务资讯欢迎登录
www.beingmate.com

转奶小贴士 Milk Transfer Tips

奶粉换品牌阶段都涉及配方不同, 为了顺利适应, 需要给宝宝循序渐进的进行转奶过渡, 以宝宝每天吃3顿奶粉为例:

原奶粉

新奶粉

第1~3天

第4~6天

第7天

温馨提示: 转奶应在宝宝身体健康时进行, 在生病或者出现其他身体不适情况下不宜转奶。同时, 转奶时注意观察宝宝大便的性状, 以便掌握宝宝转奶的适应情况。以上建议仅供参考, 实际需根据宝宝的具体情况加以判断和调整。

食用方法 Preparation



1. 用清水洗净双手和所有用具。



2. 将奶瓶和奶嘴在沸水中煮沸消毒。



3. 将饮用水煮沸5分钟并冷却至约50°C, 将正确份量的温水倒入已消毒过的奶瓶。



4. 按喂哺用量建议表, 用量匙量取正确份量的奶粉倒入奶瓶。



5. 盖好瓶盖, 摇晃奶瓶直至奶粉完全溶解。



6. 喂哺前测试奶的温度, 是否适宜宝宝食用。调制好的奶液建议在1小时内喂哺, 食用后剩余的奶液应弃用。

图示仅作参考, 请以实物为准

貝因美®

贝因美金美 婴儿配方羊奶粉 (0~6月龄,1段)

喂哺建议表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(mL)	专用平匙数
0-1周	8	30	1
1-2周	7	60	2
2周-1月龄	6	90	3
1-2月龄	5-6	120	4
2-4月龄	5	150	5
4-6月龄	5	180	6

注: 请使用本品随附专用量匙, 1平匙奶粉=4.5g

也可根据宝宝个体差异, 按照医生建议, 调整喂哺量。未经医生建议请勿随意改变喂哺量。
请按照喂哺建议表中所建议的比例用量冲调, 未经医生建议请勿改变冲调浓度。

食用方法

1. 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净, 使用前用沸水煮至少5分钟, 待用。
冲调前请清洗双手并保持环境卫生。
2. 将饮用水煮沸5分钟, 冷却至50℃左右。
3. 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量, 将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。
4. 将所需的奶粉加入到奶瓶中。
5. 盖紧奶瓶, 轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
6. 待奶液温度适宜时, 再给宝宝喂奶。

重要声明

对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳, 在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

温馨提示

- 请按以上方法冲调奶粉, 方法不当可能会影响宝宝健康。
- 冲调好的奶液应在1小时内喂哺完, 剩余的奶液应弃去。
- 冲调好的奶液勿放入微波炉内加热, 以免烫伤。
- 本品含有乳糖和蛋白质, 乳糖不耐和蛋白质过敏体质的宝宝慎用或遵医嘱。

咨询服务热线

95105377或400-1777-177

(免拨区号, 市话资费)



6 948894 001502

1 段

净含量: 820克

国食注字 YP20240022

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2065	钾	mg	22	450
蛋白质	g	0.58	11.90	铜	μg	20.3	419.0
脂肪	g	1.23	25.30	镁	mg	2.3	47.7
亚油酸	g	0.15	3.10	铁	mg	0.18	3.82
α-亚麻酸	mg	24	496	锌	mg	0.18	3.78
碳水化合物	g	2.5	52.4	锰	μg	8.09	167.00
维生素				钙	mg	16	326
维生素A	μg RE	21	425	磷	mg	11	221
维生素D	μg	0.57	11.79	碘	μg	5.7	117.5
维生素E	mg α-TE	0.28	5.76	氯	mg	17	342
维生素K ₁	μg	2.12	43.75	硒	μg	1.02	21.00
维生素B ₁	μg	19	402	可选择成分			
维生素B ₂	μg	39	796	肌醇	mg	2.9	60.0
维生素B ₆	μg	23.1	476.8	牛磺酸	mg	1.5	30.0
维生素B ₁₂	μg	0.079	1.630	左旋肉碱	mg	0.6	11.5
烟酸(烟酰胺)	μg	203	4202	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.1	84.5
叶酸	μg	5.2	106.8	二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.8	99.2
泛酸	μg	182	3767	低聚果糖	mg	135.59	2800.00
维生素C	mg	3.7	76.0	聚葡萄糖	mg	82.32	1700.00
胆碱	mg	8.4	174.0	1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	g	0.22	4.5
矿物质				叶黄素	μg	5.0	103.0
钠	mg	7	145	核苷酸	mg	1.0	20.0
				乳铁蛋白	mg	1.0	20.0

贮藏方法: 本产品应贮藏于阴凉干燥处, 勿放入冰箱内; 每次食用后及时将罐口封严, 开罐后请在一个月内食用完毕。

配料表

脱盐乳清粉(来源羊乳)、全脂羊奶粉、食用植物调和油(1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、菜籽油、棕榈仁油、葵花籽油、磷脂)、低聚果糖、聚葡萄糖、磷脂、醋酸视黄醇、胆钙化醇、dl-α-维生素生育酚、植物甲萘酚、硫酸硫酸素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钾、磷酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

生产商: 黑龙江安嘉乳业有限公司
地址: 黑龙江省铁力农场直二八九大街9号
产地: 黑龙江省伊春市
食品生产许可证编号: SC10523300800298
营销热线: 400-666-8925
曾用名商品名称: 倍悦
产品标准代号: GB 10765-2021
产品类别、属性: 乳基婴儿配方乳粉
保质期: 24个月
批号、生产日期及保质期(至): 见罐底
检验合格证号: 同批号

变更后

AJRY-37

貝因美®

贝因美金美 婴儿配方羊奶粉 (0~6月龄,1段)

喂哺建议表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(mL)	专用平匙数
0-1周	8	30	1
1-2周	7	60	2
2周-1月龄	6	90	3
1-2月龄	5-6	120	4
2-4月龄	5	150	5
4-6月龄	5	180	6

注: 请使用本品随附专用量匙, 1平匙奶粉=4.5g

也可根据宝宝个体差异, 按照医生建议, 调整喂哺量。未经医生建议请勿随意改变喂哺量。
请按照喂哺建议表中所建议的比例用量冲调, 未经医生建议请勿改变冲调浓度。

食用方法

1. 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净, 使用前用沸水煮至少5分钟, 待用。
冲调前请清洗双手并保持环境卫生。
2. 将饮用水煮沸5分钟, 冷却至50°C左右。
3. 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量, 将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。
4. 将所需的奶粉加入到奶瓶中。
5. 盖紧奶瓶, 轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
6. 待奶液温度适宜时, 再给宝宝喂奶。

重要声明

对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳, 在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

温馨提示

- 请按以上方法冲调奶粉, 方法不当可能会影响宝宝健康。
- 冲调好的奶液应在1小时内喂哺完, 剩余的奶液应弃去。
- 冲调好的奶液勿放入微波炉内加热, 以免烫伤。
- 本品含有乳糖和蛋白质, 乳糖不耐和蛋白质过敏体质的宝宝慎用或遵医嘱。

咨询服务热线

95105377或400-1777-177
(免拨区号, 市话资费)



6 948894 001410

1 段

净含量: 800克

国食注字 YP20240022

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2065	钾	mg	22	450
蛋白质	g	0.58	11.90	铜	µg	20.3	419.0
脂肪	g	1.23	25.30	镁	mg	2.3	47.7
亚油酸	g	0.15	3.10	铁	mg	0.18	3.82
α-亚麻酸	mg	24	496	锌	mg	0.18	3.78
碳水化合物	g	2.5	52.4	锰	µg	8.09	167.00
维生素				钙	mg	16	326
维生素A	µg RE	21	425	磷	mg	11	221
维生素D	µg	0.57	11.79	碘	µg	5.7	117.5
维生素E	mg α-TE	0.28	5.76	氯	mg	17	342
维生素K ₁	µg	2.12	43.75	硒	µg	1.02	21.00
维生素B ₁	µg	19	402	可选择成分			
维生素B ₂	µg	39	796	肌醇	mg	2.9	60.0
维生素B ₆	µg	23.1	476.8	牛磺酸	mg	1.5	30.0
维生素B ₁₂	µg	0.079	1.630	左旋肉碱	mg	0.6	11.5
烟酸(烟酰胺)	µg	203	4202	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.1	84.5
叶酸	µg	5.2	106.8	二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.8	99.2
泛酸	µg	182	3767	低聚果糖	mg	135.59	2800.00
维生素C	mg	3.7	76.0	聚葡萄糖	mg	82.32	1700.00
生物素	µg	1.00	20.70	1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	g	0.22	4.5
胆碱	mg	8.4	174.0	叶黄素	µg	5.0	103.0
矿物质				核苷酸	mg	1.0	20.0
钠	mg	7	145	乳铁蛋白	mg	1.0	20.0

贮藏方法: 本产品应贮藏于阴凉干燥处, 勿放入冰箱内; 每次食用后及时将罐口封严, 开罐后请在一个月内食用完毕。

配料表

脱盐乳清粉(来源羊乳)、全脂羊奶粉、食用植物调和油(1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、菜籽油、棕榈仁油、葵花籽油、磷脂)、低聚果糖、聚葡萄糖、磷脂、醋酸视黄醇、胆钙化醇、dl-α-维生素生育酚、植物甲萘酚、硫酸硫酸素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钾、磷酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

生产商: 黑龙江安嘉乳业有限公司
地址: 黑龙江省铁力农场直二八九大街9号
产地: 黑龙江省伊春市
食品生产许可证编号: SC10523300800298
营销热线: 400-666-8925
曾用名商品名称: 倍悦
产品标准代号: GB 10765-2021
产品类别、属性: 乳基婴儿配方乳粉
保质期: 24个月
批号、生产日期及保质期(至): 见罐底
检验合格证号: 同批号

变更前

喂哺建议表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(mL)	专用平匙数
0~1周	8	30	1
1~2周	7	60	2
2周~1月龄	6	90	3
1~2月龄	5~6	120	4
2~4月龄	5	150	5
4~6月龄	5	180	6

注：请使用本品随附专用量匙，1平匙奶粉≈4.5g

也可根据宝宝个体差异，按照医生建议，调整喂哺量。未经医生建议请勿随意改变喂哺量。
请按照喂哺建议表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。

食用方法

1. 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净。使用前用沸水煮沸至少5分钟，待用。
冲调前请清洗双手并保持环境卫生。
2. 将饮用水煮沸5分钟，冷却至50℃左右。
3. 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量，将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。
4. 将所需的奶粉加入到奶瓶中。
5. 盖紧奶瓶，轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
6. 待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。

重要声明

对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

温馨提示

- 请按以上方法冲调奶粉，方法不当可能会影响宝宝健康。
- 冲调好的奶液应在1小时内喂哺完，剩余的奶液应丢弃。
- 冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。
- 本品含有乳糖和蛋白质，乳糖不耐和蛋白质过敏体质严重的宝宝慎用或遵医嘱。

英博®

悦悦



1 段
净含量: 800克
国食注字 YP20240022

婴儿配方羊奶粉
(0-6月龄, 1段)



配料表

脱盐乳清粉(来源羊乳)、全脂羊奶粉、食用植物调和油
(1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、菜籽油、棕榈仁油、葵
花籽油、磷脂)、低聚果糖、聚葡萄糖、磷脂、酯化视黄
醇、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘酚、盐酸硫胺
素、核黄素、盐酸吡哆醇、氟化钠、烟酰胺、叶酸、D-泛
酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸
铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钾、碘酸
钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十
二碳六烯酸(DHA)、花生四烯酸(ARA)、叶黄素、核苷酸
(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷
酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚
种Bb-12。

生产商：黑龙江安嘉乳业有限公司
地 址：黑龙江省铁力农场场直二八九大街9号
产 地：黑龙江省伊春市
食品生产许可证编号：SC10523300800298
营销热线：0571-86852110
产品标准代号：GB 10765-2021
产品类别、属性：乳基婴儿配方乳粉
保质期：24个月
批号、生产日期及保质期(至)：见罐底
检验合格证号：同批号

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2065
蛋白质	g	0.58	11.90
脂肪	g	1.23	25.30
亚油酸	g	0.15	3.10
α-亚麻酸	mg	24	496
碳水化合物	g	2.5	52.4
维生素			
维生素A	μg RE	21	425
维生素D	μg	0.57	11.79
维生素E	mg α-TE	0.28	5.76
维生素K ₁	μg	2.12	43.75
维生素B ₁	μg	19	402
维生素B ₂	μg	39	796
维生素B ₆	μg	23.1	476.8
维生素B ₁₂	μg	0.079	1.630
烟酸(烟酰胺)	μg	203	4202
叶酸	μg	5.2	106.8
泛酸	μg	182	3767
维生素C	mg	3.7	76.0
生物素	μg	1.00	20.70
胆碱	mg	8.4	174.0
矿物质			
钠	mg	7	145
钾	mg	22	450
铜	μg	20.3	419.0
镁	mg	2.3	47.7
铁	mg	0.18	3.82
锌	mg	0.18	3.78
锰	μg	8.09	167.00
钙	mg	16	326
磷	mg	11	221
碘	μg	5.7	117.5
氯	mg	17	342
硒	μg	1.02	21.00
可选择成分			
肌醇	mg	2.9	60.0
牛磺酸	mg	1.5	30.0
左旋肉碱	mg	0.6	11.5
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.1	84.5
二十碳四烯酸(ARA)	mg	4.8	99.2
低聚果糖	mg	135.59	2800.00
聚葡萄糖	mg	82.32	1700.00
1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	g	0.22	4.5
叶黄素	μg	5.0	103.0
核苷酸	mg	1.0	20.0
乳铁蛋白	mg	1.0	20.0

贮藏方法：本产品应贮存于阴凉干燥处，勿放入冰箱内；
每次食用后及时将罐口封严，开罐后请在一个月内食用完毕。



(官方二维码)



咨询热线:(周一至周五9:00-17:00)

☎400-6798-911

www.inboschina.com

貝因美®

贝因美金美 婴儿配方羊奶粉 (0~6月龄,1段)

喂哺建议表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(mL)	专用平匙数
0-1周	8	30	1
1-2周	7	60	2
2周-1月龄	6	90	3
1-2月龄	5-6	120	4
2-4月龄	5	150	5
4-6月龄	5	180	6

注: 请使用本品随附专用量匙, 1平匙奶粉≈4.5g

也可根据宝宝个体差异, 按照医生建议, 调整喂哺量。未经医生建议请勿随意改变喂哺量。
请按照喂哺建议表中所建议的比例用量冲调, 未经医生建议请勿改变冲调浓度。

食用方法

1. 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净, 使用前用沸水煮至少5分钟, 待用。
冲调前请清洗双手并保护环境卫生。
2. 将饮用水煮沸5分钟, 冷却至50℃左右。
3. 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量, 将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。
4. 将所需的奶粉加入奶瓶中。
5. 盖紧奶瓶, 轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
6. 待奶液温度适宜时, 再给宝宝喂奶。

重要声明

对于0~6月龄的婴儿最理想的食物是母乳, 在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

温馨提示

- 请按以上方法冲调奶粉, 方法不当可能会影响宝宝健康。
- 冲调好的奶液应在1小时内喂完, 剩余的奶液应弃去。
- 冲调好的奶液勿放入微波炉内加热, 以免烫伤。
- 本品含有乳糖和蛋白质, 乳糖不耐和蛋白质过敏体质的宝宝慎用或遵医嘱。

咨询服务热线

95105377或400-1777-177

(免拨区号, 市话费)



6 948894 001359

1段
净含量: 400克
国食注字 YP20240022

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2065	钾	mg	22	450
蛋白质	g	0.58	11.90	铜	μg	20.3	419.0
脂肪	g	1.23	25.30	镁	mg	2.3	47.7
亚油酸	g	0.15	3.10	铁	mg	0.18	3.82
α-亚麻酸	mg	24	496	锌	mg	0.18	3.78
碳水化合物	g	2.5	52.4	锰	μg	8.09	167.00
维生素				钙	mg	16	326
维生素A	μg RE	21	425	磷	mg	11	221
维生素D	μg	0.57	11.79	碘	μg	5.7	117.5
维生素E	mg α-TE	0.28	5.76	氯	mg	17	342
维生素K	μg	2.12	43.75	硒	μg	1.02	21.00
维生素B	μg	19	402	可选择成分			
维生素B ₁	μg	39	796	肌醇	mg	2.9	60.0
维生素B ₂	μg	23.1	476.8	牛磺酸	mg	1.5	30.0
维生素B ₆	μg	0.079	1.630	左旋肉碱	mg	0.6	11.5
烟酸(烟酰胺)	μg	203	4202	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.1	84.5
叶酸	μg	5.2	106.8	二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.8	99.2
泛酸	μg	182	3767	低聚果糖	mg	135.59	2800.00
维生素C	mg	3.7	76.0	聚葡萄糖	mg	82.32	1700.00
生物素	μg	1.00	20.70	1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	g	0.22	4.5
胆碱	mg	8.4	174.0	叶黄素	μg	5.0	103.0
矿物质				核苷酸	mg	1.0	20.0
钠	mg	7	145	乳铁蛋白	mg	1.0	20.0

贮藏方法: 本产品应贮藏于阴凉干燥处, 勿放入冰箱内; 每次食用后及时将罐口封严, 开罐后请在一个月内存食用完毕。

配料表

脱盐乳清粉(来源羊乳)、全脂羊奶粉、食用植物调和油(1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、菜籽油、棕榈仁油、葵花籽油、磷脂)、低聚果糖、聚葡萄糖、磷酸、醋酸视黄醇、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、硫酸核黄素、硫酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、硫酸钙、磷酸钾、亚硫酸钠、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油酯(发酵法)、花生四烯酸、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

生产商: 黑龙江安嘉乳业有限公司
地址: 黑龙江省铁力农场场直二八九大街9号
产地: 黑龙江省伊春市
食品生产许可证编号: SC10523300800298
营销热线: 400-666-8925
食用商品名称: 倍悦
产品标准代号: GB 10765-2021
产品类别、属性: 乳基婴儿配方乳粉
保质期: 24个月
批号、生产日期及保质期(至): 见罐底
检验合格证号: 同批号

貝因美®

贝因美金美
婴儿配方羊奶粉
(0~6月龄,1段)

1段

净含量:200克

国食注字 YP20240022

喂哺建议表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(mL)	专用平匙数
0-1周	8	30	1
1-2周	7	60	2
2周-1月龄	6	90	3
1-2月龄	5-6	120	4
2-4月龄	5	150	5
4-6月龄	5	180	6

注:请使用本品随附专用量匙,1平匙奶粉≈4.5g

也可根据宝宝个体差异,按照医生建议,调整喂哺量。未经医生建议请勿随意改变喂哺量。
请按照喂哺建议表中所建议的比例用量冲调,未经医生建议请勿改变冲调浓度。

食用方法

1.

将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净,使用前用沸水煮沸至少5分钟,待用。
冲调前请清洗双手并保持环境卫生。

2.

将饮用水煮沸5分钟,冷却至50℃左右。

3.

依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量,将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。

4.

将所需的奶粉加入至到奶瓶中。

5.

盖紧奶瓶,轻轻摇动直至奶粉完全溶解。

6.

待奶液温度适宜时,再给宝宝喂奶。

重要声明

对于0~6月龄的婴儿最理想的食品是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

温馨提示

•

请按以上方法冲泡奶粉,方法不当可能会影响宝宝健康。

•

冲调好的奶液应在1小时内喂哺完,剩余的奶液应丢弃。

•

冲调好的奶液放入微波炉内加热,以免烫伤。

•

本品含有乳糖和蛋白质,乳糖不耐和蛋白质过敏体质严重的宝宝慎用或遵医嘱。

咨询服务热线

95105377或400-1777-177

(免拨区号,市话资费)

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2065	钾	mg	22	450
蛋白质	g	0.58	11.90	铜	μg	20.3	419.0
脂肪	g	1.23	25.30	镁	mg	2.3	47.7
亚油酸	g	0.15	3.10	铁	mg	0.18	3.82
α-亚麻酸	mg	24	496	锌	mg	0.18	3.78
碳水化合物	g	2.5	52.4	锰	μg	8.09	167.00
维生素A	μg RE	21	425	钙	mg	16	326
维生素D	μg	0.57	11.79	磷	mg	11	221
维生素E	mg α-TE	0.28	5.76	碘	μg	5.7	117.5
维生素K ₁	μg	2.12	43.75	硒	mg	17	342
维生素B ₁	μg	19	402	可选择成分	μg	1.02	21.00
维生素B ₂	μg	39	796	胆碱	mg	2.9	60.0
维生素B ₆	μg	23.1	476.8	牛磺酸	mg	1.5	30.0
维生素B ₁₂	μg	0.079	1.630	左旋肉碱	mg	0.6	11.5
烟酸(烟酰胺)	μg	203	4202	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.1	84.5
叶酸	μg	5.2	106.8	二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.8	99.2
泛酸	μg	182	3767	低聚果糖	mg	135.59	2800.00
维生素C	mg	3.7	76.0	聚葡萄糖	mg	82.32	1700.00
生物素	μg	1.00	20.70	1,3-二甘油-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.22	4.5
胆碱	mg	8.4	174.0	叶黄素	μg	5.0	103.0
矿物质				植骨脂	mg	1.0	20.0
钠	mg	7	145	乳铁蛋白	mg	1.0	20.0

贮藏方法: 本产品应贮藏于阴凉干燥处,勿放入冰箱内;每次食用后及时将罐口封严,开罐后请在一个月内食用完毕。

配料表

脱盐乳清粉(来源羊乳)、全脂牛奶粉、食用植物油调和油(1,3-二油酰-2-硬脂酰甘油三酯、菜籽油、棕榈仁油、葵花籽油、磷脂)、低聚果糖、聚葡萄糖、磷脂、醇溶小麦糊精、胆钙化醇、dl-α-生育酚生育醇、植物甲氧基、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氯化铵、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸铁、硫酸亚铁、磷酸钾、硫酸锰、硬脂酸、硬脂酸钾、亚硫酸钠、氯化铝、肌酐、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、叶黄素、核骨脂(5'-核苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠)、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

生产商: 黑龙江安慕乳业有限公司

地址: 黑龙江省铁力农场直二九八大街9号

产地: 黑龙江省伊春市

食品生产许可证编号: SC10523300800298

营销热线: 400-666-8925

常用商品名称: 倍悦

产品标准代号: GB 10765-2021

产品类型: 属性: 乳基婴儿配方乳粉

保质期: 24个月

批号: 生产日期及保质期(至): 见罐底

检验合格证号: 同批号

变更后

AJRY-40

貝因美®

贝因美金美 婴儿配方羊奶粉 (0~6月龄,1段)

喂哺建议表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(mL)	专用平匙数
0-1周	8	30	1
1-2周	7	60	2
2周-1月龄	6	90	3
1-2月龄	5-6	120	4
2-4月龄	5	150	5
4-6月龄	5	180	6

注:请使用本品随附专用量匙,1平匙奶粉≈4.5g

也可根据宝宝个体差异,按照医生建议,调整喂哺量。未经医生建议请勿随意改变喂哺量。
请按照喂哺建议表中建议的比例用量冲调,未经医生建议请勿改变冲调浓度。

食用方法

- 1.将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净,使用前用沸水煮沸至少5分钟,待用。
冲调前请清洗双手并保持环境卫生。
- 2.将饮用水煮沸5分钟,冷却至50℃左右。
- 3.依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量,将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。
- 4.将所需的奶粉加入到奶瓶中。
- 5.盖紧奶瓶,轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- 6.待奶液温度适宜时,再给宝宝喂哺。

重要声明

对于0~6月龄的婴儿最理想的食物是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

温馨提示

- 请按以上方法冲调奶粉,方法不当可能会影响宝宝健康。
- 冲调好的奶液应在1小时内喂哺完,剩余的奶液应弃去。
- 冲调好的奶液勿放入微波炉内加热,以免烫伤。
- 本品含有乳糖和蛋白质,乳糖不耐和蛋白质过敏体质的宝宝慎用或遵医嘱。

咨询服务热线

95105377或400-1777-177
(免拨区号,市话资费)



6 948894 001328

1 段

净含量:100克

国食注字 YP20240022

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2065	钾	mg	22	450
蛋白质	g	0.58	11.90	铜	μg	20.3	419.0
脂肪	g	1.23	25.30	镁	mg	2.3	47.7
亚油酸	g	0.15	3.10	铁	mg	0.18	3.82
α-亚麻酸	mg	24	496	锌	mg	0.18	3.78
碳水化合物	g	2.5	52.4	锰	μg	8.09	167.00
维生素				钙	mg	16	326
维生素A	μg RE	21	425	磷	mg	11	221
维生素D	μg	0.57	11.79	碘	μg	5.7	117.5
维生素E	mg α-TE	0.28	5.76	氯	mg	17	342
维生素K	μg	2.12	43.75	硒	μg	1.02	21.00
维生素B ₁	μg	19	402	可选择成分			
维生素B ₂	μg	39	796	肌醇	mg	2.9	60.0
维生素B ₆	μg	23.1	476.8	牛磺酸	mg	1.5	30.0
维生素B ₁₂	μg	0.079	1.630	左旋肉碱	mg	0.6	11.5
烟酸(烟酰胺)	μg	203	4202	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.1	84.5
叶酸	μg	5.2	106.8	二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.8	99.2
泛酸	μg	182	3767	低聚果糖	mg	135.59	2800.00
维生素C	mg	3.7	76.0	聚葡萄糖	mg	82.32	1700.00
生物素	μg	1.00	20.70	1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	g	0.22	4.5
胆碱	mg	8.4	174.0	叶黄素	μg	5.0	103.0
矿物质				核苷酸	mg	1.0	20.0
钠	mg	7	145	乳铁蛋白	mg	1.0	20.0

贮藏方法:本产品应贮藏于阴凉干燥处,勿放入冰箱内;每次食用后及时将罐口封严,开罐后请在一个月内食用完毕。

配料表

脱盐乳清粉(来源羊乳)、全脂羊奶粉、食用植物调和油(1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、菜籽油、棕榈仁油、葵花籽油、磷脂)、低聚果糖、聚葡萄糖、糖、磷脂、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、维生素B₁、维生素B₂、维生素B₆、维生素B₁₂、烟酸、泛酸、生物素、胆碱、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油酯(发酵法)、花生四烯酸、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bc-12。

生产商:黑龙江安泰乳业有限公司
地址:黑龙江省铁力农场场部二八九大街9号
产地:黑龙江省伊春市
食品生产许可证编号:SC10523300800298
营销热线:400-666-8925
曾用名:佳悦
产品标准代号:GB 10765-2021
产品类型:乳基婴儿配方乳粉
保质期:24个月
批号:生产日期及保质期(至):见罐底
检验合格证号:同批号

变更前

喂哺建议表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(mL)	专用平匙数
0-1周	8	30	1
1-2周	7	60	2
2周-1月龄	6	90	3
1-2月龄	5-6	120	4
2-4月龄	5	150	5
4-6月龄	5	180	6

注：请使用本品随附专用量匙，1平匙奶粉≈4.5g

也可根据宝宝个体差异，按照医生建议，调整喂哺量。未经医生建议请勿随意改变喂哺量。
请按照喂哺建议表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。

食用方法

- 1.将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净，使用前用沸水煮至少5分钟，待用。
冲调前请清洗双手并保持环境卫生。
- 2.将饮用水煮沸5分钟，冷却至50℃左右。
- 3.依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量，将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。
- 4.将所需的奶粉加入到奶瓶中。
- 5.盖紧奶瓶，轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- 6.待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。

重要声明

对于0~6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

温馨提示

- 请按以上方法冲调奶粉，方法不当可能会影响宝宝健康。
- 冲调好的奶液应在1小时内喂哺完，剩余的奶液应弃去。
- 冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。
- 本品含有乳糖和蛋白质，乳糖不耐和蛋白质过敏体质的宝宝慎用或遵医嘱。



(官方二维码) 6 948894 025669



咨询热线：(周一至周五9:00-17:00)

400-6798-911

www.inboschina.com

英博®

佶悦



1段

净含量:100克
国食注字 YP20240022

婴儿配方羊奶粉
(0-6月龄,1段)

配料表

脱盐乳清粉(来源羊乳)、全脂羊奶粉、食用植物调和油
(1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、菜籽油、棕榈仁油、葵花籽油、磷脂)、低聚果糖、聚葡萄糖、磷脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸(DHA)、花生四烯酸(ARA)、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷二钠、5'-尿苷二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷二钠、5'-鸟苷二钠)、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

生产商：黑龙江安嘉乳业有限公司
地址：黑龙江省铁力农场场直二八九大街9号
产地：黑龙江省伊春市
食品生产许可证编号：SC10523300800298
营销热线：0571-86852110
产品标准代号：GB 10765-2021
产品类别、属性：乳基婴儿配方羊奶粉
保质期：24个月
批号、生产日期及保质期(至)：见罐底
检验合格证号：同批号

贮藏方法：本产品应贮藏于阴凉干燥处，勿放入冰箱内；
每次食用后及时将罐口封严，开罐后请在一个月内食用完毕。

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2065
蛋白质	g	0.58	11.90
脂肪	g	1.23	25.30
亚油酸	g	0.15	3.10
α-亚麻酸	mg	24	496
碳水化合物	g	2.5	52.4
维生素A	μg RE	21	425
维生素D	μg	0.57	11.79
维生素E	mg α-TE	0.28	5.76
维生素K ₁	μg	2.12	43.75
维生素B ₁	μg	19	402
维生素B ₂	μg	39	796
维生素B ₆	μg	23.1	476.8
维生素B ₁₂	μg	0.079	1.630
烟酸(烟酰胺)	μg	203	4202
叶酸	μg	52	1068
泛酸	μg	182	3767
维生素C	mg	3.7	76.0
生物素	μg	1.00	20.70
胆碱	mg	8.4	174.0
矿物质			
钠	mg	7	145
钾	mg	22	450
铜	μg	20.3	419.0
镁	mg	2.3	47.7
铁	mg	0.18	3.82
锌	mg	0.18	3.78
锰	μg	8.09	167.00
钙	mg	16	326
磷	mg	11	221
碘	μg	5.7	117.5
氯	mg	17	342
硒	μg	1.02	21.00
可选择成分			
肌醇	mg	2.9	60.0
牛磺酸	mg	1.5	30.0
左旋肉碱	mg	0.6	11.5
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.1	84.3
二十碳四烯酸(ARA)	mg	4.8	99.2
低聚果糖	mg	135.59	2800.00
聚葡萄糖	mg	82.32	1700.00
1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	g	0.22	4.5
叶黄素	μg	5.0	103.0
核苷酸	mg	1.0	20.0
乳铁蛋白	mg	1.0	20.0

貝因美®

贝因美金美 较大婴儿配方羊奶粉 (6~12月龄,2段)

喂哺建议表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(mL)	专用平匙数
6-7个月	5	150	5
7-10个月	4-5	150-180	5-6
10-12个月	4	180	5

注：请使用本品随附专用量匙，1平匙奶粉=4.5g

也可根据宝宝个体差异，按照医生建议，调整喂哺量。未经医生建议请勿随意改变喂哺量。
请按照喂哺建议表中建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。

食用方法

1. 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净，使用前用沸水煮至少5分钟，待用。
冲调前请清洗双手并保持环境卫生。
2. 将饮用水煮沸5分钟，冷却至50℃左右。
3. 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量，将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。
4. 将所需的奶粉加入到奶瓶中。
5. 盖紧奶瓶，轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
6. 待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。

重要声明

6个月龄以上婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。

温馨提示

- 请按以上方法冲调奶粉，方法不当可能会影响宝宝健康。
- 冲调好的奶液应在1小时内喂哺完，剩余的奶液应弃去。
- 冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。
- 本品含有乳糖和蛋白质，乳糖不耐和蛋白质过敏体质的宝宝慎用或遵医嘱。

咨询服务热线

95105377或400-1777-177

(免拨区号，市话资费)



6 948894 001519

2 段

净含量:820克

国食注字 YP20240023

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1974	钾	mg	26	508
蛋白质	g	0.68	13.40	铜	µg	16.1	317.8
脂肪	g	1.06	20.90	镁	mg	1.9	38.1
亚油酸	g	0.10	2.07	铁	mg	0.28	5.53
α-亚麻酸	mg	18	349	锌	mg	0.20	3.97
碳水化合物	g	2.8	55.1	锰	µg	8.31	164.00
维生素				钙	mg	20	395
维生素A	µg RE	23	453	磷	mg	13	261
维生素D	µg	0.55	10.95	碘	µg	5.9	117.1
维生素E	mg α-TE	0.23	4.48	氯	mg	18	351
维生素K	µg	2.04	40.30	硒	µg	0.89	17.50
维生素B ₁	µg	26	505	可选择成分			
维生素B ₂	µg	42	822	肌醇	mg	3.0	60.0
维生素B ₆	µg	27.7	546.0	牛磺酸	mg	1.5	30.0
维生素B ₁₂	µg	0.082	1.620	左旋肉碱	mg	0.6	12.4
烟酸(烟酰胺)	µg	176	3480	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.2	82.8
叶酸	µg	3.6	71.4	二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.0	98.6
泛酸	µg	170	3364	低聚果糖	mg	141.84	2800.00
维生素C	mg	3.7	73.1	聚葡萄糖	mg	86.12	1700.00
生物素	µg	0.91	18.00	1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	g	0.14	2.8
胆碱	mg	7.1	140.0	叶黄素	µg	10.1	200.0
矿物质				核苷酸	mg	1.0	20.0
钠	mg	6	117	乳铁蛋白	mg	1.0	20.0

贮藏方法：本产品应贮藏于阴凉干燥处，勿放入冰箱内；每次食用后及时将罐口封严，开罐后请在一个月内食用完毕。

配料表

脱盐乳清粉(来源羊乳)、全脂羊奶粉、食用植物调和油(1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、菜籽油、棕榈油、葵花籽油、磷脂)、低聚果糖、聚葡萄糖、磷脂、醋酸视黄醇、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘酚、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

生产商：黑龙江安慕乳业有限公司
地址：黑龙江省铁力农场场直二八九大街9号
产地：黑龙江省伊春市
食品生产许可证编号：SC10523300800298
营销热线：400-666-8925
曾用商品名称：倍悦
产品标准代号：GB 10766-2021
产品类别、属性：乳基较大婴儿配方乳粉
保质期：24个月
批号、生产日期及保质期(至)：见罐底
检验合格证号：同批号

变更后

AJRY-42

貝因美®

贝因美金美

较大婴儿配方羊奶粉
(6~12月龄,2段)

喂哺建议表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(mL)	专用平匙数
6-7个月	5	150	5
7-10个月	4-5	150-180	5-6
10-12个月	4	180	5

注:请使用本品随附专用量匙,1平匙奶粉≈4.5g

也可根据宝宝个体差异,按照医生建议,调整喂哺量。未经医生建议请勿随意改变喂哺量。
请按照喂哺建议表中建议的比例用量冲调,未经医生建议请勿改变冲调浓度。

食用方法

- 1.将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净,使用前用沸水煮沸至少5分钟,待用。
冲调前请清洗双手并保持环境卫生。
- 2.将饮用水煮沸5分钟,冷却至50℃左右。
- 3.依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量,将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。
- 4.将所需的奶粉加入到奶瓶中。
- 5.盖紧奶瓶,轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- 6.待奶液温度适宜时,再给宝宝喂奶。

重要声明

6个月龄以上婴儿食用本产品时,须配合添加辅助食品。

温馨提示

- 请按以上方法冲调奶粉,方法不当可能会影响宝宝健康。
- 冲调好的奶液应在1小时内喂哺,剩余的奶液应弃去。
- 冲调好的奶液勿放入微波炉内加热,以免烫伤。
- 本品含有乳糖和蛋白质,乳糖不耐和蛋白质过敏体质严重的宝宝慎用或遵医嘱。

咨询服务热线

95105377或400-1777-177

(免拨区号,市话资费)



6 948894 001427

2段

净含量:800克

国食注字 YP20240023

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1974	钾	mg	26	508
蛋白质	g	0.68	13.40	铜	μg	16.1	317.8
脂肪	g	1.06	20.90	镁	mg	1.9	38.1
亚油酸	g	0.10	2.07	铁	mg	0.28	5.53
α-亚油酸	mg	18	349	锌	mg	0.20	3.97
碳水化合物	g	2.8	55.1	锰	μg	8.31	164.00
维生素A	μg RE	23	453	钙	mg	20	395
维生素D	μg	0.55	10.95	磷	mg	13	261
维生素E	mg α-TE	0.23	4.48	碘	μg	5.9	117.1
维生素K ₁	μg	2.04	40.30	氯	mg	18	351
维生素B ₁	μg	26	505	硒	μg	0.89	17.50
维生素B ₂	μg	42	822	可选择成分			
维生素B ₆	μg	27.7	546.0	肌醇	mg	3.0	60.0
维生素B ₁₂	μg	0.082	1.620	牛磺酸	mg	1.5	30.0
烟酸(烟酰胺)	μg	176	3480	左旋肉碱	mg	0.6	12.4
叶酸	μg	3.6	71.4	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.2	82.8
泛酸	μg	170	3364	二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.0	98.6
维生素C	mg	3.7	73.1	低聚果糖	mg	141.84	2800.00
生物素	μg	0.91	18.00	聚葡萄糖	mg	86.12	1700.00
胆碱	mg	7.1	140.0	1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	g	0.14	2.8
矿物质				叶黄素	μg	10.1	200.0
钠	mg	6	117	核苷酸	mg	1.0	20.0
				乳铁蛋白	mg	1.0	20.0

贮藏方法:本产品应贮藏于阴凉干燥处,勿放入冰箱内;每次食用后及时将罐口封严,开罐后请在一个月内食用完毕。

配料表

脱盐乳清粉(来源羊乳)、全脂羊奶粉、食用植物油和油(1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、菜籽油、棕榈仁油、葵花籽油、磷脂)、低聚果糖、聚葡萄糖、磷脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、肌醇、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、碘酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油酯(发酵法)、花生四烯酸、叶黄素、核黄素(5'-腺苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

生产商:黑龙江安嘉乳业有限公司

地址:黑龙江省铁力农场直二八九大街9号

产地:黑龙江省伊春市

食品生产许可证编号:SC10523300800298

营销热线:400-666-8925

常用商品名称:倍悦

产品标准代号:GB 10766-2021

产品类别、属性:乳基较大婴儿配方乳粉

保质期:24个月

批号、生产日期及保质期(至):见罐底

检验合格证号:同批号

变更前

喂哺建议表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(mL)	专用平匙数
6-7个月	5	150	5
7-10个月	4-5	150-180	5-6
10-12个月	4	180	5

注：请使用本品随附专用量匙，1平匙奶粉≈4.5g

也可根据宝宝个体差异，按照医生建议，调整喂哺量。未经医生建议请勿随意改变喂哺量。
请按照喂哺建议表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。

食用方法

- 1.将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净，使用前用沸水煮沸至少5分钟，待用。
冲调前请清洗双手并保持环境卫生。
- 2.将饮用水煮沸5分钟，冷却至50℃左右。
- 3.依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量，将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。
- 4.将所需的奶粉加入到奶瓶中。
- 5.盖紧奶瓶，轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- 6.待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。

重要声明

6个月龄以上婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。

温馨提示

- 请按以上方法冲调奶粉，方法不当可能会影响宝宝健康。
- 冲调好的奶液应在1小时内喂哺完，剩余的奶液应弃去。
- 冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。
- 本品含有乳糖和蛋白质，乳糖不耐和蛋白质过敏体质的宝宝慎用或遵医嘱。

英博®

悦悦



2 段
净含量:800克
国食注字 YP20240023

较大婴儿配方羊奶粉
(6-12月龄,2段)



配料表

脱盐乳清粉(来源羊乳)、全脂羊奶粉、食用植物调和油(1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、菜籽油、棕榈仁油、葵花籽油、磷脂)、低聚果糖、聚葡萄糖、磷脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-酮酸生育醇、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸(DHA)、花生四烯酸(ARA)、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

生产商：黑龙江安嘉乳业有限公司
地址：黑龙江省铁力农场直二八九大街9号
产地：黑龙江省伊春市
食品生产许可证编号：SC10523300800298
营销热线：0571-86852110
产品标准代号：GB 10766-2021
产品类别、属性：乳基较大婴儿配方乳粉
保质期：24个月
批号、生产日期及保质期(至)：见罐底
检验合格证号：同批号

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1974
蛋白质	g	0.68	13.40
脂肪	g	1.06	20.90
亚油酸	g	0.10	2.07
α-亚麻酸	mg	18	349
碳水化合物	g	2.8	55.1
维生素			
维生素A	μg RE	23	453
维生素D	μg	0.55	10.95
维生素E	mg α-TE	0.23	4.48
维生素K ₁	μg	2.04	40.30
维生素B ₁	μg	26	505
维生素B ₂	μg	42	822
维生素B ₆	μg	27.7	546.0
维生素B ₁₂	μg	0.082	1.620
烟酸(烟酰胺)	μg	176	3480
叶酸	μg	3.6	71.4
泛酸	μg	170	3364
维生素C	mg	3.7	73.1
生物素	μg	0.91	18.00
胆碱	mg	7.1	140.0
矿物质			
钠	mg	6	117
钾	mg	26	508
铜	μg	16.1	317.8
镁	mg	1.9	38.1
铁	mg	0.28	5.53
锌	mg	0.20	3.97
锰	μg	8.31	164.00
钙	mg	20	395
磷	mg	13	261
碘	μg	5.9	117.1
氯	mg	18	351
硒	μg	0.89	17.50
可选择成分			
肌醇	mg	3.0	60.0
牛磺酸	mg	1.5	30.0
左旋肉碱	mg	0.6	12.4
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.2	82.8
二十碳四烯酸(ARA)	mg	5.0	98.6
低聚果糖	mg	141.84	2800.00
聚葡萄糖	mg	86.12	1700.00
1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	g	0.14	2.8
叶黄素	μg	10.1	200.0
核苷酸	mg	1.0	20.0
乳铁蛋白	mg	1.0	20.0

贮藏方法：本产品应贮藏于阴凉干燥处，勿放入冰箱内；
每次食用后及时将罐口封严，开罐后请在一个月内食用完毕。



(官方二维码)



咨询热线:(周一至周五9:00-17:00)

☎400-6798-911

www.inboschina.com

貝因美®

贝因美金美 较大婴儿配方羊奶粉 (6~12月龄,2段)

喂哺建议表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(mL)	专用平匙数
6-7个月	5	150	5
7-10个月	4-5	150-180	5-6
10-12个月	4	180	5

注：请使用本品随附专用量匙，1平匙奶粉≈4.5g

也可根据宝宝个体差异，按照医生建议，调整喂哺量。未经医生建议请勿随意改变喂哺量。
请按照喂哺建议表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。

食用方法

- 1.将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净，使用前用沸水煮沸至少5分钟，待用。
冲调前请清洗双手并保持环境卫生。
- 2.将饮用水煮沸5分钟，冷却至50℃左右。
- 3.依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量，将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。
- 4.将所需的奶粉加入奶瓶中。
- 5.盖紧奶瓶，轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- 6.待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。

重要声明

6个月以上婴儿食用本产品时，须配合添加辅助食品。

温馨提示

- 请按以上方法冲调奶粉，方法不当可能会影响宝宝健康。
- 冲调好的奶液应在1小时内喂完，剩余的奶液应弃去。
- 冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。
- 本品含有乳糖和蛋白质，乳糖不耐和蛋白质过敏体质严重的宝宝慎用或遵医嘱。

咨询服务热线

95105377或400-1777-177

(免拨区号，市话费)



6 948894 001366

2段
净含量:400克
国食注字YP20240023

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1974	钾	mg	26	508
蛋白质	g	0.68	13.40	铜	μg	16.1	317.8
脂肪	g	1.06	20.90	镁	mg	1.9	38.1
亚油酸	g	0.10	2.07	铁	mg	0.28	5.53
α-亚麻酸	mg	18	349	锌	mg	0.20	3.97
碳水化合物	g	2.8	55.1	锰	μg	8.31	164.00
维生素				钙	mg	20	395
维生素A	μg RE	23	453	磷	mg	13	261
维生素D	μg	0.55	10.95	碘	μg	5.9	117.1
维生素E	mg α-TE	0.23	4.48	氟	mg	18	351
维生素K	μg	2.04	40.30	硒	μg	0.89	17.50
维生素B ₁	μg	26	505	可选择成分			
维生素B ₂	μg	42	822	肌醇	mg	3.0	60.0
维生素B ₆	μg	27.7	546.0	牛磺酸	mg	1.5	30.0
维生素B ₁₂	μg	0.082	1.620	左旋肉碱	mg	0.6	12.4
烟酸(烟酰胺)	μg	176	3480	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.2	82.8
叶酸	μg	3.6	71.4	二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.0	98.6
泛酸	μg	170	3364	低聚果糖	mg	141.84	2800.00
维生素C	mg	3.7	73.1	聚葡萄糖	mg	86.12	1700.00
生物素	μg	0.91	18.00	1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	g	0.14	2.8
胆碱	mg	7.1	140.0	叶黄素	μg	10.1	200.0
矿物质				核苷酸	mg	1.0	20.0
钠	mg	6	117	乳铁蛋白	mg	1.0	20.0

贮藏方法：本产品应贮藏于阴凉干燥处，勿放入冰箱内；每次食用后及时将罐口封严，开罐后请在一个月内食用完毕。

配料表

脱盐乳清粉(来源羊乳)、全脂羊奶粉、食用植物油调和油(1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、菜籽油、棕榈仁油、葵花籽油、磷酯)、低聚果糖、聚葡萄糖、磷脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲壳素、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钾、碳酸钠、亚硒酸钠、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

生产商：黑龙江安嘉乳业有限公司
地址：黑龙江省铁力农场直二八九大街9号
产地：黑龙江省伊春市
食品生产许可证编号：SC10523300800298
营销热线：400-666-8925
常用商品名称：倍悦
产品标准代号：GB 10766-2021
产品类别、属性：乳基较大婴儿配方乳粉
保质期：24个月
批号、生产日期及保质期(至)：见罐底
检验合格证号：同批号

貝因美®

贝因美金美 较大婴儿配方羊奶粉 (6~12月龄,2段)

喂哺建议表			
月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(mL)	专用平匙数
6-7个月	5	150	5
7-10个月	4-5	150-180	5-6
10-12个月	4	180	5

注:请使用本品随附专用量匙,1平匙奶粉≈4.5g
也可根据宝宝个体差异,按照医生建议,调整喂哺量。未经医生建议请勿随意改变喂哺量。
请按照喂哺建议表中所建议的比例用量冲调,未经医生建议请勿改变冲调浓度。

- ### 食用方法
- 1.将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净,使用前用沸水煮沸至少5分钟,待用。
冲调前请清洗双手并保持环境卫生。
 - 2.将饮用水煮沸5分钟,冷却至50℃左右。
 - 3.依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量,将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。
 - 4.将所需的奶粉加入到奶瓶中。
 - 5.盖紧奶瓶,轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
 - 6.待奶液温度适宜时,再给宝宝喂奶。

重要声明

6个月龄以上婴儿食用本产品时,须配合添加辅助食品。

- ### 温馨提示
- 请按以上方法冲调奶粉,方法不当可能会影响宝宝健康。
 - 冲调好的奶液应在1小时内喂哺完,剩余的奶液应弃去。
 - 冲调好的奶液勿放入微波炉内加热,以免烫伤。
 - 本品含有乳糖和蛋白质,乳糖不耐和蛋白质过敏体质严重的宝宝慎用或遵医嘱。



95105377或400-1777-177
(免拨区号,市话费)



营养成分表							
项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1974	钾	mg	26	508
蛋白质	g	0.68	13.40	铜	μg	16.1	317.8
脂肪	g	1.06	20.90	镁	mg	1.9	38.1
亚油酸	g	0.10	2.07	铁	mg	0.28	5.53
α-亚油酸	mg	18	349	锌	mg	0.20	3.97
碳水化合物	g	2.8	55.1	锰	μg	8.31	164.00
维生素				钙	mg	20	395
维生素A	μg RE	23	453	硒	mg	13	261
维生素D	μg	0.55	10.95	碘	μg	5.9	117.1
维生素E	mg α-TE	0.23	4.48	氯	mg	18	351
维生素K ₁	μg	2.04	40.30	硒	μg	0.89	17.50
维生素B ₁	μg	26	505	可选择成分			
维生素B ₂	μg	42	822	肌醇	mg	3.0	60.0
维生素B ₆	μg	27.7	546.0	牛磺酸	mg	1.5	30.0
维生素B ₁₂	μg	0.082	1.620	左旋肉碱	mg	0.6	12.4
烟酸(烟酰胺)	μg	176	3480	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.2	82.8
叶酸	μg	3.6	71.4	二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.0	98.6
泛酸	μg	170	3364	低聚果糖	mg	141.84	2800.00
维生素C	mg	3.7	73.1	聚葡萄糖	mg	86.12	1700.00
生物素	μg	0.91	18.00	1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	g	0.14	2.8
胆碱	mg	7.1	140.0	叶黄素	μg	10.1	200.0
矿物质				核苷酸	mg	1.0	20.0
钠	mg	6	117	乳铁蛋白	mg	1.0	20.0

贮藏方法:本产品应贮藏于阴凉干燥处,勿放入冰箱内;每次食用后及时将罐口封严,开罐后请在一个月内食用完毕。

配料表

脱盐乳清粉(来源羊乳)、全脂羊奶粉、食用植物油和油(1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、菜籽油、棕榈仁油、葵花籽油、硬脂)、低聚果糖、聚葡萄糖、磷脂、醋酸钙、胆钙化醇、dl-α-磷酸生育酚、植物甲萘酚、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氯化钾、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钾、碘酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油酯(发酵法)、花生四烯酸、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷二磷酸、5'-尿苷二磷酸、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷二磷酸、5'-鸟苷二磷酸)、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

生产商:黑龙江安嘉乳业有限公司
地址:黑龙江省铁力农场直二九大街9号
产地:黑龙江省伊春市
食品生产许可证编号:SC10523300800298
营销热线:400-666-8925
常用商品名称:倍悦
产品标准代号:GB 10766-2021
产品类型、属性:乳基较大婴儿配方乳粉
保质期:24个月
批号、生产日期及保质期(至):见罐底
检验合格证号:同批号

貝因美®

贝因美金美 较大婴儿配方羊奶粉 (6~12月龄,2段)

喂哺建议表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(mL)	专用平匙数
6-7个月	5	150	5
7-10个月	4-5	150-180	5-6
10-12个月	4	180	5

注:请使用本品随附专用量匙,1平匙奶粉≈4.5g

也可根据宝宝个体差异,按照医生建议,调整喂哺量。未经医生建议请勿随意改变喂哺量。
请按照喂哺建议表中所建议的比例用量冲调,未经医生建议请勿改变冲调浓度。

食用方法

- 1.将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净,使用前用沸水煮沸至少5分钟,待用。
冲调前请清洗双手并保持环境卫生。
- 2.将饮用水煮沸5分钟,冷却至50℃左右。
- 3.依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量,将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。
- 4.将所需的奶粉加入到奶瓶中。
- 5.盖紧奶瓶,轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- 6.待奶液温度适宜时,再给宝宝喂哺。

重要声明

6个月龄以上婴儿食用本产品时,须配合添加辅助食品。

温馨提示

- 请按以上方法冲调奶粉,方法不当可能会影响宝宝健康。
- 冲调好的奶液应在1小时内喂哺完,剩余的奶液应弃去。
- 冲调好的奶液勿放入微波炉内加热,以免烫伤。
- 本品含有乳糖和蛋白质,乳糖不耐和蛋白质过敏体质严重的宝宝慎用或遵医嘱。

咨询服务热线

95105377/400-1777-177
(免拨区号,市话资费)



6 948894 001335

2 段

净含量:100克

国食注字 YP20240023

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1974	钾	mg	26	508
蛋白质	g	0.68	13.40	铜	mg	16.1	317.8
脂肪	g	1.06	20.90	镁	mg	1.9	38.1
亚油酸	g	0.10	2.07	铁	mg	0.28	5.53
α-亚麻酸	mg	18	349	锌	mg	0.20	3.97
碳水化合物	g	2.8	55.1	锰	μg	8.31	164.00
维生素				钙	mg	20	395
维生素A	μg RE	23	453	磷	mg	13	261
维生素D	μg	0.55	10.95	碘	μg	5.9	117.1
维生素E	mg α-TE	0.23	4.48	氯	mg	18	351
维生素K	μg	2.04	40.30	硒	μg	0.89	17.50
维生素B ₁	μg	26	505	可选择成分			
维生素B ₂	μg	42	822	肌醇	mg	3.0	60.0
维生素B ₆	μg	27.7	546.0	牛磺酸	mg	1.5	30.0
维生素B ₁₂	μg	0.082	1.620	左旋肉碱	mg	0.6	12.4
烟酸(烟酰胺)	μg	176	3480	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.2	82.8
叶酸	μg	3.6	71.4	二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.0	98.6
泛酸	μg	170	3364	低聚果糖	mg	141.84	2800.00
维生素C	mg	3.7	73.1	聚葡萄糖	mg	86.12	1700.00
生物素	μg	0.91	18.00	1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	g	0.14	2.8
胆碱	mg	7.1	140.0	叶黄素	μg	10.1	200.0
矿物质				核苷酸	mg	1.0	20.0
钠	mg	6	117	乳铁蛋白	mg	1.0	20.0

贮藏方法:本产品应贮藏于阴凉干燥处,勿放入冰箱内;每次食用后及时将罐口封严,开罐后请在一个月内食用完毕。

配料表

脱盐乳清粉(来源羊乳)、全脂羊奶粉、食用植物油(1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、菜籽油、棕榈仁油、葵花籽油、磷脂)、低聚果糖、聚葡萄糖、磷酸钙、维生素B₁、维生素B₂、维生素B₆、维生素B₁₂、维生素C、维生素D、维生素E、维生素K、烟酸、泛酸、生物素、胆碱、叶酸、α-亚麻酸、亚油酸、二十二碳六烯酸(DHA)、二十二碳四烯酸(AA/ARA)、低聚果糖、聚葡萄糖、1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、叶黄素、核苷酸、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

生产商:黑龙江安慕乳业有限公司
地址:黑龙江省铁力农场场部二八九大街9号
产地:黑龙江省伊春市
食品生产许可证编号:SC10523300800298
营销热线:400-666-8925
产品名称:贝因美金美较大婴儿配方羊奶粉
产品标准代号:GB 10766-2021
保质期:24个月
批号:生产日期及保质期(至):见罐底
检验合格证号:同批号

貝因美®

贝因美金美

幼儿配方羊奶粉
(12~36月龄,3段)

喂哺建议表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(mL)	专用平匙数
12-24个月	2-3	180-210	6-7
24-36个月	2	210	7

注: 请使用本品随附专用量匙, 1平匙奶粉=4.5g

也可根据宝宝个体差异, 按照医生建议, 调整喂哺量。未经医生建议请勿随意改变喂哺量。
请按照喂哺建议表中建议的比例用量冲调, 未经医生建议请勿改变冲调浓度。

食用方法

1. 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净, 使用前用沸水煮至少5分钟, 待用。
冲调前请清洗双手并保持环境卫生。
2. 将饮用水煮沸5分钟, 冷却至50℃左右。
3. 依据宝宝月龄及喂哺量的推荐量, 将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。
4. 将所需的奶粉加入到奶瓶中。
5. 盖紧奶瓶, 轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
6. 待奶液温度适宜时, 再给宝宝喂奶。

温馨提示

- 请按以上方法冲调奶粉, 方法不当可能会影响宝宝健康。
- 冲调好的奶液应在1小时内喂哺完, 剩余的奶液应弃去。
- 冲调好的奶液勿放入微波炉内加热, 以免烫伤。
- 本品含有乳糖和蛋白质, 乳糖不耐和蛋白质过敏体质的宝宝慎用或遵医嘱。

咨询服务热线

95105377或400-1777-177

(免拨区号, 市话费)



6 948894 001526

3段

净含量: 820克

国食注字 YP20240024

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1994	铜	µg	15.7	314.0
蛋白质	g	0.74	14.70	镁	mg	2.1	42.0
脂肪	g	1.10	21.90	铁	mg	0.31	6.27
亚油酸	g	0.10	1.91	锌	mg	0.20	4.00
α-亚麻酸	mg	17	341	钙	mg	21	427
碳水化合物	g	2.6	52.8	磷	mg	15	308
维生素				碘	µg	5.9	118.2
维生素A	µg RE	24	480	氮	mg	20	400
维生素D	µg	0.56	11.10	可选择成分			
维生素E	mg α-TE	0.22	4.45	硒	µg	0.90	17.85
维生素K ₁	µg	2.03	40.40	胆碱	mg	8.7	174.0
维生素B ₁	µg	25	503	锰	µg	7.94	158.40
维生素B ₂	µg	41	819	肌醇	mg	3.0	60.0
维生素B ₆	µg	27.0	538.0	牛磺酸	mg	1.5	30.0
维生素B ₁₂	µg	0.079	1.580	左旋肉碱	mg	0.6	12.7
烟酸(烟酰胺)	µg	179	3560	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	1.0	20.0
叶酸	µg	4.4	87.5	二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	1.4	27.5
泛酸	µg	172	3437	低聚果糖	mg	140.42	2800.00
维生素C	mg	3.6	72.7	聚葡萄糖	mg	85.26	1700.00
生物素	µg	1.16	23.20	1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	g	0.14	2.7
矿物质				叶黄素	µg	10.0	200.0
钠	mg	6	126	核苷酸	mg	1.0	20.0
钾	mg	27	535	乳铁蛋白	mg	1.0	20.0

贮藏方法: 本产品应贮藏于阴凉干燥处, 勿放入冰箱内; 每次食用后及时将罐口封严, 开罐后请在一个月内食用完毕。

配料表

脱盐乳清粉(来源羊乳)、全脂羊奶粉、食用植物调和油(1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、菜籽油、棕榈仁油、葵花籽油、磷脂)、低聚果糖、聚葡萄糖、磷酸、磷酸氢钙、胆钙化醇、dl-α-维生素生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氯化钾、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸钾、亚磷酸钠、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油酯(发酵法)、花生四烯酸、叶黄素、核苷酸(5'-腺苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

生产商: 黑龙江安嘉乳业有限公司

地址: 黑龙江省铁力农场直二八九大街9号

产地: 黑龙江省伊春市

食品生产许可证编号: SC10523300800298

营销热线: 400-666-8925

曾用名名称: 倍悦

产品标准代号: GB 10767-2021

产品类别、属性: 乳基幼儿配方乳粉

保质期: 24个月

批号、生产日期及保质期(至): 见罐底

检验合格证号: 同批号

变更后

AJRY-47

貝因美®

贝因美金美 幼儿配方羊奶粉 (12~36月龄,3段)

喂哺建议表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(mL)	专用平匙数
12-24个月	2-3	180-210	6-7
24-36个月	2	210	7

注: 请使用本品随附专用量匙, 1平匙奶粉=4.5g

也可根据宝宝个体差异, 按照医生建议, 调整喂哺量。未经医生建议请勿随意改变喂哺量。
请按照喂哺建议表中建议的比例用量冲调, 未经医生建议请勿改变冲调浓度。

食用方法

1. 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净, 使用前用沸水煮沸至少5分钟, 待用。
冲调前请清洗双手并保持环境卫生。
2. 将饮用水煮沸5分钟, 冷却至50°C左右。
3. 依据宝宝月龄及喂哺量的推荐量, 将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。
4. 将所需的奶粉加入到奶瓶中。
5. 盖紧奶瓶, 轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
6. 待奶液温度适宜时, 再给宝宝喂奶。

温馨提示

- 请按以上方法冲调奶粉, 方法不当可能会影响宝宝健康。
- 冲调好的奶液应在1小时内喂哺完, 剩余的奶液应丢弃。
- 冲调好的奶液勿放入微波炉内加热, 以免烫伤。
- 本品含有乳糖和蛋白质, 乳糖不耐和蛋白质过敏体质的宝宝慎用或遵医嘱。

咨询服务热线

95105377或400-1777-177

(免拨区号, 市话费)



6 948894 001496

3段

净含量: 800克

国食注字 YP20240024

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1994	铜	µg	15.7	314.0
蛋白质	g	0.74	14.70	镁	mg	2.1	42.0
脂肪	g	1.10	21.90	铁	mg	0.31	6.27
亚油酸	g	0.10	1.91	锌	mg	0.20	4.00
α-亚麻酸	mg	17	341	钙	mg	21	427
碳水化合物	g	2.6	52.8	磷	mg	15	308
维生素				碘	µg	5.9	118.2
维生素A	µg RE	24	480	氮	mg	20	400
维生素D	µg	0.56	11.10	可选择成分			
维生素E	mg α-TE	0.22	4.45	硒	µg	0.90	17.85
维生素K ₁	µg	2.03	40.40	胆碱	mg	8.7	174.0
维生素B ₁	µg	25	503	锰	µg	7.94	158.40
维生素B ₂	µg	41	819	肌醇	mg	3.0	60.0
维生素B ₆	µg	27.0	538.0	牛磺酸	mg	1.5	30.0
维生素B ₁₂	µg	0.079	1.580	左旋肉碱	mg	0.6	12.7
烟酸(烟酰胺)	µg	179	3560	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	1.0	20.0
叶酸	µg	4.4	87.5	二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	1.4	27.5
泛酸	µg	172	3437	低聚果糖	mg	140.42	2800.00
维生素C	mg	3.6	72.7	聚葡萄糖	mg	85.26	1700.00
生物素	µg	1.16	23.20	1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	g	0.14	2.7
矿物质				叶黄素	µg	10.0	200.0
钠	mg	6	126	核苷酸	mg	1.0	20.0
钾	mg	27	535	乳铁蛋白	mg	1.0	20.0

贮藏方法: 本产品应贮藏于阴凉干燥处, 勿放入冰箱内; 每次食用后及时将罐口封严, 开罐后请在一个月内食用完毕。

配料表

脱盐乳清粉(来源羊乳)、全脂羊奶粉、食用植物调和油(1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、菜籽油、棕榈仁油、葵花籽油、磷脂)、低聚果糖、聚葡萄糖、磷酸、醋酸视黄醇、胆钙化醇、D-α-维生素生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸钾、亚磷酸钠、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油酯(发酵法)、花生四烯酸、叶黄素、核苷酸(5'-腺苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

生产商: 黑龙江安嘉乳业有限公司

地址: 黑龙江省铁力农场直二八九大街9号

产地: 黑龙江省伊春市

食品生产许可证编号: SC10523300800298

营销热线: 400-666-8925

曾用名名称: 倍悦

产品标准代号: GB 10767-2021

产品类别: 属性: 乳基幼儿配方乳粉

保质期: 24个月

批号、生产日期及保质期(至): 见罐底

检验合格证号: 同批号

变更前

喂哺建议表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(mL)	专用平匙数
12-24个月	2-3	180-210	6-7
24-36个月	2	210	7

注：请使用本品随附专用量匙，1平匙奶粉≈4.5g

也可根据宝宝个体差异，按照医生建议，调整喂哺量。未经医生建议请勿随意改变喂哺量。请按照喂哺建议表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。

食用方法

1. 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净，使用前用沸水煮沸至少5分钟，待用。
冲调前请清洗双手并保持环境卫生。
2. 将饮用水煮沸5分钟，冷却至50℃左右。
3. 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量，将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。
4. 将所需的奶粉加入到奶瓶中。
5. 盖紧奶瓶，轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
6. 待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。

温馨提示

- 请按以上方法冲调奶粉，方法不当可能会影响宝宝健康。
- 冲调好的奶液应在1小时内喂哺完，剩余的奶液应丢弃。
- 冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。
- 本品含有乳糖和蛋白质，乳糖不耐和蛋白质过敏体质严重的宝宝慎用或遵医嘱。

英博®

悦悦



3段
净含量:800克
国食注字 YP20240024

幼儿配方羊奶粉
(12-36月龄,3段)



配料表

脱盐乳清粉(来源羊乳)、全脂羊奶粉、食用植物调和油(1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、菜籽油、棕榈仁油、葵花籽油、磷脂)、低聚果糖、聚葡萄糖、磷脂、酯化视黄醇、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘酮、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、磷酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸(DHA)、花生四烯酸(ARA)、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

生产商：黑龙江安嘉乳业有限公司
地址：黑龙江省铁力农场直二八九大街9号
产地：黑龙江省伊春市
食品生产许可证编号：SC10523300800298
营销热线：0571-86852110
产品标准代号：GB 10767-2021
产品类别、属性：乳基幼儿配方乳粉
保质期：24个月
批号、生产日期及保质期(至)：见罐底
检验合格证号：同批号

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1994
蛋白质	g	0.74	14.70
脂肪	g	1.10	21.90
亚油酸	g	0.10	1.91
α-亚麻酸	mg	17	341
碳水化合物	g	2.6	52.8
维生素			
维生素A	μg RE	24	480
维生素D	μg	0.56	11.10
维生素E	mg α-TE	0.22	4.45
维生素K ₁	μg	2.03	40.40
维生素B ₁	μg	25	503
维生素B ₂	μg	41	819
维生素B ₆	μg	27.0	538.0
维生素B ₁₂	μg	0.079	1.580
烟酸(烟酰胺)	μg	179	3560
叶酸	μg	4.4	87.5
泛酸	μg	172	3437
维生素C	mg	3.6	72.7
生物素	μg	1.16	23.20
矿物质			
钠	mg	6	126
钾	mg	27	535
铜	μg	15.7	314.0
镁	mg	2.1	42.0
铁	mg	0.31	6.27
锌	mg	0.20	4.00
钙	mg	21	427
磷	mg	15	308
碘	μg	5.9	118.2
氯	mg	20	400
可选择成分			
硒	μg	0.90	17.85
胆碱	mg	8.7	174.0
锰	μg	7.94	158.40
肌醇	mg	3.0	60.0
牛磺酸	mg	1.5	30.0
左旋肉碱	mg	0.6	12.7
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	1.0	20.0
二十碳四烯酸(ARA)	mg	1.4	27.5
低聚果糖	mg	140.42	2800.00
聚葡萄糖	mg	85.26	1700.00
1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	g	0.14	2.7
叶黄素	μg	10.0	200.0
核苷酸	mg	1.0	20.0
乳铁蛋白	mg	1.0	20.0

贮藏方法：本产品应贮藏于阴凉干燥处，勿放入冰箱内；
每次食用后及时将罐口封严，开罐后请在一个月内食用完毕。



(官方二维码)



咨询热线:(周一至周五9:00-17:00)
☎400-6798-911
www.inboschina.com

貝因美®

贝因美金美
幼儿配方羊奶粉
(12~36月龄,3段)

喂哺建议表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(mL)	专用平匙数
12-24个月	2-3	180-210	6-7
24-36个月	2	210	7

注:请使用本品随附专用量匙,1平匙奶粉≈4.5g

也可根据宝宝个体差异,按照医生建议,调整喂哺量。未经医生建议请勿随意改变喂哺量。
请按照喂哺建议表中所建议的比例用量冲调,未经医生建议请勿改变冲调浓度。

食用方法

- 1.将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净,使用前用沸水煮沸至少5分钟,待用。
冲调前请清洗双手并保持环境卫生。
- 2.将饮用水煮沸5分钟,冷却至50℃左右。
- 3.依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量,将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。
- 4.将所需的奶粉加入到奶瓶中。
- 5.盖紧奶瓶,轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- 6.待奶液温度适宜时,再给宝宝喂奶。

温馨提示

- 请按以上方法冲调奶粉,方法不当可能会影响宝宝健康。
- 冲调好的奶液应在1小时内喂哺完,剩余的奶液应弃去。
- 冲调好的奶液勿放入微波炉内加热,以免烫伤。
- 本品含有乳糖和蛋白质,乳糖不耐和蛋白质过敏体质严重的宝宝慎用或遵医嘱。

咨询服务热线

95105377或400-1777-177

(免拨区号,市话费)



6 948894 001403

3段
净含量:400克
国食注字 YP20240024

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1994	铜	μg	15.7	314.0
蛋白质	g	0.74	14.70	镁	mg	2.1	42.0
脂肪	g	1.10	21.90	铁	mg	0.31	6.27
亚油酸	g	0.10	1.91	锌	mg	0.20	4.00
α-亚油酸	mg	17	341	钙	mg	21	427
碳水化合物	g	2.6	52.8	磷	mg	15	308
维生素				碘	μg	5.9	118.2
维生素A	μg RE	24	480	氟	mg	20	400
维生素D	μg	0.56	11.10	可选择成分			
维生素E	mg α-TE	0.22	4.45	硒	μg	0.90	17.85
维生素K ₁	μg	2.03	40.40	胆碱	mg	8.7	174.0
维生素B ₁	μg	25	503	锰	μg	7.94	158.40
维生素B ₂	μg	41	819	肌醇	mg	3.0	60.0
维生素B ₆	μg	27.0	538.0	牛磺酸	mg	1.5	30.0
维生素B ₁₂	μg	0.079	1.580	左旋肉碱	mg	0.6	12.7
烟酸(烟酰胺)	μg	179	3560	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	1.0	20.0
叶酸	μg	4.4	87.5	二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	1.4	27.5
泛酸	μg	172	3437	低聚果糖	mg	140.42	2800.00
维生素C	mg	3.6	72.7	聚葡萄糖	mg	85.26	1700.00
生物素	μg	1.16	23.20	1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.14	2.7
矿物质				叶黄素	μg	10.0	200.0
钠	mg	6	126	核苷酸	mg	1.0	20.0
钾	mg	27	535	乳铁蛋白	mg	1.0	20.0

贮藏方法:本产品应贮藏于阴凉干燥处,勿放入冰箱内;每次食用后及时将罐口封严,开罐后请在一个月内食用完毕。

配料表

脱盐乳清粉(来源羊乳)、全脂羊奶粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、菜籽油、棕榈仁油、葵花籽油、磷脂)、低聚果糖、聚葡萄糖、磷酸、醋酸视黄醇、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钾、磷酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

生产商:黑龙江安惠乳业有限公司

地址:黑龙江省铁力农场场直二八九大街9号

产地:黑龙江省伊春市

食品生产许可证编号:SC10523300800298

营销热线:400-666-8925

常用商品名称:倍悦

产品标准代号:GB 10767-2021

产品类别、属性:乳基幼儿配方乳粉

保质期:24个月

批号、生产日期及保质期(至):见罐底

检验合格证号:同批号

喂哺建议表			
月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(mL)	专用平匙数
12-24个月	2-3	180-210	6-7
24-36个月	2	210	7

注：请使用本品随附专用量匙，1平匙奶粉≈4.5g
也可根据宝宝个体差异，按照医生建议，调整喂哺量。未经医生建议请勿随意改变喂哺量。
请按照喂哺建议表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。

食用方法	
1.	将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净，使用前用沸水煮沸至少5分钟，待用。
2.	将饮用水煮沸5分钟，冷却至50℃左右。
3.	依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量，将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。
4.	将所需的奶粉加入到奶瓶中。
5.	盖紧奶瓶，轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
6.	待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。

温馨提示	
•	请按以上方法冲调奶粉，方法不当可能会影响宝宝健康。
•	冲调好的奶液应在1小时内喂哺完，剩余的奶液应弃去。
•	冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。
•	本品含有乳糖和蛋白质，乳糖不耐和蛋白质过敏体质严重的宝宝慎用或遵医嘱。



6 948894 001595

咨询服务热线

95105377或400-1777-177

(免拨区号，市话费)



贝因美金美 幼儿配方羊奶粉 (12~36月龄,3段)



营养成分表					
项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位
能量	kJ	100	1994	铜	μg
蛋白质	g	0.74	14.70	镁	mg
脂肪	g	1.10	21.90	铁	mg
亚油酸	g	0.10	1.91	锌	mg
α-亚麻酸	mg	17	341	钙	mg
碳水化合物	g	2.6	52.8	磷	mg
维生素				碘	μg
维生素A	μg RE	24	480	氯	mg
维生素D	μg	0.56	11.10	可选择成分	
维生素E	mg α-TE	0.22	4.45	糖	μg
维生素K ₁	μg	2.03	40.40	胆碱	mg
维生素B ₁	μg	25	503	锰	μg
维生素B ₂	μg	41	819	肌醇	mg
维生素B ₆	μg	27.0	538.0	牛磺酸	mg
维生素B ₁₂	μg	0.079	1.580	左旋肉碱	mg
烟酸(烟酰胺)	μg	179	3560	二十二碳六烯酸(DHA)	mg
叶酸	μg	4.4	87.5	二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg
泛酸	μg	172	3437	低聚果糖	mg
维生素C	mg	3.6	72.7	聚葡萄糖	mg
生物素	μg	1.16	23.20	1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	g
矿物质				叶黄素	μg
钠	mg	6	126	核苷酸	mg
钾	mg	27	535	乳铁蛋白	mg

贮藏方法：本产品应贮藏于阴凉干燥处，勿放入冰箱内；每次食用后及时将罐口封严，开罐后请在一个月内食用完毕。

配料表	
脱盐乳清粉(来源羊乳)、全脂羊奶粉、食用植物油和油(1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、菜籽油、棕榈仁油、葵花籽油、磷脂)、低聚果糖、聚葡萄糖、磷脂、酯化维生素、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、硫酸钙、磷酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸甘油酯(发酵法)、花生四烯酸、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。	
生产商：黑龙江安慕乳业有限公 地 址：黑龙江省铁力农场直二八九大街9号 产 地：黑龙江省伊春市 食品生产许可证编号：SC10523300800298 营销热线：400-666-8925 售用商品名称：倍悦 产品标准代号：GB 10767-2021 产品类别、属性：乳基幼儿配方乳粉 保质期：24个月 批号、生产日期及保质期(至)：见罐底 检验合格证书：同批号	

AJRY-50

貝因美®

贝因美金美 幼儿配方羊奶粉 (12~36月龄,3段)

喂哺建议表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(mL)	专用平匙数
12-24个月	2-3	180-210	6-7
24-36个月	2	210	7

注: 请使用本品随附专用量匙, 1平匙奶粉≈4.5g
也可根据宝宝个体差异, 按照医生建议, 调整喂哺量。未经医生建议请勿随意改变喂哺量。
请按照喂哺建议表中所建议的比例用量冲调, 未经医生建议请勿改变冲调浓度。

食用方法

1. 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净, 使用前用沸水煮沸至少5分钟, 待用。
冲调前请清洗双手并保持环境卫生。
2. 将饮用水煮沸5分钟, 冷却至50℃左右。
3. 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量, 将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。
4. 将所需的奶粉加入到奶瓶中。
5. 盖紧奶瓶, 轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
6. 待奶液温度适宜时, 再给宝宝喂奶。

温馨提示

- 请按以上方法冲调奶粉, 方法不当可能会影响宝宝健康。
- 冲调好的奶液应在1小时内喂哺完, 剩余的奶液应丢弃。
- 冲调好的奶液勿放入微波炉内加热, 以免烫伤。
- 本品含有乳糖和蛋白质, 乳糖不耐和蛋白质过敏体质的宝宝慎用或遵医嘱。

咨询服务热线

95105377或400-1777-177
(免拨区号, 市话资费)



6 948894 001342

3段
净含量: 100克
国食注字 YP20240024

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1994	铜	μg	15.7	314.0
蛋白质	g	0.74	14.70	镁	mg	2.1	42.0
脂肪	g	1.10	21.90	铁	mg	0.31	6.27
亚油酸	g	0.10	1.91	锌	mg	0.20	4.00
α-亚麻酸	mg	17	341	钙	mg	21	427
碳水化合物	g	2.6	52.8	磷	mg	15	308
维生素				碘	μg	5.9	118.2
维生素A	μg RE	24	480	氯	mg	20	400
维生素D	μg	0.56	11.10	可选择成分			
维生素E	mg α-TE	0.22	4.45	硒	μg	0.90	17.85
维生素K	μg	2.03	40.40	胆碱	mg	8.7	174.0
维生素B ₁	μg	25	503	锰	μg	7.94	158.40
维生素B ₂	μg	41	819	肌醇	mg	3.0	60.0
维生素B ₆	μg	27.0	538.0	牛磺酸	mg	1.5	30.0
维生素B ₁₂	μg	0.079	1.580	左旋肉碱	mg	0.6	12.7
烟酸(烟酰胺)	μg	179	3560	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	1.0	20.0
叶酸	μg	4.4	87.5	二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	1.4	27.5
泛酸	μg	172	3437	低聚果糖	mg	140.42	2800.00
维生素C	mg	3.6	72.7	聚葡萄糖	mg	85.26	1700.00
生物素	μg	1.16	23.20	1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	g	0.14	2.7
矿物质				叶黄素	μg	10.0	200.0
钠	mg	6	126	核苷酸	mg	1.0	20.0
钾	mg	27	535	乳铁蛋白	mg	1.0	20.0

贮藏方法: 本产品应贮藏于阴凉干燥处, 勿放入冰箱内; 每次食用后及时将罐口封严, 开罐后请在一个月内食用完毕。

配料表

脱盐乳清粉(来源羊乳)、全脂羊奶粉、食用植物调和油(1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、菜籽油、棕榈仁油、葵花籽油、磷脂)、低聚果糖、聚葡萄糖、磷酸、磷酸氢二钠、胆钙化醇、dl-α-磷酸生育酚、植物甲萘酚、盐、硫酸铜、核黄素、盐酸吡哆醇、氯化钾、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钾、亚硫酸钠、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油酯(发酵法)、花生四烯酸、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

生产商: 黑龙江安泰乳业有限公司
地址: 黑龙江省铁力农场直二八九大街9号
产地: 黑龙江省伊春市
食品生产许可证编号: SC10523300800298
营销热线: 400-666-8925
食用商品名称: 倍悦
产品标准代号: GB 10767-2021
产品类型: 真性: 乳基幼儿配方乳粉
保质期: 24个月
批号: 生产日期及保质期(至): 见罐底
检验合格证号: 同批号

喂哺建议表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(mL)	专用平匙数
0-1周	8	30	1
1-2周	7	60	2
2周-1月龄	6	90	3
1-2月龄	5-6	120	4
2-4月龄	5	150	5
4-6月龄	5	180	6

注：请使用本品随附专用量匙，1平匙奶粉≈4.5g

也可根据宝宝个体差异，按照医生建议，调整喂哺量。未经医生建议请勿随意改变喂哺量。请按照喂哺建议表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。

食用方法

1. 将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净，使用前沸水煮沸至少5分钟，待用。
2. 冲调前请清洗双手并保持环境卫生。
3. 将饮用水煮沸5分钟，冷却至50℃左右。
4. 依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量，将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。
5. 将所需的奶粉加入至奶瓶中。
6. 盖紧奶瓶，轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
7. 待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。

重要声明

对于0~6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

温馨提示

- 请按以上方法冲调奶粉，方法不当可能会影响宝宝健康。
- 冲调好的奶液应在1小时内喂哺完，剩余的奶液应弃去。
- 冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。
- 本品含有乳糖和蛋白质，乳糖不耐和蛋白质过敏体质的宝宝慎用或遵医嘱。

咨询服务热线

95105377或400-1777-177

(免拨区号，市话资费)

了解更多产品和服务资讯
欢迎扫描官方微信二维码或登录
www.beingmate.com

貝因美®

贝因美金美 婴儿配方羊奶粉 (0~6月龄,1段)

1段

净含量:318克

国食注字 YP20240022

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2065	钾	mg	22	450
蛋白质	g	0.58	11.90	铜	μg	20.3	419.0
脂肪	g	1.23	25.30	镁	mg	2.3	47.7
亚油酸	g	0.15	3.10	铁	mg	0.18	3.82
α-亚麻酸	mg	24	496	锌	mg	0.18	3.78
碳水化合物	g	2.5	52.4	锰	μg	8.09	167.00
维生素				钙	mg	16	326
维生素A	μg RE	21	425	磷	mg	11	221
维生素D	μg	0.57	11.79	碘	μg	5.7	117.5
维生素E	mg α-TE	0.28	5.76	氯	mg	17	342
维生素K ₁	μg	2.12	43.75	硒	μg	1.02	21.00
维生素B ₁	μg	19	402	可选择成分			
维生素B ₂	μg	39	796	肌醇	mg	2.9	60.0
维生素B ₆	μg	23.1	476.8	牛磺酸	mg	1.5	30.0
维生素B ₁₂	μg	0.079	1.630	左旋肉碱	mg	0.6	11.5
烟酸(烟酰胺)	μg	203	4202	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.1	84.5
叶酸	μg	5.2	106.8	二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	4.8	99.2
泛酸	μg	182	3767	低聚果糖	mg	135.59	2800.00
维生素C	mg	3.7	76.0	聚葡萄糖	mg	82.32	1700.00
生物素	μg	1.00	20.70	1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	g	0.22	4.5
胆碱	mg	8.4	174.0	叶黄素	μg	5.0	103.0
矿物质				核苷酸	mg	1.0	20.0
钠	mg	7	145	乳铁蛋白	mg	1.0	20.0

贮藏方法：本产品应贮藏于阴凉干燥处，勿放入冰箱内；每次食用后及时将罐口封严，开罐后请在一个月内食用完毕。

配料表

脱盐乳清粉(来源羊乳)、全脂羊奶粉、食用植物调和油(1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、菜籽油、棕榈仁油、葵花籽油、磷脂)、低聚果糖、聚葡萄糖、磷脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘酚、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、碘酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、叶黄素、核黄素(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

生产商：黑龙江安嘉乳业有限公司

地址：黑龙江省铁力农场场直二八九大街9号

产地：黑龙江省伊春市

食品生产许可证编号：SC10523300800298

营销热线：400-600-9718

曾用名名称：倍悦

产品标准代号：GB 10765-2021

产品类别、属性：乳基婴儿配方乳粉

保质期：24个月

批号、生产日期及保质期(至)：见罐底

检验合格证号：同批号

喂哺建议表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(mL)	专用平匙数
6-7个月	5	150	5
7-10个月	4-5	150-180	5-6
10-12个月	4	180	5

注：请使用本品随附专用量匙，1平匙奶粉≈4.5g

也可根据宝宝个体差异，按照医生建议，调整喂哺量。未经医生建议请勿随意改变喂哺量。请按照喂哺建议表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。

食用方法

- 1.将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净，使用前用沸水煮至少5分钟，待用。冲调前请清洗双手并保持环境卫生。
- 2.将饮用水煮沸5分钟，冷却至50℃左右。
- 3.依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量，将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。
- 4.将所需的奶粉加入到奶瓶中。
- 5.盖紧奶瓶，轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- 6.待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。

重要声明

对于0~6月龄的婴儿最理想的食物是母乳，在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

温馨提示

- 请按以上方法冲调奶粉，方法不当可能会影响宝宝健康。
- 冲调好的奶液应在1小时内喂哺完，剩余的奶液应弃去。
- 冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。
- 本品含有乳糖和蛋白质，乳糖不耐和蛋白质过敏体质严重的宝宝慎用或遵医嘱。

咨询服务热线

95105377或400-1777-177

(免拨区号，市话资费)

了解更多产品和服务资讯
欢迎扫描下方二维码或登录
www.beingmate.com

贝因美®

贝因美金美 较大婴儿配方羊奶粉 (6~12月龄,2段)

2段
净含量:318克
国食注字YP20240023

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1974	钾	mg	26	508
蛋白质	g	0.68	13.40	铜	μg	16.1	317.8
脂肪	g	1.06	20.90	镁	mg	1.9	38.1
亚油酸	g	0.10	2.07	铁	mg	0.28	5.53
α-亚麻酸	mg	18	349	锌	mg	0.20	3.97
碳水化合物	g	2.8	55.1	锰	μg	8.31	164.00
维生素				钙	mg	20	395
维生素A	μg RE	23	453	磷	mg	13	261
维生素D	μg	0.55	10.95	碘	μg	5.9	117.1
维生素E	mg α-TE	0.23	4.48	氯	mg	18	351
维生素K ₁	μg	2.04	40.30	硒	μg	0.89	17.50
维生素B ₁	μg	26	505	可选择成分			
维生素B ₂	μg	42	822	肌醇	mg	3.0	60.0
维生素B ₆	μg	27.7	546.0	牛磺酸	mg	1.5	30.0
维生素B ₁₂	μg	0.082	1.620	左旋肉碱	mg	0.6	12.4
烟酸(烟酰胺)	μg	176	3480	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.2	82.8
叶酸	μg	3.6	71.4	二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.0	98.6
泛酸	μg	170	3364	低聚果糖	mg	141.84	2800.00
维生素C	mg	3.7	73.1	聚葡萄糖	mg	86.12	1700.00
生物素	μg	0.91	18.00	1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯	g	0.14	2.8
胆碱	mg	7.1	140.0	叶黄素	μg	10.1	200.0
矿物质				核苷酸	mg	1.0	20.0
钠	mg	6	117	乳铁蛋白	mg	1.0	20.0

贮藏方法：本产品应贮藏于阴凉干燥处，勿放入冰箱内；每次食用后及时将罐口封严，开罐后请在一个月内食用完毕。

配料表

脱盐乳清粉(来源羊乳)、全脂羊奶粉、食用植物调和油(1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、菜籽油、棕榈仁油、葵花籽油、磷脂)、低聚果糖、聚葡萄糖、磷脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘醌、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、碘酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

生产商：黑龙江安嘉乳业有限公司
地址：黑龙江省铁力农场场直二八九大街9号
产地：黑龙江省伊春市
食品生产许可证编号：SC10523300800298
营销热线：400-600-9718
曾用商品名称：倍悦
产品标准代号：GB 10765-2021
产品类别、属性：乳基婴儿配方羊奶粉
保质期：24个月
批号、生产日期及保质期(至)：见罐底
检验合格证号：同批号

喂哺建议表

月龄	每日喂哺次数	每次使用量	
		温开水用量(mL)	专用平匙数
12-24个月	2-3	180-210	6-7
24-36个月	2	210	7

注：请使用本品随附专用量匙，1平匙奶粉≈4.5g

也可根据宝宝个体差异，按照医生建议，调整喂哺量。未经医生建议请勿随意改变喂哺量。请按照喂哺建议表中所建议的比例用量冲调，未经医生建议请勿改变冲调浓度。

食用方法

- 1.将奶瓶、奶嘴及瓶盖彻底洗净，使用前用沸水煮沸至少5分钟，待用。
冲调前请清洗双手并保持环境卫生。
- 2.将饮用水煮沸5分钟，冷却至50℃左右。
- 3.依据宝宝月龄及喂哺表的推荐量，将正确的水量倒入消毒后的奶瓶中。
- 4.将所需的奶粉加入到奶瓶中。
- 5.盖紧奶瓶，轻轻摇动直至奶粉完全溶解。
- 6.待奶液温度适宜时，再给宝宝喂奶。

温馨提示

- 请按以上方法冲调奶粉，方法不当可能会影响宝宝健康。
- 冲调好的奶液应在1小时内喂哺完，剩余的奶液应弃去。
- 冲调好的奶液勿放入微波炉内加热，以免烫伤。
- 本品含有乳糖和蛋白质，乳糖不耐和蛋白质过敏体质严重的宝宝慎用或遵医嘱。

咨询服务热线

95105377或400-1777-177

(免拨区号，市话费)

了解更多产品和服务资讯
欢迎扫描官方微信二维码或登录
www.beingmate.com

貝因美®

贝因美金美 幼儿配方羊奶粉 (12~36月龄,3段)

3段
净含量:318克
国食注字 YP20240024

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1994	钾	mg	15.7	314.0
蛋白质	g	0.74	14.70	铜	μg	2.1	42.0
脂肪	g	1.10	21.90	镁	mg	0.31	6.27
亚油酸	g	0.10	1.91	铁	mg	0.20	4.00
α-亚麻酸	mg	17	341	锌	mg	21	427
碳水化合物	g	2.6	52.8	锰	μg	15	308
维生素				钙	mg	5.9	118.2
维生素A	μg RE	24	480	磷	mg	20	400
维生素D	μg	0.56	11.10	碘	μg		
维生素E	mg α-TE	0.22	4.45	氯	mg	0.90	17.85
维生素K ₁	μg	2.03	40.40	硒	μg	8.7	174.0
维生素B ₁	μg	25	503	可选择成分		7.94	158.40
维生素B ₂	μg	41	819	肌醇	mg	3.0	60.0
维生素B ₆	μg	27.0	538.0	牛磺酸	mg	1.5	30.0
烟酸(烟酰胺)	μg	0.079	1.580	左旋肉碱	mg	0.6	12.7
叶酸	μg	179	3560	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	1.0	20.0
泛酸	μg	4.4	87.5	二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	1.4	27.5
维生素C	mg	172	3437	低聚果糖	mg	140.42	2800.00
生物素	μg	3.6	72.7	聚葡萄糖	mg	85.26	1700.00
胆碱	mg	1.16	23.20	1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油二酯	g	0.14	2.7
矿物质		6	126	叶黄素	μg	10.0	200.0
钠	mg	27	535	核苷酸	mg	1.0	20.0
				乳铁蛋白	mg	1.0	20.0

贮藏方法：本产品应贮藏于阴凉干燥处，勿放入冰箱内；每次食用后及时将罐口封严，开罐后请在一个月内食用完毕。

配料表

脱盐乳清粉(来源羊乳)、全脂羊奶粉、食用植物调和油(1,3-二油酸 2-棕榈酸甘油三酯、菜籽油、棕榈仁油、葵花籽油、磷脂)、低聚果糖、聚葡萄糖、磷脂、醋酸视黄酯、胆钙化醇、dl-α-醋酸生育酚、植物甲萘酮、盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、氰钴胺、烟酰胺、叶酸、D-泛酸钙、L-抗坏血酸、D-生物素、柠檬酸钠、氯化钾、硫酸铜、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、碳酸钙、碘酸钾、亚硒酸钠、氯化胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、花生四烯酸、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-肌苷酸二钠、5'-鸟苷酸二钠)、乳铁蛋白、动物双歧杆菌乳亚种Bb-12。

生产商：黑龙江安嘉乳业有限公司

地址：黑龙江省铁力农场直二八九大街9号

产地：黑龙江省伊春市

食品生产许可证编号：SC10523300800298

营销热线：400-600-9718

曾用名：倍悦

产品标准代号：GB 10765-2021

产品类别、属性：乳基婴儿配方乳粉

保质期：24个月

批号、生产日期及保质期(至)：见罐底

检验合格证号：同批号