

变更后

348-150g-A2

营养成分表				配料表			
项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2063	矿物质			
蛋白质	g	0.50	10.3	钠	mg	8	155
脂肪	g	1.24	25.6	钾	mg	22	445
亚油酸	g	0.18	3.7	铜	μg	17.9	370
α-亚麻酸	mg	19	385	镁	mg	1.5	30
碳水化合物	g	2.6	54.4	铁	mg	0.23	4.7
维生素				锌	mg	0.20	4.1
维生素A	μg RE	27	548	锰	μg	3.30	68
维生素D	μg	0.72	14.8	钙	mg	18	362
维生素E	mg α-TE	0.56	11.5	磷	mg	10	196
维生素K ₁	μg	3.30	68	碘	μg	4.2	87
维生素B ₁	μg	30	610	氯	mg	13	260
维生素B ₂	μg	60	1228	硒	μg	1.02	21
维生素B ₆	μg	16.7	345	可选择成分			
维生素B ₁₂	μg	0.126	2.6	肌醇	mg	4.7	96
烟酸(烟酰胺)	μg	247	5100	牛磺酸	mg	1.9	39
叶酸	μg	4.7	97.3	左旋肉碱	mg	1.0	20
泛酸	μg	271	5600	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.4	90
维生素C	mg	4.7	96	二十碳五烯酸(EPA)	mg	5.8	120
生物素	μg	0.87	18	低聚半乳糖	g	0.04	0.8
胆碱	mg	12.0	248	低聚果糖	g	0.06	1.2
				1,3-二-氧-2-磷酸甘油三酯	g	0.20	4.2
				叶黄素	μg	6.11	126
				核苷酸	mg	1.2	25

100mL奶液=13g奶粉+90mL水

配料表			
脱盐乳清粉、全脂乳粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、低芥酸菜籽油、椰子油)、乳糖、低聚果糖、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、水解乳清蛋白粉、浓缩乳清蛋白粉、核桃油、花生四烯酸油脂、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠)			
维生素: 醋酸视黄酯(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-醋酸生育酚(维生素E)、植物甲萘酮(维生素K ₁)、盐酸硫胺素(维生素B ₁)、核黄素(维生素B ₂)、盐酸吡哆醇(维生素B ₆)、氰钴胺(维生素B ₁₂)、烟酰胺(烟酸)、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、L-抗坏血酸钠(维生素C)、D-生物素(生物素)、胆碱			
矿物质: 碳酸钙、磷酸三钙、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸铜、碘酸钾、硫酸镁、硫酸锰、亚硒酸钠、柠檬酸钠、柠檬酸钾、氯化钾			
本产品含有乳成分。			
 客服中心服务热线: 4008-906-566			
了解更多产品和服务资讯 请登录: www.shengyuanyuan.com.cn 登录官方网站			
 6 970598 181853			



圣元启越



1 段

净含量:150g 注册号:国食注字YP20170287

婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段)

冲调说明



准备喂哺前,请先将双手洗净。

将奶具洗净,放入清水中煮沸5分钟。

将冲调用水煮沸,凉至50°C左右。

在奶瓶中加入适量的冲调用水。

参照冲调及喂哺建议表,加入准确份量的奶粉。

盖紧瓶盖,将奶瓶在约40°C左右的水中摇晃均匀,方可喂哺。

注:冲调后应及时给宝宝喂哺。喂哺后剩余的奶液请弃掉,勿留给下次饮用。



调奶时请按照“冲调及喂哺建议表”中的比例冲调,没有医护人员建议请勿改变冲调浓度,如果奶粉冲调浓度不恰当,宝宝便得不到适当的营养。喂哺量是推荐需要量,可根据宝宝的发育情况咨询医护人员酌情增减。

冲调及喂哺建议表

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水(毫升)	奶粉(平勺)	
0~2周	60	2	7-8
2周~1个月	90	3	6-7
1~2个月	120	4	5-6
2~3个月	150	5	5-6
3~4个月	180	6	5-6
4~6个月	210	7	4-5

提示

- 调奶时请使用配套的专用量勺,一平勺奶粉量约4克。
- 喂奶时应抱着婴儿,如疏忽照顾可能会引起婴儿窒息或其他不适。
- 对于0~6月龄的婴儿最理想的食物是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

贮存条件

请放置于阴凉干燥处。用后请将开口封好,请在保质期内到期日前食用,开封后建议在一个月内用完。

产品标准号:GB 10765-2021

产品类型:婴儿配方食品



食品属性:乳基粉状

生产许可证号:SC10523010350372



生产日期、批次号、保质期到期日见罐底
生产者:哈尔滨艾倍特乳业有限公司
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区红旗满族乡
邮编:150089 曾用商品名:启越®

圣元[®]
Synutra[®]



变更前

营养成分表				营养成分表			
项目	单位	每100kJ	每100g	项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2063	矿物质			
蛋白质	g	0.50	10.3	钠	mg	8	155
脂肪	g	1.24	25.6	钾	mg	22	445
亚油酸	g	0.18	3.7	铜	μg	17.9	370
α-亚麻酸	mg	19	385	镁	mg	1.5	30
碳水化合物	g	2.6	54.4	铁	mg	0.23	4.7
维生素				锌	mg	0.20	4.1
维生素A	μg RE	27	548	锰	μg	3.30	68
维生素D	μg	0.72	14.8	钙	mg	18	362
维生素E	mg α-TE	0.56	11.5	磷	mg	10	196
维生素K ₁	μg	3.30	68	碘	μg	4.2	87
维生素B ₁	μg	30	610	氯	mg	13	260
维生素B ₂	μg	60	1228	硒	μg	1.02	21
维生素B ₆	μg	16.7	345	可选择成分			
维生素B ₁₂	μg	0.126	2.6	肌醇	mg	4.7	96
烟酸(烟酰胺)	μg	247	5100	牛磺酸	mg	1.9	39
叶酸	μg	4.7	97.3	左旋肉碱	mg	1.0	20
泛酸	μg	271	5600	二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.4	90
维生素C	mg	4.7	96	二十碳四烯酸(EPA)	mg	5.8	120
生物素	μg	0.87	18	低聚半乳糖	g	0.04	0.8
胆碱	mg	12.0	248	低聚果糖	g	0.06	1.2
				1,3-二-磷酸-甘油三酯	g	0.20	4.2
				叶黄素	μg	6.11	126
				核苷酸	mg	1.2	25

100mL奶液=13g奶粉+90mL水

配料表			
脱盐乳清粉、全脂乳粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、低芥酸菜籽油、椰子油)、乳糖、低聚果糖、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、水解乳清蛋白粉、浓缩乳清蛋白粉、核桃油、花生四烯酸油脂、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠)			
维生素: 醋酸视黄醇(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、d,l-α-生育酚(维生素E)、植物甲萘酚(维生素K ₁)、盐酸硫胺素(维生素B ₁)、核黄素(维生素B ₂)、盐酸吡哆醇(维生素B ₆)、氰钴胺(维生素B ₁₂)、烟酰胺(烟酸)、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、L-抗坏血酸钠(维生素C)、D-生物素(生物素)、胆碱			
矿物质: 碳酸钙、磷酸三钙、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸铜、碘酸钾、硫酸镁、硫酸锰、亚硒酸钠、柠檬酸钠、柠檬酸钾、氯化钾			
本产品含有乳成分。			



客服中心服务热线:
4008-906-566

了解更多产品和服务资讯
请登录: www.shengyuan.com.cn 登录官方网站



6 970598 181808



启越®



1 段

净含量:150g 注册号:国食注字YP20170287

婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段)

冲调说明



准备喂哺前,请先
将双手洗干净。



将奶具洗净,放入
清水中煮沸5分钟。



将冲调用水煮沸,
凉至50℃左右。



在奶瓶中加入适量
的冲调用水。



参照冲调及喂哺建
议表,加入准确份
量的奶粉。



盖紧瓶盖,晃动奶瓶至奶
完全溶解,待奶液温度适中,
方可喂哺。

注:冲调后应及时给宝宝喂哺。喂哺后剩余的奶液请弃掉,勿留给下次饮用。



调奶时请按照“冲调及喂哺建议表”中的比例冲调,没有医护人员建议请勿改变冲调浓度,如果奶粉冲调浓度不恰当,宝宝便得不到适当的营养。喂哺量是推荐需要量,可根据宝宝的发育情况咨询医护人员酌情增减。

冲调及喂哺建议表

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水(毫升)	奶粉(平勺)	
0~2周	60	2	7-8
2周~1个月	90	3	6-7
1~2个月	120	4	5-6
2~3个月	150	5	5-6
3~4个月	180	6	5-6
4~6个月	210	7	4-5

提示

- 调奶时请使用配套的专用量勺,一平勺奶粉量约4克。
- 喂奶时应抱着婴儿,如疏忽照顾可能会引发婴儿窒息或其他不适。
- 对于0~6月龄的婴儿最理想的食物是母乳,在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

贮存条件

请放置于阴凉干燥处。用后将开口封好,请在保质期内到期日前食用,开封后建议在一个月内用完。

产品标准号:GB 10765-2021
产品类型:婴儿配方食品
食品属性:乳基粉状
生产许可证号:SC10523010350372



生产日期、批次号、保质期到期日见罐底
生产者:哈尔滨艾倍特乳业有限公司
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区红旗满族乡
邮编:150089

圣元[®]
Synutra[®]



变更后

348-800g-A2

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2063
蛋白质	g	0.50	10.3
脂肪	g	1.24	25.6
亚油酸	g	0.18	3.7
α-亚麻酸	mg	19	385
碳水化合物	g	2.6	54.4
维 生 素			
维生素A	μg RE	27	548
维生素D	μg	0.72	14.8
维生素E	mg α-TE	0.56	11.5
维生素K ₁	μg	3.30	68
维生素B ₁	μg	30	610
维生素B ₂	μg	60	1228
维生素B ₆	μg	16.7	345
维生素B ₁₂	μg	0.126	2.6
烟酸(烟酰胺)	μg	247	5100
叶酸	μg	4.7	97.3
泛酸	μg	271	5600
维生素C	mg	4.7	96
生物素	μg	0.87	18
胆碱	mg	12.0	248
矿 物 质			
钠	mg	8	155
钾	mg	22	445
铜	μg	17.9	370
镁	mg	1.5	30
铁	mg	0.23	4.7
锌	mg	0.20	4.1
锰	μg	3.30	68
钙	mg	18	362
磷	mg	10	196
碘	μg	4.2	87
氯	mg	13	260
硒	μg	1.02	21
可 选 择 成 分			
肌醇	mg	4.7	96
牛磺酸	mg	1.9	39
左旋肉碱	mg	1.0	20
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.4	90
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	5.8	120
低聚半乳糖	g	0.04	0.8
低聚果糖	g	0.06	1.2
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.20	4.2
叶黄素	μg	6.11	126
核苷酸	mg	1.2	25

100mL奶液=13g奶粉+90mL水

配料表

脱盐乳清粉、全脂乳粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、低芥酸菜籽油、椰子油)、乳糖、低聚果糖、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、水解乳清蛋白粉、浓缩乳清蛋白粉、核桃油、花生四烯酸油脂、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠)

维生素: 醋酸视黄醇(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-醋酸生育酚(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K₁)、盐酸硫胺素(维生素B₁)、核黄素(维生素B₂)、盐酸吡哆醇(维生素B₆)、氰钴胺(维生素B₁₂)、烟酰胺(烟酸)、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、L-抗坏血酸钠(维生素C)、D-生物素(生物素)、胆碱

矿物质: 碳酸钙、磷酸三钙、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸铜、碘酸钾、硫酸镁、硫酸锰、亚硒酸钠、柠檬酸钠、柠檬酸钾、氯化钾
本产品含有乳成分。



了解更多产品和服务资讯
请登录: www.shengyu.com.cn 登录官方网站



圣元启越



净含量: 800g 注册号: 国食注字YP20170287

婴儿配方奶粉(0-6月龄, 1段)

冲调说明



准备喂哺前, 请先将双手洗干净。
将奶具洗净, 放入清水中煮沸5分钟。
将冲调用水煮沸, 凉至50°C左右。
在奶瓶中加入适量的冲调用水。
参照冲调及喂哺建议表, 加入准确份量的奶粉。
盖紧瓶盖, 摇动奶瓶至奶粉完全溶解。待奶的温度适中, 方可喂哺。

注: 冲调后应及时给宝宝喂哺。喂哺后剩余的奶液请丢弃, 勿留给下次饮用。

调奶时请按照“冲调及喂哺建议表”中的比例冲调, 没有医护人员建议请勿改变冲调浓度, 如果奶粉冲调浓度不恰当, 宝宝便得不到适当的营养。喂哺量是推荐需要量, 可根据宝宝的发育情况咨询医护人员酌情增减。

冲调及喂哺建议表

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水(毫升)	奶粉(平勺)	
0~2周	60	2	7-8
2周~1个月	90	3	6-7
1~2个月	120	4	5-6
2~3个月	150	5	5-6
3~4个月	180	6	5-6
4~6个月	210	7	4-5

提示

- 调奶时请使用配套的专用量勺, 一平勺奶粉量约4克。
- 喂奶时应抱着婴儿, 如疏忽照顾可能会引起婴儿窒息或其他不适。
- 对于0-6月龄的婴儿最理想的食物是母乳, 在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

贮存条件



请放置于阴凉干燥处。用后请将开口封好, 请在保质期到期日前食用, 开封后建议在一个月内用完。



产品标准号: GB 10765-2021
产品类型: 婴儿配方食品
食品属性: 乳基粉状
生产许可证号: SC10523010350372

生产日期、批次号、保质期到期日见罐底
生产者: 哈尔滨艾倍特乳业有限公司
地址: 黑龙江省哈尔滨市南岗区红旗满族乡
邮编: 150089 曾用商品名: 启越®

圣元[®]
Synutra[®]



变更前

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	2063
蛋白质	g	0.50	10.3
脂肪	g	1.24	25.6
亚油酸	g	0.18	3.7
α -亚麻酸	mg	19	385
碳水化合物	g	2.6	54.4

维生素

维生素A	$\mu\text{g RE}$	27	548
维生素D	μg	0.72	14.8
维生素E	$\text{mg } \alpha\text{-TE}$	0.56	11.5
维生素K ₁	μg	3.30	68
维生素B ₁	μg	30	610
维生素B ₂	μg	60	1228
维生素B ₆	μg	16.7	345
维生素B ₁₂	μg	0.126	2.6
烟酸(烟酰胺)	μg	247	5100
叶酸	μg	4.7	97.3
泛酸	μg	271	5600
维生素C	mg	4.7	96
生物素	μg	0.87	18
胆碱	mg	12.0	248

矿物质

钠	mg	8	155
钾	mg	22	445
铜	μg	17.9	370
镁	mg	1.5	30
铁	mg	0.23	4.7
锌	mg	0.20	4.1
锰	μg	3.30	68
钙	mg	18	362
磷	mg	10	196
碘	μg	4.2	87
氯	mg	13	260
硒	μg	1.02	21

可选择成分

肌醇	mg	4.7	96
牛磺酸	mg	1.9	39
左旋肉碱	mg	1.0	20
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.4	90
二十碳四烯酸(EPA)	mg	5.8	120
低聚半乳糖	g	0.04	0.8
低聚果糖	g	0.06	1.2
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.20	4.2
叶黄素	μg	6.11	126
核苷酸	mg	1.2	25

100mL奶液=13g奶粉+90mL水

配料表

脱盐乳清粉、全脂乳粉、食用植物油和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、低芥酸菜籽油、椰子油)、乳糖、低聚果糖、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、水解乳清蛋白粉、浓缩乳清蛋白粉、核桃油、花生四烯酸油脂、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠)

维生素: 醋酸视黄酯(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、d,l- α -生育酚(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K₁)、盐酸硫胺素(维生素B₁)、核黄素(维生素B₂)、盐酸吡哆醇(维生素B₆)、氰钴胺(维生素B₁₂)、烟酰胺(烟酸)、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、L-抗坏血酸钠(维生素C)、D-生物素(生物素)、胆碱

矿物质: 碳酸钙、磷酸三钙、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸铜、碘酸钾、硫酸镁、硫酸锰、亚硒酸钠、柠檬酸钠、柠檬酸钾、氯化钾
本产品含有乳成分。



客服中心服务热线:
4008-906-566

了解更多产品和服务资讯
请登录: www.shengyuan.com.cn 登录官方网站



6 970598 181747



启越®



净含量: 800g 注册号: 国食注字YP20170287

婴儿配方奶粉(0-6月龄, 1段)

冲调说明



准备喂哺前, 请先将双手洗干净。



将奶具洗净, 放入清水中煮沸5分钟。



将冲调用水煮沸, 凉至50°C左右。



在奶瓶中加入适量的冲调用水。



参照冲调及喂哺建议表, 加入准确份量的奶粉。



盖紧瓶盖, 摇动奶瓶至奶粉完全溶解。待奶的温度适中, 方可喂哺。

注: 冲调后应及时给宝宝喂哺。喂哺后剩余的奶液请弃掉, 勿留给下次饮用。



调奶时请按照“冲调及喂哺建议表”中的比例冲调, 没有医护人员建议请勿改变冲调浓度, 如果奶粉冲调浓度不恰当, 宝宝便得不到适当的营养。喂哺量是推荐需要量, 可根据宝宝的发育情况咨询医护人员酌情增减。

冲调及喂哺建议表

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水(毫升)	奶粉(平均)	
0-2周	60	2	7-8
2周-1个月	90	3	6-7
1-2个月	120	4	5-6
2-3个月	150	5	5-6
3-4个月	180	6	5-6
4-6个月	210	7	4-5

提示

- 调奶时请使用配套的专用量勺, 一平均奶粉量约4克。
- 喂奶时应抱着婴儿, 如疏忽照顾可能会引致婴儿窒息或其他不适。
- 对于0-6月龄的婴儿最理想的食品是母乳, 在母乳不足或无母乳时可食用本产品。

贮存条件

请放置于阴凉干燥处。用后请将开口封好, 请在保质期到期日前食用, 开封后建议在一个月内用完。



产品标准号: GB 10765-2021

产品类型: 婴儿配方食品

食品属性: 乳基粉状

生产许可证号: SC10523010350372

生产日期、批次号、保质期到期日见罐底

生产者: 哈尔滨艾倍特乳业有限公司

地址: 黑龙江省哈尔滨市南岗区红旗满族乡

邮编: 150089

圣元[®]
Synutra[®]



变更后

349-800g-A2

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1951
蛋白质	g	0.59	11.5
脂肪	g	1.11	21.7
亚油酸	g	0.13	2.5
α-亚麻酸	mg	17	340
碳水化合物	g	2.8	55.1
维生素			
维生素A	μg RE	31	600
维生素D	μg	0.79	15.5
维生素E	mg α-TE	0.62	12.1
维生素K ₁	μg	3.08	60
维生素B ₁	μg	31	600
维生素B ₂	μg	62	1200
维生素B ₆	μg	19.0	370
维生素B ₁₂	μg	0.113	2.2
烟酸(烟酰胺)	μg	226	4400
叶酸	μg	4.6	90
泛酸	μg	226	4400
维生素C	mg	4.8	93
生物素	μg	0.91	17.8
胆碱	mg	12.6	245
矿物质			
钠	mg	6	119
钾	mg	22	420
铜	mg	17.2	335
镁	mg	1.8	35
铁	mg	0.30	5.8
锌	mg	0.20	3.9
锰	μg	3.49	68
钙	mg	22	420
磷	mg	13	245
碘	μg	4.6	90
氯	mg	9	168
硒	μg	0.81	15.8
可选择成分			
肌醇	mg	4.8	93
牛磺酸	mg	2.0	39
左旋肉碱	mg	1.0	19
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.6	90
二十碳四烯酸(EPA)	mg	6.3	123
低聚果糖	g	0.04	0.8
低聚乳糖	g	0.06	1.2
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.18	3.5
叶黄素	μg	12.7	248
核苷酸	mg	1.0	20

100mL奶液=13g奶粉+90mL水

配料表

脱盐乳清粉、全脂乳粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、低芥酸菜籽油、椰子油)、乳糖、低聚果糖、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、水解乳清蛋白粉、浓缩乳清蛋白粉、核桃油、花生四烯酸油脂、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠)

维生素: 醋酸视黄醇(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、dl-α-醋酸生育酚(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K₁)、盐酸硫胺素(维生素B₁)、核黄素(维生素B₂)、盐酸吡哆醇(维生素B₆)、氰钴胺(维生素B₁₂)、烟酰胺(烟酸)、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、L-抗坏血酸钠(维生素C)、D-生物素(生物素)、胆碱

矿物质: 碳酸钙、磷酸三钙、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸铜、碘酸钾、硫酸镁、硫酸锰、亚硒酸钠、柠檬酸钠、柠檬酸钾
本产品含有乳成分。



了解更多产品和服务资讯
请登录: www.shengyuan.com.cn 登录官方网站



圣元启越



2段

净含量:800g 注册号:国食注字YP20170288

较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段)

冲调说明



注: 冲调后应及时给宝宝喂哺。喂哺后剩余的奶液请弃掉, 勿留给下次饮用。



调奶时请按照“冲调及喂哺建议表”中的比例冲调, 没有医护人员建议请勿改变冲调浓度, 如果奶粉冲调浓度不恰当, 宝宝便得不到适当的营养。喂哺量是推荐需要量, 可根据宝宝的发育情况咨询医护人员酌情增减。

冲调及喂哺建议表

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水(毫升)	奶粉(平勺)	
6-8个月	200	7	5
8-12个月	230	8	4

提示

- 调奶时请使用配套的专用量勺, 一平勺奶粉量约4克。
- 喂哺时应抱着婴儿。如疏忽照顾可能会引起婴儿窒息或其他不适。
- 6个月龄以上婴儿食用本产品时, 须配合添加辅食。

贮存条件



请放置于阴凉干燥处。用后请将开口封好, 请在保质期到期日前食用, 开封后建议在一个月内用完。



产品标准号: GB 10766-2021
产品类型: 较大婴儿配方食品
食品属性: 乳基粉状
生产许可证号: SC10523010350372

生产日期、批次号、保质期到期日见罐底
生产者: 哈尔滨艾倍特乳业有限公司
地址: 黑龙江省哈尔滨市南岗区红旗满族乡
邮编: 150089 曾用商品名: 启越®

圣元[®]
Synutra[®]



变更前

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1951
蛋白质	g	0.59	11.5
脂肪	g	1.11	21.7
亚油酸	g	0.13	2.5
α -亚麻酸	mg	17	340
碳水化合物	g	2.8	55.1

维生素

维生素A	$\mu\text{g RE}$	31	600
维生素D	μg	0.79	15.5
维生素E	$\text{mg } \alpha\text{-TE}$	0.62	12.1
维生素K ₁	μg	3.08	60
维生素B ₁	μg	31	600
维生素B ₂	μg	62	1200
维生素B ₆	μg	19.0	370
维生素B ₁₂	μg	0.113	2.2
烟酸(烟酰胺)	μg	226	4400
叶酸	μg	4.6	90
泛酸	μg	226	4400
维生素C	mg	4.8	93
生物素	μg	0.91	17.8
胆碱	mg	12.6	245

矿物质

钠	mg	6	119
钾	mg	22	420
铜	μg	17.2	335
镁	mg	1.8	35
铁	mg	0.30	5.8
锌	mg	0.20	3.9
锰	μg	3.49	68
钙	mg	22	420
磷	mg	13	245
氯	μg	4.6	90
碘	mg	9	168
硒	μg	0.81	15.8

可选择成分

肌醇	mg	4.8	93
牛磺酸	mg	2.0	39
左旋肉碱	mg	1.0	19
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	4.6	90
二十碳四烯酸(AARA)	mg	6.3	123
低聚半乳糖	g	0.04	0.8
低聚果糖	g	0.06	1.2
(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯)	g	0.18	3.5
叶黄素	μg	12.7	248
核苷酸	mg	1.0	20

100mL奶液=13g奶粉+90mL水

配料表

脱盐乳清粉、全脂乳粉、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、低芥酸菜籽油、椰子油)、乳糖、低聚果糖、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、水解乳清蛋白粉、浓缩乳清蛋白粉、核桃油、花生四烯酸油脂、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠)

维生素: 醋酸视黄酯(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、dl- α -醋酸生育酚(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K₁)、硫酸硫胺素(维生素B₁)、核黄素(维生素B₂)、盐酸吡哆醇(维生素B₆)、氰钴胺(维生素B₁₂)、烟酰胺(烟酸)、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、L-抗坏血酸钠(维生素C)、D-生物素(生物素)、胆碱

矿物质: 碳酸钙、磷酸三钙、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸铜、碘酸钾、硫酸镁、硫酸锰、亚硒酸钠、柠檬酸钠、柠檬酸钾
本产品含有乳成分。



客服中心服务热线:
4008-906-566

了解更多产品和服务资讯
请登录: www.shengyuan.com.cn 登录官方网站



6 970598 181754

圣元
Synutra

启越®



2段

净含量800g 注册号国食注字YP20170288

较大婴儿配方奶粉(6-12月龄, 2段)

冲调说明



准备喂哺前, 请先将双手洗干净。

将奶具洗净, 放入清水中煮沸5分钟。

将冲调用水煮沸, 凉至50°C左右。

在奶瓶中加入适量的冲调用水。

参照冲调及喂哺建议表, 加入准确份量的奶粉。

盖紧瓶盖, 摇动奶瓶至奶粉完全溶解。待奶的温度适中, 方可喂哺。

注: 冲调后应及时给宝宝喂哺。喂哺后剩余的奶液请弃掉, 勿留给下次饮用。



调奶时请按照“冲调及喂哺建议表”中的比例冲调, 没有医护人员建议请勿改变冲调浓度。如果奶粉冲调浓度不恰当, 宝宝便得不到适当的营养。喂哺量是推荐需要量, 可根据宝宝的发育情况咨询医护人员酌情增减。

冲调及喂哺建议表

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水(毫升)	奶粉(平均)	
6-8个月	200	7	5
8-12个月	230	8	4

提示

- 调奶时请使用配套的专用量勺, 一平勺奶粉量约4克。
- 喂奶时应抱着婴儿, 如疏忽照顾可能会引起婴儿窒息或其他不适。
- 6个月以上婴儿食用本产品时, 须配合添加辅助食品。

贮存条件

请放置于阴凉干燥处。用后请将开口封好, 请在保质期到期日前食用, 开封后建议在一个月内用完。

圣元
Synutra

产品标准号: GB 10766-2021
产品类型: 较大婴儿配方食品
食品属性: 乳基粉状
生产许可证号: SC10523010350372

生产日期、批次号、保质期到期日见罐底
生产者: 哈尔滨艾倍特乳业有限公司
地址: 黑龙江省哈尔滨市南岗区红旗满族乡
邮编: 150089

圣元[®]
Synutra[®]



变更后

350-800g-A2

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1932
蛋白质	g	0.64	12.4
脂肪	g	1.09	21.0
亚油酸	g	0.13	2.6
α-亚麻酸	mg	18	340
碳水化合物	g	2.8	54.6
维 生 素			
维生素A	μg RE	33	628
维生素D	μg	0.75	14.5
维生素E	mg α-TE	0.60	11.6
维生素K ₁	μg	3.00	58
维生素B ₁	μg	30	580
维生素B ₂	μg	65	1250
维生素B ₆	μg	19.6	378
维生素B ₁₂	μg	0.114	2.2
烟酸(烟酰胺)	μg	225	4340
叶酸	μg	4.7	90.6
泛酸	μg	217	4200
维生素C	mg	5.1	99
生物素	μg	0.93	18
矿 物 质			
钠	mg	6	120
钾	mg	22	418
铜	μg	17.9	345
镁	mg	1.8	35
铁	mg	0.35	6.7
锌	mg	0.20	3.8
钙	mg	22	430
磷	mg	13	250
碘	μg	4.9	93.9
氯	mg	12	225
可 选 择 成 分			
胆碱	mg	10.9	210
肌醇	mg	4.8	92
牛磺酸	mg	2.0	38
左旋肉碱	mg	1.0	19
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	2.4	46
二十碳四烯酸(AA/ARA)	mg	3.1	60
低聚半乳糖	g	0.04	0.8
低聚果糖	g	0.06	1.2
1,3-二油酸-2-硬脂酸甘油三酯	g	0.18	3.4
叶黄素	μg	12.7	245
核苷酸	mg	1.0	19

100mL奶液=13g奶粉+90mL水

配料表

全脂乳粉、脱盐乳清粉、乳糖、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、低芥酸菜籽油、椰子油)、脱脂乳粉、低聚果糖、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、水解乳清蛋白粉、核桃油、花生四烯酸油脂、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠)

维生素: 醋酸视黄醇(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、d-α-醋酸生育酚(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K₁)、盐酸硫胺素(维生素B₁)、核黄素(维生素B₂)、盐酸吡哆醇(维生素B₆)、氰钴胺(维生素B₁₂)、烟酰胺(烟酸)、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、L-抗坏血酸钠(维生素C)、D-生物素(生物素)

矿物质: 碳酸钙、磷酸三钙、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸铜、碘酸钾、硫酸镁、柠檬酸钠、柠檬酸钾
本产品含有乳成分。



了解更多产品和服务资讯
请登录: www.shengyuan.com.cn 登录官方网站



6 970598 181839



圣元启越



净含量:800g 注册号:国食注字YP20170289

幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段)

冲调说明



注: 冲调后应及时给宝宝喂哺。喂哺后剩余的奶液请弃掉, 勿留给下次饮用。

调奶时请按照“冲调及喂哺建议表”中的比例冲调, 没有医护人员建议请勿改变冲调浓度, 如果奶粉冲调浓度不恰当, 宝宝便得不到适当的营养。喂哺量是推荐需要量, 可根据宝宝的发育情况咨询医护人员酌情增减。

冲调及喂哺建议表

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水(毫升)	奶粉(平勺)	
12-24个月	200	8	3-4
24-36个月	200	8	2-3

提示

• 调奶时请使用配套的专用量勺, 一平勺奶粉量约4克。

贮存条件



请放置于阴凉干燥处。用后请将开口封好, 请在保质期到期日前食用, 开封后建议在一个月内存用。



产品标准号: GB 10767-2021
产品类型: 幼儿配方食品
食品属性: 乳基粉状
生产许可证号: SC10523010350372

生产日期、批号、保质期到期日见罐底
生产者: 哈尔滨艾倍特乳业有限公司
地址: 黑龙江省哈尔滨市南岗区红旗满族乡
邮编: 150089 曾用商品名: 启越®

圣元[®]
Synutra[®]



变更前

营养成分表

项目	单位	每100kJ	每100g
能量	kJ	100	1932
蛋白质	g	0.64	12.4
脂肪	g	1.09	21.0
亚油酸	g	0.13	2.6
α -亚麻酸	mg	18	340
碳水化合物	g	2.8	54.6

维生素			
维生素A	$\mu\text{g RE}$	33	628
维生素D	μg	0.75	14.5
维生素E	mg α -TE	0.60	11.6
维生素K ₁	μg	3.00	58
维生素B ₁	μg	30	580
维生素B ₂	μg	65	1250
维生素B ₆	μg	19.6	378
维生素B ₁₂	μg	0.114	2.2
烟酸(烟酰胺)	μg	225	4340
泛酸	μg	4.7	90.6
叶酸	μg	217	4200
维生素C	mg	5.1	99
生物素	μg	0.93	18

矿物质			
钠	mg	6	120
钾	mg	22	418
铜	μg	17.9	345
镁	mg	1.8	35
铁	mg	0.35	6.7
锌	mg	0.20	3.8
钙	mg	22	430
磷	mg	13	250
碘	μg	4.9	93.9
氟	mg	12	225

可选择成分			
胆碱	mg	10.9	210
肌醇	mg	4.8	92
牛磺酸	mg	2.0	38
左旋肉碱	mg	1.0	19
二十二碳六烯酸(DHA)	mg	2.4	46
二十碳四烯酸(EPA)	mg	3.1	60
低聚半乳糖	g	0.04	0.8
低聚果糖	g	0.06	1.2
1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯	g	0.18	3.4
叶黄素	μg	12.7	245
核苷酸	mg	1.0	19

100mL奶液=13g奶粉+90mL水

配料表

全脂乳粉、脱盐乳清粉、乳糖、食用植物调和油(1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯、葵花籽油、低芥酸菜籽油、椰子油)、脱脂乳粉、低聚果糖、低聚半乳糖、乳清蛋白粉、水解乳清蛋白粉、核桃油、花生四烯酸油脂、二十二碳六烯酸油脂(发酵法)、胆碱、肌醇、牛磺酸、左旋肉碱、叶黄素、核苷酸(5'-胞苷酸二钠、5'-尿苷酸二钠、5'-单磷酸腺苷、5'-鸟苷酸二钠、5'-肌苷酸二钠)

维生素: 醋酸视黄酯(维生素A)、胆钙化醇(维生素D)、dl- α -醋酸生育酚(维生素E)、植物甲萘醌(维生素K₁)、盐酸硫胺素(维生素B₁)、核黄素(维生素B₂)、盐酸吡哆醇(维生素B₆)、氰钴胺(维生素B₁₂)、烟酰胺(烟酸)、叶酸、D-泛酸钙(泛酸)、L-抗坏血酸钠(维生素C)、D-生物素(生物素)

矿物质: 碳酸钙、磷酸三钙、焦磷酸铁、硫酸锌、硫酸铜、碘酸钾、硫酸镁、柠檬酸钠、柠檬酸钾

本产品含有乳成分。



客服中心服务热线:

4008-906-566

了解更多产品和服务资讯

请登录: www.shengyuan.com.cn 登录官方旗舰店



6 970598 181761

圣元
Synutra

启越®

净含量:800g 注册号:国食注字YP20170289

幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段)

冲调说明



准备喂哺前,请先将双手洗干净。



将奶具洗净,放入清水中煮沸5分钟。



将冲调用水煮沸,凉至50°C左右。



在奶瓶中加入适量的冲调用水。



参照冲调及喂哺建议表,加入准确份量的奶粉。



盖紧瓶盖,摇动奶瓶至奶粉完全溶解。待奶的温度适中,方可喂哺。

注:冲调后应及时给宝宝喂哺。喂哺后剩余的奶液请弃掉,勿留给下次饮用。



调奶时请按照“冲调及喂哺建议表”中的比例冲调,没有医护人员建议请勿改变冲调浓度,如果奶粉冲调浓度不恰当,宝宝便得不到适当的营养。喂哺量是推荐需要量,可根据宝宝的发育情况咨询医护人员酌情增减。

冲调及喂哺建议表

月龄	每次喂哺量		每日喂哺次数
	温开水(毫升)	奶粉(平勺)	
12-24个月	200	8	3-4
24-36个月	200	8	2-3

提示

•调奶时请使用配套的专用量勺,一平勺奶粉量约4克。

贮存条件

请放置于阴凉干燥处。用后请将开口封好,请在保质期到期日前食用,开封后建议在一个月内用完。

圣元
Synutra

产品标准号: GB 10767-2021

产品类型: 幼儿配方食品

食品属性: 乳基粉状

生产许可证号: SC10523010350372

生产日期、批次号、保质期到期日见罐底

生产者: 哈尔滨艾倍特乳业有限公司

地址: 黑龙江省哈尔滨市南岗区红旗满族乡

邮编: 150089

圣元[®]
Synutra[®]

